






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CFMAGL 1.7.251 vol.2





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
CFMAGL 1.7.251 vol.2













1.7.251/1





CASPARI BAUHINI

Viri Clariss.

Π Ι Ν Α Ε

THEATRI
BOTANICI

^{sive}
I N D E X

IN THEOPHRASTI DIOSCORIDIS

PLINII ET BOTANICORVM

qui à seculo scripserunt

O P E R A

PLANTARVM CIRCA SEX MILLIVM

AB IPSIS EXHIBITARVM

N O M I N A

cum earundem Synonymijs & differentijs

methodice

secundum genera & species proponens.

OPVS XL ANNORVM

summo opere expetitum

ad Autoris autographum recensitum.



BASILEÆ

IMPENSIS JOANNIS REGIS

clō lōc LXXI.

CASPARI PLANTIN
PLINAE
THEATRI
BOTANICI
IN THEOPHASTI DISCORDIA
PLINII ET BOTANICORVM
PLANTARVM CIRCITER SEX MILLIVM
AD 1832 EXHIBITARVM
MONTANA
Cum enchyridionem seminum et fructuum
et aliorum plantarum quae in
OVS XI ANONYMVM



PLINIAE
THEOPHASTI DISCORDIA
PLINII ET BOTANICORVM

1832



LECTORI BENEVOLO.



Peris hujus Autor, Galeni Præceptoris scripta legens, singulari fato, in hunc locum ipsius, qui tertio de Compositione Medicamentorum *καὶ τὰ γένη* habetur, incidit. Quisquis (inquit) auxiliorum undique copiam habere volet, omnis materiæ, stirpium, animalium & metallorum, tum aliorum terrestrium corporum, quæ ad Medicinæ usum ducimus, expertus esto; ut ex eis & exacta & notha cognoscat. Deinde, in Commentario, quem de Simplicium Medicamentorum facultate prodidi, sese exerceat. Nisi enim hoc modo instructus, ad præsentis operis præsidia veniat, verbotenus quidem medendi methodum sciet, opus vero nullum ipsa dignum perficiet. Qua sententia permotus, præter cæteras Medicinæ partes necessarias, ad Botanica, quæ auxilia medica subministrant, animum studiumque convertit: ea qua fieri potuit diligentia, non solum Botanographos, tanquam mutos præceptores, legendo & relegendo sedulo consuluit: verum etiam vivos in Germania, Gallia & Italia, per aliquot annos peregrinando, varijs in Academijs coram attente audivit, de Plantarum historia, nominibus viribusque studiose inquisivit: & quod præcipuum erat, Plantas locis natalibus inspiciendo, nullis molestijs, nullus laboribus nullisque sumptibus pepercit, imitatus Dioscoridis & Galeni exempla. Verum & ipsas Plantas cum autoribus contulit, qua fieri potuit industria, quo genio & ingenio, lectas, exsiccatas asservavit, ut ingentem earum thesaurum aliquot millium, præter fructus, semina, ligna, &c. collegerit.

)(2

Nec

Nec his contentus, ad veriolem & certiolem cognitionem, plures Medicinæ studiosos, Galliam, Italiam, aliasque regiones adeuntes, rogavit, ut omnis generis Plantas, etiam vulgarissimas (ipsa quoque Gramina & Trifolia,) colligerent & transmitterent. Quod quia liberaliter ab ipsis factum, eorum nomina gratitudinis ergo, peculiari Catalogo consignata adunxit. Insuper, hinc inde, literis ad plurimos Viros Clarissimos, rei plantariæ peritos, Germaniæ, Galliæ, Italiæ, Angliæ, Daniæ, Belgij, Cretæ in Græcia, sollicitare non destitit, ut plantas transmitterent, vel de illis suam sententiam, in bonum publicum exponerent: idque à multis, pro-na benignaque mente abunde factum, grato animo agnovit, ipsorumque honorificam mentionem fecit. Nihil autem eorum, quæ studiosis in hoc disciplinæ genere, (uti & in alijs,) utile fore existimavit, intentatum reliquit. Eos frequenter, ad Vegetabilium inspectionem & cognitionem manuduxit. Varijs utilissimis scriptis, in publicum editis, Plantarum studium illustravit & auxit. Verum cum, quæ terra, entium horum beneficentissima parens, sinu suo complectitur *φύλα*, ad infinitum pene numerum accedant, sicque huic studio difficultas inde maxima oriatur: auctorum quoque dissensus, atque *ἀμεθοδία*, hancce *ἀνισοκρίαν* augeat & exaggeret, hæc ne ab hac amœnissima, humanoque generi à utilissima contemplatione, quemquam absterreant, de methodo Plantarumque Synonymijs cogitavit; quæ ambo in hunc *ΠΙΝΑΚΑ* contulit, Plantarum hocce *μεθόδῳ καὶ συνωνύμων σύνταγμα* concinnans: in quo ex methodice, secundum genera & species, habita potissimum ratione formæ externæ, distributæ habentur. Pro ea autem qua fuit æquitate & modestia, aliorum labores benigne interpretatus, suum cuique religiose tribuit, paremque benevolentiam ab alijs speravit, omnes hujus studij cultores & assecclas, rogavit, ut, si animadverterent se (quod non dubitet, sed ultro fateatur) alicubi lapsum esse, vel forte bis eandem Plantam reperisse, hujus studij immensitatem cogitent, quod fere Oceano simile dici possit. Nam, quemadmodum DEI in Oceano miracula

P R A E F A T I O.

cula imperscrutabilia sunt: sic etiam Botanicum studium infinitum: imprimis, cum indies movæ Plantæ, tum alibi, tum in Indijs reperiantur. Paratus bene monentes audire, candide & amice monentibus gratias agere. Zoilum nunquam curandum putavit, cujus socij neque nunc attendendi: qui postquam hoc opere usi sunt, sine quo nunquam in studio Botanico progredi potuissent, convicijs illud impetunt, & filum, quo via ipsis per labyrinthi mæandros facta, turpiter dilacerare & conspurcare tentant. Sed hæc est sciolorum & maleficatorum natura, qua solent melioribus obrectare magis, quam laude dignum quicquam præstare: hac ratione potius suam prodentes invidiam & malevolentiam, quam ut virorum bonorum & bene meritum famam obscurare possint. Editio autem hæc recensita est ad Autoris autographum: quicquid à priori mutatum, ipsius manu factum. Utere ergo, BENEVOLE LECTOR, aliorum laboribus ad DEI LAUDEM, in commodum tuum, & typographica errata operantium infirmitati condona.





ZACHARIAS ROSENBACHIUS,
Medic. Doct. & Professor in Illustri Schola Herbornensi, Corollario
de methodo Plantarum, in Indice Plantar. Herbornæ
Naffoviorum 1626. edito.



Rerum naturalium perfecte mixtarum tanta per Orbem terrarum ac maria diversitas est, ut eas omnes cognoscere, & in certas classes disponere, uni homini sit plane impossibile. Unus enim homo vix unam speciem, v. gr. pisces, vel aves, licet illi per totam suam vitam, mane & vesperi, noctu & inter diu, jugiter operam det, plene cognoscet. Inveniunt tamen viri, qui heroico animo præditi, nullis sumptibus laboribusq; parcentes, ad quarundam specierum plenariam fere cognitionem pervenerunt, ut opera eorum satis testantur, &c. Sola res herbaria hucusq; imperfecte ac sine certa methodo, tradita fuit. Quamvis enim de illa plurimi, tum veteres, tum recentiores scripserint, omnes tamen, vel paucissimas plantas proposuerunt, vel plures etiam ita permiscuerunt, ut nullus in eis stabilis ordo appareat. Unus CASPARIUS BAYHINVS, circiter sex millia plantarum primus proposuit, easq; omnes mirabili ordine, in Pinace theatri sui Botanici, digessit. Sentient nobiscum in hoc, quicumque vel mediocriter in re herbaria versati sunt. Tanto magis autem præceptorem etiam illum nostrum secuti sumus, quia omnes ejus plantas, seu hortum siccum, non semel, sed bis ac ter, non sine magna admiratione, ipsi spectavimus. Nec credimus, in tanta plantarum varietate, meliorem ordinem unquam à quoquam adeò facile inveniri posse. Incipit enim ab herbis tritissimis, ut graminibus, progreditur per fruges, olera, & legumina, donec tandem ad frutices

frutices & arbores perveniat, hoc perpetuo observando, ut plantas, sibi quoad externam formam maxime, vel viribus etiam internis, similes, pulcherrimis numeris jungat, dissimiles, libris, sectionibus ac titulis diversis, elegantissime distinguat. Caterum, miretur forte junior aliquis, cur princeps ille Botanicorum, cui palmam hac in re merito tribuimus, hunc Pinacem suum, opus XL. annorum, inscripserit, cum tamen liber parvus videatur, & multi sint, qui etiam uno anno magnum volumen scribant ac publicent. Verum non librorum quantitas, sed qualitas potius spectari debet. Sic qui Pinacem hunc legeri ac intellexerit, mirabitur, quomodo Autor Bauhinus eum tam cito absolvere potuerit. Est enim revera omnium herbarum, suffruticum, fruticum & arborum, quae in hortis, agris, pratis, vallibus, montibus, sylvis, littoribus, & aquis totius terrarum Orbis nascuntur, absolutissimum compendium. Hujusmodi libri facilius quidem oculis inspiciuntur ac describuntur, at materias singulas è remotissimis locis conquirere, methodice digerere, multis nova eaq; aptissima nomina imponere, easdem ad vivum describere, pingere, doctorum virorum judicijs subicere, ac posteritatis memoria, cum centuplo fructu tradere, hoc vero opus, hic labor est, quem non noverunt nisi experti, & pluribus annis plurimum exercitati. Praestat paucis verbis multa, quam multis pauca, vel nihil omnino dicere.



Gramen adest Bulbusq;, Olus atq; Umbella, Venenum,
Atque Corona, Odor & Flos est, vescumque Legumen,
Carduus in spinis, Frutex succedit & Arbor.

F. M.

Ad




Ad
CASPARUM BAUHINUM
ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ.

I.



*U*l potius nectant benè olentia ferta Napæ,
BAUHINE, quàm tibi, cedo?
Nulle etenim herbarum, plantarum nomina mille
Collecta fasce uno doces.
Tot grates debent, quod habent ridentia plantas
Herbasq; prata & frutices.
Cui potius violas, Junonia lilia, cuinam
Nilesias spargant rosas?
Floreat & viget nomen, BAUHINE, perenne
Tibi, dum rose & flores erunt.
Assyriosq; Tibi ad cippum post fata Napæ
Fundant odores perpetim.

GEORGIUS REMVS, J. C.
Noricus.



II.

*L*ITTORA tot Ponti, tot campos visere & Hortos
Desine, tot Sylvas, tot prata, totq; rupes.
Hec loca quod Stirpes, totus quos proferat Orbis,
BAUHINI scriptis conspice in Eiconicis.

PASCHALIS LE COQ, MED. apud Picta-
vieneses Decanus & Senior.

III. DE

AUTHORUM.

tis, cadaveris servandi vim habentibus. Ibidem.
PETRI Crescentij Bononiensis de agricul-
 turæ partibus, plantarum & animalium natura
 & utilitate lib. 12. ante annos ducentos scripti.
 Basileæ 148. cum paucis figuris.

PETRI Pavvii horti publici Academię Lug-
 dunobatavæ præsidis, ichnographia, descri-
 ptio, usus, & stirpium quas habet nomina. Lei-
 dæ 1607. in 8.

PETRUS Pena, vide Adversaria.

PH LIPPUS Pigafetta regni Congiani hi-
 storiam scripsit, quæ cum Indicis historiis edita.

POMPEIUS Spreccchis, Antabstinthium Cla-
 venæ, cum figura Absinthij umbelliferi. Vene-
 tijs 1611. 4.

PROSPER ALPINUS, sextus horti Pata-
 vini præfectus, de Balsamo dialogum, ejus fi-
 gura addita, scripsit. Venetijs 1591. 4.

Ejusdem de plantis Ægypti liber, cum figu-
 ris 46. & cum Medicina Ægyptiorum. Vene-
 tijs 1592. 4.

Ejusdem de Rhapontico, cum ejusdem figu-
 ra. Patavij 1612. 4.

Q. APOLLINARIS liber experimentorum
 Germanicæ sæpius editus cum 141. figuris. Ar-
 gentinæ 1589. 8.

REMBERTI Dodonęi Stirpium histor. Bel-
 gicæ scripta, & à Clusio Gallicè reddita (vide
 Clusium) cum iconibus, quæ seorsim duobus to-
 mis in octavo prodierunt. Antverpiæ 1553. & 1559.
 Icones numero 240. cum annotationibus.

Ejusdem frugum historia, anno 1552. Latinè,
 Antverpiæ cusa & recusa in 8.

Ejusdem florum & purgantium historia seor-

sim cum novis figuris edita, in 8. Eadem simul
 juncta in libros triginta divisa. Antverpiæ an-
 no 1583. in folio, cum 1305. figuris. Hæc historia
 denuo recusa Belgicè, cum cujusdam annotatio-
 nibus prolixis, additis adhuc 36. novis figuris
 anno 1608. Latinè similiter ab authore emacu-
 lata paucis mutatis, & figuris quæ in Belgica
 editione habentur, cum descriptione additis,
 anno 1616. prodijt.

SIMONIS Januensis Clavis sanationis ob-
 scuriora vocabula ordine Alphabetico expo-
 nens. Venetijs 1486. fol. cum Sylvatico recusa.

TARQUINIUS Ocyori Dormundani, de vi-
 ginti radicibus adversus pestem probatis, cum
 earundem plantarum figuris, Germanicè cum
 Q. Apollinaris libello.

THEOPHRASTI Græci de historia & de
 causis plantarum, editio Græca Veneta 1552. 8.
 Basileensis, 1541. 4. & Gazæ versio Lugduni 1552.
 8. cum Joannis Jordani correctione.

THOBIAE Roelsij Medici Medioburgensis
 epistolæ ad Clusium: cum historia Clusij editæ.

THOMAS Harior Insulam Virgineam de-
 scripsit: Clusius Latinè reddidit, est prima pars
 Ind. Occidentalis.

VALERII Cordi in Dioscoridem anno-
 tationes.

Ejusdem lib. 4. de stirpium historia, cum fi-
 guris 272. ex Trago & aliquot novis à Gesnero
 additis.

Ejusdem Sylva observationum, quæ omnia
 simul, Gesnero curante, Argentinæ 1561. in fol.
 edita.

Ejusdem dispensatorium sæpius recusum.



))))

NOMI-



NOMINA EORUM QUI PLANTAS

VEL SEMINA COMMUNICARUNT.

- A** Clarius, Medicus Alsterodamensis.
Angelus Busti dictus Vidua, Medicus Venetus.
Arnoldus Gillenius, Ducis Megapolitani Medicus.
Basilus Beslerus, Pharmacop. Norinberg.
Bernhardus Paludanus, Medicus Enchusanus.
Casparus Barrolinus, Hassniae Medicinæ Professor.
Casparus Hoffmannus, Altorfij Medicinæ Professor.
Casparus Weckerlinus, Medic. Argent.
David Vasmarius, Lubecensis medicus.
Daniel Loritius, Ducis Wirtenberg. Med.
Everhardus Vorstius, Lugd. Batavorum Medicinæ Profell.
Fabius Columna, I.C. Lynceus.
Ferrandes Imperatus, Pharmacop. Neapolitan.
Franciscus Pona, Medicus Veronenfis.
Fridericus Meyer, Argentin. p.m.
Fridericus Monavius Med.D.
Georgius Fuere, Medicus Hafnienfis.
Georgius Rumbaum, Med. Uraislav.
Georgius Spörlinus Basil Med. Candid.
Gregorius de Regio Capuccinus.
Henricus Heyl, Medicus Dantiscan.
Hermannus Hagius, Medicus Arnheimi.
Hieronymus Vischerus, Med. Norinberg.
Honorius Belli Vicentinus, Medic. Cretenfis.
Jacobus Albinus, Medicus Hamburg.
Jacobus Antonius Cortusius, quintus Patavini horti præfectus.
Jacobus Cargillus, Medicus in Scotia.
Jacobus Guillemi Hooft Amstelredam.
Jacobus Hagenbachius, Medicus Basil.
Jacobus Zuingerus p.m. Medicus Basil.
Joachimus Burferus, Medicus Annæbergenfis.
Joan. ab Alen, pharmacop. Bremenfis.
Joan. Anatolius Privæus, Medicus Vefuntinus.
Joan. Backmeisterus, Professor Rostochienfis.
Joan. Bauhinus, frater p.m. Archiater Wirtenbergicus.
Joan. Fleisserus, Uraisl. Medicus.
Joan. Francus senior, Medicus Camicenfis.
Joan. Carolus Rosenberger, Poliater Wornat.
Joan. Henricus Cherlerus p.m. Med. Basil.
Jo. Henricus Richinerus p.m. Med. Basil.
Joan. Dortmannus, Pharmacop. Gruningenfis.
Joan. Neudorffer, Medicus Norinbergenf.
Joan. Pona, Pharmacop. Veronenfis.
Joan. Prevotius, Med. Professor & horti Patavini septimus præfectus.
Joann. Rudolphus Saltzman, Poliater & Med. professor Argentinæ.
Joan. Sigfridus, Helmstadi Medic. Professor.
Joan. Terentius ex societ. Jesu, qui ex India plantas misit.
Joan. Michael Wolffhardus, Med. Rotebur.
Laurent. Rosenau, Pharmacop. Lineburgenfis.
Laurentius Scholtzius senior p.m. Med. Uraislav.
Leonhard. Doldius p.m. Medicus Norinberg.
Lucas Justus, Basil. Ducis Bipont. Medicus.
Ludovicus Fûrer, Senator Northufanus.
Ludovicus Jûngermannus, Professor Giessanus.
Matthias de Lobel p.m. Botanographus.
Matthæus Lister, Londinenfis Medicus.
Nicolaus Agerius, Physices Profess. Argent.
Nicolaus Contarenus, Senator Venetus.
Olaus Worm. Doctor & Professor Hassniae.
Paschalis le Coq, Pictaviensis, Med. & Profess.
Philip. Steph. Sprenger p.m. Pharmacop. Heidelb.
Prosper Alpinus, Profes. & horti Patavini sextus præfectus.
Samuel Sattler, Ducis Brunsvic. Medicus.
Thomas Platerus, Basil. D. & Professor.
Vespasianus Robinus, qui Lutetia hortum exoticis plantis instructissimum habet, & à quo plura expectamus.

EXPLI-

EXPLICATIO NOMINUM

Authorum citatorum.

A COSTA Cristophorus.
 Actuar. Actuarius.
 Ad. Adversaria Penæ.
 Aegin. Aegineta.
 Aet. Actius.
 Agric. Georgius Agricola.
 Aldroan. Ulysses Aldroandus.
 Alp. Alpi. Alpin. Alpinus.
 Ama. Amarus.
 Ang. Anguillara.
 Apul. Apuleius.
 Arist. Aristoteles.
 Athenæ. Athenæus.
 Avic. Avicen. Avicenna.
 Barbosa Odoardus.
 Belli Honorius Belli.
 Bellon. Bellonius.
 Bell. obs. Belloni observationes.
 Bell. cult. de cultura neglecta.
 Bentz. Hieronymus Bentzo.
 Bot. Franc. Botanologicum Francofordianum.
 Bras. Brassav. Brassavolus.
 Bry. du Bry. Florilegium de Bry.
 Brunf. Brunfelsius in folio.
 Brunf. 4. editione in 4.
 Brunf. ico. quoad iconem.
 Brunf. def. quoad descriptionem.
 Busbeq. Augerius Busbequius.
 Cadamust. Aloysius Cadamustus.
 Cæs. Cæsalpinus.
 Cam. Camer. Camerarius in horto.
 Cam. ep. & hor. Camerarius in epitome Matthioli & suo horto.
 Cam. ad Matth. Camerarius in Matthiolo à se emaculato.
 Cam. fig. hort. Camerarius in figuris horto suo additis.
 Carate Augustinus.
 Carda. Cardanus de variet. rerum.
 Car. Carolus Stephanus.
 Cast. Castor Durantes.
 Cast. ap. in Appendice.

Cast. ico. secundum iconem, non descriptionem.
 Cast. def. Secundum descriptionem, non iconem: idem apud alios intelligas.
 Cat. Altorff. Catalogus Altorffensis.
 Cato. Marcus Cato.
 Cels. Cornelius Celsus.
 du Choul. Johannes du Choul.
 Cieca. Petrus de Cieca.
 Claven. Clavenna pharmacopœus.
 Cl. h. Clusius historia rariorum.
 Clus. hist. def. ico. historia rarior: descriptione, vel icone.
 Clus. pan. historia Pannonica.
 Clus. hisp. historia Hispanica.
 Clus. ex. exot. historia exoticarum.
 Clus. ap. appendice ad historiam rariorum: ap. alt. auct. appendicis alterius auctario.
 Clus. cur. post. in curis posterioribus.
 Clus. in corol. in corollario ad Dodonæi editionem Gallicam.
 Clus. in Garz. in Mon. Clusius notis suis in Garziam, in Monardem.
 Cod. Cæs. Codex Cæsarius à Dodonæo sæpè citatus.
 Col. & Colum. ubi in frugum historia occurrit, Columella intelligas.
 Col. Colum. Fabius Columna.
 Contareus Nicolaus.
 Cord. in Dios. Cordus notis in Dioscoridem.
 Cord. hist. in sua plantarum historia.
 Cord. obs. in sylva observationum.
 Cord. schol. Cordi scholiasfes qui Æmilii censetur.
 Cord. in disp. in dispensatorio.
 Corn. Janus Cornarus.
 Cortesius Ferdinandus.
 Cortusius Jacob. Antonius.
 Cost. in Mes. Costæus in Mesuem.
 Costin. Nicolaus Costinus.
 Dal. Dalechampius.
 Dal. in Plin. notis ad Plinium.

)()(2

Dalech.

EXPLI-

EXPLICATIO NOMINUM

Dalech. in Diof. figuris additis ad Dioscoridem Ruellianum.	Hipp. Hippocrates.
Dalech. Lugd. in historia univerſali Lugduni edita.	Hon. Belli Honorius Belli in epiftolis ad Cluſium.
Dioſc. Dioſcorides.	Imper. Ferrandes Imperatus in ſua hiſt. naturali.
Dod. Dodonæus editione Latina in folio.	Ind occ. Indiæ Occidentalis hiſtoria.
Dod. gal. Dodonæus in editione gallica Cluſij.	Ind. or. Ind. Orientalis hiſtoria.
Dod. ut. Dodonæus in utraque tam Gallica quam Latina editione.	Joſephus Acoſta in hiſt. Indiæ.
Dod. ed. belg. editione Belgica & poſtrema.	Lac. Lacun. And. Lacuna.
Dod. fl. in hiſtoria ſorum in octavo cuſa.	Lang. Johannes Langius.
Durantes Caſtor.	Lem. Levinus Lemnius.
Duretus Claudius.	Leon. Nicolaus Leoniceus.
Encelius Chriſtophorus.	Lerius in deſcript. Braſiliæ.
Eyſt. Eyſtet. hortus Eyſtettensis.	Linc. Linſcot. Linſcotus in hiſtor. Indiæ orientalis.
Eric. & Val. Cord. Eriſius & Valerius Cordus, pater & filius.	Lob. Lobelius in Obſervat.
Fallop. Gabriel Fallopius.	Lob. ob. Idem.
Fabric. Georgius.	Lob. ad par. alt. in Adverſariorum parte altera.
Frag. Fragofus.	Lob. Belg. editione lingua Belgica.
Fracaſt. Fracaſtorius.	Lob. ico. in Iconibus ſeparatim editis.
Franc. Francus in horto Luſatiæ.	Lob. pharm. Rond. pharmacîa Rondeletij reſtituta.
Fuch. Fuchſius in hiſtoria Latina in folio.	Lon. Adamus Lonicerus.
Fuch. ico. in iconibus ſeorſim editis.	Lud. Rom. Ludovicus Romanus.
Fuch. comp. de compoſitione medicamentorum.	Lugd. Hiſtoria generalis Lugduni cuſa.
Gal. Galenus.	Manard. Johan. Manardus.
Gaza in verſione Theophraſti.	Marcel. Marcellus Virgilius.
Gar. Garzias ab Orto.	Marogna. Nicolaus Maronæus Veronenſis.
Ger. Johannes Gerardus Anglus.	Matth. Matt. Matthiolus.
Gef. h. hort. Gefnerus in libro de hortis Germaniæ: hor. ap. in appendice huius libri de hortis.	Matth. comp. Matthioli compendium in 4.
Gef. lun. libello de herbis noctu lucentibus.	Matth. Ital. Matthioli editio lingua Italica cum magnis figuris, folio.
Gef. fra. in deſcriptione montis fraſti.	Matth. ico. ſi iconem perpendas.
Gef. col. in libello de collectione ſtirpium.	Mycon. Myconus hic à Lugdun. citatur.
Gef. ſof. de foſſilibus.	Myrepſ. Nicolaus Myrepius.
Gef. cat. in plantarum Catalogo quadrilingui.	Monach. Mef. Monachi in Meſuem.
Gef. ad Cord. in corollario hiſtoriæ Cordi addito.	Monard. Nicol. Monardes.
Gef. in epift. in epiftolis ſuis.	Mund. Mundel. A. oyſius Mundella.
Gomara Franciſcus.	Nicander in Theriacis & Alexipharmacis.
Guil. Guilandinus in Theone.	Ovied. Ferdinandus Oviedus.
Guil. the. in Theone.	Oribaf. Oribafius Græcus.
Guil. pap. in commentario in Plinij capita de Papyro.	Pallad. Palladius.
Hariot in deſcriptione inſulæ Virgineæ.	Palud. Bernhardus Paludanus notis in Linſcottum.
Hermol. Hermolaus Barbarus in corol. ad Dioſcorid.	Pandeſt. Pandeſtarius.
	Pena. Petrus Pena in Adverſarijs.
	Phytopin. Phytopinax C. Bauhini.
	Pigafet. Pigafetta in deſcript. regni Congiani.
	Plin. Plinius.

Pon.

AUTHORUM CITATORUM.

Pon. Johannes Pona edit. Latina.	Schvvenck. Casparus Schvvenckfeldius.
Pon. Ital. editione Italica montis Baldi.	Serap. Serapio Arabs.
Portæ. Jo. Baptista Portus in sua villa.	Sethi. Simeon Sethi Græcus.
Prod. Prodromus C. Bauhini.	Solinand. Solinander in consilijs.
Quad. Euangelista Quadramius.	Stad. Stadius in Brasiliæ descriptione.
Rauvv. Leonhardus Rauvvolfius.	Svv. Svve. Svver. Svvertius.
Reg. Gregorius de Regio Capuccinus.	Tab. Taber. Tabernæmontanus. edit. folio.
Richer. Richerius de Belleval, Botanicus Mon-	Tab. ico. in iconibus separatim culis.
speliensis.	Th. Thal. Johannes Thalius.
Röf. Eucharius Röslin.	Thever. Andreas Thevetus.
Rob. Joan. Robinus.	Tovar. Simon Tovar, Hispalensis Medicus.
Rondel. Rondeletius in sua praxi.	Trag. Hieronymus Tragus.
Ruel. Joan. Ruellius.	Tur. Guilielmus Turnerus.
Scalig. Scaliger in subtilitatibus.	Valeran. Valerandus Donreus Pharmacopœus.
Scalig. in Arist. in Aristotelem de plantis.	Vercell. Franciscus Vercellenfis.





AD AVTHOREM

HERMANNUS van der Haghen / BELGA

Illust. Principis Auriaci & Reipubl. Arnemiensis
in Geldria Med. ord.



*AVHINE Aonidum decus immortale sororum,
Quas aeterna tui laudes monumenta merentur
Ingenij, tum quanta tuis, qua nuper in auras
Doctorem manibus passim vulgata teruntur,
Gratia debetur cæptis, non prenderit acri
Mente, aut facundo quis digno expresserit ore.*

*Non si Thebanus veniat rediivus ab Orco
Maximus, aut vates Itala telluris alumnus,
Atq; his Meonides socium se adjunxerit ipse.
Tam dotes animi varia, tam multa relucet
Omnibus in scriptis virtus præstantia tanta,
Non modò ut æquales Medicorum scita sequuti,
Seu vivam licuit vocem exaudire docentis,
Seu scriptos oculis tantum evoluisse labores,
Dicere nil dubitent, se terq; quaterq; beatos:
Verùm etiam seri post secula longa nepotes,
Egregias memori solvent tibi pectore grates.*

*Quis genera herbarum seclis ignota priorum
Et fruticum plura & florum quis prodidit unus?
Quæ dum sollicito nemorosos lumine saltus,
Dum sylvas, montesq; feros vallesq; reductas
Scrutaris, monstrante DEO, & tua Vota juvante,
Eruiis atq; oculis pulchrè spectanda dedisti:*

Gallia

VII
Gallia quicquid habet, quicquid Germania, quicquid
Hesperia latis virgulti finibus extat,
Marte tuo doctis viva sub imagine chartis
Cernere cuiq; licet descriptum clare BAHINE.
Prætereo quæ missa tibi non obvia nostris
Multa locis libri concludis fasce sub uno.

Ergo Dioscorides ne tanta præmia laudis
Prima ferat, ne Matthiolus sibi proxima poscat,
Efficis, unus habes & prima & deinde secunda.
Magnanimi sileant, qui vix dum singula Reges
Invenere, suos fastus & nomina ponant.

Quid memorem innumeros, cum morbis ægra trahebant
Corpora, vicinæ tua quos solertia morti
Eripuit, miserisq; dedit producere vitam.
Ut Dis non falso raptos è faucibus artis
Arte tua sibi sexcentos perijisse queratur.

Nec minor incisos humani ob corporis artus
Gloria percrebuit: qua dexteritate nec ulli
Priscorum, nostri nec cuiquam cesseris ævi.

Multa Tibi forsân videor dixisse BAHINE
Vix tamen hæc fuerint fastigia summa tuarum
Virtutum Ingenij: at prohibet pudor addere plura.



DE VTILITATE HVJVS OPERIS
ANDREÆ LIBAVII D. & P. L.

Carmen.



Ut causas vires propria & discrimina rerum,
Primi exercitijs exposuere suis.
Inventis seros magnis iuvare nepotes,
Et cura populis consulere bona.
Scilicet his ducibus ludentibus optima ceptum est
Discerni & membris utiliora sequi.
Quin etiam si quid natum foret intus acerbi,
Sive parum cauti esset oborta lues:
Quarere praesidium morbumq; evellere membris
Hinc soliti, poterant se reperare sibi.
Idq; via facili. Nam nomine cognita quaeq;
Forma animis solita se exhibuere diu.
Improbior donec successit patribus aetas
Contemtrixq; boni Gens, populumq; ferox.
Hinc rabieg; furens & martia castra secutus
Rerum confudit notitiam atq; nota.
Artibus hinc subtracta fides, viresq; negata
Esse sub his, primi quas docuere senes.
Postera gens igitur sinxit nova nomina, resq;
Spectatas alio protulit inde sono.
Tu quoq; livor iners multum mutare solebas,
Atq; peregrinis fingere verba notis.
Scilicet ut raperes soli tibi turpiter usum
Naturae, medicae notitiamq; rei.
Sed tandem superavit amor studiumq; juvandi:
Et cessit rabies invidiosa bono.
Milliaq; in summam collecta vocabula, quae res
Signentur passim spe meliora monent.
Quicumq; ergo vagis erras autoribus, atq;
Ambiguis traberis per dubitanda vijs.
Huc propera: menti curas denturus inanes:
Hic Ariadnae fila laboris habes.
Magnus praenonj Heros BAYHINVS in ausis
Errantes certo dirigit orbe pedes.
Ille laborifer praclarus in agmine Phæbi
Herbarum titulos ut bona legit apus:
Inq; unum congestit opus, quod discere promptè
Posui, quas habeat qualibet herba notas.
Utitor hoc igitur gratus, tantumq; laborem
Declara studio, non perijisse, tuo.

CASPA-

14
I. 36

CASPARI BAVHINI
PINACIS THEATRI
BOTANICI
LIBER PRIMUS.

SECTIO PRIMA
DE GRAMINIBVS.

GRAMEN à gradiendo, quòd geniculatis ramis serpat Dio-
scorides lib. 4. cap. 30. ἀράων nominat: Ut & Theophrastus 1. hist. 10. 4. ejusd. 7.
& 11. & caus. 16. cui 3. hist. 9. ἄραωσις dicitur. Ἀράων τὸν ἀράων, quòd in agris
proveniat: ἄρα, quòd omnium herbarum frequentissima.

Genera Dioscorid. quatuor facit: Primum ἀράων, alterum καλαμάρων, tertium
quod in Parnasso, & quartum quod in Cilicia, cinna nominatum provenit: quæ à se invicem
rum figura, tum facultate multum discrepat. Et Plinio l. 24. c. 19. Primum geniculatum, alte-
rum Parnassu, tertium aculeatum, quod triplex: Primum cujus in cacumine plurimum quini
aculei, dactylon, alterum quod Αἰγύο simile, tertium quod tenuius in parietinis & regulis, quar-
tum denig, Babylonium, quod juxta vias nascitur. At Theophrastus multas differentias pro-
ponit: posteriores plures agnoscere. Verum tantus in his Naturalis, ut præter varietates, à
prisca & recentioribus propositas, longè plures enumeraturi simus, cum in hanc classẽ Bromi,
Phœnicis, Lolij & Avenæ steriles species (nam & ipsa Graminei generis sunt) retulerimus: de
quibus ordine, à Gramine canino, cum ejus in Germania officinis usus sit, initio factò.

GRAMEN CANINUM.

Gramen vocamus ad imitationem Plinij, cui Canaria, quasi à canibus inventa, quâ fastidium deducunt,
vomitus cum pituita rejicientes: hinc Cynagrostis aliis: & à foliorum primò producentium forma, qui-
busdam Dens Canis dicitur.

I. Gramen caninum arvense, sive Gramen
Dioscorid.
Gramen, Ruel. Dod. Cord. in Dioscor. Cast.
Gramen Dioscoridis, Gesner. hort.
Gramen canarium medicatum, Ad. Lob.
Gramen caninum. Tab. Ger.
Gramen vulgare, Lugd.
Gramin. primi fortè Diosc. species major, Thal.

II. Gramen caninum vineale: primum in
Prodromo.

III. & IV. Gramen caninum longius radi-
catum majus, & minus.

Gramen canarium longius radicatum latiore
panicula, majus & minus, Lob. adv. part. alt.

V. Gramen caninum supinum paniculatum
folio varians.

Graminis 1. Dioscor. species minima. Thal.

VI. Gramen caninum supinum panica-
tum dulce: 2. in Prod.

Graminis dulcis nomine, D. Lobelius misit.

VII. Gramen caninum supinum minus.

Gramen caninum supinum. Lob. ico. Ger.

Gramen caninum supinum, 2. Tab.

IX. Gram. caninum maritimum spicatum.

Gramen geniculatum caninum marinum, Lo-
bel. ico.

Gramen caninum tertium, Tab.

Gramen caninum marinum, Ger.

A

IX. Gra-

IX. Gramen caninum marit. spicâ foliaceâ.

Gram. can. longius radicat. marin. 2. Lob. ico.

Gramen caninum quartum, Thab.

Gramen caninum marinum alterum, Ger.

2. a X. Gramen can. marit. spicâ echinatâ, quod
Gramen caninum maritimum asperum, vel 3.
in Prod.

Gramen caninum medicatum marinum spicâ
echinatâ, C. Bauhini, Lob. ad part. alt.

XI. Gram. canin. marit. spicatum: 4. in Prod.

XII. Gram. muror. radice repente: 5. in Prod.

GRAMEN NODOSUM,

à radice forma.

I. Gramen nodosum avenaceâ paniculâ.
an Ægilops bulbi genus, Plin. l. 19. c. 5.

Gramen, vel avenæ syl. genus, Gef. col.

Gramen bulbosum nodosum, Ad. Lob. Lugd.

cui & Gramen nodosum, sub alia figura.

Gramen tuberosum, sive nodosum, Cam.

Gramen bulbosum, Tab.

Gramen caninum nodosum, Ger.

Agrosteos alterum genus, Dod.

II. Gram. gemmeum seu nodosum secundum.

Perlato vulgò, & Oryza sylv. Cæs.

an Coix Myconi, Lugd.

III. Gramen nodosum spicâ parvâ, sive no-
dosum tertium: 6. in Prod.

IV. Gram. bulbosum aquaticum: 7. in Prod.

V. Gramen bulbosum ex Alepo: 8. in Prod.

GRAMEN TREMULUM.

I. Gramen tremulum maximum.

an Phalaris altera, Cæs.

Gram. amourettes majore paniculâ candican-
te, Clus. cur. post.

Colore panicularum variat, est rufescentis,
est albi coloris.

II. Gramen tremulum majus.

Lolium 10. & Ægilops Plinij, Trag.

Ægilops, Gef. hort. Lon.

Graminis 1. genus, Dalech. in Diosc. Ama.

Phalaris pratensis minor, Ad. Lob. ico.

Amourettes tremblantes, Clus. hist.

Phalaris pratensis, Ger.

Gramen polyanthos, Lugd.

Gramen leporinum & tremulum, Tab.

Gramen loliaceum 10. Tragi, Thal.

Variat paniculæ colore viridi, spadiceo.

III. Gram. tremulum min. paniculâ magnâ.
Phalaris parva, Cæs.

Gramen amourett. alterum, Clus. cur. post.

Hoc aliquando in cacumine tres aut qua-
tuor ramulos exiles fundit, semenque triangu- 2. b
lum habet.

IV. Gramen tremul. minus pan. parvâ: 9. in
Prod. Idem diceremus cum Graminis specie
parva Thalij, si nostrum folia pilosa haberet.

V. Gramen paniculis elegantissimis, sive
epiphygis, majus.

Gramen amourettes, quasi amatorium, Clus.

Gramen paniculosum phalaroides, Lob.

Gramen pratense sextum, Dod.

Gramen filiceum seu polyanthos 2. Lugd.

Gramen paniculatum sativum, Tab.

Gramen paniculatum, Ger.

VI. Gram. minimum paniculis elegantiss.

Gramen minimum Dalech. Lugd.

GRAMEN PANICULATUM.

Gramen pratense paniculatum.

I. Gramen pratense paniculatum molle.

Gramen lanatum Dalechampiij Lugd.

Gramen paniculatum molle, Lob. adv. part. alt.

Gramen equinum, sive Hippagrostis Gesneri
cum hoc plurimum convenit.

Gramen albicans lanuginosum molle, Cam.

II. Gramen prat. paniculatum majus, latio-
re folio: *πῆλ* Theoph.

Gramen vulgò cognitum, Trag. ico.

Gramin. 2. genus Dalech. in Diosc.

Gramen pratens. majus vulgatius, Ad.

Gramen pratens. vulgatius, Lob. Lugd.

Gramen pratense primum, Dod.

Gramen, Lon. commune, Thal.

Gramen alterum & vulgare, Tab.

Gramen pratense, Ger.

an per Chulem Garzias hoc gramen intellexit?
Clus. not. ad Garz.

III. Gramen pratense paniculatum majus
angustiore folio: 10. in Prod.

Variat paniculâ & glumis longioribus.

IV. Gramen Ungaricum Busbequij in iti-
nerario Constantinopolitano.

V. Gramen pratense paniculatum medium.

Gramen minus, Ad. Lob. ico. Tab.

Gramen pratense secundum, Dod.

Gramen pratense minus, Ger.

Variat latiore & angustiore folio.

VI. Gramen pratense paniculatum minus.

Gra-

Gramen paniculatum minus, Tab.

Gramen minimum album & rubrum, Ger.

Variat hoc paniculâ & culmis purpurascen-
tibus & albis.

adus & alibi.

3. a VII. Gram. paniculâ multiplici: n. in Prod.
Majus & minus reperitur Mon. Grassili. 85

Majus & minus reperitur Monspessuli, &
Gramen minus duriusculum nigrum.

Gramen minus duriusculum nominatur.

Gramen paniculatum arvense.

I. Gramen arvense paniculâ crispă.

Gramen, Matth. Lugd.

Gramen minimum Xerampelinum, Ad.Lob.
ico. Lugd.

Engd.

Gramen minimum, Lugd.

Gramen bulbosum Dalech. Lugd.

II. Gramen paniculâ pendulâ aureâ

Gramen paniculâ pendu
Gramen aureum Dalech Lugd

III. Gramen segetum albis paniculâ feracâ

III. Gramen segetum altiss. paniculâ sparsâ.
Gramen segetum paniculâ sparsâ, longâ

Gramen (f)

Gramen segetum paniculâ
Lob. ice

Lob.ico.
Gramen Grass 1. T. 1. C.

Gramen segetale, Tab. Ger.

Gramen spicatum montanum & nemorosum.

- I. Gramen spicatum angustifol. montanum: 20. in Prod.
 4.a II. Gramen sylvatic. angustifol. spicâ albâ: 21. in Prod.
 III. Gramen caryophyllatum nemorosum spicâ multiplici: 22. in Prod.
 IV. Gramen caryophyllatum montanum spicâ variâ: 23. in Prod.
 V. Gramen caryophyllatum alpinum. Gramen alpinum Rabinum, Gef. hort. Gramen Rabinum, Ad. (vel Ravisum montanum,) Tab.
 VI. Gramen spicatum folijs & spicis hirsutis mollibus.

GRAMEN TYPHOIDES.

Αἰσώστis τυφοειδής.

- I. Gramen typhoid. maximum spicâ longissimâ: 25. in Prod.
 an Stelephuros Theophrasti, Ang.
 II. Gramen typhoides molle. Gramen alopecuroides, Lob. ico. Gramen alopecuroides minus, Ger.
 III. Gramen typhoides asperum primum. Gramen typhoid. asperum majus, fortè Thalij. Gramen typhinum 1. Tab. Gramen typhinum majus Ger.
 IV. Gramen typhoides asperum alterum. Gramen typhinum, Lob. Lugd. Gramen pratense 7. Dod. Gramen typhinum 2. Tab. Gramen typhinum minus, Ger.
 V. Gramen typhoid. spicâ angustiore. Gramen alopecuroides minus alterum, Lobel. icon.
 Gramen alopecurinum 2. Tab. Gramen alopecurinum minus, Ger.
 Variat spicâ longiore & brevior.
 VI. Gramen typhoides culmo reclinato. Gramen alopecuroides minus, Lob. ico. Gramen alopecurinum 3. Tab. Gramen alopecurinum majus, Ger.
 VII. Gramen typhoides spicâ multiplici. Calamagrostis prima, Trago descrip. Gramen typhinum 3. Tab. Cyperus typhinus, Ger.

GRAMEN PHALAROIDES.

- I. Gramen phalaroides majus, sive Italicum. Gramen phalaroides 2. Lob. ico. Gramen phalaroides, Tab.
 Gramen alopecuroides majus, Ger.
 II. Gramen phalaroid. minus, sive Hispan. 26. in Prod.
 III. Gramen phalaroides spicâ molli, sive Germanicum: 27. in Prod.

GRAMEN ALOPECUROIDES.

- I. Gramen Alopecuroides spicâ rotundior: Αλοπίου Theoph. Cauda vulpina Plinij. Alopecuros Theoph. Ang. Cauda vulpis Monspelienf. speciosior, Ad. Alopecuros, Dod. Lugd. Tab. Cam. Ger. Alopecuros altera, Lob. ico. Cauda vulpina, Cæf.
 Variat: Creticum enim spicâ est majore, & ad tactum delicatior.
 II. Gram. Alopecuros minor spicâ longiore. Alopecuros longâ spicâ, Tur. Cauda vulpina Monspel. Ad. Lob. ico. Alopecuros major, Tab.
 Variat magnitudine & spicarum longitudine, quæ in altera longior, in altera brevior & rotundior.
 III. Gramen Alopecuros major spicâ longiore. Juncus marinus gramineus folijs schœnanthi, Ad. Lob. ico. Lugd. Schœnanthum adulterinum, Tab. Ger.
 IV. Gramen Alopecuroides Anglobritann. maximum.
 V. Gramen Alopecuroides Africum. Utriusq; iconem D. Lobelius ad me misit, & in Illustrat. plantarum descripturum monuit.
 VI. Gramen Alopecuroides spicâ asperâ. Gramen echinatum Dalech. Lugd.

GRAMEN TOMENTOSUM.

- I. Gramen tomentosum spicatum. Gram. tomentosum, Alopecuros vera Theoph. & Plinij, Lugd.
 Gramen sparteum 2. & Schœnanthinum, Tab. Juncus marinus gramineus, Ger. tit.
 II. Gram. pratens. tomentos. paniculâ sparsâ. Gnaphalium Diosc. Trag. Typha Diosc. Ang. Juncus bombycinus, Ad. Lob. ico.

Gra-

ES.
alicum.

Hispan.

lli, five 4.b

DES.
ndiore:
nij.

Ad.
er.

ajore, &

ongiore.

ongittu-
brevior

icâ lon-

enanthi,

britann.

misit, &
onuit.
perâ.

IM.

Theoph.

m, Tab.

â sparsâ.

Gra-

Gramen eriophorum, Dod.

Linum pratense, Gef. col. Lon.

Gnaphalium Tragi, Lugd.

Pseudolinum, Cast. icon.

Gramen junceum lanigerum, Thal.

Gramen tomentosum, & Linagrostis, Tab.

Gramen tomentarium, Ger.

f.a. Nonnunquam contractis pediculis tanquam pappus conspicitur.

III. Gramen tomentosum alpinum & minus: 28. in Prod. ex Rhætia D. Burserus attulit.

GRAMEN SPARTEUM.

Αἰνόσπαραν, Theoph. Spartum Plinio.

I. Gramen sparteum 1. paniculâ comosâ.

Spartum Plinij, Clus. Lob. Lugd.

Spartum herba, Dod.

Spartum Plinij 1. Tab. Ger.

Juncus Ibericus five Hispan. Dalech. in Plin.

II. Gramen spart. 2. panicula brevi folliculo inclusâ.

Spartum herba alterum, Clus. hist.

Spartum alterum Plinij, Lob. Lugd. Tab. Ger.

Sparti herbae alia species, Dod.

III. Gramen sparteum spicatum folijs mucronatis longioribus, vel spicâ secalinâ.

Spartum tertium, Clus. Lugd.

Spartum herba 3. maritimum, Clus. hist.

Spartum nostras, Lob.

Spartum 5. & Plinianum 3. Tab.

Spartum Anglicanum, Ger.

IV. Gramen sparteum spicatum folijs mucronatis brevioribus.

Gramen sparteum 1. Tab.

Spartum Anglicum 2. Ger. tit.

V. Gramen sparteum spicatum latifolium.

Spartum nostras alterum, Lob. ico.

Spartum 6. vel Plinianum 4. Tab.

Spartum herba 4. Batavicum, Clus. hist.

VI. Gramen sparteum juncifolium.

Spartum nostras parvum, Lob. ico.

Spartum 7. vel Plinianum 5. Tab.

VII. Gramen sparteum Basileense capillaceo folio: 29. in Prod.

VIII. Gramen sparteum minus, vel Hollandicum: 30. in Prod.

IX. Gramen sparteum Monspeliacum capillaceo folio minimum: 31. in Prod.

X. Gramen sparteum setas equinas referens: 32. in Prod.

Ex Java Insula allatum: cujus videtur mentio facta in Clusij curis posterioribus, sub herba, Sparto Hispanico, non absimili.

XI. Gramen sparteum pennatum.

Spartum Auftriacum, Clus. pan.

Gramen 9. vel junceum, Dod.

Gramen pinnatum, Dalech. Lugd.

Variat juba colore: est flavo, & etiam candido.

XII. Gram. spart. variegatum: sub 33. in Prod.

Sparti nomine D. Jungermannus misit.

GRAMEN JUNCEUM ET

Spicatum.

I. Gram. foliolis junceis oblongis, radic. alba

Gramen junceum Dalech. Lugd.

II. Gramen foliolis junceis brevibus majus radice nigrâ: 34. in Prod.

III. Gram. foliolis junceis brevibus minus.

Exilegramen durius, Lob.

Gramen exile, Lugd.

Gramen minus duriusculum, Tab. Ger.

IV. Gramen exile Nicæum: de quo paucis.

Busbequius in suo Itinerario.

V. Gramen foliolis junceis radice jubatâ.

Gramen exile durius Nertvegicum aut Danicum, Lob. ad par. 2.

VI. Gramen palustre junceum racemoso semine: 35. in Prod.

VII. Gramen junceum polystachion.

Gramen junceum 2. vel junceum aquaticum majus, Tab.

Gramen junceum aquaticum Ger.

IX. Gramen junceum folio articulato sylvaticum.

Gramen junceum 1. vel sylvaticum nemorosum, Tab.

Gramen junceum sylvaticum, Ger.

IX. Gramen junceum folio articulato aquaticum.

Gramen aquar. alterum, Lob. ico.

Arundo minima, Lugd.

Gramen junceum polycarpon, Thal.

Gramen aquaticum, Tab. Ger.

Habetur majus & minus Thalio monente:

in majore, post fœniscium, caulis novus palmaris excrefcit, cui non amplius capitula corymbacea infident, sed utriculi unciales palea-

cei in capillamenta fissi, modo virides, modo purpurascens: rarissimè cum corymbis utriculi reperiuntur.

X. Gramen junceum folijs & spicâ junci.

A 3

Gra-

- Gramen junceum maritimum, Lob. ico. Ger.
 Gramen junceum tertium, Tab.
 XI. Gram. junceum folijs & spica junci minus.
 Gramen junceum marinum dense stipatum,
 Lob. ico.
 6. a Gramen junceum 5. vel aquaticum minus, Tab.
 Gramen junceum marinum, Ger.
 XII. Gramen junceum montanum capite
 squamoso: 35. in Prod.
 XIII. Gramen junceum minimum capi-
 tulo squamoso: 37. in Prod.
 XIV. Gramen junceum minimum alterum
 38. in Prod.
 XV. Gramen junceum minimum mariti-
 mum: 39. in Prod.
 XVI. Gram. junceum spicatum seu triglochin.
 Calamagrostis 2. Trag. ico.
 Calamagrostis 4. Lugd.
 Carex minus, Lon. quoad 2. fig.
 Gramen mixtum ex Junco & Gramine, Thal.
 Gramen marinum spicatum alterum, Lob. ico.
 majus, Cam.
 Gramen marinum spicatum, Ger.
 Gramen triglochin Dalech. Lugd.
 Gramen junceum 4. vel spicatum, Tab.
 XVII. Gramen spicatum alterum.
 Gramen marinum spicatum, Lob. ico.
 Gramini montano spicato simile in maritimis
 Flandriæ, Clus. pan.
 Gramen aquatic. spicatum, Tab. Ger.

GRAMEN CYPEROIDES,
 Spicatum & paniculatum.

- I. Gramen cyperoides latifolium spicâ ru-
 fa: sive caule triangulo.
 Graminis 4. genus, Trag.
 Gram. cyperoides, Lob. Lugd. Cam. Tab. Ger.
 Gramen triangulum, Lugd.
 Carex Tragi, Lugd.
 II. Gramen cyperoides latifolium spicâ spa-
 diceo viridi majus: 40. in Prod.
 III. Gramen cyperoides angustifolium spi-
 câ spadiceo viridi minus: 41. in Prod.
 IV. Gramen cyperoides angustifol. spicis
 longis erectis.
 Gramen palustre majus, Lob. ico.
 V. Gram. cyperoides spicâ pendulâ brevior.
 Pseudocyperus, Gef. hort. Lob. ico. Dod.
 Pseudocyperus *δρεγόνια* Thal.
 Gramen aquaticum, Lugd.

Majus & minus habetur.

- VI. Gramen cyperoides spicâ pendiculâ
 longiore & angustiore: 42. in Prod.
 VII. Gram. cyperoid. paniculâ sparsâ majus.
 Gram. cyperoid. aquat. vulgarius, Lob. ico. Ger. 6. b
 Gramen cyperinum majus, Tab.
 Variat paniculâ, in altera compactiore & bre-
 viore, in altera magis expansa & longiore.
 IIX. Gramen cyperoides palust. majus spi-
 câ compactâ.
 Gramen palustre cyperoides, Lob. ico. Ger.
 Gramen junceum triquetrum, Thal.
 Gramen cyperinum palustre, Tab.
 IX. Gramen cyperoides spicis minoribus,
 minus compactis: 43. in Prod.
 X. Gram. cyper. palustre majus spicâ diversâ.
 Gramen cyper. parvum aquatic. Lob. ico. Ger.
 Gramen cyperinum palustre minus, Tab.
 XI. Gramen cyperoides minus paniculâ
 sparsâ subflavescente.
 Juncus exiguus pratensis, Trag.
 Calamagrostis 3. Trag. ico. Lugd.
 Carex minus, Lon. quoad 1. fig.
 Gramen marinum spicatum minus, Cam.
 Gramen cyperoides minimum paniculâ sub-
 flavâ C. Bauhini, Lobelio ad par. 2.
 XII. Gramen cyperoides minus, paniculâ
 sparsâ nigricante.
 Gramen cyperoides minimum nigricante pa-
 niculâ, Lob. ad. par. 2.
 XIII. Gramen cyperoides miliaceum,
 Cyperus graminea, Ad. Lob. ico. Lugd.
 Juncus latus, Lugd.
 Pseudocyperus *ποδύναρι* Thal.
 XIV. Gramen cyperoides maritimum,
 Juncus maritimus, Ad. Lob. ico. Tab.
 Juncus marinus alius Penæ, Lugd.
 Gramen maritimum, Eiden.

GRAMEN ARUNDINACEUM.

- I. Gramen arundinaceum spicâ multiplici.
καλαμίσκος Dioscoridis.
 Calamagrostis forte Babylonica, Ad.
 Calamagrostis, Lob. Lugd.
 Gramen arundinaceum, Lugd.
 Gramen arundinaceum majus, Tab. Ger.
 Variat ratione loci: nam quod in arenosis,
 spicâ est crassiore: quod in montosis, dumetis
 humidis, spicâ est tenuiore.
 II. Gramen arundinaceum spicatum.

Gra-

Gramen harundinaceum minus, Tab. Ger.

III. Gramen arundinaceum paniculâ molli spadiceâ majus.

7b Gramen tomentosum, Lob. ico.

Graminis loliacei 8. alia species, Thal.

IV. Gramen arundinaceum panicula molli spadicea minus.

Graminis loliacei octavi tertia species, Thal.

V. Gramen arundinaceum ramosum, plumosum album: 44. in Prod.

VI. Gramen arundinaceum enode majus montanum.

Scirpi primum genus, Trag.

Juncus sylvestris, Lon. ico.

Juncus lychnanthemos major, Thal.

Gramen harundin. montanum, Tab.

VII. Gramen arundinaceum enode minus sylvaticum.

Scirpi alterum genus, Trag.

Juncus lychnanthemos tenuis major, Thal.

VIII. Gramen arundinaceum maritimum acutissimum.

Oxyagrostis maritima Dalech. Lugd.

GRAMEN NEMOROSUM.

Gramen nemorosum glabrum.

I. Gramen nemorosum paniculis albis capillaceo folio: 45. in Prod.

II. Gramen nemorosum spicâ subnigrâ recurvâ.

Gramen cyperinum nemorosum, Tab. Ger.

III. Gramen nemorosum spica rufescente molli.

Gramen nemorosum 1. Tab.

Gramen sylvaticum, Ger.

IV. Gram. nemorosum spicis parvis asperis.

Gramen sylvaticum 3. Tab.

Gramen sylvaticum minus, Ger.

Variat latiore folio in dumeris, & angustiore in pratis.

V. Gramen nemorosum caliculis paleaceis.

Holostium, Matth.

Holostium Matthioli, Lob. ico. Lugd.

Gramen epigonatocaulon, Thal.

Gramen junceum 6. vel bufonium, Tab.

Gramen junceum, Ger.

Duplex est repens: & erectum.

VI. Gramen holost. alpinum minimum:

64. in Prod.

Gramen nemorosum hirsutum.

I. Gramen hirsutum latifolium majus.

Gramen hirsutum nemorosum, Lob. ico. Ger. 7. b

Gramen sylvaticum 4. sive pilosum, Tab.

II. Gramen hirsutum latifolium minus.

Magnitudine potissimum differt: datur & hujus majus & minus.

III. Gramen hirsutum capitulis Psyllij.

Cyperella Cordi & Pseudocyperi species pumila, Gef. hor.

Gramen exile hirsutum cyperoides, Lob. ico.

Gramen cyperinum pilosum, Tab.

Gramen nemorum Dalechampij, Lugd.

Gramen exile hirsutum, Ger.

Variat folijs latioribus & angustioribus.

IV. Gramen hirsutum capitulo globoso.

Combretum Plinij, Ang.

Herba Luziola vulgo, Cæs.

Gramen lucidum, Tab.

Gramen palustre echinatum, Ger. icon.

V. Gram. hirsut. angustif. majus: 47. in Prod.

VI. Gramen hirsutum angustifolium minus paniculis albis.

Gramen Leucanthemum Dalech. Lugd.

GRAMEN ECHINATUM

& aculeatum.

I. Gramen spicâ subrotundâ echinatâ: vel Gramen echinatum capitulo.

Gramen echinatum tribuloides, Colum.

II. Gram. spicâ planâ echinatâ: 49. in Prod.

III. Gram. album capitulis aculeatis Italicum.

Gramen aculeatum, Matth. Cast. Lugd.

IV. Gramen palustre, aculeatum Germanicum vel minus.

Gramen palustre echinatum, Lob. ico.

Gramen aculeatum, Lugd.

Variat spicis longioribus, rotundioribus, sæpe in eadem planta.

V. Gramen palustre aculeatum Italicum vel majus.

GRAMEN DACTYLOIDES

sive Ilchæum.

I. Gramen dactylon Aegyptiacum.

Nejemelmâlib, sive Gramen crucis, Aegyptijs, Alpino.

II. Gramen dactylon folio arundinaceo majus: aculeatum fortè Plinij.

Gramen, Ang. Clus. Cæs.

Gramen vulgare Dalech. Lugd.

Gra-

- Gramen canarium alterum, Lob.
 8. a Variat: nam Gallicum folijs est nonnihil villosis: Germanicum vero; folijs est glabris & cauliculis minus erectis.
 III. Gramen dactylon folio arundinaceo minus cum appendice.
 Gramen vulgare Dalechampi, Lugd.
 Fortè cum secundo idem.
 IV. Gramen dactylon folio latiore. Sanguinaria Nevenaræ, Trag.
 Canaria Plinij, & Galli crus Apuleji, Ang.
 Coronopus, Leoniceno.
 Ischæmon, Gef. cat. Cluf. hist. Tab.
 Ischæmon vulgare, Ad. Lob. Ger.
 Ischæmon Plinij, Cluf. hist. quoad iconem.
 Gramen Ischæmon Plinij, Lugd.
 Variat spicis, plerumq; quinis & senis: raro quaternis: rarissimè ternis.
 V. Gram. dactylon angustifol. spicis villosis. Ischæmon secundum, Tab.
 Spicis tribus, 6. 7. & 10. variat.
 VI. Gramen dactylon scoparium.
 Gramen scoparium ischæmi paniculis Gallicum, Lob. ad par. 2.
 VII. Gramen dactylon aquaticum.
 Gramen aquaticum geniculatum, Tab. Ger.
 IIX. Gramen dactylon esculentum.
 Gramen mannæ, Matth. Cast.
 Gramen aculeatum, Sanguinaria, Capriola, Leon. Ruel. Ama.
 Frumentem, German. Schwaben / Oryzæ species, Cord. in Diosc.
 Gramen album seu hirsutum, Gef. hort.
 Manna cœlestis Germanis, Eidem.
 Gramen Mannæ esculentum, Ad. Lob. Ger.
 Gramen Mannæ primum, Dod. Tab.
 Gramen aculeatum 1. Plinij Thal.
 Graminis genus quod in German. feritur, Cæs.
 Gramen Mannæ prius Matth. & prius Dod. Lugd.

GRAMEN PANICEUM.

- I. Gramen paniceum spicâ divisâ.
 Panicum sylv. Matth. Ad. Cast. Cam. Lugd. Tab. Ger.
 Panicum Herbariorum sylvestre, Lob.
 Gramen Mannæ alterum, Dod. Lugd.
 Milium sylvest. & supinum, Cluf. hist.
 Panicastrellæ species, Cæs.
 an Milium sylvestre Ischæmum, Ang.

Spica subinde singularis, non rarò multiplex, eaque modò herbacei, modò atrorubens. 8. b
 tis coloris est.

II. Gram. panic. spicâ aristis longis armatâ.
 Panici effigie gramen aristis circumvallatum, Lob. icon.

Gramen paniceum Ger. secundum, Tab.

III. Gramen paniceum spicâ simplici: Ε'λ-
 μος γωστ.

Lolium sextum, Miliaria herba Plinij, Trag.

Panici effigie gramen simplici spicâ, Lob. ico.

Panicastrella, Cæs.

Panicum sylvestre aliud, Dalech. Herba alba fortassè Plinij, Lugd.

Gramen paniceum primum, Tab.

Gramen cyperoides spicatum, ger. ico.

Variat: aliquando enim spicâ oblongâ: aliquando brevi & rotundâ.

IV. Gramen paniceum spicâ asperâ.

Lolium 7. Phalaris sylv. Diosc. Trag.

Gramen geniculatum, Tab. Ger.

Variat: Monspelij palmo minus: apud nos erectum & cubitale.

V. Gramen paniceum spicis nigris.

Panici effigie gramen 3. Lob.

Gramen paniceum, 3. Tab.

Gramen paniceum parvum, Ger.

GRAMEN MILIACEUM.

I. Gramen sylvaticum paniculâ miliacê sparsâ.

Gramen miliaceum, Lob. ico. Cam. Tab. Ger.

Gramen pratense 4. Dod.

II. Gram. mont. panicula miliacê sparsâ: 50. in Prod.

III. Gramen arundinaceum paniculâ miliacê: 51. in Prod.

GRAMEN SORCHINUM.

I. Gramen Sorghi paniculâ erectum.

Gramen sorghi effigie, Lob. ico.

Gramen sorghinum, Tab. Ger.

Gramen pratense 5. Dod.

II. Gramen arundinaceum Sorghi paniculâ sparsâ: 52. in Prod.

GRAMEN SPICA TRITICEA
& Secalina.

I. Gramen latifolium spicâ triticeâ latiore compactâ: 53. in Prod.

Variat latiore & angustiore folio.

II. Gra

- II. Gramen latifol. spicâ triticeâ divulsâ: 54. in Prod.
- III. Gramen angustifol. spicâ triticeâ compactâ: 55. in Prod.
- IV. Gram. angustifolium spicâ tritici muticâ simili.
- Gramen frumentarium segetalève, triticeum, five triticea spicâ, C. Bauhini, Lob. ad. par. 2. 56. in Prod.
- V. Gramen spicâ fescalina: 57. in Prod.
- GRAMEN SPICA BRIZÆ.**
- I. Gramen spicâ brizæ majus: 58. in Prod.
- II. Gramen spicâ brizæ minus: 59. in Prod.
- III. Gramen spicâ geminâ millepedæ simil.
- Gramen dytchyophoron, Colum.
- GRAMEN HORDEACEUM.**
- I. Gramen hordeaceum montanum five majus.
- Graminis loliacei 3. genus majus, Thal.
- II. Gram. hordeaceum minus & vulgare.
- Lolium tertium, Trago.
- Holcus Plinij, Aristida alijs, Ang.
- Hordeum murinum, Tur. & Cæf.
- Hordeum spontaneum spurium, Ad. Lob.
- Hordeum five triticum murinum, Dod.
- Hordeum spurium, Tab. Ger.
- Graminis loliacei 3. genus, Thal.
- Gramen hordeaceum, Lugd.
- III. Gramen hordeo disticho simil.
- Gramen hordeaceum pumilum, Clus. cur. post.
- GRAMEN LOLIACEUM.**
- I. Gramen loliaceum spicâ longiore.
- Alex. Diosc. Arist. Theoph. Gal. Orib. Ægin. Aët. Zizanius Constan. Zinzania Arabum.
- Lolium & Æra, Plinio.
- Lolium, Ruel. Matth. Ges. cat. Ama. Cord. in Diosc. Tur. Dod. Cæf. Cast. Lugd. Tab.
- Lolium & triticum temulentum, Ad. Lob.
- Lolium verum, Ges. hor.
- Lolium album, Ger.
- Frumentum setuum, Lon.
- Variat: communiter aristas habet, sed sine aristis quoque Bononiæ observatum.
- II. Gramen loliaceum latifolium spicâ angustiore: 60. in Prod.
- III. Gram. loliac. angustiore folio & spicâ.
- Ægin. Dioscoridi, à seminis colore phœniceo.
- Herba Phœnicea Græcis, hordeum murinum nostris, Plin.
- Lolium quartum, Trago.
- Phœnix, Matth. Tur. Lacun. Dod. [cui & Lolium murinum.] Cast. Ang. Cord. Lon. Cæf. Lugd.
- Hordeum murinum, Guil. Lob. Tab.
- Graminis loliacei 4. genus Tragi, Thal.
- Lolium rubrum, Ger.
- IV. Gramen loliac. minus spicâ simplici: 63. in Prod.
- V. Gramen loliaceum minus supinum multiplici spicâ: 62. in Prod.
- VI. Gramen loliaceum supinum.
- Gram. phalaroides exile supinum humi sparsum Danicum, Lob. ad. par. 2. à quo accepimus.
- VII. Gramen maritimum paniculâ loliaceâ: 63. in Prod.
- GRAMEN FESTUCÆ, SEV**
Ægilops & Bromos herba.
- I. Festuca graminea glumis hirsutis.
- Lolium 2. Trag. at 1. icone.
- Ægilops & Festuca, Dod. gal. Ges. hort.
- Bromos, Lac. altera, Ger.
- Bromos sterilis altera, Lob. Lugd.
- Lolium, Lon.
- Festuca altera, Dod.
- Gramen murorum Dalech. Lugd.
- Festuca graminea, Thal.
- Phœnicis altera species, Eid.
- Syphonium, Bromos herba, Tab.
- Variat spicis, quæ aliquando quasi in fasciculum comprehensæ, & Phœnix altera est Thalij: aliquando dispersis: sic aliquando glabris, aliquando hirsutis: & propriè Secales vitium est.
- II. Festuca graminis glumis vacuis: 64. in Prod.
- Variat: aliquando aristis oblongis incurvis armata Monspessuli reperitur.
- III. Festuca graminea effusâ jubâ: 66. in Prod.
- IV. Festuca graminea nemoral. latifolia mollis.
- Festuca quarta, Thal.
- V. Festuca junceo folio: 66. in Prod.
- an Festuca nemoral. quarta & tenuifolia, Thal.
- VI. Festuca junceo folio spicâ geminâ: 67. in Prod.
- VII. Festuca avenacea sterilis elatior.

ἄρπυριος Diosc. aliis. *ἄρπυριος* *νόη*, ad differentiam avenæ.

Festugago. Gazæ.

Lolij primum genus, Trag. def.

Ægilops prima, Matth. altera, in comp.

Ægilops, Lac. vera, Ges. hort.

Bromos & avena herba, Dod. gal.

Festuca & avena Græca, Lon.

Avena sterilis, Ad. Thal.

Bromos sterilis, Lob. ico. Ger.

Bromos herba, Dod. Lugd.

Avena Græca, Cæs.

Ægilops 1. & Avena fatua, Tab.

VIII. Festuca avenacea sterilis humilior.

Lolij quintum genus, Trag.

Bromos herba graminei generis, Thal.

IX. Festuca graminea arvensis minor.

Festuca sexta, Thallio.

X. Festuca pratensis lanuginosa: 68. in Prod.

XI. Festuca dumetorum: 69. in Prod.

XII. Festuca dumetorum foliis angustissimis pilosis: 70. in Prod.

XIII. Festuca utriculis lanugine flavescentibus.

Ἀνθραξ Diosc. Theoph. [ubi Gaza Avenam vertit,] Gal. Oribas. Ægin.

Hordeum festuca, seu Ægilops, Plinio.

Ægilops Bromoides Belgarum, Lob.

Festuca prior, Dod.

Avenæ tertium genus syl. Cæs.

Avena sylvest. seu nigra, Thal.

Ægilops Dodonæi, inter Ægilopen & Bromum media, Lugd.

Ægilops sexta, Bromoides 2. Tab.

XIV. Festuca altera capitulis duris.

Ægilops, Ang. Matth. comp. Ad. Dod.

Ægilops secunda, Matth. Lugd.

Festuca sive Ægilops Narbonensis, Lob.

Triticum sylvest. in Sicilia, Cæs.

Frumentum syl. Cast. ap.

Ægilops Lobelij & Penæ, Lugd.

Ægilops peregrina, Tab.

Festuca Italica, Ger.

Spica communiter ex duobus aut tribus capitulis duris composita est: nonnunquam ex plurib. compacta, spicam triuncialem obrinet.

XV. Festuca longissimis aristis glumis vacuis spadicei coloris.

Ægilops 4. Bromoides 1. Tab.

Ægilops Bromoides, Ger.

GRAMEN AVENACEUM.

I. Gram. montanum avenaceum spicatum.

Gramen montan. spicatum. Clus. pan. & hist.

Gramen sylvaticum secundum, Tab.

Gramen marinum spicatum alterum, Ger.

II. Gramen mont. avenaceum locustis rubris: 71. in Prod.

Variat caule, lævi in montosis: in dumetis humidis, foliis cauleque subasperis.

III. Gramen avenaceum locustis rariorib.

Gramen avenaceum rariore grano Danicum, Lob. ad. par. 2. à quo accepimus.

IV. Gramen avenaceum capillaceum minoribus glumis.

Gramen Anglo-Britannicum avenaceum, Danico nemorali simile: Hoc nomine à D. Lobelio accepimus.

Gramen nemorale avenaceum alterum ex fusco xerampelinum & lucidum Danicum, Eid. ad. par. 2. cujus etiam varietatem notat.

V. Gramen avenaceum montanum lanuginosum.

Gram. monta. avenæ semine, Clus. pan. & hist.

Gramen avenaceum, Tab.

Hordeum distichon, Ger. ico.

VI. Gramen avenaceum lanuginosum glumis rarioribus: 72. in Prod.

VII. Gram. avenac. lanuginosum ramosum.

Gramen glumosum Dalech. Lugd.

VIII. Gramen glumis variis: 73. in Prod.

IX. Gramini affinis planta ad gutturi inflammationes utilis.

Planta in planis nascens graminis modo, Petri de Osma in epist. ad Manardem. sed quid?



SECTIO SECUNDA.

JUNCUS, NARDUS, CYPERUS, SPARGANIUM,
Uva marina & Equisetum.

DE JUNCO.

JUNCUS à jungendo, Græcis *ζών*, à loris & funibus dicitur. Dioscorides, in odoratum & inodorum divisisse videtur. Nam l. i. de Juncis odorato, quem simpliciter *ζών* per excellentiam nominavit: at l. 4. c. 52. de inodoro egit: hunc duplicem fecit, unum lævem, alterum acutum. hunc sterilem, & alterum semine nigro & crassiore calamo, & tertium *ὀξύχων* prioribus carnosiore. Sic Theoph. 4. hist. 13. tria sunt genera, *ὀξύς* & *ἀκαρπ*, acutus & sterilis, qui mas: *καρπ*, frugifer, quem *μελαγχών*, artiferum vocitat: tertius *ὀλόχων* dicitur: at de odorato 9. hist. 7. egit. Plinius l. 21. c. 18. quing. fecit, 1. Mariscum appellatum, 2. marinum, oxy-schanum, & hujus tria genera: acutum, sterilem, quem marem & oxym. alterum semen ferentis, quem Melancranin vocant, & fructuosior: magis tertius, qui Holo-schanos nominatur. Quare Juncus alius est odoratus, inodorus alter; vel alius locis aridis, alius aquosis provenit: hic, vel in aquis dulcibus, vel maritimis. Rursum utriusq. generis alij *ἀμύχων* & *ἀκρ*, in mucronem pungentem desinunt, alij in fastigium obtusius. & sic alius *λεῖς*, levius: alius *τεταχ*, asper: alius fastigio acutius alius, obtusius. Juncus *λεῖς* & in fastigio acutus, alius est oxy-schanos, alius holo-schanos. Oxy-schanos alter mas, *ἀκαρπ*, nullo semine fecundus: alter *σάμινα*, *μελαγχών*, nigrum semen ferens: sic ad fecundum, clavatus: petrosus verò, ad lapides referendus est.

I. Juncus odoratus five aromaticus.

ζών & *ιδίος* & *καὶ δούσι* & *καὶ ἐν ὕδατι*, Hipp.*Αρωματικός* & *καὶ μυρεφνός*, Græcis posterioribus.*ζών*, Diosc. & Galeno.

Juncus odoratus, Plinio, Hermol. Ruel. Matth.

Tur. Lac. Ad. Lobel. Clus. in Garz. Cæsalp. Cast.

Lugd.

Juncus rotundus, Celso.

Juncus rotundus odoratus, Marcell. Ama.

Corn.

Schoenus & Juncus odoratus teres ac rotundus

Cord.

Schoenanthum, Mesuæo, Lon. (cui & Cyperus

rotundus.) Tab. (& Juncus aromaticus.) Cam.

(& Juncus floridus five aromaticus.) Acostæ.

Squinanthum, Varroni, Ang. Guil. & Offici-

nis, quasi *ζών* & *αἰθ*, junci flos.

Adhar & Adhir, Arabibus. Sachbar, Arabiæ

incolis.

Palea de Mecha & Pastus camelorum, vulgo.

JUNCUS ACUTUS.

I. Junc. acut. capitulis sorghi: *ὀξύχων* & Diosc.

Juncus acutus, Ang. Cord. in Diosc. Cast. acuto cacumine, Gesl. cat.

Juncus maritimus primus, Ad.

Juncus rotundus alter, Cæf.

Huc referri potest

Uva palustris & inusitatum Caricis genus, cujus folia peracuta crura & pedes sauciant: par.

6. Ind. occid. expedit in Floridam.

II. Juncus acut. marit. capitulis rotandis,

Juncus acuminatus, Ama.

Juncus acutus maritim. alter, Ad.

Holo-schanos major, Lugd.

III. Juncus acutus maritimus caule triangulo: i. in Prod.

an Juncus exiguus maritimus, Cæf.

IV. Juncus acutus paniculâ sparsâ.

Juncus tertius, Dod. gal. acutus, Dod. Cast.

Juncus acutus vulgar. Lob. ico.

Juncus oxy-schanos Dodonæi, Lugd.

JUNCUS LÆVIS

ὁ λόγιος.

I. Juncus seu Scirpus Indicus.

Juncus Indicus porofus, Cluf. cur. post.
an ex hoc Junco parantur tapetia in Guinea:
Linf. part. 2. Ind. or. c. 4. & ex hoc Scirpove vi-
ridi, sportulas, storeas, stragula & pileos in
Guinea puellæ conficiunt: par. 6. Ind. or. c. 7.
& apud Bantanos, pilæ luforiæ: par. 7. Ind. or.
fig. undecima.

II. Juncus maximus, five Scirpus major
quamvis veteres Scirpum à Junco diffinxiſſe
videantur.

Marifcus Plinij.

Juncus paluftris major, Trag. Tab.

Juncus grandis Holofchenos, Cord. in Dioſc.

Gef. cat. Dod.

Scirpus, Junci tertia ſpecies, Lac.

Juncus tertius holofchenus, Ang. Caſt.

Juncus & Scirpus, Lon.

Juncus aquaticus maximus, Ad. Lob. ico. Ger.

Juncus lævis aquaticus maximus, Thal.

Juncus rotundus 3. Cæſ.

Juncus lævis, Ger. ico.

Holofchenos Theophrasti, Lugd. deſc.

III. Juncus five Scirpus medius.

Juncus ſylvaticus, Tab.

Juncus aquaticus maximus, Ger. ico.

IV. Juncus lævis paniculâ ſparsâ major.

Juncus vulgaris alter, Trag.

Juncus oxyſchenos, Ang.

Juncus lævis (ſeu lenis,) Cord. in Dioſc. Dod.

Lugd. five Oxyſchenos vulgaris.

Juncus lævis vulgar. Ad. Thal. paniculâ ſparsâ,
Lob. ico.

V. Juncus lævis alter.

Junci lævis aliud genus, Lugd.

Ex hoc, medulla proſus nivea ad lucerna-
rum lumina extrahitur.

VI. Juncus lævis paniculâ ſparsâ minor.

VII. Juncus lævis paniculâ non ſparsâ.

Juncus, Matth. Lac. Caſt.

Juncus lævis, Lugd.

Juncus lævis glomerato flore, Lob. ico.

Juncus paluftris minor, Tab.

an Juncus rotundus primus, Cæſ.

VIII. Juncus exiguus montanus mucrone
carens: 2. in Prod.

an Juncus lychnanthemus tenuis, Thal.

IX. Juncellus inutilis: 3. in Prod.

Chamæſchenos, Gef.

Huc referendus eſt

Juncellus omnium minimus, Ad.

JUNCUS ACUMINE REFLEXO.

I. Juncus acumine reflexo major.

Juncus lævis, Gef. cat. Tab.

Juncus melancranis, & Juncus oxyſchenos
ſemina, Lugd.

an Juncus lychnanth. tenuis major, Thal.

II. Juncus acumine reflexo alter: 4. in Prod.

III. Juncus acumine reflexo minus vel tri-
fidus: 5. in Prod.

JUNCUS CAPITULIS

Equiseti.

I. Juncus capitulis equiseti major.

Juncus aquaticus min. capitulis equiseti, Lob.

Juncus clavarus, Dalech. Lugd.

Juncus alius ſecundus, Eid.

Variat ſcirpis latioribus & triplo anguſtio-
ribus.II. Juncellus capitulis equiseti minor &
ſluitans: 6. in Prod.

JUNCUS CAPITULO LANU-

ginoſo & bombycino.

I. Juncus capitulo lanuginoſo: five Schœ-
nolaguros: 7. in Prod.

II. Juncus alpinus bombycinus: 8. in Prod.

JUNCUS FLORIDUS.

I. Juncus floridus major.

Calamagrostis 2. Trag. prima, Lugd. cui etiam
Calamagrostis leucanthemos.

Sparganium, Dod. gal.

Juncus floridus, Matth. Caſt. Lugd.

Gladiolus paluftris, Cord. hiſt. & Ger.

Gladiolus aquaticus, Gef. cat. Dod.

Carex alterum, Lon.

Juncus cyperoides floridus paludoſus, Lob.
Ad. &

Juncus cyperoides paludoſus, Eyſt.

Juncus cyperinus floridus, Tab.

Butomos Theoph. Cæſ.

Quibuſdam Butomos Theoph. 1. hiſt. 8. & 4.
hiſt. 9. 11. 12. alijs Gladiolus Ejuſdem 1. hiſt. 8.
& 16. Item 4. hiſt. 9. 10. 11. nonnullis Spargani-
um Dioſcorid. 1. 4. c. 21. Flos colore eſt in pur-
pura diluto: at Tragus candido notat.

II. Juncus floridus minor: 9. in Prod.

NAR-

NARDUS.

Nardus Diosc. l. i. forte à Naardourbe Syriaca, Euphrati contermina: aliis Nardos $\sigma\alpha\delta\iota\chi\upsilon\varsigma$, quam inter aromata Dioscorides: inter odorata ad unguenta, Theoph. hist. 7. recensuit.

Genera Dioscorides plura fecit, & cap. 6. differentias multas, loco natali solum differentes, proposuit, omnibus in uno monte nascentibus: ut Syriacam, Occidentem versus Syriam respiciente: Indicam, Orientem versus ad Judæam vergente: hæc duplex, una in monte, altera ad radicem montis, non procul à præterfluente Gange, quæ Gangitica, quæq; omnes simul adferuntur: addit & Samphariticam: dereliquis speciebus infra l. 4. agemus. Plinius de Nardo & ejus differentiis l. & cap. 12. verba fecit.

I. Nardus Indica, quæ spica, Spica nardi, & Spica Indica Officinis.
Nardus, Ruel. Cord. in Diosc. Gef. cat. Lac. Tur. Lob.
Nardus Indica, Matth. Cord. hist. Lon. Cast. Lugd. Tab. Ger.
Spica Nardi, Ang. (cui Nardus Gangitis Diosc.) Mundel. Amat. (& Indica spica.) Ad. Lob. ico. Acost. Cæf. (qui ex Algarum genere esse statuit,) Lugd.
Spicæ nardus, quam frumenti more ad duarum vel ternarum spithamarum altitudinem ex crescere scribunt: in 4. part. hist. Ind. Orient. cap. 39.
Hæc à Syriaca & Gangetica, tantum natalibus differre videtur.
II. Nardus spuria Narbonensis.
Nardus Gangitis spuria Narbonæ, quæ Gangitidi Dioscoridis prorsus quadrare videtur, Ad. Lob. ico.
Nardus spuria Narbonensis, Lugd.
Nardus Narbonensis, Ger. adulterina, Tab.

CYPERUS ET EJUS

Species.

Kύπερος σ aut Κύπερις, à radice effigie, quæ pyxidulam aut vasculum pusillum imitatur, nomen accepisse videtur.

Genera duo Dioscorides l. i. recensuit: alterum radice rotundâ, quod Officinarum Cyperus est: alterum Gingiberis effigie, quod in Officinis Curcuma dicitur. Theoph. 4. hist. II. Cyperum (Gladiolum Gaza vertit) radice inæquali esse scribit, partim crassa carnosâ, partim gracili & furculosa. Plin. l. 21. c. 18. Cypero radicem olivæ nigre similem tribuit, & cum oblonga sit, Cyperidem vocari.

Cyperus alius amarus, alius dulcis est: amarus, vel odoratus, vel indorus: uterque vel rotundus, vel longus: dulcis verò vel angustifolius, vel latifolius est.

CYPERUS ROTUNDUS

odoratus.

Κύπερος σ & $\sigma\epsilon\phi\gamma\gamma\upsilon\lambda\sigma$.

I. Cyperus rotundus Orient. major.
Cyperus rotund. Hodueg Egyptijs, Alpino.
Cyperus Diosc. major rotundus, Ad.
Cyperus rot. Orient. maj. vel Babylon. Rauv.
Cyperus major Syriacus, Cam. in Matth.
Cypero rotundo similis, Cæf.
II. Cyperus rotundus Orientalis minor.
Cyperus rotundus minor, Ad.

Cyperus minor Creticus, Cam. ad Matth.
Orientalis cortice est fusco; Creticus verò nigro.

III. Cyperus rotundus vulgaris.
Cyperus, Trag. Lob. ob. cui & Juncus quadrat. Celsi.
Juncus angulosus & triangularis, Plinio.
Cyperi prima species, Ama.
Cyperus rotundus, Cord. in Diosc. Gef. hort.
Dod. Lob. ico. Lon. Tab. Ger.
Cyperus alter radice olivari, Cæf.

B 3

IV. Cy-

IV. Cyperus rotund. minimus Hispanicus.
Cyperus rotundus pumilus, Cluf. cur. post.

CYPERUS ROTUNDUS

inodorus.

I. Cyperus rotundus inodorus ex Florida.
Radix S. Helenæ, Monar. Cluf. exot.
Pater noster S. Helenæ, Cast.
Pater nost. vel radix S. Helenæ Monardi, Lug.
Galangæ similis radix ex Florida, Frag.

II. Cyperus rotundus inodorus Anglicus.
Cyperus rotundus inod. littoreus, Lob. Lugd.
Pseudocyperus, cujus herbam Nocum in He-
truria vocant, Cæf.

III. Cyperus rotundus inod. Germanicus.
Cyperus aquaticus septentrionalis, Lob.
Cyperus aquaticus, Lugd.
Cyperus rotundus, nigras inodoras radices
habens, Cam.

CYPERUS LONGUS

odoratus.

I. Cyperus odoratus. radice longâ: sive Cy-
perus Officin.
Cyperus radice gracili & furculosa, Theoph.
Cyperida, Plinio.
Cyperus, Matth. (qui & longum & rotundum
vulgarem una fig. exprimit, ut & Lugd.) Ang.
Fuch. Tur. Lac. Gef. cat. (cui & Juncus angu-
losus) Cast.
Cyperus Romanus, sive longus, Cord. in Diosc.
Cyperus longus habitior, Ad.
Cyperus longus odoratior, Lob. Lugd.
Cyperus longus, Cord. Gef. hor. Dod. Cam.
Tab. Ger.
Cyperi secunda species, Ama.
Cyperus primus & major, Cæf.
Galanga syl. longa, Germanis.

II. Cyperus longus odoratus Peruanus.
Radix contra yerva, id est, venenis adversans,
Monardi.
Radix contra venena, Lugd.

CYPERUS LONGUS IN-

odorus.

I. Cyperus longus inodorus Peruanus.

Drakena radix, Cluf. ex. Lugd.
Bezoardica radix, Tab.

II. Cyperus longus inodorus Orientalis.
Radix Drakenæ affinis, Cluf. ex.

III. Radix contra venenatas sagittas.
Tarvpara radix in Guiana cujus succo vulne-
rati sanantur: par. 8. Ind. Occid.

IV. Cyperus longus inodorus Germanicus.
Cyperus longus inodorus syl. Lob. ico.

V. Cyperus longus inodorus sylvaticus, vel
montanus: hic in Prodomo describitur.

CYPERUS ESCULENTUS.

I. Cyperus rot. esculentus angustifolius.
χαιονάριον, Gef. hor.
Trafi, Matth. Cast. Cæf. Lugd. Frag.
Herba radice magnitudine avellanæ, Cord. ob.
Juncus avellana, Ama.
Trafi Veronenfium, Ad. Lob.

Dulcichinum, Gef. hor. Guil. Dod.
Holoconitis Hippocratis, Fabric.
Cyperus dulcis, Theoph. Cam. Tab.
Cyperus esculentus, Ger.
Malinathalla [quasi valde regerminans] The-
ophrasti, Ægyptiorum, & Anthallium Plinij,
Dalech. in Plin. Cæf. Colum.
Margaritæ Ægyptiæ, Aurori libri Aristotelis,
de plantis, Dalech. in Plin.
Trafi folio cyperi, Cluf. in Garz.
Habaziz, Portæ.

Habel absis Tripolitanis, sive Granum alzelan
Arabum, Rauvvolf.

Plantam hanc nec caulem, nec florem, nec
semen producere, sed sola radicum propaga-
tione conservari, Gesnerus libr. de hor. & Po-
na in suo Baldo, affirmant. Contrâ, Matth.
Dodonæus Lob. Columna, cum flore pin-
gunt: & Cæsalpinus, caules, folia, & se-
men Cyperi, & Fragosus flores spicatos ali-
quantum flavos, tribuit.

II. Cyperus rotundus esculentus latifolius.
Caceras, Garziæ: addit Cluf. in notis, an Μαλι-
νάθλλα Theophrasti.
Caceras in Goa, Frag.



SPAR-

SPARGANIUM.

Σ παρρησιον ἀπὸ τῶν παρρησίων, fasciolis, quod foliis ejus latis & vitilium modo lentis, pro fasciis nutrites utantur: cujus Dioscorides l. 4. meminit: Βάμν. & Theoph. 4. hist. 8. cui mas & semina, & hæc sterilis.

I. Sparganium ramosum.

Sparganium, Trag. Matth. Ang. Tur. Cord. in

Diosc. Gef. cat. Lac. Ad. Cæf. Cast. Cam. Tab.

[cui & Gladiolus palustris.] Ger. Eyf.

Butomos Theoph. Ang.

Butomon, Ruel. Dod. gal. Gef. cat.

Platanaria, Dod. Thal.

Sparganium & Butomos Theoph. Lob.

Carex, Lon.

Phleas femina, Lugd.

Calamagrostis secunda, Eidem.

II. Sparganium non ramosum.

Sparganium alterum, Lob. Cæf. Lug. Tab.

Platanaria altera, Dod.

Sparganium latifolium, Ger.

II. Sparganium minimum, in Prodro-
mo descriptum, à Dom. Furero missum.

POLYGONUM BACCIFERUM.

sive Uva maritima.

I. Polygonum bacciferum scandens.

Caucon & Ephedra, Plinio.

Ephedra sive Anabasis, Bellonio & Dod.

Ephedra Plinij fortè, Rauvvolf.

II. Polygonum bacciferum maritimum majus, sive Uva maritima major.

Polygonum quartum Plinij majus, Clus. hist.

Tragos, sive Uva marina major, Lob.

Uva marina, Dod. quoad icon. & Ger.

Polygonum marinum 1. sive cocciferum 1. Tab.

III. Polygonum bacciferum maritimum minus.

Tragos, Ruel. Tragium, Gef. hor.

Equisetum quartum, Matth. Lugd.

Croton Nicandri, Ang.

an Androface, Bellonij,

Equiseti facie recemosa planta, Ad.

Uva marina Monspel. Lob. Tab.

Polygonum quartum Plinij minus, Androface

fortè Bellonij, Clus. hist.

Polygonum marinum secundum, Tab.

Tragus, sive Scorpius maritimus Dalech. Lugd.

Tragum, Uva marina, Dod. desc. Cam.

Uva marina quarta, vel minor, Ger.

an Osteocollon, Hieroclis & Absyrtij, Lugd.

EQUISETUM.

Ἰππῆρις Dioscoridi l. 4. c. 46. sive Cauda equina, quod folia setis equinis respondeant. Hinc Plinio l. 26. c. 13. Equisetum, Hippuris à Græcis dicta, est pilus terræ, equine setæ similis; cui l. 18. c. 28. Equisetis, & Equisetis dicitur.

Genera duo Dioscoridi, alterum vicinos arborum caudices scandens: alterum caule cubito majore, & comis brevioribus, &c. Plinius & tertium agnovit, quod pini foliis assimilavit.

I. Equisetum palustre linariæ scopariæ folio: 1. in Prod.

II. Equisetum palustre longioribus setis.

Hippuris major, Brunf. Dod.

Equisetum 1. Matth. Lac. Ang. Cast. Lugd. qui

etiam sub Equiseti primi Asparago Dodon.

pinxit.

Caucon Plinij, Ang.

Equisetum majus, Dod. gal. Lob. ob. Ger.

Hippuris, Ama. Ad. Lob. ico.

Equisetum 2. & Hippuris 1. Diosc. Tab.

III. Equisetum palustre brevioribus setis.

Equisetum palustre, Lob. ico.

IV. Equisetum palustre brevioribus foliis

polypermon: πολύπερον βίβλ. Sanguinariam

fœminam quidam vertunt.

Polygonum fœmina. Dioscoridi.

Polygoni tertium genus, quod Oreon, Plin.

Polygonum fœmina, Matth. Eric. Cord. Bra-

sav. qui Equiseti speciem esse negat. Gef.

B 4

cat. &

cat. & hort. Dod. Ama. Ang. Lac. Cast. Lugd. Tab.

Sanguinalis foemina, Cord. in Diosc.

Limnopeuce, Cord. hist.

Polygonum foemina femine vidua, ad Lob. ico.

Polygonum foemineum, Thal.

Equisetum tertium, Cæs.

Cauda equina foemina, Ger.

Hoc communiter sine semine reperitur, aliquando ad singulas articularum commissuras dena & plura semina [hinc polyspermon] adnascuntur.

V. Equisetum pal. minus, polystachion: 2. in Prod.

VI. Equisetum palustre tenuissimis & longissimis setis: 3. in Prod.

VII. Equisetum sylvaticum tenuissimis setis.

Hippuris minor altera, Trag.

Equisetum sylvaticum, Tab. Ger.

VIII. Equisetum pratense longissimis setis.

Equisetum alterum, Matth. Lac. Cæs. Lugd.

Equisetum alterum, Diosc.

Equifelis, Plin.

Hippuris altera, Trag. Ama.

Hippuris & Equisetum, Gef. cat.

Equisetum, Fuch. ico. Cord. in Diosc.

Equisetum longius, Dod. gal. [figurâ transpositâ.] Fuch.

Hippuris major, Thal. prima, Lon.

Hippuris fontalis, Ad. & Equiset. 2. Diosc. Lob.

Hippuris minor fontalis, Ad.

Hippuris minor, Lob. ico. figurâ 2.

Equisetum palustre majus, Tab. palustre, Ger.

IX. Equisetum arvense longioribus setis.

Hippuris minor, Trag. Dod. Thal.

Hippuris altera, Gef. cat. Cornar.

Equisetum, Er. Cordo, minus, Fuch. figurâ

transpositâ: minus vel 3. & 4. Lon.

Polygonum foemina, Fuch. ico.

Equisetum alterum, Ang. Bras. Cord. in Diosc.

Lob. ico.

Hippuris arvensis major, & Corsanda Tab.

Equisetum segetale, Ger.

X. Equisetum foliis nudum non ramosum sive junceum, *ἰσπυρίς ἀφύλλος*.

Hippuris major, Trag. major altera, Lon.

Sanguinali foeminae similis, Cordo in Diosc.

Polygonum foemineum *ἀφύλλος καυλόν*, Thal.

Equisetum junceum, Tragi. Lugd.

Hippuris prima Cornar.

Hippuris sine foliis & nuda, Tab.

Equisetum nudum, Ger.

XI. Equisetum foliis nudum ramosum.

Equisetum 3. Matth. Lugd.

Hippuris minor, Lob. ico. & Dodon. sed utriusque primam figuram.

XII. Equisetum nudum minus variegatum Basileense.

an Hippuris lacustris, foliis mansu arenosis, Gef. coll. quod in Prod. 4. est.

XIII. Equisetum foetidum sub aqua repens, 5. in Prod.

Equisetum pini foliis simile apud Plinium: & Hippuris minima à Diosc. non descripta, Dal. in Plin.

Equiseti quintum genus minimum, Lugd.

SECTIO TERTIA DE ARUNDINE, PAPHYRO, ET Typha.

ARUNDO.

ARUNDO (que Græcis κάλαμος, παρὰ τὸ καλῶς ἀμῆσθαι, ut vult Etymologus) in odoratam & inodoram dividitur. Odoratam sive Aromaticam, Diosc. l. i. c. 17. at inodoram c. 115. proposuit, & genera quinque agnovit.

Est enim ναρός, ὀνήλυ, στρογγύλης, δοναξ, & Φραγγίτης: solida, famina, fistulis dicata, crassa & sepiaria. Verum Theoph. 4. hist. 12. duo summa genera, τὸν αὐλητικὸν, καὶ τὸν ἐτέρον, tibialem & reliquam constituit, & inde in plures species subdividit. At Plinius l. 16. c. 36. multo plures differentias agnovit: quare l. 24. c. 11. viginti novem genera se demonstrasse monet, ubi & odorata mentio fit.

ARUN-

ARUNDO ODORATA.

I. Calamus Aromaticus Indicus.

Κάλαμος, & Κάλαμος ινδικός, Hipp. & Gal.

Κάλαμος ινδικός, Theoph.

Κάλαμος αρωματικός, Diosc. Orib. Aegin. Aëtio.

Κάλαμος ἐρυθρεῖος, Dionysio de situ Orbis.

Calamus Arabicus, Plutarchus Alexandrinus, Cels.

Calamus odoratus, Plin. Hermol. Ruel.

Calamus aromatites, Manardo.

Calamus aromaticus, Cord. in Dioscor. Fuch.

comp. Guil. pap. Garz. Lob. ob. Clus. ad Garz.

Acost. Cels. & in 4. parte Ind. Orient. fig. 20. &

Diringo Malays, & Deringo, par. 3. Indic.

Orient. 39.

Diringuo, 4. parte Ind. Orient. fig. 20.

II. Calamus aromaticus Syriacus.

Calamus aromaticus à Syriaco diversus Guil.

pap.

Calamus odoratus Libani, Lob. ico. Cam. ad

Matth.

Solius Calami figuram proponunt, qualem

à Doct. Paludano, anno 1579. ex Aëgypto allat-

tum, Patavij accepimus, qui 1. in Prod.

III. Calamum odoratum Matthiolum pin-

git, & ex eo Lacuna, Lonicerus, Acosta, Du-

rantes, Lugd. hist. Tabernæm & Gerard. Ca-

lamum aromaticum nominantes, quem ficti-

tium suspicantur.

ARUNDO INODORA.

I. Arundo vulgaris sive φραγμίτης Diosc.

Κάλαμος φραγμίτης, Theoph.

Harundinis quintum genus, Trag.

Harundo phragmitis, Ruel. Corn. Dod.

Arundo aut Calamus, Tur. Gef. Lon.

Harundo vallaris, Ama.

Harundo vallatoria, Dod. gal. Lob. Lugd.

Thal. Ger.

Arundo palustris, Matth. Lugd. Tab.

Calamus vulgaris, Cord. in Diosc.

Canna secunda, quæ fœmina Diosc. Ang.

Calamus sive harundo alia gracilis, Cels.

II. Arundo sativa, quæ δόναξ Dioscor. &

Theoph.

Arundo, Matth. Lac. Cast. Amnica, Ruel.

Arundo domestica, Matth. Lugd. Tab.

Arundo cypria, Dod. gal. Ama. Ger.

Canna quarta, quæ Donax, Ang.

Arundo magna, Gef. hor. Italica major, Cam.

Arundo donax sive cypria, Dod.

Arundo donax sativa, Lob.

Calamus, sive harundo crassa, Cels.

III. Arundo Anglica foliis in summitate dissectis: 2. in Prod.

IV. Arundo scriptoria atrorubens.

Κάλαμος συγγίτης, Diosc. Σύνγης, Theoph.

Syringias fistularis arundo, Dod. gal.

Canna tertia, Calamus scriptoria, Ang.

Harundo fistularis, Ama.

Fistula vel Syringa, & Arundo scriptoria, Ad.

Lob. ico.

Canna fistularis, Tab. Ger.

Sic in China ex Arundinibus pennæ scrip-

toriæ sunt [an ex hac?] in quas penicilla mo-

re pictorum nostratum indunt: in hist. Ind.

Orient. par. 2. c. 26.

V. Arundo farcta maxima atrorubens, quæ

Principes pro scipionibus utuntur.

Κάλαμος μέγας, Dioscoridi.

Κάλαμος τοξικός, Theophrasto.

Canna Indica, aliquibus Papyrus, Matth. Ital.

Cannæ prima species Diosc. Ang.

Arundo Indica & septima, Dod. gal.

Arundo Indica, cum teres sit, Papyrus anti-

quorum non rectè statuitur, Guiland. pap.

Juncus, papyri Aëgyptiæ genus, Ama.

Nastos vel farcta, Ad. Lob. ico. tertia, Tab.

Nastos Clusij, Ger.

VI. Arundo farcta geniculata sive sagittalis.

Nastos & Arundo prima, Dod. gal.

Nastos sive farcta altera toxica, Lob. ico.

Arundo farcta seu Nastos 1. Tab.

Calamus sagittalis, Ger.

In Bali insula, gestant Cannas sagittivomas,

ex quibus teretes exilesque sagittulas ex Arun-

dine fabrefactas [an ex prædicta Arundine?] in

apice verò intoxicatas, effilant: in hist. Ind.

Orient. part. 3. c. 39.

VII. Arundo farcta flava.

Ζωρίτης καὶ ἰνδὸς, Theophrasto.

Arundo fœmina & secunda, Dod. gal.

Nastos, seu farcta, sive toxica gracilis & pli-

catilis, Lob. ico.

Nastos secunda, Tab.

Arundo farcta, Ger.

VIII. Arundo repens vel Chamæcalamus.

Arundo humilis, Gef. hor.

Arundo tertia in maritimis, Cels.

Arundo epigejos, Lugd.

C

ARUN-

fctis.

gurâ

n Diosc.

Tab.

mosum

on.

Diosc.

Thal.

um.

dutriq;

ariega-

renosis,

repens,

ium: &

ta, Dal.

Lugd.

gus) in

7. at in-

dicata,

on ἐτέρον,

36. multo

oner, ubi

ARUN-

ARUNDO INDICA.

I. Arundo arbor: in qua humor lacteus gignitur, qui Tabaxir, Avic. & Arabibus dicitur. Mambu Indorum, in cujus arundinibus Tabaxir five Saccar. Mambu, Garziæ.

Mambu five arbor Tabaxir, Lugd. Frag. Spodium aut Tabaxir Perfianorum, Acoft. Spodium, Cast. Frag.

Hj duo secuti errorem Gerardi Cremonensis, qui in Rhafi Tabaxir Arabum per Spodium reddit: cum *Spodium* five Spodium, sit Turia Arabum, cujus in externis remedijs solum usus est. Tabaxir verò in Arabum compositionibus, intra corpus sumatur.

Est autem Tabaxir (ut habetur in 4. part. Ind. Orient. c. 14.) medulla arundinis Mambu five Bambus, & vocatur Saccar Mambu, id est, Saccharum de Mambu, quod propter insignem vim medicamentosam magni fit, & ab Arabibus, Persis, & Aethiopibus, qui illud Tabaxir vocant, avidè coëmitur.

Harundo Indica, Clus. exot.

Bambus five Lunc. Indic. 4. p. Ind. or. c. 14. fig. 12.

Bambu, Mambu, ex qua Tabaxir, part. 4. Ind. Orient. cap. 3.

Canna Tabaxir & Arundo, quam Indi Bambus vocant, Idem.

Sunt arundines aspectu gratissimæ, præaltæ, nigrae, rotundæ, crassæ, ita ut utraq; manu vix junctim includas, imò femoris crassitie. Crescunt sponte in Norfingæ Regno ad litus, & universo litore Malabar, præcipuè juxta Choromandel. Indi ex ijs domos suas ædificant, ut in Terenate, quas findunt, & singulari industria intorquent: part. 5. Ind. Orient. Sic in Pegu etiam, & stramine teguntur: par. 7. Ind. Or. c. 35. & 37. & in civitate Bantam, cuncta ædium sublicia ex his arundinibus assulatim dissecis constant: 3. part. Ind. Orient. cap. 22. Imò ad lesticas Pallankyns dictas vulgò, utuntur, in quibus mulieres per publicum deferunt. Sic & naviculas, duobus viris capiendis aptas conficiunt: par. 2. Ind. Orient. 17. & par. 4. c. 14. Hac adversarij, quem vitâ omnino exuere nolunt, dorsum contundunt: par. 2. Ind. Orient. cap. 32.

Arundines in Indiæ Occident. sylvis (an eadem cum priore?) non raro nascuntur, crassitudine cruris humani, quæ ad eò teneræ, ut singulae stantes uno ictu gladij secantur: aridæ ve-

rò tanta duritie, ut fisis illis, & in modum Chirurgicorum scalpiorum efformatis, sagittas suas ita arment Barbari in Brasilia, ut uno ictu feras humi fundant, &c. in Ind. Occident. hist. part. 3. c. 12.

Cannæ seu arundines editissimè nascuntur, quarum quodlibet interseptum mensuræ Hispanicæ capax est: hæc structis ædium etiam adhibentur: in hist. Ind. Occident. l. 4. c. 30.

Cannarum Hierosolymitanarum nomen quoq; occurrit in hist. Ind. Orient. part. 4. c. 6.

II. Arundo Saccharifera.

Arundo octava, vel saccharata, Dod. gal.

Harundo ex quo Saccharum.

Melicalamus, Cord. hist.

Mel arundinis quibusdam Saccharum, Lon.

Arundo Saccharata, Dalech. in Diosc.

Sacchari canna, Ges. hor.

Arundo saccharina Indica, Ad. Lob. ico. Lugd.

Canna mellea, Cæs.

Arundo & calamus saccharinus, Tab.

Calamus Indicus, par. 6. Ind. Or. c. 19.

Calamus Indicus Saccharites, & Canna Saccharina, in hist. Ind. Orient. par. 4. 5. & 6. c. 38.

& hist. Occid. Ind. part. 3. 4. 8. & 9.

De Sacchari differentijs, & conficiendi modo, in nostris in Matthiolum notis, & lib. de compositione Medicam. egimus: Vide & Munsteri cosmograph. l. 2. c. 91.

III. Arundo Indica versicolor.

Canna de Bengala Lusitanis: in Regno Bengala crescunt Arundines versicolores, medulla plenæ, crassitie arundinibus Hispanicis similes, paulò tamen tenuiores: virides adhuc, lentæ inflectuntur, ad stanni modum, aut instar Salicis, foris punctis versicoloribus notatæ sunt, haud secus ac si arte ita pictæ forent. Utuntur ijs in Lusitania mulieres vetulæ pro scipionibus, quibus gressus titubantes sustinent, quarum varia genera apud Doct. Paludanum videre est: in hist. Ind. Orient. p. 2. c. 18.

IV. Arundo Indica versicolor flexilis.

Rota vocat in Bengala, aliud genus ejusdem arundinis, quod gracilius & succinctius est, viminis ad modum flexile, ex quo Calathi & alia multa pulcherrima conficiuntur: ex hist. Ind. Orient. part. 2. cap. 18.

V. Arundo Indica punicea mollis.

Arundo vel Scirpi potius genus puniceæ coloris & mollis, quam parumper contortam, arcui pro

pro nervo adaptant: nascitur in Regno Congiano, & in regno Bengala ad Gangen fluvium, hist. Ind. Orient. part. 1. c. 5.

VI. Arundo Indica volubilis.

Arundo Indica in Insula Sumatra, variè se circa arbores vinciens, centum, ducentarum, imò trecentarum, & plurium Orgyarum longitudine, ita ut vix ejus origo finisve deprehendi possit, circulis vasariis conficiendis, valde accommoda: ad Clusij curas posteriores.

VII. Arundo Indica fluitans.

Trombas sive arundineta fluctuantia in Bali Insula: in hist. Orient. Ind. part. 3. c. 2. & 40. & part. 4. fig. 10. pingitur.

Arundines longæ seu Algæ in salo fluctuantes, par. 5. Ind. Orient.

VIII. Tubuli arundinacei ad Asthma.

Refert Manardis, & ex eo Lugd. hist. ex Hispaniola adferri tubulos cannarum, qui extrinsecus & intrinsecus, gummi illiti sunt, quod Tabaci succum esse putant. Addit Clus. incolas

Virginæ frequenter uti tubulis quibusdam ex argilla factis, ad Tabaci fumum hauriendum: quales apud Anglos in frequenti usu.

IX. Arundo Indica latifolia.

Canna Indica, Gesf. hor. Clus. hisp. [cui & flos cancri nonnullis,] Cam. [cui & Xiphium Indicum,] Cæs. rubra, Eyf.

Arundo Indica florida, Ad. Lob. & Canacorus quorundam, quod inter Cannam & Aconem ambiguae naturæ sit, quare & Calamagorus.

Papyrus, Cast.

Gladiolus Indicus, Cam. ad Matth.

Arundo seu Canna Indica, Lugd. cum duplici figura.

Arundo Indica latifolia sive florida, & Harundo liliflora Tab.

Harundo florida, Ger.

X. Arundo Indica latifolia, flore luteo punctato: quæ 3. in Prod.

Canna Indica lutea rubris maculis punctata, vel flore croceo guttato, Eyf.

PAPYRUS ET QUÆ

pro Papyro usurpantur.

CUM Papyrus in Aegypto res sit cognata Arundini, secundum Plin. l. 24. c. 11. imò & Calami chartis serviant, eodem, lib. 16. c. 36. autore: idcirco papyrus, & ea quæ in novo Orbe Papyri vicem præbent, subjiciamus.

I. Papyrus Nilotica sive Ægyptiaca.

Næmper, Diosc. & Theophrasto.

Papyrus, Plinio & Alpino.

Papyrus Ægyptia sive Biblus Ægyptia Eustathio, Guil. pap.

II. Papyrus Syriaca vel Siciliana.

Sari, Theophrasto.

Biblos secunda, Eustathio.

Papyri altera species, quæ Paperus in Sicilia, Guiland.

Papyrus, Cæs. Nilotica, Ad. Tab. Ger.

Papyrus Ægyptia, Penæ, Lugd.

Cum in novo Orbe diversarum arborum foliis & corticibus pro papyro utantur, sequentia nominare tantum luber, siquidem ad arbores pertineant.

I. Palmera humilia, Scalig. Lugd.

II. Guaiabara in Insula Hispaniola, ex Oviedo, Lugd.

III. Copey, ibidem apud eundem.

IV. Tal, in provincia Mangi, Lugd.

V. Lantor, palmæ Indicæ genus, cujus folia

viri longitudinem æquant: hist. Ind. Orient. part. 4. c. 3. & 6. & pingitur fig. 15.

VI. Ficus Indicæ foliis & Turcæ utuntur, hist. Ind. Orient. part. 6. c. 38.

VII. Palmæ, nuces Indicæ Cocos gignentis, arboris substantiam plicabilem usurpant. hist. Ind. Orient. par. 4. c. 12.

VIII. Arboris foliis sex brachiorum longis, cujus folio extenso, tres, quatuor viri, in itinere operiuntur, ut pluvias non metuant: ex Nicolai Costini itineralio, Lugd. hist. refert.

IX. Papyrus ex lava, est liber arboris tenuissimæ membranæ instar, ut ex Clusij notis, Lugd. hist. proponit.

Papyrifera arbor libro tenuissimæ membranæ instar candido, Clus. exot. l. 1. c. 4.

an Pannus è libro arboris quo in Insula Tidoræ foeminæ pudenda tegunt, Pigafettæ.

X. Arboris liber subpunicæ coloris, Clus. l. cit. qui & Filorum tenuissim. ex arboris

C 2 cortice

cortice confectorum ibidem meminit.

XI. Melt five Magnei, ex hujus folijs, Me- xicani papyrum & pergamenum conficiunt : Duretus de admirabilibus plantis.

TYPHA EIUSQUE SPECIES.

TYPHE Diosc. l. 3. c. 133. meminit, cui florum effigies turbinata, quasi typhonis sese gyran- turbinem, aut gigantis staturam minacem signaret, nomen dedisse videtur : vel potius τίφη à τίφῃ quod locum palustrem notat.

Duplex est, palustris & cerealis. Theophrast. utriusque meminit : alterius 4. hist. 11. in lacu Orchomenio nascentis : alterius, inter frumentacea, 2. hist. 4. & 4. caussas plant. 6. At Dioscorides de prima, de qua Plinius l. 16. c. 36. inter aquaticos Calamos egit.

I. Typha palustris major.

τίφη, Dioscorid. & Theophrasto.

Typha aquatica, Trag. Lugd.

Typha, Matth. Fuch. Ama. Lac. Tur. Cord. in

Diosc. Lon. Ad. Lob. Cast. Tab. Ger.

Typha palustris, Ruel. Cæs. aquatica, Cestrum morionis, Dod.

Papyri species, Dod. gal.

Ulva, Ang.

Juncus asper Dod. Lugd.

II. Typha palustris clavâ gracili.

Typha media, Clus. pann.

III. Typha palustris minor.

Typha minor, Ad. Lob. ico. Lugd. minima, Clus. pann.

Typha minor sive Typhula, Tab.

SECTIO QUARTA.

DE FRUMENTO.

Triticum, Zea, Hordeum, Secale, Avena, Ustilago, Oryza, Milium, Panicum, Phalaris.

FRUMENTACEA dicuntur, quæcunque geniculato culmo, & foliis harundinaceis constant, semeng. panificio & pultribus aptum, in spicis aut jubis producunt, cœn Triticum, Hordeum, Milium, Panicum, & his similia.

Genera prima duo sunt, per tempora sætüs divisa: Hyberna, quæ circa Vergiliarum occasum sata, terrâ per hyemem nutriuntur, ut Triticum, Hordeum: Aestiva, quæ ante astatem, Vergiliarum exortu seruntur, ut Milium, Panicum. Verum in Græcia & Asia, omnia Vergiliarum occasu feri, Plinius testis est: quedam autem utroq. tempore in Italia: ex his quedam & tertio, Veris scilicet: aliqui enim Verna appellant, Milium, Panicum, Alicam seu Siliginem.

DE TRITICO.

TRITICUM, quamvis generaliter omne frumentum, quod ex spicis tritum, ac trituratione repurgatum est, significet, ut ex Varrone colligere est; posteriores tamen, peculiari frumenti speciei Tritici nomen tribuunt, de quo priori loco, Dioscoridem imitati, qui l. 2. c. 107. περί πνεῶν primò egit. Πνεῶς dicitur Græcis, quasi σπνεῶς, pro σπνοῶς, ἐπὶ τῷ ἀσπερ, secundum Etymologicum.

Genera duo fecit Dioscorides: at Theoph. 8. hist. 4. plura ratione regionum, quæ ex locis cognomina sortita sunt: quæ etiam colore & specie, & proprietate inter se differunt: quem Plinius l. 18. c. 7. sequitur. Sic in Lyma Ind. Occident. una Tritici spica, duplo plus Hispanicis spicis fundit: in hist. Ind. Occident. part. 9. additamento.

I. Triti-

I. Triticum hybernium aristis carens.

Triticum, Brunf. 4. Gef. hor. Cord. in Diosc. Cui
& Triticum semestred Dod. Tab. five Robus,
Colum. Dod. gal.

Tritici primum genus, Trag. Fuch. Lon.

Siligo spica mutica, Ad. & Lob.

Triticum spica mutica, Lugd. Ger.

Triticum aristis carens, Cæf.

Siligo veterum videtur, quam Plinius Tritici
delicias vocavit.

II. Triticum siligineum.

Triticum candidum, Græcorum & Galeni,

Σιλιγίνης & τριτύρου Hippocr. aut ejus interpreti

Trago: five Olyro.

Siligo Varroni, Columellæ & Plinio, cui &
Sandalum.

Tritici genus candidistrum, Cæfalp. 1. 13.
vocavit.

III. Triticum æstivum.

Trimestre triticum Græcis τριμῆστρον Theoph. &
Dioscor.

Seranium, Galen.

Siliginis & tritici tertia species, Columell.

Triticum trimestre, Portæ.

Triticum aliud quod Vernellum vocant,
Cæfalp.

IV. Triticum rufum grano maximo.

Far five Adoreum veterum, Lugd.

V. Triticum rufum hexastychon.

Tritici rufi genus aliud, Lugd.

VI. Triticum spicâ multiplici.

Triticum ramosum Plinij, spicâ ramosâ, Cæf.

Tritici quinta species, & Gran del graspo, id
est, frumentum racemosum, Ang.

Triticum multiplici spica, Lob. ico. Ger.

Ele qui truche, Lugd.

Triticum typhinum multiplici spicâ, Tab.

Triticum racemosum, Portæ.

Spicis modo paucioribus, modo pluribus, ita

ut Matthiolus 24. spicas viderit.

VII. Triticum semine oblongo.

Long gran Matis conensium, ad *Belfav* Thraciâ

Galenii accedere videtur, Lugd.

Huic congener Frumentū Scourgeon, Ruellij.

VIII. Triticum aristis longioribus spicâ

cæruleâ.

Triticum Loca vocatum alterum, & triticum

lucidum Gallo-belgarum, Lob. ico.

Tragus frumenti genus spicâ cæruleâ, Lugd.

Triticum nigrum peregrinum 2. Tab.

Triticum lucidum, Ger.

IX. Triticum aristis longioribus spicâ albâ.

an Far Gallicum five barbati genus, Ruel.

Robus five Triticum, Insularis Gallo-belgis.

Loca vocatum, Lob. ico.

Triticum typhinum, Ger. quartum, Tab.

X. Triticum typhinum five Typha cerealis

multiplici folliculo.

Typha inter frumentacea, Theoph. Typha,

Galenio: Typhe, Plinio.

XI. Triticum typhinum simplici folliculo.

Tritici tertium genus, Trag. Fuch. Lon.

Triticum, Matth. Lac. Cast. Lugd.

Triticum Romanum Tragi, Eid.

Typha cerealis, Ruel. Dod. gal.

Typha Dodonæi, & Typha Fuchij, Lugd.

Triticum aristis circumvallatum, Ger.

Triticum typhinum, Tab. aristis munitū, Cæf.

XII. Triticum typhinum simplici folliculo

Hispanicum.

Triticum typhinum, Dod. Lugd.

Triticum aristis circumvallatum, Lob.

XIII. Triticum sylvestre Creticum.

Agriostari, id est, Triticum sylvestre grano mi-

nore tritico sativo, in Creta frequentis: Honor.

Belli epist. 5. ad Clusium.

Agriostari, five Frumentum syl. Creticum,

Pon. in Bald: Ital.

ZEA EIUSQUE SPECIES.

ZEA, Ζέα, ἡ σεία, quibusdam idem cum *σάρα*: alius frumenti peculiaris species, qua Latinorum

Semen est: nam & Plinio Zea, Semen dicitur 1. 18. c. 8.

Quam generum est Dioscoridi 1. 2. c. 111. *σεία* ἢ *δίνυμος*.

I. Zea Briza dicta, vel Monococcus German.

Ζέα ἀπλή, quod simplicis grani sit, Diosc.

Spelta prima, Trag. ico. secunda, Eid. descript.

Zea, Ang.

Zea simplex, Matth. Lac. Cord. in Diosc.

Zea alterum genus, Fuch.

Frumentum locale: Ruel.

Siligo, & Zea alterum genus, Tur.

Briza, Dod. gal. Ad. Lugdun. Monococcus,

Lob. Ger.

Monococcon, frumentū barbatum, Far venni-

culum rubrum, Col. Zea, Mnesitheï fortè, Dod.

C 3

Spelta

Spelta vulgò, Cæf.

Zea species prima, Cast.

Zea monococcus, Tab. minor & monococcus, Lugd.

II. Zea dicoccus vel major.

Zea *dimonnes*, [quod grana bina juncta habeat,]

Zea Diofc.

Zea, Theoph. & Galeno.

Zea, Brunf. Cord. in Diofc. Lon. Ger.

Spelta prima, Trag. descript. secunda, Eid. ico.

Zea dicoccus, Matth.

Zea altera, Matth. Lac. Cast.

Zea primum genus, Fuch. Tur.

Zea, Romanis veteribus Semen, nunc Spelta, Dod. gal.

Zea, vulgò Spelta, Far antiquis: Ador posteri-

oribus, & Semen Adoreum, Dod.

Typha, Ang.

Far primum, Cæf.

Zea major seu dicoccus, Lugd.

Zea ador, Tab.

III. Zea Amylea, vel Zeopyrum Amy-

læum. an Far. Olyra Diofc. halicstrum trime-

stre cognominatum, Col.

Triticum secundum, Trag. Fuch. Lon.

Olyra, Dod. gal. Lugd.

Triticum trimestre, Cord.

Amylæum frumentum & Far halicstrum, Dod.

Frumentum vel Triticum Amylæum, Tab.

Triticum amyaleum, Ger.

IV. Zeopyrum seu Triticospeltum, quod naturam habeat Zea *xy pyp*.

Zea *xy pyp* *xy pyp*, Galeno.

Spelta species tertia, Trag.

Hordeum alterum, Ang.

Zeopyron, Dod. Ad. Lob. Lugd. Tab.

Hordeum glabrum, Cord. hist. hexastichon,

hodie hordeum sine tunica, Cord. in Diofc.

Hordeum nudum, Gef. hor. Ger. mundum, Cæf.

Hordeum *xy pyp*, Cam.

V. Zeocryton seu Oryza Germanica.

Oryza Germanica, Trag. [cui & Tragum ce- reale, & candidum far,] Dod. cui & Far Galli-

cum, & frumenti barbati genus Ruel. videtur.

Olyra, Ad.

Far, *Zeuscher Reis* / Cast.

Thypha Theophrasti, Tab.

an Far Clusianum, Lugd.

Spelta in Regno Congiano, omnium frumen- torum, quæ habent, vilissimum, quo porcos

alunt: in hist. Ind. Orient. part. 1. lib. 2. c. 1.

Siligine abundat ex se Cambaig Regnum: hist.

Ind. Orient. par. 1. lib. 2. c. 1. & Chinæ tellus

feracissima est Siliginis, ibid. c. 25. & Japonen-

sis terra filiginem fert, ibid. c. 28.

Siliginis Turcica, quæ Milie Abrai dicitur,

promontorium Viride perfelix: Ind. Orient.

part. 3. c. 40.

HORDEUM EIUSQUE SPECIES.

HORDEUM, *Κριθὴ* *κροτὶς* *ἀνδροειδής*, quod eo reperto & in usum recepto, glandibus spretis, à bru- tis homines distincti sunt: antiquissimum enim in cibis hordeum, sicuti Atheniensium ritu, Me- nandro autore, apparet, & gladiatorum cognomine. (ut Plin. l. 18. c. 7. loquitur,) qui Hordearij voca- bantur: nunc studiosos, idiotæ sic appellare solent.

Unius Dioscorid. l. 2. c. 108. meminit: at Theoph. 8. hist. 4. Hordeum aliud rotundius minusq., aliud oblongius majusq.: Item aliud candidum, aliud ad purpuram accedens. Hoc, ut & Triticum, in India Occid. semine ex Hispania delato, secundum & uberius enascitur, ut habetur in hist. Ind. Occid. par. 9. c. 31.

I. Hordeum polystichum hybernium.

Hordeum, Brunf. Matth. Lac. Gef. hor. Lob.

[cui & Hordeum polystichon autumnale Ad.

part. alt.] Dod.

Lon. Cast. Cæf. Ger.

Hordeum majus, Trag.

Hordeum polystichum, Fuch. Tur. Dod. gal.

[cui & Hordeum Cantherinum,] Lugd. Tab.

Hordeum primum, Ang.

Hordeum secundum hyemale, Cord. in Diofc.

Polystichum dicitur quia in multos versus

spicatur: est enim differentia in spicarum forma, magnitudine & granorum numero: quoddam binos, quoddam ternos quater- nos, quinos, cumque plurimum senos ver- sus habet: sic aliud rotundius & minus, aliud oblongius & majus, aliud candidius, aliud nigrius.

II. Hordeum polystichum vernum.

Hordeum senis versibus, Matth. Cam.

Hordeum Septentrioni notissimum *πολύστικον*,

Lob. ob.

Hor-

Hordeum polytychon vernum, Lob. ico. & Ad. in Diosc. Lob. Lugd. Tab. cui & æstivum & trimestre minus.
 port. alt.
 Hordeum polytychum æstivum, & Hordeum Hordei alterum genus, Cæf.
 trimestre polytychum, Tab.
 III. Hordeum distichon: quodd spicâ binos IV. Hordeum Cauticum.
 ordines habeat, Plinio.
 Hordeum *ἰσχυρὸν* Galaticum, Columellæ.
 Hordeum Cantherinum, Ruellio.
 Hordeum minus, Trag.
 Hordeum distichum, Fuch. Tur. Dod. Cord. huc relatum.

SECALE SIVE ROGGA

ejusque species.

SECALE, monente Plinio l. 18. c. 16. etiam Farrago appellatur: nonnullis Rogga: & duplex est, rationis tempore & magnitudine distinctum.

- | | |
|--|---|
| I. Secale latifolium, in Prod. descriptum. | Illud lætius, hoc gracilius, culmis paucioribus, spicâ brevior & tenuior. |
| II. Secale hybernium vel majus. | IV. Secale luxurians. |
| Siligo, Brunf. Ruel. Lon. veterum & secale, Tra. | Clavi filiginis, Lon. |
| Secale, Matth. Dod. gal. (quibusdam Farrago, non tamen est vera Farrago, quæ nil aliud est quam Hordeum,) Fuch. Lob. Tab. Ger. | Secalis mater, Thal. tit. de Gramine. |
| Secale & Farrago Plinij, Lugd. Cast. | An Plin. l. 18. c. 17. de hoc intelligendus, dum scribit: Inter vitia segetum & luxuria est, cum onerata fertilitate procumbunt: alij volunt Plinium intelligere id, quod Theophr. 8. hist. <i>φυλλοφανία</i> , infanam foliorum luxuriam, vocavit. |
| Olyra, Cord. in Diosc. | V. Secale affinis peregrina. |
| Rogga five secale Plinij, Dod. | Nuchani, Garziæ. |
| Tipha cerealis & Tipha Theophrasti, Portæ. | Secales peregrinum genus, Lugd. |
| NI. Secale vernum vel minus. | |
| Siligo æstiva, Trag. | |
| Secale alterum, Lugd. | |
| Rogga five secale æstivum, Dod. | |

AVENA EIUQUE SPECIES.

AVENA, *Βρώμος* Dioscoridi l. 2. c. 116. forsan à *Βρώμα*, quod cibum significat: nam ut autor est Plin. l. 18. c. 17. Germaniæ populi huius pulve vivunt. Theophr. 4. hist. 6. ex Zea Avenæ scribit: at Plin. l. c. Aven. primū frumenti vitū esse, & Hordeum in eam degenerare, refert.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| I. Avena vulgaris seu alba. | Avena mitior & fativa, Cæf. |
| Avena, Brunf. Matth. Fuch. Dod. Tur. Ama. | II. Avena nigra. |
| Lac. Lon. Ad. Cast. Tab. Lugd. | Avena altera, Ang. |
| Avena fativa & prima, Trag. | Bromos, Ama. |
| Avena vesca, Ad. Lob. Ger. | Avena sylvestrior nigra, Cæf. |
| Avena frumentum, Cord. in Diosc. | III. Avena nuda. |
| Avenæ prima species, Ang. | Avena nuda, Ad. Lob. Dod. Tab. Ger. |

USTILAGO.

USTILAGO, frugum, præsertim spicatarum, maximè Avenæ & Secales, morbus est. Theophr. 8. hist. 10. de frugum vitiiis agens, scribit, quædam communia esse omnibus seminibus, ut *ἰσχυρὸν*, id est, Rubigo, sicut Gaza vertit: quædam verò propria quibusdam, ut Tabitudo radici, Ciceri & Erucarum infestatio. Sic & 3. causar. 27. Rubiginis, & Plin. l. 18. c. 17. meminere.

I. Utilita-

I. Vstilago secales.

Vstilago, Trag. Dod. (cui Avenæ ac Tritici proprie morbus) Lon. Lob. Lugd. (cui præfertim Avenæ pestis est.)

Vstilago fcalina, Tab.

II. Vstilago hordei.

Vstilago polystichi, & Vstilago hordei dystichi, Lob. ico.

Vstilago hordeacea, Tab.

III. Vstilago Avenæ: & Lob. ico.

Vstilago Avenacea, Tab.

ORYZA.

ORYZA Dioſcoridi l. 2. cap. 117. Οῤῥῖζον Theoph. 4. hist. 5. Oryza Plin. l. 8. cap. 7. ex qua Prifanam fieri ſcribit. Per Prifanam aliqui intelligunt Oryzam, quæ vulgo cortice nudata venalis habetur.

I. Oryza Italica, ad differentiam Germanicæ, de qua inter Zeas.

Oryza, Brunf. Matth. Ang. Tur. Cord. in Dioſc. Lac. Dod. Lob. Lon. Cæſ. Caſt. Cam. Tab. Oryza peregrina, Trago.

Oryzam, frumentacearum generi, Dioſc. inter legumina, Galenus recenſet, Lugd.

Hordeum Galaticum Columellæ, Hermolaus, Ruel. Ama. & Tab. cenſuere.

II. Oryza Indiæ Orientali peculiaris.

Oryzæ peculiare genus, Regina Patenſis, Hollandiæ obulit, ut habetur in Ind. Or. par. 8. ſed quid? Oryzam ex India originem traxiſſe, & per univerſum ferè orbem diſſeminatam eſſe, in 6. part. Ind. Orient. ſcribitur. Hæc præcipua omnium Indiæ Orientalis locorum annona eſt, part. 3. Ind. Orient. c. 39. Hinc Indiſ loco panis eſt, ex ea placentas parantibus; ex

qua in China potum faciunt, quem in Peru Aquam vocant: in Iaponia vinum, quod Iavenſes Aracle nominant: & in Pegu, Aquam extrahunt, quæ cum aqua vitæ certat: part. 7. Ind. Orient. c. 36.

Diſtinguunt in Oryzam optimam, quam Girafol, & in vilioſiorem, quam Chambafal Indi vocant. Linſcot. par. 2. Ind. Or. c. 37. & par. 4. c. 6. In ſumma, Oryzæ uſus, univerſis prænationibus, non minus quàm frumentum familiaris eſt: ut de China, Iaponia, Philippinis, & maxima Indiæ Orientalis parte ſileam, etiâ per Africam & Aethiopiam univerſam, Indiæ & Europæi, qui panes ex frumento habent, Oryza, obſonij vice, cum lacte aut aqua decoctâ, utuntur.

FRUMENTVM INDICVM.

ETSI in Canaria frumenti varia genera habeantur: attamen poſitiſſimum apud Indos quadruplex eſt: Primum, Milium Indicum: ſecundum Mays, quod Triticum ipſorum eſt: tertium, quod Manigette indi etant: quartum eſt Oryza, quæ in Regno Congiano Mazza di Manputo, id eſt, ſemen Luſitanicum, at Malaicenſes Bras appellant: & tres poſteriores ſpecies delineata in 6. parte hiſtorie Indiæ Orientalis figura 14. proponuntur.

I. Frumentum Indicum, ſeu Milium Indicum. Milium hoc ſpicas habet oblongas, ex granulis colore ſemen Cannabis æmulantibus, compoſitas, formâ nonnihil oblongis, utriculis ſive folliculis ariſtis carentibus incluſis inſtar Diſpaci herbæ, quod trium menſium ſpacio ſuccreſcit: dein abſcinditur, in terram menſis ſpacio deponitur, ut Solis calore probè exicceſcat

& percoquatur: tandem ſpicæ à culmis reſecantur, in falculos collectæ domum deportantur, ſtramine operiendis, vel muniendis ædificijs, deſtinato. Hoc frumenti genus optimum eſt, quod fractum & comminutum, cãdidiffimum apparet, ex quo facili labore panis pinſitur, cùm admodum molle ſit, & attritu ſtatim, maſſam conficiendis panibus aptam, præbeat. Et hoc fru-

hoc frumenti genus, semper habuerunt, etiam ante Lusitanorum adventum: hist. Ind. Orient. part. 6. cap. 30.

An semen, quod Congiani Lucum vocant, canabis grana, nisi quod paulo sit majus, referens, quod molâ manuariâ, subactum & pistum, panem præbet candidum, tritico non inferiorem, hist. Ind. Orient. part. 1. l. 2. cap. 1.

An Arundinis genus granum ferens, nostro Secali aut frumento simile, quod decoctum esui est aptum: Insulæ Virginæ historia.

II. Frumentum Indicum grano avellanæ magnitudine.

Folia habet angusta & tenuia, sed in tantam altitudinem, quemadmodum tertium, non exurgit: ex ramis frumentum illud instar nucum avellanarum dependet, quod aristas habet cum Tritico sive Mays convenientes, colore rubicundo: grana cute tenella involuta, putaminibus includuntur, & peculiaribus quasi loculis, admodum granorum in malo Punico, ab invicem distincta: feminatur in agris, quemadmodum frumentum verum, potissimum in Africa, & quidē in peculiari quodam loco, qui nomen etiam suum inde obtinuit: & Aethiopibus, Manigette: Batavis, Grain dicitur: part. 6. Indic. Or. cap. 38.

III. Frumentum Indicum Mays dictum.

An Triticum Baſtrianum Plin. l. 18. c. 7.

Frumentum Arabicum, quod Mays nominant, in hist. Ind. Orient. part. 8.

Frumentum ex Guineâ, ibid.

Triticum Indicum sive Mays, quod Lusitani apud Nigritas primò seminarunt: in hist. Ind. Orient. part. 6. c. 31.

Pagatovv, Virginæ indigenis.

Avati fructus, ex quo Brasiliiani potum Kaavvy coquunt: Stad. par. 3. Amer. c. 7.

Milium amplum, Triticum Sarracenicum, barbaris Avati, quod idem cum Indorum Mays & Triticum Peruanum, Lerio part. 3. Amer. c. 8.

Milium Abayn, id est, Siligo Turcica in Baly, par. 3. Ind. Or. c. 40.

Frumentum Asiaticum: par. 7. Ind. Occid.

Milium Brasilianum: par. 3. Amer.

Milium in florida: par. 6. Ind. Occid.

Differentia notanda, cum duo genera, ad sex

vel septem pedes, tertium ad decem in Virgi-

neâ excrescat. Sic alterum crassius & rotundi-

us, ut quod è Lucanis tollitur: alterum subtilius & aridius, quod Morochen appellant.

Granum hoc magni proventus est (bis enim Martio & Junio serunt: part. 2. Ind. Occid.) cum in Peru ex uno grano 600. gignantur: at in Virginea mille & quinquaginta, & interdum bina millia reddat. Siquidem spica vel una, vel binæ, ternæ, vel quaternæ, & singulæ spicæ quinquies, sexies, & septies centena grana in Virginea contineant: apud Americanos, singuli culmi tribus quatuorve spicis onusti adoleſcunt, quarum singulæ, grana centum & amplius pendunt. Sic grana alba, rubra, flava, cærulea, in Virginea sunt.

Frugum omnium communissimum Indiæ Occidentalis locis, in Peru, nova Hispania, Guatimala, Chile, & universa terra firma, in Insulis verò non item: sic & in Indiæ Orientalis aliquibus. Hoc Indi communiter cum primo commiscunt: & ex hoc solo panem Arepas nominatum, & potum Chicha (potus subaculus Cici dictus: par. 9. Ind. Occid. addit.) Indis vocatum; ut fortissimum, quod in Peru Sora dicitur.

an hæc herba quâ in Brasilia aliquando senes virilia contegunt, cujus folia duorum digitorum latitudine, paulum incurva, in longitudinem excrescentia, veluti calamus qui spicam Milij sive Tritici Sarracenicici contegit: Lerio in Brasil. cap. 7.

Haftenus ex hist. Indica: subjiciamus recentiorum nomina.

Turcicum frumentum, Trag. (cui & Typhamagna) Fuch.

Frumentum Indicum, perperam Turcicum, Matth. Lon. Cast.

Milium Indicum Plinianum, Ruell. Gef. Ad. Lob. cui & Mays Occidentalium.

Milium Indicum, Dod. Gal. (cui & frumentum Asiaticum,) Tur. Lac. Gef. cat.

Frumenti octava species Turcic. dictum, Ang. Triticum Baſtrianum sive Indicum, Cord. hist. Gef. hort.

Frumentum Turcicum, Ang. Dod. Gef. hor. (cui & Panicum peregrinum rectius,) Tab. Ger.

Triticum Indicum Fuch. & Matth. Lugd. Portę.

Maizum, Monardi.

Maiz, triticum Indicum potius, quàm frumentum Turcicum dicendum, cum non ex Asia,

D

sed In-

sed India primum sit allatum, Cam.

Maiz Indorum, Panicum Indicum, Cæf.

Mays, quod nulla specie cum Milio, quod Plinius ex India in Italiam importari scribit, convenit, Joseph. Acofta hist. Ind. l. 4. c. 16.

Variat apud nos floris colore, purpureo, rubeo, luteo, aliquando pro ratione fructus futuri: granorum in colore quatuor præcipue genera: habetur enim granis rufescentibus, nigricantibus, crocantibus, & subalbicantibus.

IV. Frumentum Ind. Mays dictum alterum.

Milium Indicum magnum aliud, Lob. ico.

Milium Indicum, Cast.

Frumentum Indicum, Tab.

Frumentum Asiaticum, Ger.

Hoc cum spicarum colore variet, idcirco Tabernæmontanus spicas sedecim, Gerardus ve-

ro 12. pingit: quæ colore sunt vel simplici, vel mixto: simplici, albo, luteo, aureo, violaceo, spadiceo, nigro: mixtis coloribus, albo, spadiceo: & cæruleo: cæruleo, albo, nigro, partimque punctis spadiceis mixto: albo, violaceo, luteo cum punctis spadiceis: rubro, nigro & spadiceo: luteo albo, aliquando cæruleo & violaceo, aliquando luteo & albo, violaceis & cæruleis punctis aspersis: rubro & spadiceo: aureo & albo: cæruleo, luteo, albo, & punctis cæruleis aspersis: denique cæruleo, luteo, violaceo & albo.

V. Frumentum Indic. Mays dictum minus. Hujus Tabern. meminit, quod prioris altitudinem tantum mediam attingat, cuius spicæ non ad culmorum latera, sed floribus succedant, colore albo, rubeo, spadiceo, luteo, atrorubente, & aliquando mixto.

MILIUM EJUSQUE SPECIES.

Milium, à miliari summa Festo, quasi millesimum granum ferat. Κέγγε Diofcor. lib. 2. cap. 119. & Theoph. 8. hist. 3. à numerosissimis & minutis granis ficuum, quæ Κέγγε αμύδες vocantur. Hippocrati secundum Galenum πικραλ. Milium, Plin. lib. 18. c. 7.

I. Milium semine luteo vel albo.

Milium, Brunf. Trag. Marth. Fuch. Tur. Dod.

Cord. in Diofcor. Lac. Lon. Lob. Cast. Tab. Lugd.

Milium Diofcoridis, Theophrasti & Plin. Cæf.

Milium vulgare, Gef. hor. Ad. commune, Ang.

Milium aureum & album, Cam.

II. Milium semine nigro.

Milij nigri species apud Oribasium, Ang.

Milium semine nigro & latiore juba, Lob. obs.

Milij alterum genus è colore nigro deterius, Cæfalp.

Milium jubâ subinde coloris nigricantis, Dod.

Milium nigrum, Tab. Cam. Ger.

Hoc quod in Argovia Bernatum frequenter feritur, à vulgato differt folijs latioribus, caule non adeo alto, jubâ sparsâ & minore, semine aliquantum majore & rotundiore, & ad pulres conficiendas altero longè utiliore.

III. Milium Sabæum.

Millo, frumentum in Guinea parvum, Milij forma sed dulcius, ex quo panem & vinum conficiunt in Regno Sabo: ad Clus. curas post.

IV. Milium arundinaceum subrotundo semine, Sorgo nominatum.

Milium quod ex India in Italiam investum nigro colore, Plinio.

Panicum Diofcoridis & Plinij, Trag.

Milium Indicum, Marth. Fuch. ico. (cui & Sarracenicum,) Gef. hor. Cord. hist. Guiland. Lugd. Cast. def.

Milium Indicum Plinij, Ang. Cam.

Milium aliud, Ama.

Panicum Indicum, Gef. hor.

Sorghi, Fuch. Dod. gal. (cui Panici species videtur,) Lon.

Sorgum, Gef. hor. Tab. (cui & Panicum loculare,) Ger.

Sorgo, Melica Italarum, Lob. Sorgo Infubrum, Bellonio.

Melica sive Sorgum, Dod.

Melica, fortè à Meline: Sagina alijs à saginando, Calamagrostis Diofcoridis ex hoc genere videtur, Cæf.

Variat feminis colore, quod aliàs rufum, aliàs plenius nigricat: habetur & album & luteum, quod

Sorgum fructu rubro & fructu albo, Eyst.

V. Milium arundinac. plano alboque semine. Sorgo simile granum, Hareomen Arabum, Bellonio.

Dora, Rauvvolfio.

Milium Æthiopicum, Portæ.

an Mi-

an Milium album in Regno Congi, quod vocant, hist. Ind. Orient. part. prim. libro se-
Mazza di Congo, id est, semen Congianum, cundo, cap. primo.

PANICUM EIUSQUE SPECIES.

Eλυμ & μελίνη Dioscoridi lib. 2. cap. 120. Theoph. 8. hist. cap. 1. 3, 7. & 10. μελίνη. E' λυμ & μελίνη
forfan ab ἐλύω involuo. Plin. lib. 18. cap. 7. Panicum, a paniculis quibus semen inest.
Mel frugum Dioclis, eidem lib. 22. cap. 25. μελίνη, quasi melleum quidpiam.

I. Panicum Germanicum, sive paniculā
minore.

Milium agreste sive exiguum, Trag.

Panicum, Fuch. Tur. Dod. Cord. Gesner. hor.

Lon. Lob. Cæsalp. Cam. Tab. Ger.

Variat paniculis albis, flavis & purpureis:

femen album, luteum, rufescens: Dioscorides

frumentaceis, Gal. leguminibus jungit.

II. Panicum Italicum, sive paniculā majore.

Panicum Marcello, Hermolao, Ruellio, Mat-

thiolo, cui & domesticum: Anguil. Cæsalp.

Portæ.

Panicum sativum, Lugdunensi.

Panicum vulgare, Clus. hist.

Panicum aliud Indicum, paniculā villosā, Lob.

Panici Indici spica, Dodon.

Panicum Indicum, Tab. Ger.

III. Panicum Indicum spica obtusa cærulea.

Panicum cæruleum Indic. Ad. Lob. ico. Cam.

Tab.

Panicum Indicum, Dod. Ger. sive peregrinum,

Lugd.

Panicum Americanum, Clus. hist.

Panicula est subcærulea, in calidioribus

regionibus magis satuta.

IV. Panicum Indicum spicā longissimā.

Panici Americani spica grandis vel sesquipe-

dal, Clus. hist.

Panicum Æthiopicum ex Guinea, Clus. hist.

ap. ad lib. 6.

DE SESAMO ET ERYSIMO CEREALI.

CUM Dioscorides & Theophrastus Sesamum inter fruges retulerint: & Plin. lib. 18. cap. 10.
frumenta astina dixerit, Sesama, milium, panicum: sic & Erysimum in Asia & Græcia,
Sesamo simile asserat: & Theophrastus 2. caus. plant. 17. semina hæc, milium, sesamum, erysi-
mum inter fruges reposuerit: & 6. caus. plant. 19. Sesama & Erysimum sicca cibo idonea,
non verò viridia scripserit, de utroque nunc.

Sesamum & Sesama similiter Dioscoridi lib. 2. cap. 121. Theoph. pluribus locis σῆσαμον, aliis
σῆσαμα dicitur. Duplex Theophrastus agnovisse videtur, dum 8. hist. 5. inquit, Et Sesami
genus quoddam candidum datur.

SESAMUM VETERUM.

Sesamum, Matth. Ang. Tur. Lob. Dod. Cast.

Tab. Portæ.

Sesamum verum, Cord. in Diosc. Ges. hor.

Lugd. Cam.

Sesama, Cæsalp.

Sempsem, Alpino.

Semen ex Alexandria, Creta, Sicilia affertur.

ERYSIMUM.

Theophrasti folio hederaceo, τραχύφυλλον

φυτόφυρον, hirco-triticum & fagi-triticum, quod

fagineam glandem forma triquetra & colore

fordido quodammodo referat, licet multo

minus sit.

Ocymum veterum, Trago.

Frumentum Sarracenicum, Matth. Lugd. Cast.

Tragotrophon & Fago-triticum, Dod. gal.

Erysimi alterum genus Theoph. Cord. in Diosc.

Irion cerealis sive Erysimum Ruel.

Erysimum cereale, Ges. cat. Portæ.

Frumenti genus folio hederaceo, Eid.

Formentone, Ang. (cui Ocymum est Var-

ronis) Cæsalp.

Frumentum vaccinum, Lon.

Erysimum Theophrasti, Lob.

Fegopyron, Dodonæo, Fagopyrum, Ad. (an

Erysimum Theoph.) Lob. ob. (& Lamplana

vera quorundam,) Franco.

Ocymum cereale, Clus. pan. Tab.

Tragopyron, Gerard.
Polygonum hederaceum, Col.
Sarracenicum dicitur, quia ex Africa primum

delatum credatur: nam veteribus vel non cognitum, vel non usitatum, vel neglectum, Dodonæus asserit.

PHALARIS.

PHALARIS Plinio lib. 27. cap. 12. *Φάλαρις* Dioscoridi lib. 3. cap. 159. an Melia altera Theophrasti.

I. Phalaris major semine albo.
Phalaris Dioscoridis, Trag. ico.
Phalaris, Matth. Ang. Tur. Dod. Cord. Gef.
hor. [cui & Canariense semen,] Lon. Lob.
Cæsalp. Cast. Cam. Lugd. Tab. Ger.
Phalaris herba, Gef. cat.
Miliun alterum Theoph. Dalech. in Plin.

II. Phalaris major semine nigro.
Cuneno, Melitensium incolis.
Granum hoc in Melita frequens, Canariis
insulis familiare, Malsiliæ notum, nigrum,
oblongum, milio simile, quo Canarios pasce-
res præcipue nutriunt: ex grano aliquando à
Dalechampio fato, Phalaris prodiit.



SECTIO QUINTA.

ASPHODELUS, PHALANGIUM.

ASPHODELUS sive Hastula Regia, quod regis sceptri effigiem, dum floret, referat.
Ἀσφοδελὺς unius Dioscor. lib. 2. c. 199. meminit, cuius florem *ἀσφελόν* appellant: &
Theophrast. 1. hist. 10. & 7. ejusd. 11. & 12. qui 1. hist. 7. *ἀσφελόν*, pro tota planta usurpat.
Asphodelum aliquos Herois appellasse, Dionysium marem ac faminam fecisse, & aliquos
Halymon Hesiodi existimasse, Plin. lib. 22. cap. 12. scribit. Sic lib. 21. cap. 17. restatur, Theoph.
& ferè Græcos & Pythagoram, caulem Anthericon, radicem verò, quæ ex octuaginta simul
acernatis bulbis constat, Asphodelum nominasse: cuius genera duo faciunt: quod etiam
lib. & cap. 22. ostendit.

I. Asphodelus albus ramosus mas.
Asphodelus primus, Ang. Clus. hist.
Asphodelus major, Clus. hisp. albus, Eyft.
Asphodelus ramosus, Lob. ico. Ger.
Asphodelus caule ramoso maritimus & mas,
Cæf.

Hic sæpè radicibus ducentis, aut pluribus
ab uno capite dependentibus reperitur.

II. Asphodelus albus non ramosus.
Asphodelus, Marcel. Ruel. Matth. Ama. Gef.
cat. Lon. Cast. verus, Cord. in Dioscorid.
Asphodelus mas, Dod. gal.
Asphodelus alter, Ang. Clus. hist.
Hastula regia, Trag. lat. Lon. Lac. Gef. hor.
Lugd.
Asphodelus albus, Gef. hor. ap. Clus. hisp.
Dod. Tab. Cam. major, albus, Lob.

Asphodelus caule simplici, Cæf.
Asphodelus non ramosus, Ger.

III. Asphodelus autumnalis.

Asphodelus autumnalis sive major, Cam.

I V. Asphodelus purpurascens foliis mac-
ularis.

Asphodelus flore incarnato pallido, Dod. gal.

Asphodelus flore suave rubente, Lob. ico.

Asphodelus flore rubente, Tab. Ger.

V. Asphodelus luteus & flore & radice.

Asphodelus flore melino, Matth. ico.

Asphodelus luteus, Gefner. hor. Dod. Cæsalp.
Lugd.

Asphodel. luteus minor, Ad & Lob. (& Eri-
zambac Arabum,) Tab. Lugd. Gerar.

Iphyon Theoph. videtur, Ang.

Asphodelus fœmina sive luteus, Cam. epit.
Hastula

- Hastula regia minor, & Asphodel. minor, Cast.
 Asphodelus luteo flore & radice, Cam.
 Meminere Tabern. & Gerar. Asphodeli lutei,
 qui albo, radicibus & floribus sit similis, sed
 foliis brevioribus, cauleque latis foliis cincto,
 quem Asphodelum luteum nominant.
 VI. Asphodelus albus minimus.
 Asphodelus minimus, Clus. hist.
 VII. Asphodelus foliis fistulosis.
 Asphodelus tertius aliquibus maritimus, Ges.
 hort. ap.
 Asphodelus minor, Clus. Dod. Lugd. Cam.
 Phalangium Cretæ Salonenfis, Ad. Lob. Lugd.
 Ger.
 Phalangij alterum genus, Cæf.
 Phalangium Narbonense, Tab.
 VIII. Pseudoasphodelus palustris Anglicus.
 Asphodelus luteus palustris, Dod. Tab.
 Asphodelus palustris, Lugd.
 Asphodelus minimus luteus acori fol. palust.
 Lob.
 Asphodelus acorifolius palustris luteus, Ad.
 Asphodelus Belgicus palustris luteus, Lob. ad.
 part. alt.
 Pseudoasphodelus primus vel major, Clus.
 hist.
 IX. Pseudoasphodelus palustris Scoticus.
 Asphodelus minimus Noruegicus luteus palu-
 stris Scoticus & Lancastrienfis, Lob. advers.
 parte secunda.
 Asphodelus Lancastræ, Gerar.
 X. Pseudoasphodelus alpinus.
 Pseudoasphodelus pumilio foliis Iridis, Clus.
 pan. vel secundus, Eid. hist.

PHALANGIUM EIUQUE

Species.

Φαλαγγίς Diosc. lib. 3. cap. 122. meminixit: sic dictum Galeno, 8. simpl. facult. quod de-
 morsis à Phalangis auxiliatur, cui Φαλαγγίτης, & Plin. lib. 27. cap. 12. Phalangites,
 à quibusdam Phalangium, ab aliis Leucanthemum vocatur.

- I. Phalangium magno flore.
 Phalangium, Matth. Cast. majus, Ges. hor.
 Phalangium Matthioli, Lugd. Tab.
 Phalangium Allobrogicum majus, Clus. hist.
 ap. 2. Eyst.
 Phalangium Dalechampij, Lugd.
 Lilium polyrhizon Myconi, Lugd.
 II. Phalangium parvo flore non ramosum.
 Phalangites quorundam, Cord. in Diosc.
 Liliago, Cord. hist. ejus Scholiafti, Asphodelus
 Germanicus.
 Liliago Cordi, Asphodeli syl. species, Thal.
 Phalangium non ramosum, Lob. Dod. Tab.
 Ger.
 Phalangium cauliculis simplicibus, Cæfalp.
 Liliasphodelus albo flore quibusdam.
 Phalangio Allobrogico congener, vel Phalan-
 gium montanum, Clus. cur. post.
 Est majus folio longiore, & latiore, semi-
 ne majore: est alterum in quo omnia mino-
 ra, & folia angustiora, in monte Wasserfall:
 cujus radices sæpe pro Rusci veri radicibus,
 magno errore divenduntur.
 III. Phalangium parvo flore ramosum.
 Moly alterum Plinij, Dod. gal.
 Phalangites sive Palangium herba, Gesner.
 hor.
 Phalangium ramosum, Lob. Dod. Lugd. Tab.
 Ger. Eyst.
 Phalangium, Asphodelus parvus dici posset,
 Cæfalp.
 Phalangium majus, Cam.



SECTIO SEXTA.

XYRIS, IRIS, ACORUS, GALANGA, ZIN-
ZIBER, ZEDOARIA, COSTUS, CURCUMA
ET CROCUS INDICUS.

XYRIS.

Eſt *Pis* ob folij ſimilitudinem, quaſi raſorium cultrum dicitur, de qua Dioſc. lib. 4. cap. 22.
Iris *ἀγρία*, *Iris ſylveſtris* Theophrasto: Plin. lib. 21. cap. 20. *Iris ſylveſtris*, à quibusdam
Xyrin vocata. *Spatula* ſætida, tum ob figuram folij gladiolum referentis, tum quod gravem
odorem exhaleat, vulgo dicitur.

I. Gladiolus ſætidus.

Xyris ſive *Iris ſylveſt.* Dioſcoridi.

Sparganium ſive Xiphidion, Offic. ſpatula ſætida, Ruel. Ama.

Spatula ſætida, Trag. (cui & Gladiolus Italic.)

Fuch. Lon. Gef. hor. Ang. Cæſ. Tab. Dod.

Xyris, Matth. Lac. Tur. Cord. Cornaro, Lob.

Caſt. Cam. & Ger.

Xyris vel *Iris agria* Theo. Dod. gal. Ad. Lob. ico.

Xyris Matthioli & Lobeli, Lugd.

Cum Matthioli & Lobeli figura, radicis forma differant, idcirco in hiſtoria Lugdunenſi duæ figuræ poſitæ: dum enim adhuc juvenca eſt, radicem habet fibroſam ſeu capillarem: ubi verò adolevit, craſſa eſt. Flos communiter obſoletè purpureus: aliquando ſaturata purpura aridet, rariuſ rubet.

II. Gladiolus ſætidus maritimus.

Xyris maritima, quam fluctus in littora, cum aliis purgamentis reiiciunt, Lugd.

IRIS ET EIUS DIFFERENTIÆ.

Iris, ſeſ Dioſc. l. 1. c. 1. à cæleſtis arcus ſimilitudine nomen accepit. Species complures eſſe, colore ſoris differentes, idem oſtendit, nempe candido, pallente, luteo, (alii nigros legunt,) purpureo, cæruleo, ſeu cyaneo. Quam colorum diverſitatem non in uno flore reperiri, videtur Dioſcorides, (ut aliqui credunt,) voluiſſe: ſiquidem de Illyrica maxime loquatur, quam Braſſarvo-
lus in Illyrico plerumq. candidis, aliàs pallidis, nonnunquam luteis & etiam purpureis conſpexit. Theo. 6. cauſ. 13. *Iris odorata* eſt, & à gratia palati nomen accepit, quæ in Illyride (6. cauſ. 28.) melior quàm in Macedonia: in Thracia verò, locisq. frigidioribus odore penitus caret. Gaze Iridis vocem Conſecratricem vertit. Plin. l. 21. c. 7. *Iris diverſicolor* ſpecie floret, ſicut & arcus cæleſtis, unde & nomen: laudatiſſima in Illyrico; proxima in Macedonia, quæ longiſſima, candidans, & exilis: tertium locum habet Africana, quæ ampliſſima & guſtu amariſſima. Illyrica quoq. duum generum: Raphanitis, à ſimilitudine, (forè *Aſtragalites* Gal. & *Actij*.) quæ & melior: Rhizotomos ſubrufa: non improbat & Piſidica.

Recentiores multas differentias agnoſcunt: quare dividemus in eam, quæ radice eſt geniculata, & eam quæ radice eſt bulbosa: hæ enim & foliorum latitudine anguſtiæ, ſlorisq. colore, & ratione loci natalis variant.

IRIS LATIFOLIA.

I. *Iris vulgaris* Germanica ſive ſylveſtris.

Iris, Brunf. Gefner. cat. ſylveſtris, Matth. Lac.

Cord. hiſt. Caſt. Lugd. Tab. ſyl. prima, Adverf.

Iris ſyl. major, Matth. ep. Gef. hor.

Iris Germanica, Fuch. cærulea, Dod.

Gladiolus cæruleus major, Trag.

Iris latifolia major vulgaris, Cluſ. hiſt.

Iris biflora, Ger. ico.

Hæc eſt, quam in tectorum culminibus, vinarum

nearum macerijis & muris plantare consue-
runt, quæ in hortos translata, cultura specio-
sior redditur.

II. Iris hortensis latifolia.

Iris Germanica, Trag. Domestica, Matth. Lac.
Cast. Lugd.

Iris, Tur. Ang. Dod. Cord. in Diosc. Lon. Tab.

Iris communis, Ges. hor. vulgaris, Lob. Ger.

Iris nostra fativa, Cord. hist.

Iris, Hyacinthus Virgilij, Columellæ & Palla-
dij, Ang. Cam.

Iris major cærulea, vel purpurea, Cam.

Iris latifolia vulgaris cærulea, Eyf.

III. Iris hortensis pallide cærulea.

Iris cujus flores aquæ cyaneum colorem refe-
runt, Dod.

Iris dilute cærulea involucri albo, Tab.

Iris Chalcedonica, Ger. ico.

Iris latifolia major obsoleta, Clus. hist.

IV. Iris hortensis alba Germanica.

Iris albo flore, Ges. hor. alba, Tab. Ger.

Iris vulgaris candidis floribus, Lob. ico. Lugd.

Iris candida, Dod. sub Iride altera.

V. Iris alba Florentina.

an Iris Africana Dioscoridis?

Iris fativa floribus nivei coloris, Matth.

Iris Florentina seu scemina, Ges. hor.

Iris Florentina, Ireos officin. Dod. gal. Lon. Ad.

Tab. Ger. Franco, Eyf.

Iris Illyrica, Cord. in Diosc.

Iris flore ex toto candido, Cæs. alp.

Iris major alba, Illyrica vulgo vel potius Flo-

rentina, Cam.

Iris latifolia major alba, Clus. hist.

Hæc Florentina à Germanica differt, quod

hujus radix siccata: non secus ac vulgaris cæru-

lea, corrugatur: illius verò non, quæ etiam ra-

dice minor est: in officinis nostris Illyrica ha-

betur, quæ Venerijs adfertur, quæ rufescit, mi-

nus nitida est, at odore est suaviore.

VI. Iris Illyrica.

Iris Illyrica, Eyf. quæ à Florentina aliquan-

tum differt, quod hujus flos candidissimus sit,

cum Illyricæ sit coloris dilute cærulei pallescen-

tis & odore remissiore.

IRIS LATIFOLIA PERE-

grina major.

I. Iris Susiana flore maximo ex albo nigri-

cante.

Iris Susiana, Clus. pan.

Iris Chalcedonica variegata, Lob. Tab.

Iridi luteæ variegatæ in Lugd. hist. jungitur.

Iris Camerarij, Ger. ico.

Iris latifolia major prima, Clus. hist.

Iris Chalcedonica latifolia, Eyf.

Iris Pharaonis, vel nigra Cretica quibusdam.

II. Iris Asiatica cærulea polyanthos.

Iris Asiatica cærulea, Clus. pan. sive latifolia

major 2. Eid. hist.

Iris Dalmatica major, Lob. ico. Lugd. Tab.

Ger. ico.

III. Iris Asiatica purpurea.

Iris Asiatica purpurea vel 3. Clus. pan.

Iris latifolia major 5. Eid. hist.

Huc referantur

Iris latifolia violaceo colore major, &

Iris latifolia major variegata, Eyf.

IV. Iris peregrina subrubens inodora.

Iris major latifolia sexta, Clus. hist.

V. Iris peregrina odore oxyacanthæ.

VI. Iris major latifolia 24. Clus. hist.

VI. Iris Dalmatica major,

Iris Dalmatica major, Clus. hisp. ut Lob. Lugd.

defc. Cam. Tab. Ger. & Chalcedonica 2. Tab.

icon.

Iris major latifolia 3. Clus. hist.

an Iris Lusitanica verna, Lob.

VII. Iris Byzantina purpureo cærulea.

Iris major latifolia 18. Clus. hist.

VIII. Iris Damascena polyanthos.

Iris major latifolia 4. sive Damascena, Clus.

hist.

IRIS LATIFOLIA GERMA-

nica & Pannonica.

I. Iris latifolia Germanica odore suavi.

Iris major latifolia 7. Clus. hist.

II. Iris latifolia Germanica odore Sambuci.

Iris major latifolia 8. Clus. hist.

III. Iris latifolia Germanica ochroleucos.

Iris major latifolia 28. Clus. hist.

IV. Iris latifolia Germanica candido pur-

purea.

Iris major latifolia 21. Clus. hist.

V. Iris latifolia odore oxyacanthæ.

Iris exotica, Camer. vel Iris 5. Clus. pan.

Iris major latifolia 14. Clus. hist.

VI. Iris latifolia Pannonica colore mul-

tiplici.

Iris

Iris varia caulifera, vel *Iris* 4. Clus. pan.

Iris major latifolia 15. Clus. hist.

Iris Pannonica 4. Clusij, Tab.

Iris lutea variegata, Ger. icon.

VII. *Iris latifolia alba viridis*.

Iris major latifolia 16. Clus. hist.

VIII. *Iris latifolia caule aphylo*.

Iris 7. & *Iris caulifera purpurea* 1. & 2. Clus. pan.

Iris major latifolia 25. & 26. Clus. hist.

Variat: in illa, folia circa caulem minus, in hac, magis purpurascunt.

IX. *Iris latifolia candida*, purpureis venis distincta.

Iris major latifolia 27. Clus. hist.

Iris Portugalia, Eyfset.

IRIS LATIFOLIA

Belgica.

I. *Iris latifolia Belgica* odore Sambuci.

Iris Lusitanica verna, Lob. quoad icon.

Iris latifolia major 9. Clus. hist.

II. *Iris latifolia Belgica* versicolor odore Sambuci.

Iris major latifolia decima, Clus. hist. def. Eyfset.

III. *Iris latifolia Belgica* odore Sambuci altera.

Iris latifolia major 11. Clus. hist.

IV. *Iris latifolia Belgica* variegata.

Iris major latifolia 12. Clus. hist.

V. *Iris latifolia Belgica* cærulea versicolor.

Iris major latifolia 13. Clus. hist.

VI. *Iris latifolia ex albo* pallescens striata.

Iris major latifolia 17. Clus. hist.

VII. *Iris latifolia humilior* purpurea.

Iris major latifolia 19. Clus. hist.

VIII. *Iris latifolia humilior* versicolor.

Iris major latifolia 20. Clus. hist.

IRIS BIFLORA.

I. *Iris biflora* flore minore, odore lilij convallij.

an *Raphanitis* Plinij: & *Astragalites* Aëcio.

Iris biflora, Clus. hisp. Lugd.

Iris biflora Lusitanica, Lob. Dod.

Iris latifolia major 22. Clus. hist.

II. *Iridi bifloræ* affinis flore majore.

Iris Illyrica, vel *Iris* 6. Clus. pan.

Iris major latifolia 23. Clus. hist.

an *Iris Byzantina*, Camerarij huic similis?

III. *Iridi bifloræ* affinis minor.

Iris Dalmatica minor, Clus. hisp. Lob. Lugd.

Iris latifolia major 18. Clus. hist. quoad icon.

IRIS LATIFOLIA

Lutea.

I. *Iris lutea sativa*.

Iris sativa floribus aureis, Matth.

II. *Iris lutea variegata* Lobelij.

Iris lutea variegata, Lob. Lugd.

III. *Iris lutea variegata* Camerarij.

Iris variegata è luteo & purpureo, Cam.

Duplicem habet, aliam folijs languidis, aliam erectis.

Huc referenda.

Iris Pannonica variegata, Eyfset.

Flores ex purpureo flavescent, & lineis purpurascens, cibus distinguitur.

IV. *Iris media* longissimis folijs lutea.

Iris Tripolitana mediam inter latifolias & angustifolias, Clus. hist.

IRIS ANGUSTIFOLIA.

I. *Iris pratensis angustifolia* folio foetido.

Iris angustifolia media, Clus. hisp.

Iris angustifolia major, sive prima, Clus. hist.

Iris folijs angustis prima Clusij, Eyfset.

II. *Iris pratensis angustifolia* non foetida altior.

Iris angustifolia media, sive *Iris angustifolia Pannonica* vario flore, & *Iridis undecimæ* species prior, Clus. pan.

Iris sylvestris Byzantina peramœna, Lob. icon.

& Ger.

Iris syl. angustifolia major, Tab.

Iris undecima Clusij, Camer.

Iris tenuifolia, Thal.

Iris angustifolia altera, Clus. hist.

Iris pratensis major, Eyfset.

III. *Iris pratensis angustifolia* humilior.

Xiphion, seu *Gladiolus cæruleus minor*, Trag.

Iris tenuifolia, Cord. hist. Gef. hor.

Iris minor seu *tenuifolia*, Dod.

Pseudoacorus cæruleus Tragi, Lugd.

Iridis undecimæ altera species, Clus. pan.

Iridis angustifoliæ secundæ species altera, Eide.

dem hist.

Xyris minor, Camer.

IV. *Iris angustifolia* maritima major.

Iris maritima Narbonensis, Advers.

Iris

Iris sylv. maritima Narbonensis, Lob. ico.

Iris angustifolia media, vel ejus prima species, Clus. hisp.

Iris sylv. altera, Penæ, Lugd.

Iris maritima, Camer.

Iris angustifolia 3. Clus. hist. at 1. quoad icon.

V. Iris angustifolia maritima minor.

Iris angustifolia mediæ altera species, Clus. hisp.

Iris angustifolia quarta, Clus. hist.

VI. Iris angustifolia hortensis versicolor.

Iris angustifolia tertiæ species, Clus. hisp.

Iris angustifolia quinta, Clus. hist.

VII. Iris angustifolia candida lineis rubentibus notata.

Iris candidis floribus angustifolia, Lobel. ad part. 2.

VIII. Iris angustifolia bicolor.

Iris flore cæruleo obsoleto cinereæ polyflora, Lob.

Iris flore cæruleo polyanthos, Lugd.

IX. Iris angustifolia prunum redolens minor.

An Rhizoromos Plinij.

Iridis Illyricæ nomine ostensa Hermolao.

Iris perpusilla syl. angustifolia, Lob. observ.

Chamæiris angustifolia, Eid. ico. minor, Tab. Eyflet.

Chamæiris, Dod. & Lugd. odoratissima, Cam.

Iris angustifolia humilior, Clus. hisp.

Iris angustifolia minor, vel 12. Eid. pan.

Iris peregrina, Illyrica vulgo, Cæsalp.

Chamæiris vel Iris humilis, Cam. in Matth.

Chamæiris tenuifolia, Ger.

Iridis angustifoliæ sextæ species altera, Clus. hist.

X. Iris angustifolia prunum redolens major.

Iris sylvestris minor, Matth. Cast.

Iris syl. altera, Gæf. hor. Lugd.

Chamæiris angustifolia, Tab. Ger.

Iridis angustifoliæ sextæ species prima, Clus. hist.

Chamæiris odore carens, Cam.

CHAMÆIRIS.

I. Chamæiris major saturatè purpurea biflora.

Chamæiris latifolia biflora, Eyflet.

II. Chamæiris variegata.

Iris perpusilla latifolia, Lob. observ.

Iridis perpusillæ latifoliæ varietas, Eid. ico.

Irid. humili latifoliæ similis, Clus. hisp.

Chamæiris seu alia perpusilla Iris latifolia, Lugd.

Iris sylv. minor latifolia, Tab.

Iris violacea, Ger. ico.

Chamæiridis latifoliæ genus 1. cum icone Chamæiridis nivæ Lobelij, Clus. hist.

Flos ex cæruleo dilutus aut candidus, aut pallens, aut purpureus, aut violaceus: huc pertinet.

Chamæiris cæruleo & violaceo colore, Eyflet.

III. Chamæiris flore saturo violaceo.

Chamæiris latifolia Pannonica major, vel Iris octava, Clus. pan.

Chamæiris latifolia major, addida figura Chamæiridis latifoliæ flore rubello Lobelij, Clus. hist.

Flos hujus aliquando purpureus, aliquando eleganter cæruleus est.

IV. Chamæiris minor, flore purpureo.

Iris minor, Dodon.

Iris violacea parva, Lob. ico.

Chamæiris latifolia minor purpurea, vel Iridis 9. species prima, Clus. pan.

Chamæiris latifolia minor prima, Clus. hist.

Flos saturatioris purpuræ, odoratus: interdum dilutior & inodorus.

V. Chamæiris minor flore purpureo cæruleo.

Chamæiris latifolia minor cærulea, vel Iridis 9. species altera, Clus. pan.

Chamæiris latifolia minor 2. Clus. hist.

VI. Chamæiris minor flore rubello.

Chamæiris latifolia flore rubello, Lob.

Chamæiris latifolia minor rubescens, vel Iridis 9. species tertia, Clus. pan.

Chamæiris latifolia minor tertia, Clus. hist.

Floris colore variat purpureo, cæruleo, rubescens, pallido, albo & vario: est flore odoro & inodoro.

VII. Chamæiris minor flore variè picto.

Chamæiris latifolia minor septima, Clus. hist.

VIII. Chamæiris flore purpureo flavescente.

Chamæiris latifolia minor octava, Clus. hist.

Eyflet.

Huc referri debet

Chamæiris flavo & purpurascens flore, Eyflet.

IX. Chamæiris flore pallido & albo.

Chamæiris latifolia minor, vel Iridis 9. species 4. Clus. pan.

E

Chamæiris

Chamæiris latifolia minor 4. Eid. hist.

Huic similis est.

Chamæiris latifolia minima, Eyf.

X. Chamæiris minor flore variegato.

Chamæiris latifolia minor varia, vel Iridis 9. species 5. Clus. pan.

Chamæiris latifolia minor 5. Eid. hist.

XI. Chamæiris flore luteo, vel candido.

Iris minor lutea, Dod.

Chamæiris lutea altera, Lob. ico.

Chamæiris nivea, aut candida, Eidem. & Eyf.

Huc pertinet,

Chamæiris flore argenteo & flore candido, Eyf.

XII. Chamæiris flore obsoleto pallido.

Chamæiris latifolia minor sexta, Clus. hist.

XIII. Chamæiris flore pallide luteo, vel

Chamæiris minor *ἡχρόλινος*.

Chamæiris latifolia minor nona, hist.

XIV. Chamæiris minor flore purpureo.

Chamæiris latifolia minor 10. Clus. hist. Eyf.

XV. Chamæiris candicans venis variis distincta.

Chamæiris latifolia minor 11. Clus. hist.

XVI. Chamæiris saxatilis Gallica.

Iris perpusilla saxatilis latifolia acaulos ferme, Adver. & Lob. ico.

Iris pusilla sylvestris, Cæsalp.

Iris perpusilla & saxatilis, Lugd.

an Iris *ἀνθαλός*, Cam.

Variat: altera flore est purpureo & radice odorata; altera flore pallido, radice inodora.

XVII. Chamæiris latifolia saxatilis Lusitanica.

Iris humilis latifolia, Clus. hisp.

Iridis aliud genus humilior, Eid. hist.

ACORUS.

AΚΟΡΟΣ, quia τῆς κόρης, id est, pupillis sive aciei oculorum caliginose medetur, dicitur, de quo Dioscorid. lib. 1. cap. 2. Meminit Plin. lib. 25. cap. 13. Acori Iridis folijs, radicibus nigris: quare cum & Dioscoridis & nostra, sit radicibus albicantibus, candidaq; commendetur, de hac Plinius intelligendus non est.

I. Acorus verus, sive Calam. aromat. Officinarium.

Acorus, perperam Calamus aromaticus officinarum, Manardo, Trag. Matth. Cord. Gesner. Dod. Ad. Lob.

Calamus aromaticus vulgo, Amato, Mundellæ, Cæsalp.

Acorum, Lon. Cam. Tab. Ger. Eyf.

Acorum legitimum, Clus. hisp. verum, Lugd.

Calamus noster, Iridis species, Ang.

II. Acorus adulterinus.

Iris in maritimis nascens, à Theophrasto & Plinio improbata.

Acorus, Brunf. Cord. hist. Lac. Cæsalp. Cam. Cast. Lob.

Acorus falsa, Cord. in Diosc. Ges. hor. vulgo, Cæsalp.

Acorum adulterinum, Trag. falsum, Matth. Cast.

Gladiolus luteis lilijs, Er. Cord. luteus, Fuch. ico. Lon.

Acorum officinarum, Fuch.

Acorus nostras, Ruel. palustris, Ad. Lob.

Acorus luteus falsus, Lugd.

Gladiolus aut Acorus falsus, Tur.

Gladiolus aquaticus, Ama.

Iris lutea, Dod. gal. Cord. hist.

Iris palustris lutea, Tab. Ger.

Iris agrestis, Ges. cat.

Pseudoiris, Dod. palustris, Eyf.

Butomon, Clus. hist.

III. Acorus adulterinus Aquitanicus.

Acorus Aquitanicus, Ad.

China spuria, Acori effigie, Lob. ico.

GALANGA.

CUM Galanga, quibusdam Acori, nonnullis Iridis species videatur, & minor à recentioribus Græcis Cyperus Babylonica nominetur, huc omnium optime referri posse censuimus. Græcis recentioribus γάλαγγα, Arabibus Galingian dicitur.

I. Galan-

- I. Galanga major, Matth. Cord. hist. Ad. majore, Clusius dubitat.
 Lon. Lob. Cæs. Lugd. Tab.
 Galanga crassa, Ama.
 Galangam, Schoenanthi radicem, volunt Monachi in Mesuem.
 Acorus veterum, Leonico & Brassau.
 Acorus seu Galanga major, Fuch. comp. Corn.
 Galanga crassior, Costæo.
 Lancuaz Javanensibus, apud quos crescit.
 Linsc. par. 4. Ind. Orient. cap. 39. & Tab. 18.
 Iridis genus, Clusio in Acoftam.
 Galangam Garzias ab Orto & Acofta proponunt: quos secuti sunt Durantes & Lugd.
 historia: an eadem sit cum nostra Galanga cem intellexit?
- II. Galanga, & Galanga minor officinatum.
 Galanga, Ruel. Brassav. Mund. Ges. cat. Officin.
 Cæsalp.
 Galanga minor, Matth. Cord. hist. Fuch. comp.
 Corn. (cui & Cyperus Babylonica,) Ad. Lon.
 Lob. Acoftæ. Lugd. Tab. Ger. Linsc. part. 4.
 Ind. Orient. cap. 39.
 Galanga Indica, Ama.
 Galanga tenuis, Costæo.
 Lavandou Chinenfibus, apud quos nascitur,
 Linsc. lib. cap.
 An Dioscorid. lib. 2. cap. 189. per Piperis radicem intellexit?

ZINZIBER EIUSQUE

Species.

ZINGIBER, cum folia Iridis & siliquam aliquatenus Xyridi similem habeat, de eo hic agendum: quod Diosc. lib. 2. cap. 190. *Ξιγγίβερις*; Galeno & Oribasio *Ξιγγίβερις* dicitur: Plin. lib. 12. cap. 7. *Zimpiberi*, & *Zingiberi* habet.

I. Zingiber.

Gingiber & Zingiber, Herbariis.
 Zingiber, cypero cognata herba, Cordo.
 Acofta pingit latissimis foliis, cum tamen ei
 Lacrymæ Jobi folia tribuat, ut & Monardes:
 at Adversaria, arundinaceis foliis, & rectius
 Lobelius in suo de Balsamo libello: hæc fecere,
 ut dubius essem, diversa ne forent. Accedit,
 quod Auror. 6. part. hist. Ind. Orient. cap. 38.
 scribat, primò tenuioris arundinis speciem
 præ se ferre: & mox subjungit, crescere etiam
 velut Gladiolus: sic Svertius in suo Florilegio,
 foliis & flore Iridis pingit.
 Zinziber flore albo facie Iridis nominans.
 Radices conditæ ex India Orient. adferuntur,
 Monarde monente; in nova Hispania & in

Cuba copiosè provenit, ut Joseph. Acoft. lib. 3.
 cap. 23. scrib.
 Reperiuntur apud Aromatarios, radices
 albæ & rubentes: hæ rubricæ, illæ sæpè cretæ
 infectæ, quò à teredinibus, cui candidiores &
 molliores magis obnoxie, præserventur: hæ
 Zingiberis albi, illæ rubri nomine, ab Amato
 donantur.

II. Zingiber fuscum.

Zingiber intus fuscum, Cord. hist.
 Mechin & Zingiber fuscum Officinis, Ad.
 Zingiber fuscum, Lugd.
 III. Zingiberi affinis cortice squamato.
 Mechini rara varietas, Ad. Lob. ico.
 Mechinum Penæ, vel Mechinum rarius, Lugd.
 Doronicum Arabum, Ponæ.

ZEDOARIA EIUSQUE

Species.

ZEDOARIA subjungitur, quia foliis & Gingiberis, sed majoribus, longioribus, & latioribus, ut & radice, & in Calecut Gingiber sylvestre dicitur, Garzia autore: à Javanensibus, apud quos in Sunda copiosè provenit, Canior nuncupatur. 4. part. Ind. Or. cap. 7. Sunt qui veterum Arnabo, & Zarnabum, & Zurumbet Arabum esse velint: recentioribus Gracis, *Zadseæ*, quam duplicem faciunt, longam & rotundam. Costus Syriacus Dioscoridis videtur.

I. Zedoaria longa.

Zedoaria & Veterum Arnabi altera species longa radice, Cord. hist.

E 2

Zedea-

Zedoaria radice longa, Clus. in coroll.
 Zedoaria Officin. Zerumbeth five Zurumbeth,
 Avicennæ & Serapionis, Dod.
 Zedoaria seu Costus Arabicus, Ang.
 Zadura five Zadura herba, Ad.
 Zedoaria, Bras. Lon. Lugd.
 Zadura vel Zaduvar, Ges. cat. Ruel. Fuch comp.
 Zeduaria vulgaris, Guil.
 Zedoaria Officin. Lob. vulgò appellata, Cæs.
 Zedoaria Arab. Zurumbeth, aroma Zingiberi
 simile, Græcis prætermisum, Ama.
 Zedoaria, aliquibus Costi species, Diosc. Frag.
 II. Zedoaria rotunda.
 Zurumbethum, Cord. hist.
 Zedoaria Arabum, Guil.
 Zedoaria quæ rotunda est, Clus. in coroll.
 Zedoaria loripes, Costæo in Mesuem.
 Zerumbeth & Zedoaria rotun. Ang. Fuch. com.
 Zedoaria rotunda, quæ Avicennæ Antora, Lon.
 Zerumbeth Serapionis, Lob.

Zerumbeth Javanensis canior, Linsc. par. 4.
 Ind. Or. fig. 20.

Hæc à priori alia ratione non differt, quam
 forma, & ejusdem radice partes esse dicimus,
 quemadmodum Lobelius, & hist. Lugd. figura
 proponunt: quare utraq; indifferenter uti pos-
 sumus, Conditur etiam Saccharo, & Zingiberi
 præfertur.

II. Zedoaria tuberosa nigricans.
 Zerumbeth Serapionis, Clus. in Garz. Lob.
 (quod cum rotunda junxit,) & Lugd.

Zadura & Zedoaria, Cast.

IV. Zedoaria Geiduar dicta.
 Geiduar Avicennæ Garziæ & Lugd.
 Gedvvar Clus. in exot. auctario.

Zedoaria vera, Garziæ, Cæs.
 Sambaya Malays, Geiduar Chinenfisbus, part.
 4. Ind. Or. c. 8.

Hanc Veronâ à Johanne Ponâ insigni Phar-
 macopæo accepimus.

COSTUS EJUSQUE SPECIES.

Costus sequitur, cum ejus species una Zingiberi similis sit, & initio Zingiberis sylvestris
 nomine vendiderint, Adversar. autoribus monentibus.

Tæ Kōsæ species tres Diosc. l. i. c. 15. proposuit: Arabicum, qui albus est: Indicum, qui
 niger & lævis: Syriacum, qui gravis buxi colore. At Plin. lib. & cap. 12. duo fecit genera: ni-
 grum, & quod melius, candicans. Theoph. 9. hist. 7. Costum solum nominat, & quidem inter ea,
 quæ ad unguenta apta sunt. Officina, in dulcem & amarum dividunt, cum tamen Galeno
 omnis Costus amarus sit: at Actuarius, Arabes securus, Costi dulcis meminit. Verum hæc ra-
 dix cum recens est, nullius amaritudinis particeps est, candidiorq; persistit: cum autem vetu-
 state corrumpi incipit, amaritudinem & nigredinem contrahit.

I. Costus Arabicus Dioscoridis.
 Costus albus seu Arabicus, Cord. hist.
 Costus verus, Valerando.
 Zingiberis effigie Costus Arabicus & Syriacus:
 non tamen genuinus costus est, Ad.
 Costi quoddam genus, Zingiberis radicibus si-
 mile, Clus. in Garz.
 Costus Arabicus, Cam. in Matth.
 Costus Arab. & Syriacus, Lugd.
 Cyperi Indi potius, quam Costi species, Co-
 stæo in Mes. At Paludanus notis in 4. part. In-
 diæ Or. c. 39. Syriacum ab Arabico distinguit,
 quatuor sibi esse genera scribens, Indicum ni-
 irum, Arabicum & Syriacum, cum genere
 quarto alio, quod Zingiberi simile sit.

II. Costus Iridem redolens.
 Costus Garziæ, Acoltæ. Fragofo.
 Costus Indicus, Ama. Clus. in Garz. Tab.
 Lugd.
 Costus facie radice centaurij majoris, Lob.
 Costus Lusitanicus, Cam. in Marth.
 Costus Indicus, Malays Puchodictus, quo no-
 mine pingitur in 4. par. hist. Ind. Or. tab. 20.

III. Costus corticosus.
 Costus Molucensis corticosus rugosus, Ad. Lob.
 ico. Lugd. historia sub uno titulo & hunc, & se-
 quentes 4. & 5. posuit.

IV. Costus lignosus.
 Costus Molucensis lignosus fervidior, Ad. Lo-
 bel. ico.

Costus

Costus Molucanus, Tab.

V. Costus effigie radices Solani furiosi, Ad. Lob. ico.

Costus alter peregrinus, Tab.

VI. Costus amarus Officinarum, seu Helenium, & Comagenium Discoridis.

Helenij Comagenij radix, Cord. in Diosc.

Inula Comagenia, Eid. hist.

Costus officin. Ad.

Costus amarus Pharmacop. Cam. ep. Matth.

Costus Comagenius adulterinus officin. Lob. icon.

Costus officin. amarus Costæo, Lon. Cast. Tab.

Costus Officin. adulterinus, Lugd.

VII. Costus dulcis officin. centaurio magno cognatus.

Costus dulcis officin. Lon. sed adulterin. Tab.

Costi Pharmacopolarum species major, Cam.

in Matth. lit. D.

Costus dulcis, Cast.

VIII. Costus adulterinus insipidus.

Costus alter litera B. notatus, Cam. in Matth.

IX. Costus Officinarum ingratus, sive Thapsiæ species.

Costi vice sæpè venditur & alia radix, per transversum in taleolas secta, crassitudine plerumque manum implens, foris fusca, intus candicans, cortice crasso, substantia rara, gustu acri admodum, & nauseosam salivam ciens, & quasi strangulans; & cum reritur, rancidam pinguedinem olens. Quare non Costus, sed Thapsiæ majoris, montis Gargani radix est, quæ non sine periculo intra corpus sumitur, quam Agyræ corrupto nomine cum Italis Costones, quasi Costum amarum vocant. At Cæsalpino Ferulæ cujusdam radix est.

CURCUMA.

K *ῥαζίνη* Dioscoridi: Indica herba, quæ Cyperis vocatur, Zingiberis effigie, Plin. lib. 21. cap. 18.

I. Cyperi genus ex India, Matth. Fuch. comp.

Cyperus Indicus Dioscor. & Curcuma officin.

Cord. hist. Clus. corol. Lon. Lob. Cæsal. Tab.

Cyperum Indicum Brasau. & Cortæus suspicantur.

Cyperi tertia species, vel Indus, Ama.

Curcuma longa & rotunda, Cord. hist.

Cyperis Indica, Ges. car.

Cyperus altera, radice lutea, Cast.

Terra merita, Ruel. Ad. Lob. ico. Lugd.

Duplex est, radice communiter longa, aliquando rotunda: hæc multo acrior existit, & cum Zingibere sæpè adfertur.

II. Crocum Indicum proposuit Garzias, folijs milij majoribus: & Acosta, folijs Orchidis Serapiæ dictæ majoribus latioribusque.

Croci Indici, Acostæ nomine, cum ejusdem figura, in Lugd. hist. proponitur.

Radix Zinziberis facie intus flava, Malaia, Cunhet. Linscot. par. 3. Ind. Or. c. 14.

Crocus Indicus, Lusitanis Saffran da Terra, planta lilio albo similis. Linsc. par. 4. Ind. Or. c. 3. & 7. cujus figura tab. 13. exhibetur: cui & Curcuma, cap. 8.

III. Ganti radix ac Zinziber ex China, qua Indi corpora sua fucant: part. 4. Ind. Orient. cap. 8.

IV. Tomon pute, radix Galangæ seu Curcumæ similis est, albicat, & ad illinenda corpora facit. l. c.

V. Caxumba, in Bantam Floers, quo in cibis condiendis & vestibus gossypinis tingendis utuntur; part. 4. Ind. Or. 7.



CASPARI BAUHINI
PINACIS THEATRI BOTANICI
LIBER SECVNDVS.
DE BULBOSIS.
SECTIO PRIMA.

IRIS BULBOSA: IRIS TUBEROSA: SISYRIN-
CHIUM: GLADIOLVS ET HYACINTHVS.

IRIS BULBOSA
latifolia.

Iris bulbosa latifolia acaulos odora.
Iris bulbosa latifolia, Clus. hisp. Dod. Lug. Cam.
Iris bulbosa latifolia purpurea, Svvert.
Hyacinthus poetarum latifolius, Lob.

Flos vel purpureus, vel cæruleus: interdum
lactei coloris.

II. Iris bulbosa latifolia caule donata.

Hæc variat floribus colore, cæruleo, albo pur-
purante: est & cærulea lineis & violaceis, vel
purpureis, sic & cinerea violaceis strijs distin-
cta, quas Svvertius pinxit, nomine
Iridis Anglicæ majoris bulbosæ latifoliæ: quæ
Iris bulb. Anglicæ fl. cæruleo, &
Iris Anglicana major, flore violaceo, Eyft.
Iridis bulbosæ latifoliæ flore atro purpurante.
Iridis majoris Franciæ cæruleæ lineis violaceis
crassioribus ornata, quæ etiam variat.

III. Iris bulbosa latifolia candida.

Iris bulbosa Anglicana major fl. candido, Eyft.
Iris bulb. Anglic. latifolia flore albo, Svvert.

IV. Iris bulbosa folijs cepaceis maculatis
flore purpureo inodoro.

Iris bulbosa, Dodon. Ger.
Iris bulbosa angustifolia fl. purpureo, Clus. hisp.

Iris bulbosa violaceo flore, Clus. hist.
Hyacinthus flore Iridis Theocriti & Poëta-
rum, Lob.

Hyacinthus poeticus Lobelij Lugd.

Est & flore violaceo, interdum elegantissi-
mi, interdum dilutioris coloris: est & atroru-
bens in summo albo: niveo flore in Pyræneis:

aliquando macula flava albo flori aspergitur,
Clusio in append. altera monente; qui in cu-
ris posterioribus longè majorem varietatem
recenset, cum etiam rubro & purpurascente flo-
re reperitur.

Huc referendæ quatuor species ex Svvertio.
Iris bulbosa flore cæruleo, quæ Iris bulbosa an-
gustifolia cærulea, Eyfsterrensi.

Iris bulbosa flore atro purpurascente.

Iris bulbosa flore albo.

Iris bulbosa flore cinereo.

IRIS BULBOSA ANGUSTI-
folia verticillata.

I. Iris bulbosa angustifolia tricolor odore
coriandri.

Iris bulbosa angustifolia flore vario, Clus. hisp.
Lugd.

Iris bulbosa Lusitanica, Dodon.

Hyacinthus Poëtarum Hispanicus, Lob.

Iris bulbosa flore vario, Cam. Ger.

Iris bulbosa 3. five verticillata, Clus. hist.

Variat flore latiore & radice brevi binis ple-
rumque floribus: altera flore angustiore radi-
ce oblonga: utraque dilutioris aut saturatio-
ris coloris.

II. Iris bulbosa angustifolia tricolor.
Iris bulbosa varicolor, Clus. hist. qui sub classe
secunda species quinque floribus colore varian-
tes proponit.

1. Trium foliorum inclinatum labra flava
sunt, maculâ aureâ magnâ in labro reflexo in-
signita, ad quam venæ purpurascens excur-
runt:

runt: at trium incumbentium dorsum & alæ pallent, latera candicant: tria erecta albicant, venis subcæruleis saturatioribus vel dilutioribus distincta.

2. Tria inflexa pallent labro flavâ maculâ notata, internè quibuldam venulis purpurascentibus distincta: tria ligulam tegentia albicant, vel Ochri colore sunt: tria surrecta exalbida, nervo flavo excurrente.

3. Flore est latiore, brevior, ternis folijs inflexis latis, & propendente labro, aureâ maculâ insignito, & alio orbe cincto, per oras crispo, cærulei coloris, nervo extrinsecus virente, intrinsecus pallente, venis purpureis in latera excurrentibus: at tria gibba purpurea sunt, gibbo albicante, alis cæruleis: tria erecta ex cæruleo purpurascunt.

4. Tria reflexa flava sunt, maculâ aureâ in labro, à qua venæ dilutius purpurascences sparguntur: folia incumbentia exalbida, nervo pallido divisa: tria surrecta inferius cæruleo purpurascunt, venis distincta, supernè candicant.

5. Terna inflexa lactei coloris, aureâ maculâ labro impressâ: folia incumbentia, & terna erecta alba, & circa ungues subcærulea.

III. Iris bulbosa vericolor *πελοπιδωρ*, Clus. hist. Variat binis, ternis, quaternis floribus.

IRIS BULBOSA LUTEA

inodora.

I. Iris bulbosa lutea inodora major.

Iris bulbosa angustifolia luteo flore, Clus. hisp. Lugd. Eyfster.

Iris bulbosa 3. luteo flore, Dod. 4. sive lutea, Clus. hist.

Hyacinthus poetarum luteus, Lob. Lugd.

Lirium mas, aut Lirium verum Dodonæi, Lug.

Iris bulbosa lutea, Tab. Cam. Svvert.

Iris bulbosa flore pallido, Ger.

Invenitur latiore aliquantulum, saturatiore & magis rutilante aureo colore, radice item brevior & crassior, vaginula sanguineo colore infecta: alia dilutioris flavi coloris, vaginula sanguineo colore carente: & aliæ adhuc differentiæ occurrunt, Clusio notante.

Huc pertinent

Iris bulbosa pallido colore, sive luteo pallescens, Eyfster.

Iris bulbosa lutea mixta, Ejusdem.

Iridis bulbosæ luteæ varietates quatuor, Lobelius advers. parte altera recenset.

II. Iris bulbosa lutea inodora minor.

Iris Mauritanica, Clus. cur. post.

IRIS BULBOSA LUTEA

vericolor.

I. Iris bulbosa lutea vericolor major & elatior.

Iridis bulbosæ vericoloris, vel flavivariæ classis tertiæ prima, Clus. hist.

Iris bulbosa lutea varia, Lob. ad. par. 2.

II. Iris bulbosa lutea vericolor latiflora elatior.

Iris bulbosa flava varia septima, Clus. hist.

III. Iris bulbosa lutea vericolor latiflora humilior quadruplex.

Iris bulbosa flavivaria classis tertiæ 2. 3. 4. & 8. Clus. hist.

Primæ, terna folia inflexa flava sunt maculâ aureâ insignita, purpureis venis internè distincta: folia gibba purpurascunt: hæc 2. est Clusio.

Alterius folia reflexa flava sunt cum aureâ maculâ, & qua parte gibbosis integuntur venis obsolete purpureis distincta: tria surrecta ex cæruleo purpurascunt, nervo flavo per longum excurrente: tria incumbentia obsoleta, quibus flammei quid permistum est: hæc 3. Clusio.

Tertiæ, folia inflexa pallida, aureâ maculâ insignita, quæ camerato folio integuntur, venis purpurascensibus distinguuntur, folia gibba purpurascunt, tria erecta cærulea sunt: hæc 4. est Clusio.

Quartæ, folia recurva flava sunt, aureâ maculâ notata, internè purpurascensibus radijs distincta: folia gibba purpureo cærulea, gibbo ex purpura flavescente: folia erecta, cærulei purpureæ permixti coloris: hæc 8. est Clusio.

IV. Iris bulbosa lutea vericolor angustiflora elatior, quæ duplex est.

Iris bulbosa flavivaria classis tertiæ 5. & 6. Clus. hist.

Primæ, folia reflexa flavescent, maculâ aureâ labro insignita, at incumbentia candicant, nervo eminentiore *ἀρχαὸν*: folia erecta exalbida internè subcæruleis venis distincta. Altera media est inter 2. & 3.

Huc referatur

Iris bulbosa angustifolia lutea mixta, quæ flore est pallide flavescente, venulis purpureis disseminatis, Eyfster.

V. Iris

V. Iris bulbosa lutea verticolar angustiflora humilior triplex.

Iris bulbosa flavovaria, classis tertiae 9. 10. & 11. Clus. hist.

Primae folia reflexa labris sunt longioribus & pallidioribus, oris purpurascens, macula aurea longiore insignita, incumbens internis purpurascens: nervo carnei coloris externis ex viridi pallescentibus: & folia gibba purpurea, gibbo dilutior: foliis surrectis purpura saturatiore nitentibus.

Alterius folia reflexa labro sunt pallescente, flava macula in radios desinente infecta: parte angustiore foris virescente, internis venis viridibus praedita: folia bifida, exalbida, gibbus pallescens: folia erecta alba, nervo circa unguem pallescente.

Tertiae folia inflexa alba, flava macula insignita, incumbens purpurascunt: tria erecta purpurei sive violacei coloris sunt.

VI. Iris bulbosa lutea verticolar, inter latifloram & angustifloram media.

Iris bulbosa flavovaria 12. Clus. hist.

IRIS BULBOSA CAERULEA:

caeruleo varia: violacea alba.

I. Iris bulbosa angustifolia caerulea tiliae odore.

Iris bulbosa s. sive caerulea, Clus. hist.

Iris bulbosa angustifolia odorata Eyst.

II. Iris bulbosa caerulea minor.

Iris Hispanica caeruleo purpurea, Svvert.

III. Iris bulbosa caeruleo purpurascens vario flore.

Iridis bulbosae verticolaris 13. genus, Clus. hist.

IV. Iris bulbosa caeruleo violacea.

Iris bulbosa flore caeruleo & purpureo, Eyst.

Huc pertinent ex horto Eystettenfi

Iris bulbosa variegata.

Iris bulbosa mixta.

illi flos purpuroviolaceus, medio luteus: huic è caeruleo albicans, aureus & ex albo pallescens.

V. Iris bulbosa angustifolia violacea.

Iris bulbosa violacea Pyraëna, Lob. ad. part. 2.

Iris Anglicana violaceo flore, Eyst.

Huc referatur,

Iris bulbosa violacea colore mixto, Eyst.

VI. Iris bulbosa angustifolia alba.

Iris bulbosa alba, Lob. ad. part. alt.

Refert Clusius in altera appendice, se à Joachimo Venerio admonitum, se in Pyraënis Iridis bulbosae varia genera observasse, & viginti sex generum descriptionem fecisse, & Iridem quae flauum aut rubrum florem haberet, in illis montibus non reperisse: sed inter multas myriades, eam quae caeruleum sive violaceum florem gerit, unicam plantam reperisse, quae florem prorsus niveum haberet.

IRIS TUBEROSA.

Iris tuberosa folio anguloso.

Hermodystylus verus, Matth. Lugd. Tab.

Cam. Ger.

Iris tuberosa, Dod. gal. Lugd. Lob. Eyst.

Iris bulbosa praecox, Clus. hist.

Lonchitis major, Cast.

Lonchitis prior Diosc. Aldrouando.

Satyrium, Cæsalp.

Iris tuberosa obscurè viridi colore, Svvert.

SISYRINCHIUM.

Σ *ἰσσυρινχίον* Theoph. lib. 7. hist. 13. hoc peculiare habet, ut una radix, primo augeatur hyeme, tum incuntes vere, quod in imo excreverit, contrahatur, supremumq. crescat, quod manditur. Sic quoque Plin. lib. 19. cap. 5. *sisyrrichio* hoc mirum, imas ejus radices crescere hyeme, verno autem tempore minui & contrahi, tum deinde bulbum pinguescere: Non solum suillo pabulo bulbosae atque carnosae radices aptitudo, sed plantae hujus, rostro forma rostrata, suillo similis nominis (ut rectè doctissimus Fab. Columna) causa fuit.

I. Sisyrrinchium majus flore lutea macula notato.

Sisyrrichion majus vel primum, Nofelha Hispanis, quasi nucula auellana, Clus. hisp.

Sisyrrichium majus, Dod. flore caeruleo, Schwver.

Hyacinthus Poëticus Hispanicus gemino gladiolo reticulato bulbo, Lob. observ.

Sisyrrichium Cordi & Clusij, Lob. ico.

Sisyrrichium, bulbi esculenti genus, Lugd.

Flos coloris est caeruleus luteis maculis aspersis.

II. Sisy-

II. Sisyrrinchium flore albâ maculâ notato. Sisyrrinchium Mauritanicum, Clus. in app. 1. & cur. post.

Flos purpureæ dilutioris albâ maculâ insignitus.

III. Sisyrrinchium medium.

Sisyrrinchium minus, Dod. Clus. hisp. Lugd. Svvert. Eyst.

Sisyrrinchion Theoph. & parva Nofelha, Lob.

IV. Sisyrrinchium minus latifolium.

Sisyrrinchium alterum latifolium, Colum.

V. Sisyrrinchium minus angustifolium flore majore variegato.

Sisyrrinchium Asprensium angustifolium alterum, Colum.

VI. Sisyrrinchium minus angustifolium.

Sisyrrinchium Theoph. Colum.

VII. Sisyrrinchium Persianum.

Flos Persicus Sisyrrinchio congener, Clus. hist.

GLADIOLUS.

Gladiolus, à foliorum forma, Dioscoridi l. 4. c. 20. *Ἐπίον & Φάσγανον dicitur: & Gaza apud Theoph. 7. hist. 11. & 12. Ensem vertit. Plin. l. 25. c. 11. & 26. c. 8. Xiphion & Phasga non nominat.*

I. Gladiolus maximus Indicus.

Gladiolus maximus promontorii Bonæ spei flore rubro incarnato, Svvert.

II. Gladiolus major Byzantinus.

Gladiolus Byzantinus atropurpureus, Svvert.

III. Gladiolus floribus uno versu dispositis major.

Xiphion, Spatha seu Gladiolus segetalis Ruel.

Victorialis fœmina, vel Gladiolus sylvestris Cord. hist.

Victorialis rotunda & Gladiolus verus, Ges. hort.

Victorialis herba, Lon. rotunda, Eyst.

Gladiolus, Dod. Narbonensis, Lob.

Xiphion minus, Clus. hist. pan. & rar.

Gladiolus nostras, Cam. Germanicus, Tab.

Variat magnitudine, quibusdam locis major ac procerior: alijs minor & humilior: floribus colore purpureo rubente, aliquando candicante, qui

Gladiolus flore albo, Lob. adv. part. 2. & Svvert.

Gladiolus Narbon. flore incarnato & flore purpureo, Eystet.

Gladiolus carnei coloris, Svvert.

Gladiolus Hispanicus flore albo, Eystet.

Sic in Narbonensi & Germanico, flores ad unam caulis partem digesti.

IV. Gladiolus utrinque floridus.

Gladiolus, Matth. Dod. gal. (cui & Gladiolus segetalis, & Lingua cervina Apuleij) Ges. col.

Ang. Lac. Cast. Cæs. Lugd. peregrinus, Cam.

Xiphion, Diosc. Ges. ap.

Gladiolus utrinque floriferus, Dod.

Gladiolus Italicus binis florum ordinibus cinctus, Lob.

Gladiolus Italicus, Tab.

Gladiolus flore pallido, Ger.

Gladiolus purpureo violaceus, Svvert.

Variat flore rubro & incarnato, qui

Gladiolus Italicus fl. rubro, Eyst.

V. Gladiolus angusto gramineo folio: in Prod. descript.

VI. Gladiolus floribus uno versu dispositis minor.

Gladiolus minimus, Lob. adv. part. 2.

VII. Gladiolus palustris.

Gladiolus lacustris aut stagnalis Dortmanni, Clus. cur. post.

HYACINTHUS ET EJUS
Species.

ΥΑΚΙΝΘΟΣ unus est Dioscoridi l. 4. c. 63. at Theoph. 6. hist. 7. duplex, sativus & sylvestris: & ut Plin. l. 21. c. 11. Hyacinthum fabula duplex comitatur, luctum præferens ejus quem Appollo dilexerat (Hyacinthum vocatum) aut ex Ajacis cruore editi, ita discurren-
F
ribus

ribus venit, ut Græcarum litterarum figura. A. I. inscripta legatur. Duplex Veteres meminere, alter Poëticus, alter Medicus est: illum, aliqui fabulosum vel Poëticum: hunc, historicum seu Medicum vocant: rursus alius Græcorum, alius Latinorum, est; Græcorum esse Hemerocallida Diosc. sive Liliū rubrum Plinij; Latinorum, Iridem radice tuberosa, censent; Medicorum verò ab utroque variat, de quo in præfens.

HYACINTHUS COMOSUS.

I. Hyacinthus comosus major purpureus.

Hyacinthus, Dioscoridi.

Bulbine prima, Plinij, forte alijs Pericarpus bulbosus, Ejusd.

Hyacinthus quartus & major, & Hyacinthus rubens Virgilij, Trag.

Hyacinthus, Ruel. Matth. Cord. in Diosc. Ges. cat. Port. Cast.

Hyacinthus maximus, Tur. major, Lugd. Tab.

Hyacinthus primus, Ama. Fuch. Ges. hor.

Hyacinthus cæruleus maximus, Fuch. fol.

Hyacinthus cæruleus major mas, Fuch. ico.

Hyacinthus sylvestris, Cord. hist.

Pancratium, Ges. hor. Lac.

Bulbus, Ang.

Bulbi esculenti genus, Dod. gal. Lugd.

Bulbi sylvest. primum genus, quem Pothos Theophrasti, suspicatur, Cæf.

Hyacinth. magnus, & Bulb. Vomitorius, Lon.

Hyacinthus primus Matthioli, Clus. hist.

Hyacinthus Neotericorum sive comosus spurius tertius, Dod.

Hyacinthus comosus, Diosc. Ad. major, Lob. Cam. Lugd.

Hyacinthus comosus, Ger. spurius, Eyf.

Variat: alter præcox, latiore folio, coma crassiore, majoreq; bulbo: alter serotinus, angustiore folio, coma tenuiore, laxiore tamen & elegantiore, minoreq; bulbo: Hinc apud Cam.

Hyacinthus comosus major sive serotinus & minor sive præcox, & flore communiter purpureo, vel cæruleo purpureo (rarius albo) qui Hyacinthus comosus purpureus, Svvert.

II. Hyacinthus comosus albus Belgicus.

Hyacinthus comosus albus, Lob. Lugd. albo flore, Clus. hist.

Hyacinthus comosus leucanthemos, Cam.

Huc referatur

Hyacinthus comosus fl. albo obsoletiore Clus. pan.

III. Hyacinth. comosus albus Byzantinus.

Hyacinthus comosus Byzantinus, Clus. pan. & hist. Eyf.

Flores initio candicantes, cum marcescunt fusci: vel exterius subfusco obsoleto colore, intus albicantes, ad fundum capillis nigricantibus.

IV. Hyacinthus comosus Hispanicus.

Hyacinthus comosus major Hispanico semine natus, Clus. pan. & hist.

V. Hyacinthus paniculâ cæruleâ.

Hyacinthus Sannesiensis comâ panniculosa, Colum.

Hyacinthus comosus ramosus nondum descriptus purpuroviolaceus, du Bry.

HYACINTHUS RACEMOSUS.

I. Hyacinthus racemosus cæruleus major.

Hyacinth. botryoides cæruleus, Lob. ico.

Hyacinth. botryoid. cæruleus major, Tab. Ger.

Hyacinthus botryodes cæruleus, Clus. pan.

Hyacinthus botryoides odoratus, Cam.

Hyacinthus botryoides major, Eyf.

Hyacinthus botryoides major Hispanicus, Svvert.

II. Hyacinthus racemosus latif. speciosior.

Hyacinthus botryodes cæruleus, vel 3. genus, Clus. pan. vel purpureus 3. Ej. hist.

Hyacinthus botryoides incarnatus, Tab. Eyf.

Hyacinthus botryoides cæruleus amœnus, Ger. ico.

Flos dilutioris purpuræ etiam in cæruleum tendens.

III. Hyacinthus racemosus albus.

Dipcadi candidis floribus, Lob. Lugd.

Hyacinthus botryoides lacteus, Clus. pan. Tab.

Ger. albo flore, Clus. hist. Eyf.

Variat floris colore lacteo, niveo, cui dilutissima purpura perfusa: est & tertius floribus ex cæruleo virefcentibus: Svvertius carneis, albo & cæruleo botryoides nomine pingit.

IV. Hyacinthus uvâ ramosâ major.

Hyacinthus ramosus botryoides cæruleus, Casp. Bauhini: in florilegio du Bry.

V. Hyacinthus uvâ ramosâ minor.

Hyacinth. botryodes ramosus, Clus. pan. vel 3. uvâ ramosâ, Eidem hist.

VI. Hy-

VI. *Hyacinthus racemosus cæruleus minor latifolius.*

Bulbina Plinij videtur.

Bulbi esculenti genus minus, Dodonæo gal.

Lugd.

Hyacinthus cæruleus major, Fuch. Tur. Lugd. femina, Fuch. ico.*Hyacinthus* 2. Fuchij, Gef. hort.*Hyacinthus minor*, Lon.*Hyacinthus botryodes primus & major*, Clus. pan. & hist.*Hyacinthus botryoides cæruleus*, Eyst.VII. *Hyacinthus racemosus cæruleus minor juncifolius.**Hyacinthus primus*, vel *Hyacinthus vernus* exiguus, Trag.*Allium caninum exiguum*, Eidem.*Hyacinthus Cord.* in Diosc. minor, Eidem observ.*Hyacinthus neotericorum primus*, Dod. flor.*Hyacinthus racemosus*, Dod.*Hyacinthus comosus minor*, Lob. obs. Lugd.*Hyacinthus botryoides vulgaris*, Lob. ico.*Hyacinthus botryoides* 1. & minor, Clus. hist.*Hyacinthus botryoides odoratus*, Cam.*Hyacinthus botryoides cæruleus*, Ger.*Hyacinthus cæruleus minor*, vel sextus, Tab.*Pancratium alterum Dodonæi*, Gef. cat.*Bulbine flore cæruleo*, Gef. hor. minor, Eid. color.*Bulbus sylvest.* & *Bulbus coronarius Theoph.*

Cæsalp.

Variat floris colore cæruleo, aliàs saturato, aliàs dilutè exalbido, dilutè purpurascens; odore apud nos est pruni: at Tragus inodorum asserit.

VIII. *Hyacinthus racemosus moschatus.**Bulbus vomitorius*, Matth. Cast. Lugd.*Muscari*, Clus. hisp. & pan. Ger. Turcarum, Camer.*Dipcadi Chalcedonicum & Italarum*, Lob. Lugd.*Hyacinthus spurius recentiorum alter*, Dod.*Hyacinthus botryoides Chalcedonicus moschatus*, & *Hyacinthus purpureus magnus peregrin.* Tab.*Hyacinthus neotericorum alter*, Lugd.*Muscari obsoletiore flore*, Clus. hist.*Muscari majus obsoletio albo flore*, Eyst.

Flos initio interdum purpurascens, aut viridis: dein ex purpura virens, aut cum viriditate albicans: nonnunquam subcæruleus: aliquando initio nigricans, sive saturatè purpurascens, dein pallidus, vel flavescens; vel ab initio pallidus, postea flauus, postremo pallescens, nigricans, aut pullus; hic & niveo, & egregiè rubente, & carneo reperitur; hinc quatuor figuræ apud Svvertium; & in hort. Eyst.

*Muscari flore obsoleto albo & obsoleto nigro.*IX. *Hyacinthus racemosus moschatus luteus.**Dipcadi flavum*, sive *Muscari Constantinopolitanum*, sive *Chalcedonicum*, Lob. ico.*Muscari flavo colore*, Clus. hist. flavum, Ger. luteo flore, Eyst.*Muscari Turcarum flore luteo*, Cam.*Hyacinthus botryoides Chalcedonicus luteus*, Tab.

Nonnunquam flore dilutè purpureo, aliquando cæruleo virente reperitur; ex viridi flavescens, Clus. in ap. alt. notavit.

X. *Hyacinthus racemosus luteus præcox.**Tipcadi lutei varietas*, sive *Muscari luteum præcox*, Lob. ad part. 2.

Flores initio subcærulei, postea aurei.

HYACINTHUS OBLONGO flore.

I. *Hyacinthus oblongo flore cæruleus major.**Hyacinthus*, Dod. gal. Lugd.*Hyacinthus Anglicus*, Ad. Ger. Eyst. & Belgicus, Lob.*Hyacinthus non scriptus*, *Hyacinthus Dioscoridis*, Dod. Lugd.*Hyacinthus Belgicus non scriptus*, Cam.*Hyacinth. Hispanicus*, Clus. hist. addit. Svvert. flore cæruleo & albo.

Variat floris colore ut plurimum cæruleo, cæsioue: aliquando amethystino vel violæ, nigra dilutam purpuram refert: aliquando carneo, hinc

Hyacinthus Anglicus colore amethystino: & aliàs colore violaceo, Eyst. &*Hyacinthus Anglicus flore incarnato*, &*Hyacinthus Anglicus cinericeus*: Item*Hyacinthus Hispanicus flore violaceo*, & flore incarnato, Eyst.

qui Hyacinthus carnei coloris, Svver. item floribus albicantib. aut candidis, five niveis, qui Hyacinthus Belgicus candidus, Lob.

Hyacinthus non scriptus flore candido, Dod.

Hyacinthus albus Anglicus, Tab. Ger.

Hyacinthus Hispanicus flore albo, Svvert.

II. Hyacinthus oblongo flore fusco.

Hyacinthus Mauritanicus, Clus. hist. ap. 1. & cur. post.

Hyacinthus Mauritanicus Clusij, cui flores vicini plures obsoleti, & fusci, Lob. ad. part. 2.

III. Hyacinthus obsoleto flore.

Hyacinthus obsoleterior Hispanicus, Clus. pan.

obsoleti coloris Hispanicus serotinus, Eid. hist.

Hyacinthus Hispanicus obsoleto flore, Cam.

Hyacinthus obsoleterior Hispanicus semine compresso Pancratij Monspel. maritimi, Lob. ad. par. 2.

Hyacinthus serotinus maximus, Eyf.

Variat floris colore ex purpureo pallido & virescente mixto: sic ex albo cinerei, & ex albicante virescente, Clus. ap. alt.

Hyacinthus obsoletus Clusij, flore obsoleto viridi, Svvert.

Sic eorum color valde obsoletè spadiceus est, qualis plerumque ceruis esse solet.

IV. Hyacinthus obsoleto flore alter.

Hyacinthus serotinus obsoleto colore, Eyf.

V. Hyacinthus serotinus albicans.

Hyacinthus serotinus facie Orientalis, Eyf.

VI. Hyacinthus oblongo flore flavo viridi.

Hyacinthus obsoletus Æthiopicus Clus. cur. post.

VII. Hyacinthus oblongo flavo flore.

Hic cum tertio conuenit, nisi quòd minor, & flos ex sex foliolis luteis, aliquando candicantibus compositus est, in cujus medio staminula bina pallida conspiciuntur: in Gallia Narbonensi in summitate pontis Gari reperitur.

VIII. Hyacinthus oblongo cæruleo flore minor.

Hyacinthus minor Hispan. Clus. hist. ap. 2. & cur. post.

Variat flore cæruleo, albo, interdum mixto, dilutè suauiterque rubente, (qui Hyacinthus flore rubro ex Lusitania, Lob. ad. par. 2.) venis saturatioribus per foliolorum exteriorum longitudinem excurrentibus.

IX. Hyacinthus floribus campanulæ uno versu dispositis.

Hyacinthus totus albus, Campanilla, Lob. ad. par. 2. ex Lusitania.

X. Hyacinthus floribus campanulæ utrinque dispositis.

Hyacinthus Neapolitanus, Svvert.

HYACINTHUS ORIENTALIS.

I. Hyacinthus Orientalis caule maculato.

Hyacinthus Dioscorid. & Theoph. Ang.

Hyacinthus Orient. Matth. Gesner. hor. Dod. (cui & minor) Cast. Lugd. Clus. hist. Rauv. cæruleus, Tab. Ger. Eyf.

Hyacinth. Orientalis Græcus, Ad. Lob. Lugd.

Hyacinthus Constantinopolitanus, Cam.

Hyacinthus, Cæsalp.

II. Hyacinthus Orientalis purpureus.

Hyacinthus Orientalis purpurorubens, Lob. ico. flore purpureo, Cam.

Variat flore purpureo, purpurorubente: & Svvertius.

Hyacinthum Orient. serotin. flore purpureo pingit: & huc referendus.

Hyacinthus fl. purpureo albo, Eyf.

III. Hyacinthus Orientalis exalbidus.

Flores antequam aperiantur albi, aperti oras tantum albas habent, reliqua parte carnei sunt, senescentes totinivei sunt, Clus. hist.

Est & alter floribus ex cinereo albis, folijs paulo angustioribus & crassioribus, qui Hyacinthus Orient. fl. cinereo albus, Eyf.

IV. Hyacinthus Orientalis albus primus.

Hyacinthus Or. albus, Lob. ico. & Clus. hist. Flore niveo, Eyf.

Flore albicante, & flore albo, Svvert.

Hyacinthus Constantinopolitanus albo flore, Cam.

Flore albicante & flore albo, Svvert. qui etiam Hyacinthum facie Orientalis, flore cæruleo & flore albo, &

Hyacinthum Germanicum flore albo, pingit.

Flores intus nivei, foris albi, folijs tribus externis ad *expansum* colorem accedentibus: aliquando argentei coloris, qui

Hyacinthus Orientalis niveus, Clus. hist.

Hyacinthus Orient. argenteo colore, Eyf.

V. Hyacinthus Orientalis albus alter.

Hyacinthus brumalis Orientalis Gemmæ, Lugd. albus, Lob.

VI. Hyacinthus Orientalis maximus.

Hyacinthus Orientalis alter, Matth. Lugd.

Hyacin-

Lob. ad.
e utrin-
LIS.
culato.
g.
or. Dod.
Rauv.
Lugd.
am.
us.
s, Lob.
ente: &
urpureo
idus.
perti o-
e carnei
hif.
is, folijs
i
Eyft.
rimus.
luf. hif.
t.
bo flore,
ui etiam
cæruleo
pingit.
s tribus
entibus:
ift.
Eyft.
er.
emmae,
nus.
Lugd.
Hyacin-

Hyacinthus Orient. major, Dod. polyanthos, Ad. Lob. Tab. Lugd.
Hyacinthus Orientalis polyanthos, Cluf. hif. Ger.
Hyacinthus Orient. præcox multiflorus cæruleus, Svvert.
Hyacinthus Orient. major, flore cæruleo, & alter violaceo colore, Eyft.
Flores sæpè 40. producit.
VII. Hyacinthus præcox albus.
Hyacinthus præcox flore albo Caccini, Cluf. cur. post.
VIII. Hyacinthus Orientalis latifolius.
Hyacinthus Orient. πολυανθὸς alter, Cluf. hif.
IX. Hyacinthus Orientalis variegatus phœniceis caliculis subtus rubentibus: vel floribus anterijs albescentibus, aversâ parte purpurascentibus.
Hyacinthus Orientalis variegatus, & Hyacinthus Orientalis mixtus, Eyft.
V. Hyacinthus maximus polyanthos.
Hyacinthus Jacobæus altus multis floribus Italicus, Svvert.
XI. Hyacinthus Orientalis ramosus.
Hyacinthus Orientalis πολυανθὸς, Cluf. hif.
XII. Hyacinthus Orient. florum folijs reflexis & variegatis.
Hyacinthus Orient. reflexis folijs, colore violaceo, &
Hyacinthus Orient. viol. colore albis lineis, Eyft.
Flores purpuroviolacei, lineis albicantibus dorsalis distincti: vel lætè purpurei & janthini, virgulis obscurioribus signati.
XIII. Hyacinthus Orientalis, caule foliofo.
Hyacinthus Asiaticus ποικιλόχρω καυλὸς, Cluf. cur. post.
Hyacinthus caule foliofo, Svvert.
XIV. Hyacinthus Arabicus, Camerarij, quid?
XV. Hyacinthus exoticus flore phalangij.
Hyacinthus circa Alepum Ayur dictus, Rauvolf.
Hyacinthus Tripolitanus, Cam. ad. Matth.

Hyacinthus Orientalis serotinus.
I. Hyacinthus Orientalis serotinus.
Hyacinthus Orient. serotinus mixtus, Eyft.
Florum apices albescent, qua pediculis adherent, rubescunt.

II. Hyacinthus Orient. serotinus floribus erectis candidis, vel cæruleis.
Hyacinthus Orientalis serotin. erectis candidis floribus, &
Hyacinth. Orient. serot. erectis cæruleis floribus, Eyft.
III. Hyacinthus Orient. serotinus striatus.
Hyacinthus minimus serotinus facie Orientalis hyacinthi, Lob. ad. par. 2. ap.
an Hyacinthus serotinus minimus cæruleus, Cluf. hif. ap. 2.
Flos ex cæruleo dilutus, senis venis cæruleis striatus.

Hyacinthus Orientalis flore pleno.

I. Hyacinthus Orientalis flore duplici.
Hyacinthus flore duplici ex albo virescente, Cluf. cur. post.
Hyacinthus Orientalis pleno flore subviridi, Svvert.
Hyacinthus Orient. fl. duplici, Eyft.
Flores gerit infitos duplices: ex albo virentes, vel cæruleos, ad pediculum parum virentes.
II. Hyacinthus Orient. fl. cæruleo pleno: & Eyft.
III. Hyacinthus Orient. albus multiplici flore.
Hyacinthus candidissimus pleno flore, Eyft.

HYACINTHUS STELLARIS.

I. Hyacinthus stellaris bifolius Germanicus.
Narcissus Martius, Brunf.
Narcissus cæruleus & Hyacinthus alius, Trag.
Hyacinthus cæruleus minor mas, Fuch. ico.
Hyacinthus albicans seu fœmina, Fuch. Tur. Lugd.
Hyacinthi Germanici liliflori minor species, Lob. ob.
Satyrium trifolium, Dod. gal.
Bulbus syl. quidam bifolius, Gef. hor. &
Hyacinthus, seu Bulbus syl. Eid. col.
Bulbus vomitorius, Lon.
an Hyacinthus bifolius Theoph. Lob. ico.
Flore est cæruleo, in alijs colore magis saturo, alijs magis diluto, rariùs ad carneum vergente, suaviter rubente: est etiam exalbido, & veluti cinericeo, subcæruleo te flore: sunt qui & flavos notarunt.

II. Hyacinthus stellaris trifolius.

Satyrium erythronium, Dod. gal.

Hyacinth. cæruleus minor, Tur. minor fœmina, Fuch. ico.

Hyacinth. cæruleus mas minor, Fuch. Lugd.

Hyacinthus Fuchij, Dod. medius, Lon.

Hyacinth. Germanicus liliflorus, Ad. stellaris, vel flos Martius stellatus Germanicus, Lob.

Hyacinthus stellatus, Clus. hist. flore cæruleo, Cam. Eyft.

Hyacinthi alterum genus, Cæs.

Priore per omnia major & triphyllos, qui tamen volet, eundem dicat.

III. Hyacinthus stellaris albus.

Narcissus candidus, Trag.

Hyacinthus niveus, Fuch. floribus candidis, Dodon.

Hyacinth. diphyllus Fuchij floribus candidis & purpureis, Cord. obf.

Hyacinthus stellaris albicans serotinus, Lob. Lugdun.

Hyacinthus albicans Botanicorum, Lob. ad. part. 2.

Hyacinthus stellatus flore albo, Cam.

Bulbus vomitorius albo flore, Lon.

IV. Hyacinthus stellatus cæruleus staminulis ex viridi luteis.

Hyacinthus stellatus Italicus, Eyft.

V. Hyacinthus stellaris purpureus.

Hyacinthus stellaris major, Lob. ad. par. 2.

VI. Hyacinthus stellaris spicatus cinereus.

Hyacinthus stellatus cineracei coloris, Clus. hist. &

Hyacinthus stellatus æstivus, Eid. cur. post.

Hyacinthus stellatus Byzantinus sive exoticus Someri, latâ depresâ spicâ fastigiatus, Lob. ad. part. 2.

an Hyacinthus stellaris cinereus ex Gallica, Eidem.

VII. Hyacinthus stellaris cæruleus amœnus.

Hyacinth. stellaris Byzantinus alter elegantissimus serotinus bullatus, Lob. ad. par. 2.

Hyacinthus latifolius Dalechampij, Lugdun. icon.

Hyacinthus peregrinus pluribus caulibus præditus, cæruleo violaceus, Svvert.

Variat magnitudine & floris colore amœno cæruleo, dilutè cæruleo, quandoque ex cæ-

ruleo purpurascente, vel violaceo: rarissimè albo.

VIII. Hyacinth. stellaris obsoletè cæruleus, vel major.

Hyacinthus stellatus Byzantinus, Clus. hist. & Eyft.

Hyacinthus stellatus Byzant. tenuifolius præcox, Lob. ad. part. 2.

Huc referendus

Hyacinthus Byzantinus flore cæruleo lacteo, Svvert.

IX. Hyacinthus stellaris cæruleus striatus.

Hyacinthus stellatus Poreti, Clus. cur. post.

X. Hyacinth. stellaris saturè cæruleus.

Hyacinthus Hispanicus stellaris flore, Clus. cur. post.

XI. Hyacinthus stellaris æstivus cæruleo purpurascens major.

Hyacinthus stellatus æstivus, Clus. hist. ap. altera.

Flores sunt subcærulei dilutiores: sic albi, staminibus purpurascens.

XII. Hyacinthus stellaris æstivus minor flosculis alternatim sitis.

Hyacinthus stellatus æstivus minor, Clus. in auct. ap. alt. & cur. post.

XIII. Hyacinthus stellaris folijs & radice lilij.

Hyacinthus stellaris lilifolius, Lobel. Lugd. Ger.

Hyacinthus liliaceus, vel septimus, Tab.

Hyacinth. stellat. *λινάριον*, Clus. hist. & ap. alt. ejusdemq; auctario & cur. post.

Hyacinthus lilifolius flore cæruleo pallido, Svvert.

Flores intensè cærulei, sive violacei, rarius nivei.

XIV. Hyacinthus stellaris autumnalis major.

Hyacinthus autumnalis major, Ad. Clus. hisp.

& hist. Lob. Dod. Lugd. (cui & Typhium Theophrasti) Ger.

Hyacinthus stellatus autumnalis angustifolius major, Eyft.

Aliquando cauliculis est ramosis, & Svvertius exhibet

Hyacinthum autumnalem albo flore.

Hyacinthum flore purpureo pallido.

XV. Hyac-

XV. Hyacinthus stellaris autumnalis minor.

Hyacinthus autumnalis, Gef. hor. Ad. Clus. hisp. Lob. Lugd. Ger.

Hyacinthus autumnalis minor, Dod. Clus. hist. Eyst.

Bulbus æstivus Dalech. Lugd.

Flos cæruleus, purpuræ dilutioris, ex purpura rubens.

XVI. Hyacinthus stellaris minimus.

Hyacinthus stellaris vernus pumilus, Lob. ad. par. 2. Eyst.

XVII. Hyacinthus minimus maritimus in Prod. descript.

In Florilegio Svvertij adhuc pinguntur sex diversi Hyacinthi;

Hyacinthus stellaris albus: 2. cæruleus: 3. ex cæruleo violaceus: 4. carnei coloris: 5. luridus: 6. stellatus major, azureus, hicque elegantissimus existit.

HYACINTHUS INDICUS.

I. Hyacinthus Indicus bulbosus stellatus.

Hyacinthus stellatus Peruanus, Clus. hist. Lob. ad. par. 2. Eyst.

Hyacinthus Peruanus, Robino; flore cæruleo multiflorus, Svvertio.

Hyacinthus stellatus Boëticus, Clus. cur. post.

Variat colore floris, qui nunc è cæruleo purpureus, modò saturatioris purpuræ & quasi

violaceus, umbone purpureo, staminulis cæruleis: vel ex albo rubicante, umbone & staminulis albis, quem nomine

Hyacinthi Peruani carnei coloris, Svvertius pinxit.

II. Hyacinthus Indicus bulbosus minor.

Hyacinthus Indicus minor Orientalis, Svvert.

III. Hyacinthus Indicus tuberosus flore Hyacinthi Orientalis.

Bulbus Indicus flore albo Hyacinthi Orientalis æmulo, Paludano.

Hyacinthus Orientalis Indicus, Sirm. Tourar.

Hyacinthus Indicus tuber. radice, Clus. hist. Lob. ad. par. 2.

Hyacinthus minor Indicus tuber. radice albus, Svvert.

IV. Hyacinthus Indicus tuberosus flore Narcissi.

Hyacinthus Indicus tuberosa radice, Robino.

Hyacinthus major Indicus tuberosa radice, Svvert.

HYACINTHUS COLCHICI folio.

I. Hyacinthus latifolius maximus.

Hyacinthus Ind. Orient. dictus, adhuc incognitus, Svvert.

II. Hyacinthus latifolius alter.

Hyacinthus Africanus bulbo crasso facie Hyacinthi Peruani, Svvert.

BULBUS ERIOPHORUS

BULBUS CRINITUS ET FLOS.

Tigridis.

BULBUS ERIOPHORUS, id est, laniferi, inter veteres Theoph. 7. hist. 13. meminit, illum in historibus nasci, lanamq. sub primis runcis habere, ex qua roge & alie vestes conficiantur: cujus & Plin. lib. 9. cap. 11. meminit, Theophrasti testimonio usus.

I. Bulbus eriophorus Peruanus.

Eriophorus Peruanus, Clus. hist.

Magnam cum Hyacintho Indico bulbo

stellato affinitatem habet, hujus tamen folia

duplo latiora: flos purpureus, circa umbili-

cum cæruleus, venâ atropurpureâ floris folium percurrente,

II. Bulbus eriophorus Orientalis.

Bulbus eriophorus, Clus. pan. & hist. Lob.

Dod. Cam. Lugd. Tab.

Bulbus

Bulbus lanatus ex Oriente, Cæs.

Cum Dodonæus in florum historia scititiam figuram posuerit, idcirco eandem figuram sub nomine

Eriophori bulbi commentitij, posuere Lobel. Lugd. at Cast.

Bulbi eriophori, & Tab. sub Eriophori bulbi altera icone.

Ipse verò Dodonæus edit. postrema, utramque figuram habet; alteram titulo Bulbi eriophori icon ab amico missa; alteram, Bulbi eriophori Viennæ nati effigies.

III. Bulbus eriphorus minor.

Hyacintho obsoleto Æthiopico, subjecit Clus. cur. post.

IV. Bulbus marinus crinitus, *τερυόδης*, in hist. Lugd. proponitur; quid sit, ignoramus.

V. Tigridis flos, Dod. Lub. Lugd. Tab.

Ocelo Xochiel, id est, flos Tigridis, novæ Hisp. sive Mexiocanæ Provinciæ, in hist. Mexiocana.

Radicem habet porraceam, folia gladioli, flos rubet egregie, circa medium tamen albus, & instar pellis Tigridis maculatus: hujus veram figuram in florilegio I. du Bry videre est.



SECTIO SECUNDA.

NARCISSUS: LEUCOIUM: LILIO- NARCISSVS SIVE TVLIPA.

NARCISSUS ET EJUS SPECIES.

NΑΡΚΙΣΣΟΣ καὶ λεύκιον Dioscoridi l. 4. c. 161. & Theoph. 6. hist. 6. & 7. ejusdem 12. dicitur, non à Narcisso adolescente nimium seipsum adamante, ut Poëta fabulantur, sed à vi stupefaciendi, quam *ναρκωσις* Græci vocant: seu ut Plinius, à narce, quam vim Narcisso inesse l. 21. c. 19. testatur: hinc Plutarcho in Sympasio, quasi nervos hebetans & torpidas gravitates efficiens dicitur.

Unius Theophrastus meminit: at Dioscorides in flore differentiam notat, qui albus sit, intus croceus, in quibusdam purpureus, ita ut alius sit *πορφυρεὸς* es, alius *κενέωδης* es. Et Plinio l. 21. c. 5. Narcissus alter flore candido, calyce purpureo: alter calyce herbaceo: per calycem intelligens quod in floris medio est, nullius Græci autoris exemplo: & seq. c. 19. Narcissum unum purpureo flore, & alterum, herbaceum dixit.

NARCISSUS PORRACEO FOLIO,
angusto calyce, latifolius simplex,
uno flore.

I. Narcissus maximus pallidus folijs incanis.

Narcissus omn. maximus pallidus ad Clus. cur. post.

II. Narcissus maximus flore cæruleo albicante fimbriâ croco aureâ.

Narcissus maximus mediopurpureus, aut cæruleus latifolius Hispanicus, Eyft.

III. Narcissus albus magno odore flore circulo pallido.

Narcissus 13. medioluteus Poëticus, Tab.

Narcissus mediopurpureus, Ger. ico.

Narcissus latifolius 7. Clus. hist.

IV. Narcissus niveus odoratus circulo rubello.

Narcissus ferotinus montanus, Clus. pan.

Narcissus latifolius 6. Clus. hist.

Narcissus mediorubeus communis, Svvert.

V. Narcissus albus circulo purpureo.

Narcissus purpureus, Gef. hor.

Narcissus mediopurpureus, Dod. Lugd. Clus. pan. Eyft.

Narcissus mediocroceus purpureus, Ad.

Nar

Narcissus Poëticus mediopurpureus, Lob.
Narcissus, Cast. primus circulo rubeo, Cæf.
Narcissus 14. & Poëticus 5. Tab.

Narcissus mediopurpureus præcox, Ger.

Unum fert florem, raro binos: & huic simili, circulo tamen rubro, in Pannonicis Clusius proponit,

Narcissum serotinum montanum vocans.

Narciss. medio rubeus communis, Svvert.

VI. Narciss. alb. circulo croceo vel luteo.

Narciss. Veterum, Trag. Candidus, Lon.

Narcissus primus, Dod. gal. Cæf.

Narcissus Italicus flore candido, & Narcissus alb. Gef. hor.

Anemone limonia Theophrast. Narcisso cognata, Eid.

Narciss. Poët. mediocroceus, Lob.

Narcissus Poëticus medioluteus Dodonæi, Lugd.

Narcissus 10. roseoluteus major, Tab.

Narciss. medio purpureus præcox, Ger. ico.

Narcissus serotinus, Svvert.

Hic à priori potissimum circuli colore differt, & Narcissus Dioscoridis videtur.

Hujus generis tres reperiuntur; forma, colore, aut odore nequaquam, & magnitudine parum, sed florendi tempore, differentes: majores, medij, præcoces: & serius prodeuntes, minores sunt.

VII. Narcissus albus circulo croceo minor.

Narcissus minor serotinus mediocroceus, Lob. ico.

Narciss. 16. serotinus albus, Tab. minor, serotinus, Ger.

VIII. Narcissus flore cæruleo, Clus. pan.

Narciss. cæruleus, solo floris colore à Narcisso medio croceo differens, Lob. ad. part. 2.

NARCISSUS EXOTICUS.

I. Narcissus Indicus totus ruber.

Narciss. latifolius octavus, qui & Indicus rubro flore, vulgo Jacobæus, Robi. Clus. hist.

Narcissus Indicus rubro flore, Lob. ad. part. 2.

Narciss. Ind. flore sanguineo, Svvert.

Ex India Orientali adfertur.

II. Narcissus ex albo rubescens.

Narciss. Garetii, flore albo exteriore parte rubicundo Svvert.

III. Narciss. Ind. obtuso latiss. folio, bulbo vastissimo.

Narcissus Indicus Orient. bulbo magno & compressiore rotundo, folijs Narcissi, Svvert.

IV. Narciss. Ind. obtuso latissimo folio alter. Narcissus Indicus Occident. folijs Narcissi latifolij, Svvert.

V. Narciss. Ind. lato & multiplici folio. Narcissus promontorii Bonæ spei bulbo oblongo, Svvert.

VI. Narcissus Africanus folijs bifolij.

Narcissus Africanus five Narciss. exoticus, Lob. ad. part. 2.

Variat folio acutius, rotundius, & complicato; flore est phoeniceo.

NARCISSUS LATIFOLIUS SIMPLEX pluribus floribus.

Narcissus totus albus.

I. Narcissus albus major odoratus.

Narcissus latifolius major, in latifoliorum classe alter, Clus. hist.

Communiter binos, interdum ternos & quaternos flores, & sex folijs, imò ex duodecim constantes, Clusius notavit.

II. Narcissus Orientalis major albus.

Narcissus Orientalis major polyanthos totus albus, Eyst.

Est latifolius, floribus copiosis albis peramplis, odoratus, tribus staminibus luteis brevibus donatis.

III. Narcissus Orientalis medius albus.

Narcissus Orient. medius totus albus polyanthos, Eyst.

A priori sola magnitudine differt.

IV. Narcissus Orient. albus calice stellato.

Narcissus Orient. albus odoratus calice stellato, Eyst.

Floribus est albis odoratis, in medio stamina aurolutea instar stellæ radiatim disposita.

V. Narcissus totus albus major.

Narcissus totus albus, Dod. Lob. & Lugd.

Narcissus totus albus prior, Clus. hisp.

Narcissus latifolius simplici flore prorsus albo, Eid. hist.

Narciss. albus major, Cam. quintus albus, Tab.

Narcissus Orient. polyanthos minor totus albus, Eyst.

Narciss. medioluteus polyanthos, Ger. ico.

VI. Narcissus totus albus major.

Narcissus totus albus alter, Clus. hisp.

Narcissus latifolius niveus alter, Eid. hist. descr.

Narcissus totus albus paucioribus floribus, Lob. ob.

Narcissus albus minor, Cam.

VII. Narcissus niveus.

Narcissus latifolius niveus tertius, Clus. hist.

VIII. Narcissus albus flore minore Jasmini odore.

Narciss. latifol. niveus tertius alter, Clus. hisp.

Narcissus medioluteus.

I. Narcissus orientalis albus calice luteo Campanulæ simili maximus.

Narciss. polyanthos orient. calice medioluteo odoratus maximus, Eyst.

Hujus, ut & duorum sequentium calix, campanulæ instar amplius luteus: flores jucundum odorem spirant.

II. Narcissus orientalis albus calice luteo medius.

Narciss. polyanthos orient. medioluteus odoratus medius, Eyst.

III. Narciss. orient. albus calice luteo minor.

Narciss. polyanthos orient. medioluteus minor odoratus, Eyst.

IV. Narcissus orient. calice aureo pluribus foliolis pleno.

Narcissus orientalis mediocroceus calice pleno, Eyst.

Flos albus, calice aureo pluribus tortilibus foliolis pleno.

V. Narcissus Orient. calice rotundo aureo luteo.

Narciss. orient. mediocroceus major, Eyst.

VI. Narcissus pallidus mediocroceus.

Narciss. medioluteus Pisanus, Lob. ico. Svvert.

Narcissus latifolius flore prorsus albo secundus, Clus. hist.

VII. Narcissus pallidus medioaureus.

Narcissus sulphurei coloris minor, ad Clus. cur. post.

VIII. Narcissus albus circulo croceo polyanthos.

Narcissus. Matth. comp. octavus, edit. Ital.

Narcissus mediocroceus serotinus polyanthos, Lob. ico.

Narciss. quart. Matthioli, Lugdun.

Narcissus 15. niveus serotinus, Tab. totus albus, Ger. ico.

Narcissus, Castori; quem quinto simplici flore junxit,

Hic etiam circulo purpureo reperitur, qui Narcissus mediopurpureus, Eyst.

IX. Narcissus pallidus circulo luteo.

Narcissus medioluteus, Dod. Lugd. Ger. Svvert. Eystert.

Narcissus albidus medioluteus, Lob.

Narcissus 6. medioluteus 1. Taber.

Narcissus latifolius flore prorsus flavo, Clus. hist. icon.

X. Narcissus pallidus circulo aureo alter.

Narcissus latifolius 5. vel Narcissus pallido flore medioaureus, Clus. hist.

Meminit Clusius & alterius; cujus flos ex pallido virefeit, calice angusto flavo.

XI. Narcissus medioluteus copioso flore odore gravi.

Narcissus octavus fortè Matth.

Narcissus medioluteus, Ad. Lob. (cui & Donas Narbonensium) Clus. hisp. Svvert. medioluteus alter, Dod. Lugd.

Narcissus præcox simpl. flore, vel latifolius simplex 1. Clus. hist.

Narcissus 7. medioluteus 2. Tab.

Narcissus Pisanus, Ger.

Narcissus alter comofo flore, Cæf.

Narcissus Constantinopolitanus minor calice fimbriato, mediocroceus, Eyst.

Variat folijs obtusioribus & acutioribus: sic floris colore, qui aliquando sulfureus, five *oxgelaum*: aliquando 10. 12. etiam 18. flores observavimus.

XII. Narciss. medioluteus majorib. floribus.

Narcissus præcox, Clus. hisp.

Narcissus medioluteus alter, Lob. obf.

Narciss. latifol. Byzantin. mediolut. 2. Clus. hist.

Præcocior priore, latioribus folijs, & floribus majoribus.

XIII. Narciss. niveus calice flavo odoris fragrantissimi.

Narciss. latifol. simpl. mediolut. 3. Clus. hist.

Narciss. latifol. simpl. mediolut. 3. Clus. hist.

Narciss. latifol. simpl. mediolut. 3. Clus. hist.

Narcissus totus luteus.

I. Narcissus luteus polyanthos Africanus.

Narciss. Africanus major, flavus polyanthos: in addit. ad Clus. cur. post.

Narcissus Africanus multiflorus coronatus, Svvert.

Narcissus luteus Africanus major, & Narcissus Africanus aureus major, Rob.

II. Narciss. luteus polyanthos, Lusitanicus, Narciss.

Narcissus d'Argiers, aut Ægyptius, Lob. ad part. alt.

Narciss. de Argiers polyanthos totus lut. Eyf.

Narciss. Africanus flore aureo, Svvert.

III. Narciss. luteus Constantinopolitanus.

Narciss. totus luteus ex Thracia, Clus. hisp.

Narciss. latifolius flavo flore sive 4. Zerincadacatamer nomine allatus, Eidem hist.

Flos aut omnino luteus, aut pallidus: qui pallidus, caliculus planè aureum habet.

IV. Narciss. angustifolius totus luteus.

Narcissus totus luteus semper florens Caccini, ad Clus. cur. post.

Singulis caulibus ad quindenos flores, idque sæpius in anno, Florentiæ profert.

V. Narciss. angustifol. flavus magno calice.

Narcissus 9. qui angustifolius 1. vel Narcissus juncifolius 1. amplo calice, Clus. hist.

Narciss. maximo calice, flore luteo, Svvert. qui alium adjungit.

Narcissum oblongo calice, flore luteo.

Narciss. juncifolius præcox major, &

Narciss. juncifolius latiore calice, Eyf.

NARCISSUS PORRACEO angusto folio.

I. Narcissus angustifolius albus major.

Narcisso juncifolio albo flore, junxit Clus. in cur. post.

II. Narciss. angustifolius albus minor: qui 1. in Prod.

III. Narciss. angustifol. pallidus calice flavo.

Narcissus sulfurei coloris majusculus, ad Clus. cur. post.

IV. Narcissus parvus albus simbria suave rubente.

Narcissus parvus stellatus albus medio suave rubente vertice, Lob. ad. par. 2.

V. Narcissus mediocroceus gramineo folio.

Narcissus mediocroceus tenuifolius, Lob. ad. par. 2.

NARCISSUS JUNCIFOLIUS. simplex, luteus & albus.

I. Narciss. juncifol. oblongo calice luteus major.

Narciss. juncifolius prior, Clus. hisp. Lugd.

Narciss. juncifol. major, Dod. odoratiss. Cam.

Narciss. luteus juncifolius vel luteus Africanus, Ad. præcox, Lob.

Narciss. 10. angustifol. 2. & juncifol. 1. Clus. hist.

Narciss. 8. juncifolius 1. Tab. juncifol. præcox, Ger.

Narciss. major juncifol. Eyf.

Flores terni, quaterni, quini, interdum gemelli odorati.

II. Narciss. juncifol. luteus minor.

Narciss. juncifol. Dod. flo. Lugd. alter, Clus. hisp.

Narciss. juncifol. minimus Dod. Camer. Clus. hist. Eyf.

Narciss. juncifolius serotinus, Lob. Ger.

Narciss. 9. juncifolius 2. Tab.

Narciss. flore luteo, brevi calice, Svvert.

Clusius frequentioribus: Lobelius paucioribus folijs dicit: uterque eadem figura utitur: unico aut altero flore flavo & odoro.

III. Narciss. juncifol. flore luteo variegato.

Narciss. luteus albicantibus lineis distinctus, brevi calice, Svvert.

IV. Narcissus juncifol. flore pallidiore, calice flavo.

Narciss. juncifol. minor, Clus. hist. ap. & Lob.

ad. par. 2. minimus, Eyf.

V. Narciss. juncifol. flore rotundo roseo.

Narciss. juncifolius flore rotundæ circinitatis roseo, Lob. Lugd. Svvert. cui flos albus est.

Narcissus 10. roseo luteus major & minor, Tab.

VI. Narcissus juncifolius totus albus.

Narciss. juncifol. flore albo, alter, Clus. ap. alt. auct. & cur. post.

Narciss. juncifol. polyanthos albus, Eyf.

VII. Narciss. autumnalis albus.

Narcissus juncifolius albus autumnalis medio obsoletus, Svvert.

VIII. Narciss. albus autumnalis minimus.

Narciss. autumnalis minor, Clus. hisp. Lugd.

Tab. Ger. parvus, Dod. Lob.

Narciss. serot. sive autumnal. minim. Clus. hist.

IX. Pseudonarcissus gramineo folio, sive

Leuconarcissus æstivus: qui 2. in Prod.

NARCISSUS MAGNO ET brevi calice.

I. Narciss. latifol. max. alb. calice brevi luteo.

Narcissus albus max. calice luteo brevi, Eyf.

II. Narciss. latifolius pallidus calice amplo

& aureo, caule striato.

Narcissus latifol. flavo flore amplo calice, Clus.

cur. post.

Pseudonarcissus pallidus calice amplo, Eyf.

Variat unico flore, aliquando binos conjunctos habet: hic intensè luteus, ille pallidus: ad Cluf. cur. post.

III. Narciss. latifol. pall. calice amplo alter. Narcissus omnium maximus pallidus amplo calice flavo: in addit. ad. Cluf. cur. post.

IV. Narcissus latifolius sulfureus vel albus brevi calice.

Narcissus sulfurei coloris brevi calice, Svvert. Narcissus totus albus brevi calice, Idem.

Pluribus est floribus. Addit & alium totum album triplici flore & angustiore folio.

V. Narcissus albus medius calice luteo brevi: & Eystet.

NARCISSUS MAGNO ET OB- longo tubo vel calice, latifolius.

I. Narcissus maximus pallidè luteus. Narcissus maximus griseus vel pallidus, amplo calice flavo, non descriptus, Svvert.

II. Narcissus alter crasso bulbo. Narcissus minor pallidus amplo calice flavo non descriptus, Svvert.

III. Narcissus subflavus tubo sexangulo. Narcissus falsus sive Pseudonarcissus tuba sexangulari dilutior flavus non descriptus, Svvert.

IV. Narcissus flavus tubo rotundo. Narcissus seu Pseudonarcissus oblonga tuba rotunda, non fimbriata quasi abscissa, flavo flore, Svvert.

V. Narcissus albus tubo luteo. Narcissus seu Pseudonarcissus albus oblongo calice luteo, Svvert.

VI. Narciss. alb. calice flavo, moscari odore. Narcissus oblongo calice, Cluf. hist. ap. alt. Narcissus albus luteo longiore calice, ad Cluf. cur. post.

Pseudonarcissus albus calice luteo, Eyst. Triplicis Clufius meminit: 1. fl. albo, calice flavo. 2. flore albo, sed calicis ore magis croceo: 3. flore ex albo pallecente, aut *αχρολίνιν*, calice latiore & oris croceis.

Et in curis post. in alijs stylus tubi oras superat, in alijs non excedit. Aliquando (ut ad cur. post. additum) fore majore ex folijs niveis, aut candidis, sed angustioribus & oblongis, odore grato.

VII. Narcissus albus calice flavo alter. Narcissus albus oblongo calice præcox, ad Cluf. cur. post.

Triplex species: 1. latis & viridibus folijs, caule brevior, flore albo, tubo flavo: 2. folijs angustioribus: 3. folia tubum cingentia pallida, angustiora, & acuminata: & est tubo fimbriato & non fimbriato, ut est

Narcissus tuba non fimbriata flavescens, Svve.

VIII. Narcissus syl. pallidus calice luteo. *Βαλβυνοδιον* Theoph. Codianum Gaza vertit, Plin. lib. 22. cap. 11. secutus.

Narcissus Brunf. Lac. quo ad ico. primam.

Narcissus luteus, Trag. Gef. hor.

Narcissus 8. Matth. fol. quo ad ico. 1.

Narcissus 3. Eid. comp.

Narcissus Matthioli, Lugd. quoad 2. ico.

an Narcissus, Ang?

Codianum, vel Codianum flore Codij, id est, Campanulæ, Gef. hor.

Bulbus syl. & Codianum, Eid. col.

Pseudonarcissus, Dod. gal. vulgaris, Cluf. hist.

Pseudonarcissus luteus, Tab. Eyst.

Narcissus luteus syl. Dod. Lon. Lugd.

Narcissus totus luteus montanus, Theoph. Ad. & Lob.

Narcissus calice prælongo anguloso, Cæf.

Pseudonarcissus Anglicus & Hispan. Ger.

Pseudonarcissus minor Germanicus, Svvert.

Cauli cuilibet communiter flos unus insidet: aliquando duo: hinc

Pseudonarciss. vulgaris binos flores in eodem caule gerens, Cluf. hist. ap. alt. verum & triplici flore adsero: reperitur & magis præcox, Cluf. hisp.

Pseudonarcissus præcox, Eyst.

Sic Cluf. hist. ap. alt. auctar. multas notat differentias, flores majores, minores, forma & colore dissimiles: aliquibus sex folia tubam amplexantia præpallida, alijs pallida, alijs saturatiora: tubus aut valde amplus, aut angustus, qui vel pallidus, vel flavus & quasi aureus, aut oris crenatis, vel crenatis & fimbriatis simul, quales sunt

Pseudonarcissus simpl. Belgarum &

Pseudonarcissus luteus, Eyst.

Aut quodammodo æqualibus, & minimè crispis. Hue referri possunt:

Bulbus flore luteo superiore parte aperto, &

Bulbus alius flore luteo humili, cujus semen simile Hemerocallidi Valentinae: plura non habet, Cluf. pan.

IX. Narcissus maj. tot. lut. calice prælongo. Pseu-

Pseudonarcissus major, Clus. hisp. & Hispani-
cus Clus. hist. Svvert.

Narcissus syl. alter, Dod.

Narcissus totus luteus montanus, Theophrasti.
Hispanicus, Lob.

Narcissus totus luteus montanus major, Eyf.

Huic similis inodorus, inefficacior locis ad
meridiem, Ad.

X. Narcissus totus luteus flor. folijs reflexis.
Narcissus totus luteus oblongo calice & reflex.
folijs, Eyf.

XI. Narcissus parvus totus luteus.
Pseudonarcissi genus admodum exile, Clus.
pan.

Pseudonarcissus minor Hispanicus latifolius,
Clus. hist.

Narcissus totus luteus mont. minimus, Eyf.

Narcissus Hispanicus flore luteo pumilus,
Svvert.

XII. Narcissus albus oblongo calice.

Pseudonarcissus albo flore, Clus. hist. ap. alt.
auct. totus abus, Eyf.

Narcissus oblonga tuba totus albus, Svvert.

Duplex est: unus altior flore longiore & tu-
bo angustiore, flore albo, vel etiam *ωχρόδυνος*

colorem accedente: alter humilior, flore bre-
vior & tuba laxiore. Aliquando flos non

pendulus sed protuberans, Clus. cur. post.

XIII. Narcissus albus fimbria lutea.
Pseudonarcissus flore albo tuba oblonga, fim-
brijs luteis, Svvert.

XIV. Narcissus luteus repens.
Pseudonarcissus minor luteus repens, Eyf.

NARCISSUS OBLONGO CALI-
ce, vel Calathi figurā, angusto etiam

juncifolio.

I. Narcissus angustifolius albus calice ob-
longo floreque reflexo.

Narcissus juncifolius albus fl. reflexo, Clus.
ap. alt. auctar. & cur. post.

Narcissus juncifolius alb. calice magno, Lob.
ad. par. alt.

Narcissus totus alb. reflexus, Svvert.

II. Narciss. montan. juncifol. calice flavo.

Pseudonarcissus primus, Clus. hisp. juncifol.
primus, Clus. hist. & juncis folijs, Eid. cur.
post.

Narcissus montanus juncifol. minimus, Lob.
Lugd.

Narciss. juncifol. fl. luteo reflexo, Svvert.

III. Narciss. montan. alter flore fimbriato.

Pseudonarciss. juncifol. 2. flavo flore, Clus. hist.

Narciss. montan. juncifol. minim. alter, flore

luteo fimbriato, Lob. Lugd.

Pseudonarciss. juncifol. Eyf.

Huc referendus

Narciss. tubā fimbriatā flore flavescence, &

Narciss. pseudojuncis folijs luteus fimbriat.

Svvert.

IV. Narciss. montan. albus minimus.

Narcissus omnium minimus montanus alb.

Lob. Lugd.

Pseudonarciss. juncifol. 3. albo flore, Clus. hist.

Variant hi tres: alijs flos amplior, vel fla-
vescentis coloris, vel flavi, vel aurei: in non-

nullis stilus oras excedit, in alijs vix ad oras

pertingit: aliquando oris æqualibus, ali-
quando fimbriatis.

V. Narciss. montanus juncif. calice aureo,

Pseudonarciss. minim. juncifol. aureus, Eyf.

VI. Narciss. montanus coronatus.

Narcissus montanus minimus coronatus, Lob.
ico.

tiplici corollâ, Lob. ico.

Narcissus juncifolius multiplici complexu, constans, Cæs.

Narcissus medioluteus corona duplici, Svver.

Odore est, inter Narcissum & Muscari medio: etiam cum decem floribus vidimus.

V. Narcissus bulbo anguloso.

Narciss. Constantinopolitanus, quem Zeiden Sari vocant, Camer.

VI. Narciss. multiplex totus flavus.

Narciss. plenus quartus flavo flore, Clus. hist.

Narciss. flavus pleno flore, Svvert.

VII. Narcissus mediopurpureus multiplex.

Narcissus pleno flore quintus, Clus. hist.

Flos unus, interdum duo, odore ad Muscari accedens: aliquando viginti & pluribus: aliquando sexaginta quatuor folijs constat.

VIII. Narcissus totus niveus multiplex.

Narciss. pleno flore sextus, Clus. hist.

Narcissus albus pleno flore, Svvert.

IX. Narciss. albus multiplex ex Virginea.

Narcissus totus albus de Virginea pleno flore, oblongo apice, Svvert.

X. Narcissus sylv. multiplex calice carens.

Pseudonarcissus pleno flore, Clus. hist.

Pseudonarcissus luteus polyanthos, Tab.

Narcissus sylv. multiplex, Dod.

Narciss. luteus multiplici flore, Lob.

Narciss. luteus multiplex Dodonæi, Lugd.

Narcissus cujus flos multiplici plexu rosæ instar constat, Cæs.

Narcissus ex luteo pallidus flore pleno, Cam.

Narciss. sylv. stellatus, Eyft.

Duplex est: unus elegantior est, florem explicatum semper gerens: hic

Pseudonarcissus luteus flavo pleno flore, Svve.

Alter verò florem explicat, sed involucri inclusus permanet: uterque pallidus.

XI. Narcissus flore pleno variegato.

Narciss. Septentrionalis flore pleno luteo, Eyft.

XII. Narcissus luteus syl. duplici & triplici tubo aureo.

Narcissus duplici tuba flore luteo, Svvert.

Pseudonarcissus pleno flore, seu triplici tuba, Clus. hist. ap. alt. & cur. post.

Narcissus Septentrionalis calice luteo pleno, duplicatis folijs, Eyft.

XIII. Narcissus luteus syl. triplici tubo alter.

Pseudonarcissi pleno flore varietas, Clus. cur. post. qui duplicem proponit.

Narcissi totilutei præcoci Septentrionalium, five montani Theophr. omnium vulgarissimi, triplicem ex eadem radice differentiam, additâ figurâ, Lob. ad. par. 2. recenset.

Narciss. Septent. fl. pleno luteo oris incis, Eyft.

XIV. Narciss. luteus tubo diviso.

Pseudonarcissus duplex diviso calice odoratus, Svvert.

XV. Narciss. latifolius luteus multiplex.

Narcissus Cyprius luteus polyanthos fl. pleno, Lob. ad. part. alter, & addit

Narcissum polyanthea Byzantinum hujus familiae esse, quem tamen non describit.

XVI. Narcissus juncifol. aureus multiplex Anemones formâ.

Narcissus juncifol. pleno flore, Clus. cur. post.

Narcissus juncifolius luteus flore pleno, Eyft.

Est & huic similis alter, qui licet multiplex sit, tamen adeo multiplex foliorum textura non est, quem

Narcissum aureum pleno flore vocat Svvert. hunc à Patre Gregorio de Regio Capucino, unâ cum alijs ex Italia accepimus.

NARCISSUS MARITIMUS.

I. Narcissus maritimus.

Narcissus maritimus, Theoph. 6. hist. 1. ubi Elium Gaza vertit.

Hemerocallis quibusdam putatur, Bulbus scilicet littoralis, Theoph. Pancratium Monspel. & Squilla minor Pharmacop. Ges. hor.

Hemerocallis Valétina, Clus. hisp. & hist. Dod. fl. Lob. (cui & Narcissus Constantinopolitanus Matth.) Cam. (cui & Con Zambach Turcis)

Taber.

Pancratium maritimum, Ad.

Pancratium floribus rubris, Lob. ico.

Pancratium Dalech. Lugd.

Narcissus marinus, Dod. Clus. hist. ap. alt. & cur. post. Cæs.

Narcissus Pancratium marin. flore albo, Svve.

Variat flos colore: apud Monspelienfes est albo, est subluteo, & est pallescente: apud Italos, rubeo & purpureo, quandoque punicante:

hinc apud Lobelium in iconib. duplex figura, Pancratium maritimum, &

Pancratium floribus rubris: & apud Taber.

Lilium maritimum album.

Lilium maritimum luteum:

Narcissus major five Pancratium floribus rubris,

bris, & Narcissus Pancratium marium five Hemerocallis Valentina, Svvert.

II. Narcissus Illyricus liliaceus.

Narciss. 3. vel Constantinopolitanus, Matth. & Lugd. qui priorem putat.

Afouzenas de las Indias, Lob. ob.

Lilionarcissus Hemerocallidis Valentinae facie, &

Lilionarciss. Orient. Plateau, Clus. hist.

Lilionarciss. Hemerocallidis facie, Eyst.

Narcissus montanus five marinus alter, qui

Matthioli tertius, Clus. hist. app. 2. & in auct. hujus meminit.

Narcissus Constantinopolitanus, Tab.

Narciss. 3. Matthioli multiflorus albus, Svvert.

Pancratium Indicum alterum vernum, five

Narcissus Indicus alter facie Pancratij Monspe-
liani, Lob. ad. par. 2.

Flores seni, septeni: sic, caule duplici: ab uno 14. Liliacei candidi, ab altero 12. aliquando unus caulis triginta quinque flores sustinuit: aliquando flos fuscus caryophyllo aromatico concolor.

III. Narcissus Indicus autumnalis.

Pancratium Indicum, aut Narcissus Indicus maximus autumnalis quorundam, Lobel. ad. par. 2.

IV. Narcissus Indicus folio latissimo triquetro.

Narcissus five Pancratium Orientale Svvert.

V. Narcissus Indicus latifolius alter.

Narciss. Indic. five Pancratium Occid. Svvert.

LEUCOIMUM BULBOSUM EJUSQUE Species.

Λευκίον apud Theoph. 6. hist. 7. & 7. ejusd. 13. Gaza violam albam verit. *Leucoion, inquit, florum prima se ostendit, emicat ubi caelum clementius statim, etiam nondum hyeme exacta: ubi verò immitius, postea. Plin. l. 21. c. 11. Viola alba florum prima Ver nunciantium, cujus vita longissima est trimatus.*

I. Leucoium bulbosum vulgare.

Leucoium Theophrasti, & Viola alba, Plinij.

Narciss. Martius. Brunf. septimus, Matth. Lugd.

Viola alba Theoph. Trag. (cui & Hemerocallida Diosc.) Fuch. Gef. cat.

Narcissus & Viola alba, Tur.

Narcissi candidi genus, Cord. in Diosc.

Narcissus aquaticus, Cæs.

Viola alba bulbosa Fuchsij, Lugd.

Leucoium Theoph. Dod. gal. Lon.

Leucoium bulbosum Theoph. Gef. hor. Thal.

Leucoium bulbosum primum, Tab.

Leucoium bulbosum hexaphyllum, Dod. Cam.

minus, Eyst.

Leucoium bulbosum præcox majus, Clus. pan.

& hist. Ger. ico.

Leucoium alterum bulbaceum Theoph. Portæ.

Leuconarcissolirion prat. vernum paucioribus

floribus, Ad.

Leuconarcissolirion paucioribus floribus, Lob.

Leuconarcissolirion vulgare, & Opition Theophr. Cam. in Matthiolum.

Narcissus Germanicus vulgaris, Svvert.

Flores in singulis pediculis singuli, rariss. gemini: tribus & quinque folijs pingit, Svvert. nomine

Narcissi Hispanici Leucoij minoris.

II. Leucoium bulbosum flore patulo.

Narcissoleucoion Bohemicum, Svvert.

Leucoium bulbosum hexaphyllum majus, Eystett.

Folij est latioribus, flore majore & patulo.

III. Leucoium bulbosum majus five multiflorum, quod aliqui Acrocorion Plinij statuunt.

Leuconarcissolirion prat. vernum, Ad. Lob.

Leucoium bulbosum polyanthemum, Dodon.

Cam. Lugd. multiflorum, Tab.

Leucoium bulbosum majus, Ger.

Leucoium bulbos. serotinum majus, Clus. pan.

Leucoium bulbosum serotinum, Eystett. qui & minus exhibet.

Narcissus 2. Matthioli. Lugdunens. 3. & Matth.

10. Tab.

Narcissoleucoium majus Hispanicum, Svvert.

Variat folijs pallidiorib. minus mucronatis sed

sed velut bifidis: floribus, maculis ex viridi pallidioribus infectis.

IV. Leucoium bulbosum trifolium minus. Narcissus tertius alter, Matth. comp. Narcissus 8. alter, Eid. fol. 2. Lac. ico. Leucoium bulbosum triphyllon, Dod. Cam. minus, Eyft. Leucoium bulbosum præcox minus, Cluf. pan. & hift. Leuconarcissolirion prat. vernum omn. minimum, Ad. Leuconarcissolirion minimum, Lob. Leuconarcissolirion bifolium, Cam. in Matth. Narcissus, Matth. quoad. 1. fig. Lugd. Narcissus montanus alter, Cæf.

V. Leucoium bulbosum trifolium majus. Leucoium bulbosum Byzant. Cluf. pan. præcox, Eid. hift. & Lob. ad. par. 2. & Leuconarcissolirium, sive tertium bulbosum Leucoion, Lob. Leucoium bulbosum triphyllum majus Byzantinum, Eyftett. an Narcissus sextus, Matth. Lugd.

Leucoium bulb. 2. Tab. sub bulb. præcoce, Ger. VI. Leucoium bulbosum trifolium cæruleum.

Leucoium triphyll. flore cæruleo Someri, Lob. ad. part. 2.

VII. Leucoium bulbosum autumnale latifolium.

Narcisso leucoium autumnale, Svert.

VIII. Leucoium bulbosum autumnale. Leucoium bulbosum autumnale minimum, Dod. minus, Cluf. hisp. Lugd. & Cam. Leucoium bulbosum autumnale tenuifolium, Cluf. hift.

Leuconarcissolirion minim. autumnale, Lob.

IX. Leucoium bulbosum tenuifolium vernum.

Leucoium bulb. vernum minimum, sive folio capillari præcox, Cluf. cur. post.

X. Leucoium unico & junceo folio.

Bulbus *μνίφου* seu unifolius.

an *βελβιν* Theophrasti, Cluf. hift. app. 2. auct.

an Orinthogalum unifolium flore albicante, Svert?

XI. Leucoico bulbo affinis duplex.

Bulbus quatuor aut quinque flores gestans in modum Campanulæ albæ, Cluf. pan. & hift.

Alterum addit bulbum flore magno, Campanulæ forma, terram spectante, intus luteo, foris purpureo, ibid.

TULIPA ET EJUS SPECIES.

Tulipa, cujus descriptionem & figuram primus Gesnerus, Anno 1560. in append. ad Cordi hift. dedit, à pileo Dalmatico, vel amiculo capitis, ab ipsis gestari solito, nomen habet, idè propter floris cum pileo similitudinem. Sunt qui Anemonem, *λεμωνίαν* Theoph. velint, cum ibi Pulsatillam intelligere videatur: alij Cynorrhodon Plin. l. 21. c. 5. censent: alij ad Satyrium trifolium referunt. Turcæ Alé & Zampúl vocant. *πυθώρα* fortè Theophrasti.

Genera prima tria sunt: præcocius unum: serotinum alterum: dubium tertium, medio tempore florens.

Præcox, caule est pedali, firma medulla pleno, quem folia plerumq; terna, nonnunquam quaterna & quina amplectuntur, propendentia & nutantia, interdum surrecta: cauli flos unicus (rarissimè gemini, vel summo caule conjunctim nascentes, vel bifido inherentes) sex folijs (rarissimè septenis & octonis) constans, ex quo tot stamina, quot folijs constat, colore variantia prodeunt.

Serotina, caule est cubitali & tripedali, fungosa materia pleno, quem quaterna plerumq; folia, nonnunquam quina & sena firmiora, ut plurimum erecta non nutantia ambiunt: semine quam in præcoci majore, & bulbo longiore majoreq; plerumq; constat: sic & caulem ramosum interdum habet.

Dubia, quæ præcocium flore marcescente suos explicant, & serotinis florere incipientibus,

jam

jam senescunt, & cum his interdum florent. Sunt inter has nonnullae, quae serotinarum magnitudinem aequant: aliae quae praecoces non superant, nec illis forma abfimiles sunt: & illae quidem vel amplissimis floribus praeditae, vel praecoe non majoribus: quaedam etenim praecocibus humiliores sunt.

Omnia folia apice mucronato, aut orbiculato: vel tria interiora orbiculata, exteriora mucronata, & contra existunt.

TULIPA PRAECOX SIMPLICIS & unius coloris.

I. Tulipa praecox lutea.

an Satyrion triphyllon Dioscoridis.

Tulipa alia, Gef. ap. ad Cordum, lutea, Cast.

Lilionarcissus luteus, Lob.

Tulipa praecox flava, Clus. hist. tota lutea, Ger.

an Ouludia, Lugd.

Variat: vel pallens, unguibus plerumque aureis, vel ad auri fulgorem accedentibus, unguibus veluti fuligine aspersis: interdum flos inodorus, vel odor imbecillus, vel quasi croci five etiam cerae recentis. Aliquando flavus, sequenti anno flavum & rubrum commixtum habuit.

II. Tulipa praecox rubra.

Tulipa Turcarum, Gef. ap. ad Cordum.

Narcissus quintus, Matth. Lugd.

Anemone limonia Theophr. Tulipa quorundam, Gef. hor.

Lilij rubentis genus videtur: Idem.

Satyrion erythronium forte: Idem.

Lilionarcissus sanguineus puniceusve, Ad Lob.

Tulipa, Dod. Lon. major, Lug. rubra, Cast. praecox rubra, Clus. hisp. pan. & hist.

Colore est nunc saturiore, modo dilutiore & gratissimi aspectus: interdum ineleganti & obsoleto: foliorum unguis, vel lutei omnino, aut levi fuligine in luteo aspersi: in quibusdam in medio ungue macula nigra, in alijs ita lata, ut sola linea lutea ambiens conspiciatur: interdum unguis folij partem dimidiam occupant. Odor instar mali aurei, ut plurimum obscurus, vel papaveris virus referens. Aliquando qui ruber fuit, sequenti anno varie commixtus, ex rubro & flavo inter se confusis coloribus, modo flavo, medium folium occupante, modo rubro, vel utroque radiatim per oras discurrente fuit. Verum eae, quae nativum colorem mutant, subinde corrumpi solent. Huc pertinent ex Eyst.

Tulipa praecox floribus rubris in album luteum languescentibus.

III. Tulipa praecox purpurea.

an Cosmo sandalos Veterum inter coronarias? Lilionarcissus purpureus, Lob.

Tulipa praecox purpurea, Clus. hist.

Alias dilutior & Damascanam rosam colore referens: interdum adeo diluto, ut albescere videatur: alias purpura saturior, & violaceum five amethystinum colorem habet: hic est, Lilionarcissus purpureo violaceus, Lob.

Alias Paeoniae floris aemulus: aliquando ex purpura nigricat, & obsoletior est: hic est,

Lilionarcissus purpureus sanguineus, puniceusve quintus, Lobel. & huc referas duos sequentes:

Lilionarcissus sanguineum paniceumve 2. &

Lilionarcissus sanguineum puniceumve obsoletum, tribus exterioribus mucronatis folijs, internis vero retusis, Lob.

Ungues cum apicibus aut pallent, aut lutei sunt: nonnulli apices nigros habent, pediculis veluti fuligine infectis: odora est & inodora. Aliquando purpurea, sequenti anno album & purpureum colores, varie inter se commixtos, & radiatim folia secantes, habuit. Item ex Eyst.

Tulipa purpurea calice pallescente &

Tulipa summe miniata calice luteo.

IV. Tulipa praecox alba.

Lilionarcissus niveus, Lob. ico.

Tulipa praecox alba, Clus. hist.

Flos omnino candidus, nisi tria folia exteriora dorso cineracei vel caerulei quippiam admixtum haberent; unguis lutei, nonnunquam veluti fuligine aspersi, apicibus & staminibus pallidis, aliquando unguis prorsus albi, apicibus nigricantibus:

Admonet Clusius, se Tulipas caerulei omnino coloris nondum vidisse: totum florem pallide violaceum in horto meo habui.

TULIPA PRAECOX

Varia.

I. Tulipa praecox rubra varia, Clus. hist.

Rubrae variae floris folia exteriora mucronata, H inte-

teri, Lob.

nnale la-

nnale.

inimum,

uifolium,

ale, Lob.

lium ver-

five folio

o.

2. auct.

e albican-

lex.

gestans in

& hist.

, Campa-

ateo, foris

ad Cordi

en habet,

elint, cum

Satyrion

um, medio

nunquam

cauli flos

mes) sex

colore va-

a plerumq;

viunt: so-

autem ra-

pienibus,

jam

interiora orbiculata, magna ex parte sunt: huius differentiæ octo:

1. Est magnis oris auri fulgore splendentibus, magnis unguibus luteis: apicibus, vel nigris, vel obsoleta purpura tinctis, pediculis veluti fuligine infectis.

2. Foliorum exteriorum ora foris lutea, interius dilutius rubentia, rubedine quasi radiatim in luteas oras desinente: at interiora rubent, ungues lutei, stamina cinerea.

3. Folia dilutius minii colore rubent, oris mediocribus, foris minii colore, interiora folia ferè tota occupante, & virgatim in oras luteas desinente: unguibus magnis, flavis, apicibus cineraceis, pediculis luteis.

4. Folia exteriora medio dorso luteo, sanguineis virgulis distincta sunt, parte reliqua rubra, orisque luteis: interiora omnia ferè rubra, sed rubro colore in aureas oras radiatim desinente: interiore parte lutea, rubris radijs circa medium folium distinctis: ungues & pediculi lutei, apices nigri.

5. Folia omnia mucronata, externa, dorso lutei, reliqua parte sanguinei coloris, oris tamen extremis luteis, quæ internè sanguineis radijs tota resperfa: interiora foris sanguinis modo omninò rubent, oris luteis sive flavis coloribus se commiscuentibus, interna parte flavis, circa medium sanguineis radijs, instar orbis insignitis: ungues & pediculi lutei, apices nigri.

6. Folia mucronata, oris aureis, reliqua parte rubris, excepto dorso foliorum exteriorum, quod aureis virgulis aspersum: omnium ungues lutei, radiatim in rubro commixti, pediculi lutei, apices nigri.

7. Folia externa mucronata, interna orbiculata tota rubra, oris tamen aurei coloris radiatim in rubro desinentibus: exteriores saturatiores, interiore tamen parte magis aurea: ungues, stamina, pediculi cum præcedenti conveniunt: omnium istorum flores satis odorati sunt.

8. Folia sunt parvis oris aureis, per reliqua elegantissimi rubri coloris: ungues flavi, stamina veluti fuligine tincta, apices obsoletè purpurei.

II. Tulipa rosea variegata polyanthos.
Tulipa polyanthos præcox rosea, colore mixta, Eyttet.

III. Tulipa præcox lutea varia, Clus. hist.

Lilionarcissus luteolis adversa parte folijs, secundum ora strijs rubris decoratus: intus verò luteus amœnus, Lob. ico.

Huius etiam differentiæ novem sunt.

1. Flos primis diebus totus luteus, at quarto, vel quinto, folia extrinsecus per oras rubris virgulis leviter distinguuntur, interna parte (præsertim tria externa) luteis remanentibus, & unguibus nonnunquam veluti fuligine tinctis, apicibus interdum luteis, pediculis fuscis.

2. Floris folia externa, circa medium rubris radijs raris insignita sunt, interiora autem frequentioribus, & ad extremum usque folium ferè excurrentibus: ungues aurei, stamina pallida.

3. Foliorum exteriorum ora, foris planè rubent, interius à medio ad oras extremas rubris virgulis distinguuntur: interiora folia externè omnino rubent: internè, à medio ad summum, rubrum nervum protensum, & latera rubentibus radijs exornata, habent.

4. Folia exteriora dorso luteo sunt, per oras verò dilutioris cinnabaris colore virgatim distincta: interiore parte, ad unguem usque, cinnabaris color tota occupat: interiora folia cinnabaris colore infecta, nervo tamen duplici luteo secundum longitudinem, & luteis virgulis in oras externas excurrentibus: apices nigricant, pediculi lutei nonnullis fuligine infectis: ungues aurei, magni, stamina quodammodo superantes: Huc refer

Lilionarcissum luteum coccineum rubentibus oris, Lob.

5. Flos odoratus est, cujus folia tria exteriora mucronata & lutea sunt, oris purpura rubescente radiatim intercurrente insignitis: dein orarum extrema lutea sunt, & interna parte, ad folij medium, radij frequentes rubri coloris conspiciuntur: sic interiora folia orbiculato mucrone prædita, lineis rubris ab infimo ad extremas oras luteas distinguuntur: interior pars minus radiata, quàm exterior: ungues magni & cum staminibus & apicibus lutei.

6. Flos aliquantulum odoratus, cujus folia orbiculata, foris aurea, oris luteis, intus lutea, linea aurei, sive rubri coloris flavo permixti, radiatim & transversim folium medium secante: pediculi lutei, apices cineracei.

7. Folia orbiculata, exterioribus, dorso ad extremum mucronem luteo, oris latè ex aureo rubris:

rubris: unguibus, staminibus & apicibus luteis: nonnihil odor.

8. Flos priori par, sed dilutioris coloris, staminibus & apicibus duntaxat variantibus; nec odore caret.

9. Flos luteus, oris strijs rubris distinctis, & unguibus subviridibus: hic est

Lilionarcissus luteus hilaris, oris rubris striatis, carinâ subviridi, Lob. ico.

Huc referatur ex Eystett.

1. Tulipa lutea maculis minutis aspersis.

2. Tulipa lutea lituris aureis.

3. Tulipa lutea margine roseo.

4. Tulipa lutea maculis rubens.

5. Tulipa lutea prope calicem radio rubro.

6. Tulipa lutea lituris miniatis.

7. Tulipa ex pallido tota virescens.

8. Tulipa ex luteo citrini coloris lineis, dorso viridibus.

9. Tulipa flava ex sulphureo colore pallescentibus lituris prope apices roseis flammiformibus.

10. Tulipa floridè pallens oris coccineis.

IV. Tulipa præcox purpurea varia, Clus. hist.

Hujus differentiæ decem sunt:

1. Folia omnia mucronata, quæ Pæoniæ pleno flore purpureum colorem imitatur, oris ex albo purpurascens, unguibus ex luteo viridiq; coloribus permixtis, subobscuris, circulo exalbido eos ambiente: pediculis flavis veluti fulgine infectis: apicibus nigris: floribus magnis & admodum patulis.

2. Folia mucronata sunt, foris purpurea, internis media parte carnei coloris, oris ex albo pallescentibus, unguibus, staminibus, & apicibus flavis sive luteis.

3. Folia mucronata, foris & intus purpurea, oris extremis albis: ungues lutei, albo orbe circumdati: apices obsolete purpurascens initio, dein ubi obversi sunt, flavo polline aspersi: pediculi flavi.

4. Folia mucronata, saturatiore purpureo colore prædita, ora exalbida, ungues albi, in imo flavi, apices & stamina pallida.

5. Folia mucronata, coloris purpurei dilutioris magisq; floridi: ora exalbida, ungues ex viridi pallentes, pediculi nigricantes, apices pallidi: hic solus odor.

6. Folia mucronata, obscurioris purpuræ, & quasi amethystino colore prædita: magnis oris

albis: unguibus, staminibus & apicibus flavis.

7. Folia orbiculatis oris, magnis & albis, reliqua parte saturatiore, nitenteque purpureo colore prædita: ungues flavos orbis albus ambit: apices cineracei, pediculi flavi.

8. Folia interiora aliquando orbiculata, dilutior purpureo colore splendent: interiore parte tota ferè alba, omnium extremitates magnæ albæ: ungues, stamina & apices flavi coloris sunt: & hic est

Lilionarcissus rubellus nitidus candidis oris, Lobel.

9. Folia externa mucronata & reflexa, exterius obscure purpurascens: interna orbiculata & dilutius purpurascens: utraque in magnas oras albas desinentia, interiore parte veluti purpureum orbem, totum florem per medium ambientem, habentia; & ungues luteos vel flavos, albo orbe inclusos: apices obsolete purpurascens obtinent.

10. Folia omnia mucronata, & externa tria foris purpurea, magnis oris albis prædita, interiore parte alba, & eorum mediam partem orbe purpureo secante: ungues flavos, circulus albus ambit: stamina cum apicibus pallent.

Huc pertinent ex Eystett.

1. Tulipa rosea venis luteis.

2. Tulipa miniata, linea viridi.

3. Tulipa floribus reflexis, interitus miniatis, exterius herbaceis, margine ex cinnabari rubente.

V. Tulipa præcox alba varia, Clus. hist.

Et hujus differentiæ octo notantur.

1. Folia externa albescent, exceptis oris, quæ elegantis & dilutè admodum purpurascens sive carnei coloris sunt: interna magis purpurascunt, ungues lutei, dein exalbidi: stamina cum apicibus flava. Huc refer

Lilionarcissus candore & rubore confusum, Lobel.

2. Folia exteriora dorso sunt exalbido, virgulis purpureis aspersis, reliqua parte purpurascens, aut incarnato: interiora purpurea sunt: ungues stellatim flavi, dein albi: apices lutei: pediculi veluti fulgine aspersi.

3. Folia externa dorso albo sunt, punctis purpureis distincto, interiore parte dilutior purpura nitente: interna, saturatiore sunt purpuræ: ungues flavi, radiati, stellæ instar: apices nigri: pediculi fufci.

4. Folia externa oras magnas carneo colore præditas habent, reliqua parte alba: interiora verò quasi carnei coloris sunt.

5. Folia externa, dorso sunt pallescente, aliàs alba præter oras, quæ foris brevibus & raris purpurascens radijs exornantur: interiora albescunt, oris, lineis purpureis longioribus & frequentioribus foris insignitis.

6. Folia exteriora, dorso & mucrone extremo pallent, aliàs candida, ora interius paucis purpurascens radijs distinguuntur: interiora, à medio ad oras radijs purpurascens, foris aspersa sunt: intus alba, oris rarioribus virgulis distinctis.

7. Folia exteriora alba: interiora oras habent, nunc paucis, nunc multis virgulis purpurascens, sive carnei coloris distincta: unguis flavi: apices ac pediculi omnium palent.

8. Folia omnia, coloribus albo & carneo permixtis prædita sunt: sed qui cineraceum carneo coloris temerè perfusum referant: unguis exalbidi: apices obsoletè purpurascens, pediculi albi sunt.

Verum si Tulipæ præcoci semina germinant, rarè nativum matris colorem retinent, sed in varios colores flores transformant, præsertim Albæ, ex quibus aut omnino albi, aut albo varij: vel lutei & luteo varij: aut rubri atque rubro varij: vel purpurei, ac purpureo varij, quorum videlicet purpurea folia albis oris ornata fuere. Quoad flavas, aut rubras, pleraque proles matris colorem retinet, sæpè etiam in alium commutatur. Huc referatur ex Eystett.

1. Tulipa candida lineis viridibus.
2. Tulipa alba maculis roseis.
3. Tulipa albicans maculis latis rubentibus.
4. Tulipa alba marginibus rubescens.
5. Tulipa argentei & albicantis coloris.
6. Tulipa præcox ex albo in luteum lineis oblongis rubris.
7. Tulipa ex albo rufa marginè rubente.
8. Tulipa explicata flore candido lineis rubris.

VI. Tulipa præcox angustifolia.

Tulipa Persica præcox, Clus. cur. post. qui duplicem facit.

VII. Tulipa angustifolia altera sive folijs Hyacinthi.

Tulipa bicolor, tribus luteis & tribus rubris folijs Caccini, ad. Clus. cur. post.

TULIPA SEROTINA.

I. Tulipa serotina lutea.

Tulipa sive Lilionarciss. luteus latifol. obtusus phœnicis rubentibus oris, Lob.

Tulipa lutea, Clus. pan. serotina flava, Eid. hist. Serotina lutea latifolia, Cam.

Tulipa sive Lilionarcissus luteus latifolius, Lugdun.

Flos coloris dilutioris, & quidem modo flavo, vel pallescentis, vel intensioris & quasi auri modo rutilantis: est cujus foliorum orè sanguineis guttis aspersæ sunt: unguis ceræ recentis coloris, interdum nigricantibus venis distincti, vel macula nigra notati: apices cum pediculis, vel flavi, aut cineracei, vel fuligine infecti, aut omnino nigri. Huc referatur ex Eyst.

Tulipa aurei coloris.

Tulipa lutea, ex rubro viridi coccineo variegata.

Tulipa globosa serotina aureo colore punctata.

II. Tulipa serotina alba: cujus varietas ex Eystett.

1. Tulipa albicans margine coccineo.

2. Tulipa albicans ex flavo purpureo, folijs prope calicem luteis unguibus.

3. Tulipa nivea oris rubeo purpurascens.

4. Tulipa nivea oris ex rubro purpureis.

5. Tulipa serotina stellata.

6. Tulipa diversicoloris alba linea rubente.

III. Tulipa serotina coccinea: cujus varietas ex Eystett.

1. Tulipa coccinea albescens oris.

2. Tulipa globosa serotina cinnabari colore.

IV. Tulipa serotina rubra. Clus. hist.

Floris color plerumque saturatior & quasi nigricans: interdum dilutior & perelegans: unguis aut omnino flavi, aut nigri, qui, Sole illustrati, cæruleum quidpiam permixtum habere videntur: vel macula nigra majore, vel minore, (tenui orbe aureo inclusâ) flavum inficente: apices cum pediculis, vel flavi, vel nigri: sic apices cinerei & pediculi flavi.

Ex his varietas observata, quod interdum ex rubræ semine, flava: contra ex flavæ semine, rubræ natæ sunt, unguibus sæpè variantibus.

Huc referatur

Tuli-

Tulipa, versicolor, parte mediâ viridibus signaturis, alterâ verò rubrâ, Eyst.

V. Tulipa ferotina ramosa major.

Tulipa ferotina πολυανθής major, Clus. hist.

Tulipa ferotina polyanthos, Eyst.

Huc referenda, Tulipa ferotina lutea latifolia diclonos, Cam. & ejusdem cristata papaveris modo five ἀνθοχρύς.

VI. Tulipa ferotina ramosa minor.

Tulipa ferotina πολύλωνος min. Clus. hist.

Utraque & rubro & flavo flore reperitur.

VII. Tulipa ferotina brassicæ floridæ similis, vel Tulipa viridis prima.

Tulipa viridis, Eyst.

Variat simpliciter & duplici foliorum serie: & hæc Tulipa ferotina viridis, duplici foliorum in flore serie, Clus. hist.

VIII. Tulipa viridis altera.

Tulipa ferotina viridis, oris pallidis & albis, Clus. hist.

IX. Tulipa ferotina flore pleno.

1. Tulipa ferotina flore pleno miniato, Eystett.

2. Tulipa ferotina tota lutea fl. pleno, Eyst.

TULIPA DUBIA.

Tulipa dubia major.

Lilionarcissus luteus phœniceo confusè mixtus, Lob.

Tulipa media major prima, Clus. pan.

Tulipa dubia prima major, Clus. hist.

Differentiæ, hujus sunt novem.

1. Folijs est mucronatis, calice admodum pallido, vel flavo: unguibus ceræ recentis instar flavis.

2. Folia habet flava orbiculata ad aurei mali præmaturi colorem accedentia: stamina cum apicibus flava, & flos odoratus est.

3. Flos omnino aureus, cujus externa folia, dorso flavo prædita, oris dilutioris cinnabaris colore radiatim distincta: interna, cinnabaris coloris, binis nervis luteis, & radiolis flavis in latera excurrentibus: unguibus magni, flavi: apices nigri: pediculi flavi, fuligine infecti.

4. Folia orbiculata flava, venis rubris secundum longitudinem excurrentibus, interdum totum dimidium folium inficientibus.

5. Flos dilutius rubet, cinnabaris colore, folijs mucronatis: vel saturatioris & quodammodo nigricantis coloris, exterioribus mucrona-

tis, interioribus orbiculatis: unguibus flavis veluti fuligine aspersis; vel in omnibus folijs, vel in exterioribus apicibus modo flavis & leviter nigricantibus, modo omnino nigris: pediculis flavis media ex parte nigricantibus.

6. Flos coloris albi exoleti, folijs ex albo palléscentibus, dorso flavescente: folijs interioribus orbiculatis, unguibus apicibusque pallentibus.

7. Folia orbiculata dilutissimi purpurei coloris & quodammodo carnei, unguibus maximi albi, quorum principia cum staminibus & apicibus flavent.

8. Flores saturatius purpurascunt, prædulcium rufescentium vuarum instar, folia interiora orbiculata: unguibus cum apicibus flavescent.

9. Flores saturæ admodum purpuræ, & ceraforum acidorum nigrorum succum referunt (Bieyelsarb & nos vocamus) unguibus subcæruleis, vel ex cæruleo nigricantibus, staminibus fuscis.

II. Tulipa dubia major altera.

Lilionarcissus phœniceus peramœnus oris luteis, Lob.

Tulipa media major secunda, Clus. pan.

Tulipa dubia prima, major altera, Clus. hist.

Huc refer

Lilionarcissus luteis oris flore patulo, Lob. qui in Lugdunensi historia, Tulipæ sive Lilionarcisso luteo latifolio jungitur.

III. Tulipa dubia media sulphurei coloris, Lilionarcissus striatus candidis suaverubentibus oris, Lob. ico.

Tulipa dubia secunda, media prima, Clus. hist.

Variat quoque:

1. Flos pallidi coloris coctum sulphur refert, folia mucronata, unguibus fuligine infecti.

2. Flos eleganter flavus, folia mucronata, unguibus & apices nigri, pediculi fuligine infecti: hujus flos ex sedecim, mox tredecim, octo & sex folijs compositus.

3. Flos ex flavo & rubro coloribus permixtus, folijs sex magnis mucronatis & flavis constans, quæ ab ungue nigro rubras venas per folia radiatim excurrentes & in latera sparsas habet. Huc referantur ex Eyst.

1. Tulipa lutea lituris miniatis.

2. Tulipa sulphurei coloris, oris rubris.

IV. Tulipa dubia media altera.

Lilionarcissus totus luteus sanguineo puniceo

par & similis, odoratus Croci aut Narcissi æmulatione, & inodorus præcox & serotinus, Lob. ico.

Lilionarcissus Chalcedonicus totus luteus sanguineo puniceo par & similis, Lob. obs. Tulipa dubia tertia, & media secunda versicolor, Clus. hist.

Et hujus differentiarum novem:

1. Flos coloris flavi dilutioris, vel pallescentis, cujus folia externa foris virescunt: alterius folia orbiculata, unguis subvirescentes: Item folia flava, interiora orbiculata & guttis sanguineis aspersa: vel folia flava, unguis cerei coloris: vel in unguibus macula nigra splendens: vel ex fusco & viridi coloribus commixtis.

2. Flore est flavo vario, initio flavo, tertio die tenui limbo rubeo exornato: cujus folia in una flava, oris cinnabaris colore infectis: in altera pallidiora, oris rubris venis ornatis, vel mali aurei præmaturi colore perfusis. Invenitur versicolor, flavo & rubro colore commixtis, instar sericei panni flavi, cujus subtegmen rubrum & unguis nigri sunt, & hæc dicitur Tulipa dubia 3. media 2. versicolor, Clus. hist.

3. Flos albus in flavum degenerans, folia vel omnia mucronata: vel interiora orbiculata; unguis, stamina & apices pallent.

4. Flos Ochreæ colore, cujus foliorum mucro rubro colore tingitur: pallidus, oris rubris vel purpureis, vel carnei coloris venis distinctis.

5. Flos albus, initio virescente colore perfusus, staminum apicibus fuscis.

6. Flos albus, varius, dilutior, folijs interioribus orbiculatis, unguibus exalbidis, maculâ purpurascens notatis, staminibus exalbidis, apicibus nigricantibus: vel unguibus & staminibus candicantibus: vel unguibus exalbidis, orbe subcæruleo inclusis, staminibus albis, apicibus nigricantibus, vel folijs extrinsecus saturatoribus, oris candicantibus, unguibus exalbidis cum subcærulea maculâ, staminibus albis, apicibus nigricantibus, folijs exterioribus mucronatis: vel folia mucronata, dilutioris aut saturatoris coloris: vel venæ purpureæ per totum folium dispersæ.

7. Flos purpureus, vel dilutioris & magis floridi coloris, folia interiora orbiculata, unguis exalbidis, stamina purpurascens, apices nigricantes, vel purpureæ dilutioris, oris candicantibus; unguibus vel flavis, aut veluti

fuligine infectis, vel ex albo flavescentibus, aut ex cæruleo, flavo, & subvirescente mixtis, modo saturatoris, venis albicantibus permixtis, unguibus ex flavo nigricantibus, aut flavis, aut ex viridi nigricantibus, aut subcæruleis, vel ex cæruleo flavescentibus, aut cæruleis, orbe flavescente ambiente: sunt & dilutæ purpurei & remissi miniat, aurei mali coloris, & vel dilutiores internæ & per oras, vel saturatioris: interdum internæ dilutissimi, foris saturatioris: unguis vel flavi, vel fuliginoso orbe cincti, vel ex viridi nigricantes, vel fæsci sunt. Est humilior folijs interioribus orbiculatis, unguibus vel albis, vel candicantibus, supernè cæruleis, staminibus albidis, apicibus subfuscis, vel unguibus cæruleis, aut ex cæruleo virescentibus, vel nigricantibus. Huc pertinet Lilionarcissus coccineus rubentibus medijs folijs candicans, & ad basin notulis rubris cordis effigie aspersis, Lob. & Lilionarcissus coccineus, candidis oris, Lob. ico.

8. Flores purpureovarj, folijs vel dilutè purpurascens, vel saturatoribus, oris mucronatis, vel orbiculatis exalbidis: unguis sunt aut albi, aut subcærulei, aut albi, orbe lato carnei coloris cincti, stamina plerumque nigricantia.

9. Flos ruber, foris purpurascens, intus carnei coloris: unguis, stamina, apices, flavi: vel folijs exterioribus, flavo colore aspersis: & colore obscuro ad lateritium accedente, unguis flavi, vel nigri: vel rubræ serotinæ similes, unguibus flavo orbe cinctis; Oculis folijs cognominatur: hic est Lilionarcissus coccineus puniceus rutilans, Lob.

10. Floris folia mucronata, initio viridia, dein oris pallescentibus, quæ in rubrum colorem mutantur, radiatim alteri colori se miscens, colore viridi, qui senescente flore languescit, præsertim intrinsecus.

Verum ex semine interdum serotinæ nascuntur: sic ex purpurea præcoci, purpurea serotina dilutior, intrinsecus aurei mali colore, unguibus flavis, in exterioribus nigricantibus, natus Item *ἡχρόθενος*. E purpurea varia præcoci, purpurea serotina ad rubrum tendente, vel dilutioris elegantem: vel ad carneum colorem accedente: unguibus ex cæruleo nigricantibus.

E purp

E purpurea præcoci *ῥοδῶν* ferotina, rubra ferotina, unguibus & staminibus flavis; purpurea ferotina, unguibus nigricantibus: & purpurea varia ferotina. Sic ex ferotinis, aliquando præcoces, ut ex alba varia ferotina, natae sunt præcoces, alba, flava, rubra, unguibus, flavis, rubra Oculus solis, & purpureo dilutior.

Nec omnes versicolores, tam præcoces, quam ferotinae, singulis annis eandem coloris gratiam retinent: sed alternis sæpius variant: ut Flava varia & Alba varia, uno interdum anno nitidissimæ sunt, sequenti vix alius color quam flavus, vel albus conspicitur: sic Rubra varia & Purpurea varia, nonnunquam magnas oras flavas & albas habent, sequente valde exiguas. In summa, tanta in Tulipis colorum varietas, ita ut singulis annis adhuc nascantur, quibus pares nunquam antè conspiciat: ita Deus in ipsis floribus admirabilem suam potestatem ostendit, ut ex prædictis, ex Clusio, Lobelio, Camerario, propriaque observatione adductis, colligere est: ita ut ducentarum specierum numerum superare deprehensum sit. Sic in Florilegio Syvertij, Tulipæ imprimis variegatae differentia triginta duæ proponuntur: quemadmodum & in Florilegio de Bry, & etiam Palsini, aliquot species exhibentur: & in horto Eystett. supra quinquaginta depinguntur.

V. Tulipa bulbos in foliorum alis ferens.
Tulipa bulbifera, Cusius pan. & hist. Taber. Ger.

Tulipa prolifera, Cam.

TULIPA PUMILIO.

I. Tulipa pumilio latifolia alba.

Tulipa pumilio alba unguibus luteis, Eystett.

II. Tulipa pumilio latifolia sulphurea.

Tulipa pumilio fulvo sulphurei coloris, Eystett.

III. Tulipa pumilio latifolia rubra.

Tulipa pumilio, Lob. ico.

Tulipa dubia humilior, Clus. pan.

Tulipa dubia pumilio, Clus. hist.

Tulipam nanam sive pumilionem flore luteo, Camer. habuit.

IV. Tulipa pumilio angustifolia.

Tulipa pumilio altera, Clus. hist.

Tulipa pumilio angustifolia alba, Lobel. ad. part. alt.

V. Tulipa pumilio gramineo folio.

Tulipa pumilio alba altera Lusitanica, Lobel. ad. part. alt.

TULIPA MINOR.

I. Tulipa minor lutea Italica.

an Narcissus octavus, Matth. comp. quem sub Narcisso Constantinopolitano primo Matthioli, ex ejus hist. latina, Lugd. proposuit.

Lilionarcissus Bononiensis luteus, sive Tulipa, Lob. Lugd.

Lilionarcissus Bononiensis, Eyst. & *λαριονγκ-νιος πολύνκλονος*, Cam. in Matthiolum.

Lonchitis, Cæf.

Tulipa Apenninea, Clus. hist. Italica prima, Taber.

Tulipa Bononiensis, Ger. quæ plerumque polyclonos, Cam.

Senis, nonnunquam octonis folijs, flos constat.

II. Tulipa minor foliolatiore.

Tulipæ Byzantinae genus alterum, Clusius hist.

III. Tulipa minor rubra.

Tulipa rubra Apenninea similis, Clus. hist.

Tulipa rubra angustifolia facie Bononiensis, Lob. ad. part. 2.

IV. Tulipa bombycina Cretica.

Tulipa bombycina flore rubro, Rober. Syvert. & Bry.

an Tulipa Cretica Caccini, Clus. cur. post.

Tulipam Bononiensem facie & formâ refert, sed bulbis lanugine obsitus, & veluti tomentosus est.

V. Tulipa minor lutea Gallica.

Tulipa minor Narbonensis, Dodonæ. minor, Lugdun.

Narcissolilium luteum, Ad.

Lilionarcissus Narbonensis luteus montanus, Lobel.

Tulipa Narbonensis, Clus. pan. & hist. Cam. & Ger. tit. trans.

Tulipa Italica secunda, Tab.

Clusius in cur. post. meminit Creticæ Caccini, Mompeliana, & ejus quæ in montanis Placentiæ (at hæc quænam est?) nascitur.

VI. Tu-

VI. Tulipa minor ex luteo purpurascens.
Tulipa Hispanica, Clus. pan. & hist.

VII. Tulipa variegata Persica.
Tulipa Persica, Rob. Svvert. Bry. & Eyfset.

Tulipa Persica minor altera, Clus. cur. post.
Folia tria interiora alba, tria exteriora rubra,
per oras albicantia, ungue nigrâ maculâ nota-
to, staminibus violaceis.

FRITILLARIA.

Fritillaria, ab abaco in quo Scacorum lusus exercetur, quem Fritillum dici existimant, nomen habet: alijs Meleagris à Meleagrideis, avis plumis, quas, si non coloris specie, tamen varietate, & dispositione, & macularum magnitudine, refert.

I. Fritillaria præcox purpurea variegata.
Meleagris, Dod. Meleagris flos, Lugd.
Fritillaria, five Lilionarcissus purpureus varie-
gatus, Lob. & ad. part. 2.
Fritillaria dilutior, Clus. pan. & hist. cui &
Lilium variegatum vulgo.

Fritill. & Narciss. Caparoni⁹ ab inventore, Cam.
Fritillaria, Eyfset.

Fritillaria vulgaris purpureo colore, Svvert.
Flos sæpissimè unicus, interdum bini, raro
terni: sex folijs ut plurimum constans, rarius
octonis & duodenis: areolis nunc quadratis,
nunc longiusculis, colore partim candidi, par-
tim purpurei, five saturatoris carnei: est alia
præcocior, alia serotina, & harum quadræ, ut
plurimum saturatius, interdum dilutius pur-
purascunt. Huc pertinet

Meleagris flore max. Ital. flore gemello, Eyfset.

II. Fritillaria ramosa.

Fritillaria maxima purpurei coloris, Svvert.

III. Fritillaria polyanthos flavoviridis.

Fritillaria polyanthos lutea, Eyfset.

Fritillaria triceps colore flavo viridi, du Bry.

IV. Fritillaria umbellifera.

Fritillaria Hispa. umbellifera, Rob. Svvert. & Bry.

V. Fritillaria flore magno pleno.

Fritillaria flore pleno, Cam. Eyfset.

VI. Fritillaria alba variegata.

Fritillaria alba ex phaio purpureo tessulata,
Lob. ad. part. 2.

VII. Fritillaria alba præcox.

Fritillaria alba altera, Lob. ad. part. 2.

Fritillaria alba, Clus. hist. app. alt. & in app. 2.
auct. unius flos totus albus: alterius foris albus,
internè venis quibusdam purpurascens distin-
ctus, & in cur. post.

Fritillaria albo flore, Svvert. alba, Eyfset.

VIII. Fritillaria serotina atropurpurea.

Fritillaria saturatior, Clus. pan.

Meleagris altera, Dod.

Lilionarcissus variegatus atropurpureus Xan-
tonicus, Lob.

Fritillaria Xantonica serotina, Lob. ad. par. 2.

IX. Fritillaria serotina floribus ex flavo vi-
rentibus.

Fritillaria 2. Clus. pan.

Fritillaria Aquitanica, Clus. hist.

Fritillaria Clusij, & Brisotti serotina, Lob. ad.
part. 2.

Fritillaria minor obsoleto colore inodora, Eyfset.

Fritillaria Aquitanica flore luteo obscuro, Svvert.

X. Fritillaria flava rubris maculis distincta:

Fritillariæ tert. genus, flavo colore, Clus. hist.

Fritillaria lutea Someri, Lob. ad. par. 2. Svvert.

XI. Fritill. angustif. lutea variegat. magno fl.

Fritillaria, juncifolia, Eyfset.

XII. Fritillaria angustifolia lutea variega-
ta parvo flore.

Fritillaria Lusitanica, Clus. cur. post.

XIII. Fritillaria flore minore.

Fritillaria Pyrenæa, Clus. hist. ap.

Fritillaria nigra Pyrenæa, Lob. ad. part. 2.

Fritillaria Pyrenæa obsoleto luteo colore, Eyfset.

Flos exterius obsoleto color. venis flavescen-
tibus distinctus: interiore, ex viridi flavescens,
maculis saturatè purpurascens, tessulatis
dispositis notatus: odore gravi.

Variat: 1. internè ex luteo virefcit, oris re-
flexis lineis viridibus striatis, à medio ad cen-
tram subfusca purpura tessulatus. 2. Flos hila-
rior purpurascens, tessulis similibus præditus.
3. ex luteo magis viridi parum subfuscus, intru-
sus minus tessulatus: 4. ex fusco & luteo subliv-
idus, intrus minus tessulatus.

XIV. Fritillaria minima pluribus floribus
Fritillaria minima, Svvert.

SECTIO

SECTIO TERTIA.

CROCUS: COLCHICUM: OR-
NITHOGALON.

CROCUS ET EJUS SPECIES.

Crocum puerum, cum Smilacem virginem adamaret, in hunc sui nominis florem ver-
sum esse, Virgil. & Plin. l. 16. c. 35. testantur. Κρόκον verò, filum villumq; significat, cu-
jusmodi sunt croci stamina, seu villi, qui κροκίδες appellantur, qui plerumq; terni, nonnun-
quam etiam plures in floris medio conspiciuntur; & cum soli in usum veniant, per excellen-
tiam Croci nomine donantur.

Genera duo fecit Theoph. sativum, de quo 3. hist. 6: 6. ejusdem 6: 7. ejusd. 9. & 10. Mon-
tanum, de quo 6. hist. 7. At Dioscorides l. 1. c. 25. sativi meminit, qui pro ratione Regionum, in
quibus plantatur, variat. Sic sylvestrem dicimus, alium majorem, alium minorem. Alium
vernum, alium autumnalem: qui rursus colore & floris & foliorum variant.

I. Crocus sativus.

Crocus, Brunf. Frag. Fuch. Tur Dod. Cord. Lac.

Gel. Lon. Lob. Tab. Sativus, Ang. Lugd.

Crocus sativus autumnalis, Eyst.

Crocus, Matth. Cast. Cæf. hortense, Cam.

Hic aliquando bis per annum florere solet.

alias nihil à vulgari differens: & hic dicitur

Crocus biflorus, Eyst.

Habetur Crocus verus purpureo colore, apud

Svvert.

CROCUS SEROTINUS.

I. Crocus alpinus autumnalis.

Crocus montanum, Clus. hisp. (1. in hist.)

Lugdun.

Crocus montanus autumnalis, Lob.

Crocus sylv. autumnalis, Dod. Cam.

Crocus alterum genus sylv. Cæf.

Crocus montanus vernus, Eystett.

Flores modò candicantes, modò purpura-
scentes, instar sativi, sed dilutiores & mi-
niores.

II. Crocus autumnalis florem sine folijs pro-
mens odorus.

Crocus montanus 2. Clus. hist.

Crocus sylv. autumnalis, Lob. ad. par. 2.

III. Crocus autumnalis subcæruleus mul-
tiflorus.

Crocus montanum 3. Clus. hist.

Hæc affinis

Crocus sylv. Byzant. serotinus, Lob. ad. par. 2.

IV. Crocus autumnalis flore minore.

Crocus Pyrenæum autumnale, Clus. hist. ap. 2.

V. Crocus autumnalis flore majore vari-
egato.

Crocus montanus autumnalis, Portæ.

CROCUS VERNUS

latifolius.

I. Crocus vernus latifolius purpureus va-
riegatus.

Crocus vernus latifol. purpur. versicolore flore
vel 5. Clus. hist.

Variat flore, qui communiter sex, quandoq;
octo folijs donatur.

II. Crocus vernus latifolius flore purpureo
magno.

Crocus vern. latifol. purp. fl. majore, Clus. hist.

III. Crocus vernus latif. albus variegatus.

Crocus montanus sive alpinus, Gef. hor.

Crocus sylv. mont. fl. albo, Ad. Lob.

Crocus sylv. vernalis alter, Dod.

Crocus vernus major alter, Clus. hisp.

Crocus vernus latifol. albo flore, Eid. hist.

Variat, folijs externis venis purpurascen-
tibus aspersis: aliquando foliorum mucrones

I

pur-

purpurascunt: aliquando linea purpurea, vel nigra, per folium fertur, & hic est

Crocus flore albo lineis nigris, Svvert.

IV. Crocus vernus albus versicolor alter.

Crocus vernalis major 1. Clus. hisp. def.

Crocus vernus latifolius albus versicolore flore. 1. Eid. hist. def.

V. Crocus vernus latifolius purpureo violaceus.

Variat: 1. flore purpureo violaceo: 2. flore albo, purpureo violaceo basi: 3. aliquando flos superne purpureus inferius flavescit: 4. est & flore violaceo, vel caeruleo distincto: 5. vel caeruleo lineis violaceis variegato.

1. Crocus vernus purpureo violaceus, Lob.

Crocus sylv. vernalis prior, Dod.

Crocus vernalis major, Clus. hisp. & Lugd.

Crocus vernus latifolius purpur. flore minore, Clus. hist.

2. Crocus sylv. vernus 3. flore albo purpureo violaceo basi, Lob.

Crocus vernus albus fundo violaceo, Eystett.

At Dodon. Clus. & Lugdun. utrumque una tabella expriment.

3. Crocus sylv. primus Dalech. Lugd.

4. Crocus vernus fl. violaceo, Eystett.

Crocus violaceus & caeruleus distinctus, Svvert.

5. Crocus caeruleus lineis violaceis distinctus, Eid.

VI. Crocus vernus flore pleno.

Crocus vern. latifol. duplici flore, Clus. hist.

VII. Crocus vernus latifolius, multiflorus.

Crocus vernus polyanthos, isque duplex, Eystett. alter purpureo violaceus, lineis candidis: alter floribus candidis, lineis purpureo caeruleis.

Crocus vernus multiflorus alb. facie lutei majoris, Svvert.

VIII. Crocus vernus minor albicans.

Crocus montani species, Gef. hort.

Crocus sylv. minor prior, vel sylv. 4. Dod.

Crocus vernus ferotinus primus, Lob. ico.

Crocus vernus latifolius albus versicolore flore 2. Clus. hist. ico.

IX. Crocus vernus minor purpurascens.

Crocus montanus flore ex candido & puniceo mixtis, Gef. hort.

Crocus sylv. 5. vel minor sylv. alter, Dod.

Crocus vernus albus 2. Lob. ico.

Crocus vernus latifolius albus versicolore flore 1. Clus. hist. ico.

Crocus vernus flore vario, Cam.

Crocus ferotinus, Lugd. quem præced. junxit.

Crocus purpureo rubeus, Svvert.

X. Crocus vernus latifolius albus, vel cinericeus.

Crocus cinericeus, duplex, Svvert.

XI. Crocus columbinus duplex, Svvert. (quid?)

CROCUS VERNUS LATIFOLIUS luteus, aureus.

I. Crocus vernus latifolius flavus.

Crocus vernus latif. flavo flore, vel Croci sexti species prima, Clus. hist.

Crocus vernus luteus 1. Lob. ad. part. 2.

Crocus flore luteo, Svvert.

Crocus vernus polyanthos flore luteo, Eyst.

Variat: 1. flore flavo sive fulvo nitido latiore, & majore. 2. minore & pallidior. 3. flore luteo corona phoenicea, Lob. ad. part. 2.

II. Crocus vernus latifolius aureus.

Crocus vernus Mæfiacus, Clus. pan.

Crocus vernus latifol. fl. aureo, vel Croci sexti alia species, Clus. hist.

Crocus aureus, Lob. ad. part. 2.

III. Crocus vernus latifolius pallidus.

Crocus vernus Mæfiacus 2. Clus. pan.

Crocus vernus latifolius pallido flore, Eidem hist.

Crocus luteus flore pallido, Lob. ad. part. 2.

IV. Crocus vernus latifolius flavo varius.

Crocus vernus latifolius flavo vario flore 1. vel

Crocus vernus 7. Clus. hist.

Crocus vernus latifolius flavo vario flore Constantianopolitanus, seu Crocus luteus alter, Lob. ad. part. 2.

Crocus luteus lineis nigris, Svvert.

V. Crocus vernus latifolius flavo varius alter.

Crocus verni latifol. flavo vario flore, vel Croci verni septimi alia species, Clus. hist.

Crocus sylv. vernus versicolor aureo rutileo panicoconcolor, Lob. ad. part. 2.

A priore potissimum differt radijs, foliorum exteriorum dorsum totum inficientibus.

VI. Crocus vernus latifolius flavo vario flore duplici, Clus. hist.

Crocus vernus latifolius secundus Constantianopolitanus, Lob. ad. part. 2.

CRO-

CRO

I. Cro

Crocus sy

Crocus ve

(quem cu

Crocus ve

Crocus sy

Nozilicha

Crocus ve

Variat:

dicant, re

vergunt:

II. Co

bulbo.

Crocus sy

Crocus ve

Crocus ve

Crocus sy

Crocus ve

Crocus sy

Crocus ve

Flos ex

C

K OLY

quod

inter vene

I. Colo

Primula V

Colchicum

Lac. Gefne

merum, i

Colchicum

Colchicum

ram crocif

Lob.

Ephemem

Hermodac

Colchicum

Colchicum

Germanic

Colchicum

Hermodac

rapioni.

CROCUS VERNUS ANGU-
stifolius.

I. Crocus vernus angustifol. magno flore.
Crocus syl. angustifolius, Ang.
Crocus vernus minor primus, Clus. hisp. Lugd.
(quem cum 3. jungit) Tab.
Crocus vernus angustifol. 1. Clus. hist.
Crocus syl. min. Hispanicus flore patulo, vulgo
Nozilicha minor, Lob.
Crocus vernus, Ger.

Variat: flores infernè flavescent, intus can-
dicant, reliqua ad cæruleum sive violaceum
vergunt: inveniuntur & toti candidi.

II. Crocus vernus angustifolius gemino
bulbo.

Crocus sylvestris, Lob.
Crocus vernus minor alter, Clus. hisp. Tab.
Crocus vernus angustifolius 2. Clus. hisp. desc.
Crocus syl. vernalis minor alter, Dod.
Crocus verni minoris alterum genus, Lugd.
Crocus syl. 1. Dalech. Lugd.
Crocus vernus flore violaceo, Eystett.

Flos ex folijs sex, aliquando octo constat.

III. Crocus vernus angustifolius parvo
flore.

Crocus syl. vernalis 6. Dod.
Crocus vernus minor 3. Clus. hisp. Lugd. Tab.
Crocus vernus angustifolius 3. desc. at ico. 2.
Clus. hist.
Crocus sylvestris Hispanicus, vulgò Nozili-
cha major, Lob.
Crocus vernus minor, Ger.

IV. Crocus vernus juncifolius purpureus.
Crocus vernus angustifolius quartus, sive vio-
laceo flore, Clus. hist.

Hujus iconem figuræ primæ Lobelius in ico-
nibus junxit.

V. Crocus vernus capillari folio, Clus. hist.
ap. 1. & ap. 2. fixe & cur. post.

Duplex est, unus purpurascens flore, ipfius
folijs tribus venis saturatoribus distinctis:
alter albo flore, qui etiam duplex, flore ma-
jore, & minore.

VI. Crocus vernus angustifol. variegatus.
Crocus vernus aureus variegatus, Eyst.

Flos interius aureus, exterius strijs ex pur-
pura nigricantibus radiatus.

COLCHICUM ET EJUS SPECIES.

Kολχικόν, quod plurimum in Colchide nascatur, Dioscoridi lib. 4. cap. 84. cui ἐὶσθημενον,
quod eadem die, quâ sumptum, interficiat. Colchici appellatio apud Plin. lib. 22. cap. 9.
inter venena reperitur.

Colchicum autumnale.

I. Colchicum commune.
Primula Veris, Brunf.
Colchicum, Trag. Tur. Fuch. Dod. Matth.
Lac. Gesner. hor. Lon. Cast. descrip. at Ephe-
merum, ico.
Colchicum nigrum & subrubens, Cord. hist.
Colchicum sive strangulatorium & Ephe-
merum crocifolium, & bulbi folium, Ad. Costæo.
Lob.
Ephememerum venenosum, Amato.
Hermodactylus vulgo & Crocus syl. Cæs.
Colchicum Ephememerum, Lugd.
Colchicum masculinum & femininum, Tab.
Germanicum, Ger. & album, Ejd.
Colchicum commune pallido colore, Syvert.
Hermodactylus niger & rufus, Mesueo & Se-
rapioni.

Variat: nam in montibus folio est latiore,
in pratis angustiore: flore communiter dilutè
vel saturatè purpurascens, aliquando albo:
bulbo nigricante, aut rubente foris & interius.

Quare
Colchicum vulgare purpurascens flore, &
Colchicum vulgare album, Eyst. &
Colchicum autumnale flore albo & flore ru-
bello, Eidem:

Addit Syvertius
Colchicum, cui hoc solum peculiare, quod au-
tumno folia proferat.

II. Colchicum radice siccata alba.
Colchicum album, Cord. hist.
Hermodactylus legitimus, Dod.
Hermodactyli non venenati officin, Lobel.
ico.
Hermodactylus officin. Lon. Tab. Orientalis,
Cæsalp.

Hermodystylus albus, Serapioni.

III. Colchicum Anglicum candidum angustifolij.

Colchicum candido flore Anglicum, Ad. & Lob.

Colchicum Anglicum Lobelij, Lugd. album, Clus. hist. Tab. & Ger.

Huc referri potest quod flore dilutioris coloris & lactei candoris:

Colchicum Lusitanicum serotinum, Lob. ob.

Colchicum pratense Salmanticum, Clus. hist.

IV. Colchicum montanum angustifolium.

Colchicum mont. Clus. hisp. Lugd.

Colchicum montanum Hispanicum & *αειφύλλον*, Clus. hist.

Colchicum minus, Lob. Tab. & montanum, Eid. & Ger.

Colchicum Hispan. parvum, Cam.

Colchicum mont. minim. angustifol. autumn. Eyfett.

V. Colchicum pumilum croci folijs.

Colchicum minim. tenuif. Gallæcium, Lob. ad. par. 2.

VI. Colchicum Illyricum, Ang. Lob. Lugd. Tab. Ger. Clus. hist. (quod sibi nunquam conspectum scribit) quid?

VII. Colchicum vere & autumn. florens.

Colchicum biflorum, Clus. hist. Lob. ad. par. 2. & Eyfett.

Colchicum variegatum.

I. Colchicum florum folijs albis & rubris alternatim dispositis.

Colchicum album & rubrum, Eyf.

II. Colchicum multiflorum.

Colchicum exoricum folijs ternis purp. ac alijs ternis albicantibus, varians: Eyf.

III. Colchicum alb. strijs variegatum.

Colchicum mixtum autumnale, Eyf.

Flos albus, strijs saturatè rubris seu sanguineis maculis inæqualibus infectus.

IV. Colchicum polyflorum variegatum.

Colchicum versicolor polyanthes reflorescens, Eyfett.

Flos in albo pallidus, strijs & maculis dilutè purpurascens variegatus, è cuius medio alius flos prolis modo exurgit.

V. Colchicum latifol. variegatum.

Colchicum 4. sive latifolium, Clus. hist.

Colchicum Lusitanicum fortè, Eidem.

Colchicum Byzantinum polyanthos Fritillariæ facie autumnale, Eyf.

VI. Colchicum purpureo lacteum variegatum.

Colchicum versicolore flore sive 3. & *ποικιλῶδες*, Clus. hist.

Huc refer

Colchicum album strijs purpurocæruleis variegatum, Eyf.

Colchicum album distinct. lineis rubris, Syvert.

VII. Colchicum ex albo & purpurascens varium.

Colchicum *ποικιλῶδες*, alterum, Clus. hist. ap. 1.

VIII. Colchicum flore Fritillariæ instat tessellatis.

Colchicum Neapolitanum, Clus. hist. & ap. 1.

Colchicum Fritillariæ facie pallidum, Syvert.

IX. Colchicum florum folijs angustis & variegatis.

Colchicum montanum minus versicolore flore, Clus. hist.

Floris folia longa & angusta, interius alba, exterius media parte viridia, altera carnei coloris.

X. Colchicum pleno flore variegatum.

Colchicum fl. pleno maculatum autumn. Eyf.

XI. Colchicum latifol. multiflorum variegat.

Colchicum polyanthos candid. eleganti rubore varium, Lob. ad. par. 2.

Folia latiora, cubitalis longitudinis.

Colchicum polyanthes, sive multiflor. simplex & plenum.

I. Colchicum candidum multiflorum.

Colchicum Pannonicum *ποικιλῶδες* albo flore, Clus. hist. Cam.

Colchicum candid. Pannon. polyanth. Lob. ico.

Colchicum polyanth. Tab. vulgare poly. Eyf.

Colchicum Pannon. Ger. albo flore, Syvert.

Septenis, denis, duodenis, vel pluribus floribus lactei candoris: floribus etiam eleganter rubentibus reperitur: & hoc dicitur

Colchicum polyanthos, Lob. ad. par. 2.

II. Colchicum polyanthes lato Elleboii albi folio.

Colchicum Byzantinum *πλεῖστον ποικιλῶδες*, Clus. hist.

III. Colchicum polyanthos multiplex.

Colchicum polyanthos flore multiplici autumnale, Eyf.

IV. Col-

IV. Colchicum pleno flore.

Colchicum πολυφύλλανθον, sive pleno flore, Clus. hist. & ap. 1.

Colchicum pleno flore, Lob. ad. par. 2.

Colchicum autumnale, Eystett.

Quod bulbus major & verustior, ed plures majores & majore foliorum numero, flores constant. Sunt etiam flore albo vel purpureo, quod

Colchicum vernum fl. pleno purpureo, Eyst.

Colchicum album rubr. pleno flore, Svvert.

V. Colchicum polyanthes folijs latis convolutis.

Colchicum vernum flore purpureo plenum, Eystett.

Colchicum vernum.

I. Colchicum vernum Helveticum.

Colchicum subobscuro flore & minore, Gef. Camer. Colchicum vere prodiens, Eidem Matth.

an Colchicum brumale, Lob. Belg.

II. Colchicum vernum Hispanicum.

Colchicum vernum, Clus. hist. ap. 2.

Colchicum vernum fl. purpureo, Svvert.

Flore est antequam se expandat albo, postea coloris purpurei dilutioris vel saturatoris.

III. Colchicum Alexandrinum, quid?

Colchicum Orientale, Matth. alterum Orient. Matthioli, Lugd.

Colchicum Syriacum Alexandrinum, Lob.

Ad. Tab. Ger.

Tulipæ genus, quale Appenninæ videtur, Clus. hist.

Item scribit, se semen Colchico semine simile nomine Hermodactyli Syriaci accepisse.

COLCHICUM LUTEUM.

I. Colchicum luteum majus.

Lirium alterum, Theophrasti.

Helichryso Cratææ similis, Ang.

Narcissus in Apenino, Marcell. autumnalis quorundam, Clus. hisp. Lugd.

Narciss. autumnalis major, Dod. Clus. hist. Ger.

Narcissus autumnalis flore luteo, Eyst.

Narcissus autumnalis, Cæsalp. & Lob. ad. par. 2.

(cui & Colchico - Narcissus) autumnalis luteus, Cam.

Colchicum luteum, Lob. Tab. luteo flore, Svve.

Variat in hortis Belgij angustioribus folijs & cauliculo dodrantali surrecto, Lob. obs. & Dod. ac Clus. hist. aliquando largiore foliorum numero à præcedente discrepat, & est

Narcissus autumnalis flore luteo multiplex, Eystett.

II. Colchicum melino flore.

Narcissus Perficus, Clus. pan. & hist. Camer.

Tab. Ger.

III. Colchico luteo similis flore albo.

Sparganium Placæ, Clus. hisp. & hist.

IV. Colchicum luteum minus.

Colchicum parvum mont. lut. Lob. ico. Ger.

Narcissus autumnalis minor, Clus. hist.

Colchicum mont. luteum minus, Tab.

V. Colchicum luteum vernum.

Narcissus vernus præcocior flavo flore, Clus. hist. ap. 2.

Narcissus luteus vernus facie Narcissi autumnalis lutei, Lob. ad. par. 2.

Narcissus vernus flore luteo, Svvert.

an Colchicum vernum flavo flore Plateau, Clus. hist.

ORNITHOGALUM ET EJUS SPECIES.

Ορνιθόγαλον, propter lacteum colorem, qui in flore nitet, similem ei, qui in alis aut ovibus gallinarum observatur, nomen accepisse videtur. Dioscorides lib. 2. cap. 174. unius, ut & Plin. lib. 21. cap. 17. Ornithogale nominans, meminere. Sunt qui Bulbinam Theoph. 7. hist. 13. & Athenæi censent.

ORNITHOGALUM UMBELLATUM album.

I. Ornithogalum umbellatum maximum.

an Narcissus quartus, Matth. Lugd. Tab.

Ornithogalum majus, Dod. Arabicum, Clus.

pan. & hist. Eyst. Italicum, Cam.

Lilionarcissus polyanthos, Lob. ob.

Lilium Alexand. Neoteriæ, Lob. ico. Cam.

Hyacinthus de Padro nostro Itatorum, Clus.

hist. ap. 2. negans esse Narcissum 4. Matthioli, quod prius asseruerat.

Dulipan apud nos barbaro nomine, Cæsalp.

I 3

Orni-

Ornithogalum Arabicum multiflorum album, umbilico interiore nigro, Svvert.

II. Ornithogalum umbellat. majus angust. Ornithogalum medium, Eyst.

Flores intrus candidi, exterius virentes, flaminibus ex viridi pallescentibus.

III. Ornithogalum umbellat. alb. medium latifolium.

Ornithogalum aliud vulgare, Clus. hist.

IV. Ornithogalum umbellat. med. angust.

Ornithogale, Manardo, Hermolao.

Ornithogalum Dod. gal. Tur. Ang. Gef. hor.

Ama. Ger. Cast. vulgo, Cæsalp. secundum, Matth. Lugd.

Ornithogalum s. five vulgare, Clus. hist. & pan.

Ornithogalum candido flore, Cord. in Dioscorid.

Ornithogalum candidum vulgare, Ad. Lob.

Bulbus Leucanthemos minor, Dod. Lugd.

Ornithogalum alterum minus, Cam.

Bulbus follequius, Tab.

Ornithogalon spicatum, Svvert.

Est & folijs gramineis, ut in cæteris humistratis. Matthiolus duplex habet, & utrumque caule folioso pingit: quare in Lugd. historia utrumque à Dod. differre scribitur: sic Lacuna & Lugd. Matthioli utramque figuram proponunt: at Lonicerus, primam tantum, quam fidam suspicatur.

V. Ornithogalum album minus.

Ornithogal. minus è Pyrenæis, Clus. hist. ap. 1.

Ornithogalum minus, Eyst.

VI. Ornithogalum umbellatum flosculis ex albo subcæruleis.

Ornithogalum Hispanicum minus, Clus. hist.

ORNITHOGALUM SPICATUM.

I. Ornithogalum latifolium & maximum.

Ornithogalum magnum Myconi, Lugd.

Ornithogalum maximum, Clus. hist. ap. 1.

Ornithogalum vel Liliū Alexandrinum floribus albis innumerabilibus, Svvert.

Magna florum spica, aliquando centenis floribus nivei coloris.

II. Ornithogalum latifolium alterum.

Ornithogalum Æthiopicum, Clus. cur. post.

Ornithogalum Indicum promont. Bonæ spei, Svvert.

III. Ornithogalum angustifolium majus, floribus ex albo virentibus.

Asphodelus fœmina, Dod. Gal. Gef. hor.

Asphodelus Galeni, Lac. bulbosus Gal. Dod. Lugd. Cam. Ger.

Asphodel. Hyacinthinus fortè Galeni, Ad. Lob. obs. Hyacintho asphodelus, Lob. ico.

Ornithogalum majus, Clus. in pan. majus primum, Eid. hist.

Ornithogalum Pyrenæum, Clus. cur. post.

Ornithogalum aliud spicatum, Cam.

IV. Ornithogalum angustifolium, spicatum maximum.

Ornithogalum lacteum, spicatum max. Eyst.

V. Ornithogal. spic. seu comosum fl. lacteo. Ornithogali lactei species major, Eyst.

VI. Ornithogal. majus spicatum flore albo. Ornithogalum Narbonense, Dod. Lugd. spicatum, Cam.

Ornithog. spicatum Monspel. flore lacteo, Lob.

Ornithogalum alterum, Cam. apud. Matthioli, qui vulgari adjunxit.

Bulbus Ornithogalo similis Cæs.

Ornithogalum majus Monspel. Clus. pan. secundum, Eid. hist.

Ornithogalum spicatum flore lacteo, Eyst.

Mallu. Dioscorid. lib. 3. cap. 54. Theophr. 7. hist. 11. & Epimedium Plinij, lib. 19. cap. 5.

VII. Ornithogal. majus spicatum alterum. Ornithogal. 3. vel majus Byzantin. Clus. hist.

Ornithogalum spicatum minus, Lob. obs.

VIII. Ornithogal. majus spic. flore luteo. Bulbus Ornithogalo similis, flore luteo, Cæs.

IX. Ornithog. spicatum fl. viridi lactescente.

Ornithog. Pannon. albo flore, Clus. pan. & hist.

Ornithogalum flore albo viridique linea in dorso prædito, Svvert.

an Ornithogalum ferotinum, Cam.

X. Ornithogalum spicatum album.

Ornithogalum Hispanicum spicatum, Eyst.

XI. Ornithogalum cæruleo pallente flore. Ornithogalum cæruleum pallens Hyacintho autumnali pene par, Lob. obs.

XII. Ornithogalum exoricum magno flore, minore innato.

Hyacinth. arborum Ornithogaloïdes, Colum.

Narcissus 4. Matthioli, Clus. hist. ap. 2.

Ornithogal. Neapolitanum, Eidem ap. 2. Eyst.

Ornithogalum Neapolitanum flore interius candido, exterius cineraceo, Svvert.

Phalangij nomine, Honor. Belli ex Creta misit.

ORNI-

ORNITHOGALUM LUTEUM.

I. Ornithogalum luteum sive pallidum majus.

Ornithogalum 7. sive pallido flore, Clus. hist.

II. Ornithogalum luteum magno flore.

Ornithogalum flavum Alcmarianum, Clus. hist.

III. Ornithogalum luteum.

Bulbus, Trag. (cepa agrestis) Lac. sylv. Ruel.

Fuch. Tur. Gef. cat. Dod. Lugd. Cam. Eyst.

Bulbus sylv. alius bifolius, Gef. hor.

Sisyrinchium, Cord. hist.

Bulbus esculentus, Cast. Lon.

Ornithogalum luteum, Cord. in Diosc. Ad. Lob.

Tab. Lugd. Col. Svvert.

Bulbus Ornithogalo similis florib. luteis, Cæf.

Ubi adolevit, folia inferiora amittit, quare apud Tabernam. & Gerar. duæ figuræ.

Ornithogali lutei, & Ornithogali majoris, Taber.

Ornithog. lutei & Cepæ agrariæ nomine, Ger.

IV. Ornithogalum luteum minus.

Ornithogalum 10. sive Pannonic. luteo flore, Clus. pan. & hist.

Ornithogali lutei species minor, Lob. obs.

V. Ornithogal. angustifol. bulbiferum.

Ornithogalum angustifolium campestre luteum minimum bulbosum, Colum.

Variat: nam locis pinguioribus folia latiora & plura, sicut & flores: folia circa bulbillos hirsuta & candidiora sunt.



SECTIO QUARTA.

CEPA: PORRUM: SCILLA:

ALLIVM ET MOLT.

CEPA ET EJUS SPECIES.

Agyptiorum numina, Cepas & Allium (Plin. l. 19. c. 6.) prosequamur. Cepa à capitis magnitudine, Græcis κρόμμυον, ὅτι κρόμας συμπύκναι μέλι, quod oculi pupillam comprimere cogat, ut potest secundum Aristot. 20. probl. 22. mordaci nimium vapore lancinando & lacrymas movendo.

Genera Theophrast. 7. hist. 4. à locis cognominata refert, Gardiam, Cnidiam, Samothraciam, Satamicam, Afcaloniam, & sifilem. At Dioscorides l. 2. c. 181. longæ, rotundæ, flavæ & candidæ meminit. Plin. l. 19. c. 6. Cepa, inquit, genera apud Græcos Sardia, Samothracia, Afsidena, Serania, Schifta, Afcaloniam, &c.

Quare alia major est, alia minor: alia candida, alia viridis, alia rufa, alia subrubens: alia est rotunda, alia oblonga: omnes ut plurimum duplici aut triplici membranâ, quas Festus rallas, alij tunicas vocant, vestita. Sic alie acerrime, alie mediocriter acres, aut nihil ferè acedinis habentes. Sic alie feruntur, alie deponuntur: aliquando seminis loco bulbos gerunt, ut Dalechampius notavit.

I. Cepa vulgaris.

Cepa, Brunf. Gef. Lob.

Cepa, Trag. Fuch. Tur. Matthiol. Lac. Cord. in

Diosc. Ang. Cast. Cæf. capitata, Matth.

Cepa rotunda, Dod.

Cepa sativa Matthioli, Lugd.

Cepa alba & rubra, Gef. hort. Lon. Tab.

Variat colore floris, vel candido, vel purpu-

rascente: tunicarum quoque, coloris rubri, aut

candidi: radicis formâ, major est, & minor: ob-

longa, scissilis, vel orbiculata, turbinata, qui-

busdam communioribus, in compressam latior-

em circumferentiam bulbaceam abit.

Cepas porraceas, vocant stiones, qui primo

Vere, dum tenelli sunt, antequam caulescant,

in cibos eruuntur.

II. Cepa oblonga, Dod. Gef. hor.

Cepa Hispanica oblonga, Lob. ico. Cam.

III. Cepa radice candida dulci.

Cepa quarta, Gef. hort.

IV. Cepa plurium caulium.

Cepa ovata à radicis figura, Cord. hist.

V. Ce-

V. Cepa seclilis, Matth. Cast. Lugd.
an Gethyon Græcis, & Cepola Columellæ.

VI. Cepa fissilis, Matth. Lugd. cui & Cepæ
αἰραι, Portæ.

Cepis affinis Muligia, Cæs.

VII. Cepa sterilis, Trag. Ges. hor.

Cepa Afcalonica, Matth. Lugd. cui fortè Bul-

bus Seranius, quem Theoph. & Plin. Cepæ ge-
nus esse testantur.

Cepæ species sunt Afcalonica, Cast.

Cepis affinis, Afcalonica vulgo, Cæs.

Scaliones, Tur.

Verum & Lobelius hist. Belgica Afcalonitidem
antiquorum exhibuit, fortè à priore diverfam.

PORRUM EJUSQUE SPECIES.

QUOD περὶ σκῶν Dioſcorides l. 2. c. 179. vocavit, & in κεφαλαίων, capitatum, & ἀμπελό-
περὶ σκῶν distinxit; id Latini Porrum, quod porro eat, & longè lateq. grassetur, voca-
runt. Theophrast. 2. caus. 20. & 3. ejusdem 23. τὸ καρπὸν περὶ σκῶν, tonsum porrum addidit: alias
7. hist. 1. 2. 3. 4. 5. & 6. de Porro egit. At Plin. l. 20. c. 6. est seclivum & capitatum; & illud
l. 19. c. 6. duplex fecit.

I. Porrum commune capitatum.

Porrum, Brunf. Cord. in Dioſc. Dod. (& Porrus

Palladij) Ges. hor. Ang. Lon. Cæs. Cast. Tab.

Porrum commune, Matth. Lug. vulgare, Lob.

Porrum capitatum, Fuch. Tur.

Porrum capitatum Plinio, Hermol. Ruel. (cui
Gethyllidas Græcorum) Dodon. gal. vulgare,
Camer.

II. Porrum seclivum latifolium.

Porrum seclivum, Plin. Dod. Cæs. Lugd. Portæ.

Porrum seclivum capitatum, Matth. & (seclile)
Lac. Lugd.

Porrum tonsile & capitatum, Lob.

Porrum tonsile sive seclile, Cam.

Hæc duo genere non differunt, cum ex eo-
dem semine generentur, & cultura solum dif-
crepent: quia id quod ad culinaria juscula sæ-
pius detonderi solet, Seclivum aut Seclile Co-
lumellæ & Palladio nominatur: quod verò
capitatum fieri debet, non tondendum, & au-
tumnali tempore transferendum: etiam Plin-
io monente.

III. Porrum seclivum juncifolium.

Porrum seclivum, Trag. Fuch. Ges. hor. Lon.
Lugdun.

Porrum seclile, Matth.

Cepa Afcalonica, Matth. def. Ger.

Cepa fissilis & Getion. Tur.

Schoenoprasum, Dod. Ad. Lob. (cui Afcalonica
Matth.) Tab. Ger.

Porro tonsili cognatum, Cam.

Gethyllis, quam Ceparum genus Nicandri
Scholiastes dicit, Ges. hor. in Porro seclivo.

Differt à veterum Seclivo, cum illi folia lata,
huic pro folijs junci inanes sint: hinc nomine
ex Junco & Porro composito, Schoenoprasum
vocalunt.

Majus & minus habetur: illud rarius & ad
condimenta mitius, quod Gethium Gesnero:
minus vero Gethyllis.

Gethyllidem sylvest. Ges. lib. de hor. proponit.

IV. Porrum folio latissimo.

Porrum Syriacum, Tab. Franco.

Porrum Indicum, Cam.

Scorodoprasum, Ger.

V. Porrum sylv. inodorum.

Porro simile, exilius & inodorum, Lob.

VI. Porrum sylv. gemino capite.

Ampeloprasum, seu Porrum syi. Lob. Lugd. cui
à Matthioli diverfum.

Porrum sylvestre primum, Tab.

VII. Porrum sylvestre vinearum.

Ampeloprasum, Matth. Ruel. Ama. Ang. Ges.
hor. Cæs. Port. Lugd.

SCILLA EJUSQUE SPECIES.

ΣΚΙΛΛΑ Theophrast. 1. hist. 7. & 10. proposuit, & 7. hist. 11. Scilla Epimenidia vocat, &
qua ab usu nuncupationem sortita sit, meminit. Sic Dioſcorid. l. 2. c. 202. σκίλλα habet,
& cap.

& cap. seq. *μυρεγρον*, quod Scillam aliqui nominant. Genera duo Scilla medica, Plin. l. 19. c. 5. mascula albis folijs, femina nigris: & tertium genus cibus gratum, Epimenidium vocatam & c. Et l. 20. c. 9. Scillarum in Medicina alba est, quæ mascula, femina nigra: candidissima utilissima.

I. Scilla vulgaris radice rubra.
Pancratium & Scilla Dioscor.

Scilla femina, Plinio.

Squilla, Brunf.

Squilla, Trag. (& Ceba muris) Matth. Fuch.

Tur. Cord. in Dioscorid. Gesn. hort. Lac. Lugd.

dun. Lon. Camer. Cæsalp. cujus bulbus rufi coloris, & nigra in montibus non longè à mari,

reperitur.

Scilla communis & Pancratium, Dod. gal.

Scilla nigra & femina Plinij, & Pancratium

Dioscoridis, Costæo.

Scilla major, Cast.

Pancratium, Ang. & Scilla vulgaris, Guil. Cluf.

hisp. & hist. Dod. Lugd. Tab.

Scilla rubentibus radicis tunicis folio aloës carinato, Lobel.

II. Scilla radice alba.

Scilla, mascula Plinio: femina, Myreps.

Scilla, Marcell. Hermol. Manard. Ruel. Guil.

Dod. Hispanica, Cluf. hisp. & hist. Cast. ap. Lug.

alba, Eyst.

Scilla (five cepa marina) Lob. major, Tab.

Scilla minor, five Pancratium, Cast.

III. Scilla esculenta.

Scilla epimenidia, Theophr.

Scillæ 3. genus epimenidia, Plin.

Scilla vera & legitima, Ang.

Scilla dulcis & candida in Cephalonia, & Creta, Costæo in Mesuem.

ALLIUM EJUSQUE SPECIES.

Allium fortè ab ἀλλεῖν exilire, quod exiliendo crescat. Σκόροδον Dioscoridis l. 2. c. 182. vel quasi σκόρον ῥόδον, id est, rudis rosa, propter odorem gravem: vel quod comestum, vapores excrementitios ad cutim pellat, & vescentibus pandiculationes moveat. Sunt qui ab halante gravi odore deducant, & Allium scribant.

Genera Dioscoridis, sativum & hortense, quod vel multiplici in Aegypto, vel singulari, ut Porrum, capite constet, cujus nucleos Græci ἀλλιδας nominant: aliud sylvestre, quod σκόροδον. At Theophrasto 7. hist. 4. aliud præcox, aliud scrocinum: differunt prætere a magnitudine singulari: quedam etiam non nucleis, quedam verò multis coagmentantur, quos ῥόδεis Theophr. ἀλλιδας, Galenus: σκελλιδας, Aegineta l. 4. c. 33. ὀνυχας, Aërius lib. 6. cap. 11. vocat. Verum Plinio l. 19. c. 6. Generum Allij differentia, in tempore, præcox maturescit 60. diebus: tum in magnitudine. Ulpicum quoque, in hoc genere Græci appellavere. Allium Cyprium, alij Antiscorodon (fortè rectius Aphroscorodon) & c. sunt qui velint Allium Ulpicum Plinij, Allium Aegyptiacum Dioscoridis esse.

In Virginea multis locis Allium nascitur, ab Anglicano parum differens: desc. Virgin. quod ut & Cepe in Hispaniola, vix unquam bonum evadit: par. 4. Amer. c. ult. Et Indi ex omnibus Europæis radicibus Allium eligunt, quo ventriculum reficiant: Joseph. Acosta l. 4. c. 18.

I. Allium sativum.

Allium, Brunf. Trag. Matth. Ruel. Cord. in Dioscorid. Tur. Lac. Ang. Lon. Lobel. domesticum,

Matth. Cast.

Allium hortense, Fuch. vulgare, Cam.

Allium sativum, Dod. Gesn. hor. Ad. Cæf. Lugd.

Allium sativum multifidum, Cord. hist.

Verum Matthiolus, Lobelius & Dodonæus,

una figura Allium sine flore, Allium cum flore,

& Allium amphicarpon; & Tabernæmon, sub Porro sylv. latifolio proposuit.

Genus quoddam capitibus ingentibus ex Africa adferri, Cæsalpinus auctor est.

II. Allium sativum alterum: five Allioprasum caulis summo circumvoluto.

Allium sativum amphicarpon, quod & radicem nucleis feritur, & feminibus, quæ nucleos

similitudine referunt, Cord. hist.

K

Alli-

Allium sativum secundum, Dod.
 Scorodoprasum secundum, Clus. pan. & hist.
 Allium Creticum, sive Serpentinum, Cam.

III. Allium sativum radice simplici.

Máruſa, Hippocrati.

Allium mas, Matth.

Allium simplex, Cord. hist.

Allium sativum singulari capite, & Allium masculum, Vercell.

Allium Ægyptiacum, Portæ.

IV. Allium Cyprium, Theoph.

Allium Ulpicum, Plin.

Allium Ulpicum vel Punicum, Columell.

Aphroscorodon, sive Allium Ulpium, Ruel. Gesner.

Allium Cyprium, sive Ulpicum, Portæ.

Allium sativum tertium, Dod.

V. Allioporrum sive Scorodoprasum.

Scorodoprasum, Dioſcor. l. 2. c. 183. Gal. Ægin.

Scorodoprasum, Trag. Matth. Cord. in Dioſc.

Gef. hort. Lac. Caſt. Lugd. Portæ.

Allium porrinum, Car. Stephano.

Scorodoprasum & porrum Turcicum, Amat.

VI. Allium sphaericeo capite, folio latiore, sive scorodoprasum alterum.

Ampeloprasum primum, Dod.

Scorodoprasum sive allioporrum, Ad.

Scorodoprasum, Lob. Caſt.

Scorodoprasum 1. Clus. pan. & hist.

Scorodoprasum alterum, Lug. qui cum sequenti eadem tabellâ pinxit.

Porrum Indum, Cam.

VII. Allium sphaericeo capite folio angustiore.

Scorodoprasum alterum, Lob. Lugd.

VIII. Allium sylvestre latifolium.

Allium syl. quod ursinum vocant, Plin. l. 19. c. 6.

Allium syl. Brunf. Trag. (& colubrinum) Eric.

Cordo: syl. latioris folij, Dod.

Allium ursinum, Matth. Fuch. Dod. gal. Ama.

Gef. col. Tur. Clus. hist. Lugd. Thal. Caſt. Cam. Eyſtet.

Allium ursinum latifolium, Ad. Lob. Lugd.

Allium sylvestre bifolium & arctoscorodum,

Gef. hort.

Allium sylvestre ophioscorodon appellatum,

Cord. in Dioſc.

Ophioscorodon, Lon.

an Scorodoprasum.

Moly sive Allium Ursinum, Syvert.

Sunt qui Dioſcoridis Scorodoprasum, aut ejus Ampeloprasum, aut Ophioscorodon, sed male, censeant.

IX. Allium montanum, latifolium maculatum.

Allium anguinum, Matth. Lugd. Portæ, serpentinum, Caſt.

Allium latifolium maculosum, sive serpentinum, Ad.

Ophioscorodon, Lob.

Victoralis longa, Gef. hort. Clus. pan. & hist. (cui & major) Eyſt.

Allium alpinum, Gefn. hort. Dod. Tab. cui & Victoralis mas.

Est mas & femina, illa latioribus, hæc angustioribus est folijs, quare

Victoralis mas, & femina, Camerario dicitur.

X. Allium sylv. campestre purpurascens.

Allium caninum primum, Trag.

Allium sylv. primum, Fuch.

Allium campestre, Cord. in hist.

Allium sylvest. Gef. hort. Caſt. Caſt. syl. minus, Dod. gal.

Allium tenuifolium, Cant.

XI. Allium campestre juncifolium capitatum purpurascens majus.

Allium in arvis, Plinio.

Allium syl. quod Ophioscoridon, Ruel. Matth.

Allium syl. tenuifolium, Ad. Lob. ico. Dod.

Allium syl. vulgare seu caninum, Thal. tenuifolium, Franco.

XII. Allium sylv. capitatum purpurascens minus: quod à primo potissimum magnitudine differt, cum palmare fit, & folijs juncis.

XIII. Allium sylv. bicorni flore obsoleto.

Allium caninum alterum, Trag.

Allium sylv. Tur. syl. alterum, Fuch.

Allium sylvestre majus, Dod. gal.

Allium rubentibus nucleis, Lob. ico.

Est majus & minus.

XIV. Allium aquaticum.

Allium fluviatile in sabulo ad Albim fluvium in Misnia, Franc. hort. Lusat.

ALLIUM MONTANUM.

I. Allium montanum bicorni latifolium flore dilute purpurascens.

Allium sive Moly mont. latif. 1. Clus. pan. & hist.

Allium montanum bicorni angustifolium flore purpurascens.

Ampe-

Ampe loprasion proliferum, Lob. ico. Cam.
 Ampeloprasum 1. Cam. apud Matth.
 Allium five Moly montanum 2. Clus. pan. (&
 Moly montanum gramineo folio) & hift.
 Moly montanum carmesino colore, Svvert.
 III. Allium mont. bicorni flore exalbido.
 Allium five Moly montanum 3. Clus. pan. (&
 Moly montanum junceo folio) & hift.
 an Gethioides fyl. Colum.
 IV. Allium mont. bicorni flore obsoletiore.
 Allij montan. quarti species 2. Clus. pan. & hift.
 Huc referri potest
 Moly lurido colore, Svvert.
 V. Allium mont. bicorni fl. pallido odore.
 Allij mont. quarti species 1. Clus. pan. & hift.
 VI. Allium juncifol. bicorni luteum: quod
 1. est in Prod. Monspelio D. Saltzman. attulit.
 VII. Allium mont. capite rotundo.
 Allium five Moly montanum 5. Clus. pan. (&
 Moly montanum purpureo flore) & hift.
 VIII. Allium Pyrenæum.

Moly Pyrenæum purpur. flore, Clus. hift. ap. alt.
 IX. Allium mont. folijs narcissi majus.
 Allium five Moly narcissi fol. 1. Clus. pan. & hift.
 an Moly folijs narcissi, Lob. Lugd.
 Variat: 1. est, folijs splendentibus viridibus,
 floribus purpureis. 2. folijs magnis cinereis &
 mollioribus, floribus dilutioribus. hoc posterius est
 Moly narcissi folijs primi altera spec. Clus. hift.
 X. Allium montan. folijs narcissi minus.
 Allium five Moly narcissinis folijs 2. Clus.
 pan. & hift.
 Allium saxatile & Bulbus vomitorius, Cam.
 Et hujus altera species folijs longioribus &
 angustioribus, floribus dilutioribus, & est
 Moly narcissi fol. secundi alt. spec. Clus. hift.
 XI. Allium mont. radice oblonga: quod
 2. in Prod.
 an Allium mont. five Petroscedon, Gef. hor.
 Allium mont. radice oblonga, Eid. col. stirp.
 XII. Allium montanum minus: quod
 3. in Prod.

MOLY ET EJUS SPECIES.

M ὁ λυ, ἀπὸ τῆς μωλδὲν τῆς νόσος, ab amolendis morbis. Unius Theoph. 9. hift. 15. &
 Dioscorid. lib. 3. cap. 54. meminere: at Plin. lib. 25. cap. 4. duplex proposuit: alterum
 radice rotunda: alterum verò longa.

I. Moly latifolium liliflorum.
 Moly Theoph. fortè & Plinij radice rotunda.
 Moly Theoph. Ang. Dod. Clus. hisp. & hift. Cam.
 Moly liliflorum, Ad. Lob. Lugd.
 Moly latifolium, Moly Theoph. Dod.
 Moly Homericum, Scillæ alterum genus, &
 Pancratium, Diosc. Cæs.
 Moly Indicum flore purpureo, Svvert.
 Flore est candido, vel subrubente.
 II. Moly latifolium Indicum.
 Duplex figura proponitur: altera priori simi-
 lis, paucis folijs, caule oblongo, capite rotun-
 do: altera, folijs plantaginis, caule brevi, capite
 ex pluribus bulbulis compacto: illud dicitur
 Caucasum, Moly Indicum vocatum, Lob.
 Moly Indic. Dod. Lugd. Indicum 1. Tab. 2. Cam.
 Alterius figuræ nomina:
 Caucasum, Lob. ico.
 Moly Indic. Clus. hisp. & hift. Indicum 2. Tab.
 Narcissus five Pancratium Clusij, Svvert.
 III. Moly latifolium Hispanicum.
 Moly Hispanicum purpureum, vel Moly mon-
 tanum latifol. purpur. Hispan. ad Clus. cur. post.

Flores plus minus 60. dilute rubentes, aut
 purpurascens. Huc refer
 Moly latifolium, Eyst.
 IV. Moly latifol. luteum odore allij primum.
 Moly mont. latifol. flavo flore, Clus. hift. ap. alt.
 Moly luteum Botanicorum perperam Ornithogalum
 luteum latifolium, Lob. ad. par. 2.
 Moly flavo flore, Svvert.
 V. Moly latif. luteum odore allij secundum.
 Moly latifolium flore flavo, Eyst.
 VI. Moly African. umbella purpur. in Prod.
 VII. Moly exoticum floribus albo viridibus.
 Moly flore albo lineis viridis coloris, Svvert.
 VIII. Moly angustifolium umbellatum.
 Moly, Matth. Cast. Lugd. Lon. angustifolium,
 Dod. Lon.
 Myle, Gefner. cat.
 Moly Dioscoridis putatum, Ad.
 Moly Dioscoridis, Lob. Clus. hisp. & hift. Cam.
 an Allium ursinum alterum, Cæs.
 IX. Moly humile folio gramineo.
 Chamæmoly, an Moly Dioscorid. Colum.
 X. Moly parvum caule triangulo.

Moly parvum Pefarenfe, Ponn. Ital.

XI. Moly angustifol. floribus majoribus.

Moly minus, Cluf. hift.

Moly minimum albo flore, Svvert.

XII. Moly angustifolium folijs reflexis.

Moly serpentinum vocatum, Lob. Lugd.

Scorodoprafum alterum Clufij, quibusdam.

XIII. Moly atropurpureum Svvert. mihi incognitum.

XIV. Moly moschatum capillaceo folio.

Allium syl. perpusillum juncifolium moschatum, Lob. ad. part. alt.



SECTIO QUINTA. LILIUM: MARTAGON: CORONA IMPERIALIS.

LILIUM ET EJUS SPECIES.

Lilium, κρίνον & λείριον Græcis, Theoph. 6. hift. 6. Lilij florem variare dixit, & purpureum esse, singulis caulibus, aliàs unum, aliàs plura exire. Dioscorides lib. 3. cap. 116. duo genera agnovisse videtur, dum scribit, & rubra lilia esse. At Plinio lib. 21. cap. 5. Lilium triplex, album, rubens, purpureum, quod aliquando gemino sit caule, quod Narcissum vocitent. Dividimus in Lilium radice bulbosa & una, ut sunt Lilia alba, Martagon: vel pluribus, Asphodeli bulbis constante, ut Lilium luteum & rubrum.

LILIUM ALBUM.

I. Lilium album flore erecto & vulgare.

Lilium sive rosa Junonis, Apuleio.

Ambrosia sive Lilium album Nicandri, Ang.

Lilium Brunf. Död. gal. Tur. Matthiol. Lac.

Cast. Casalp.

Lilium album, Trag. Fuch. Gefner. hor. Ang.

Lon. Lugd. Tab. Ger. Eyft.

Lilium candidum, Cord. in Diosc. Ad. Lob.

Dod. Franco.

Lilium album vulgare, Cam.

Variat: aliquando circa caulibus medium, fo-

liorum quasi cespes, ut pingit Bry, nomine

Lilij multifolij Sturgardiæ nati.

Aliquando ex caule plano trium unciarum la-

to, numerosi flores exurgunt, ut idem figuram

habet, cui titulus

Lilium liliorum, sive 122. lilia ex eodem bulbo enata.

II. Lilium album floribus dependentibus, sive peregrinum.

Sultan Zambach (sive Martagon Constanti-

nopolitanum) Cluf. pan. & hift. Eyft. du Bry.

Martagon album, Lilium candidum Byzanti-

num, Lob. ico.

Lilia candida Martagonis Constantinopoli-

tani nomine insignita, Lob. ad. par. alt.

Lilij albi species alia, Cam.

Hoc nonnunquam sexagenos flores in plano

& lato caule protulit, quare.

Lilium album Byzantinum πολυανθές, Clusio.

Sic Lobelius ad. part. alt. in caule palmaris

latitudinis, humanæ proceritatis, ducentos &

plures candidissimos & suavissimos flores ob-

servavit.

Huc referendum

Lilij pulchri albi & ignoti species Theophrasti, Rauvvolf.

Lilium album Syriacum, Lugd. in ap.

an Lilia candidissima in Baya, medicinæ tota

utilia, Linsc. par. 4. Ind. Orient. cap. 14.

LILIUM PURPUROCEUM.

I. Lilium purpureoceum majus.

an Bulbus cruentus, Hippocrati.

Lilium purpureum Diosc. rubens Plinij.

Hemerocallis Diosc. Matth. Amat. Ang. Lac.

Cast.

Hemerocallis 1. Matthioli, Cam. & Lugd.

Hya

Hyacinthus & Cosmofandalos Poëtarum,
Dod. & Portæ.

Lilium rubrum, five aureum, Brunf.

Lilium rufum, Trag. Dod. gal.

Lilium rubens, Gef. cat. Fuch. ico.

Lilium rubens vel croceum alterum, Gef. hor.

Lilium croceum, Fuch. Lon. fyl. croceo flore,
Cæfalp.

Lilium purpureum, Tur. Ad. purpur. majus,
Lob. Dod. (& Cynorrhodon Plinij, ut & Ang.

& Portæ) Lugd. Eyft.

Lilium aureum Ger. majus, Tab.

Martagon, Caft. ico.

Martagon radice alba, Ang.

Martagon Chymiftarum, Lob. ico.

Vidi & candido flore.

II. Lilium purpurocroceum flore pleno.

Hemerocallis 1. Matthiol. flore pleno, Cam.

Lilium cruentum puniceum flore pleno, Eyft.

III. Lilium purpurocroceum minus.

Lilium purpureum minus, Ad. Lob. Dod.

Lilium purpureum alterum minus, Lugd.

Lilium rubrum minus non bulbiferum, Cluf.

pan.

Martagon 3. Hyacinthus Poëtarum, Ang.

Lilium puniceum non bulbiferum minus,
Cluf. hift.

Variat: communiter flore puniceo & quali

rubente, numero paucioribus: aliquando vi-

ginti & plures obferuantur: reperitur & pleno

flore, duodecim, viginti, aut plurium foliorum

textura, conftans.

IV. Lilium phœniceum.

Martagon phœnicum dilutum, Lob. belg.

Martagon Chymiftarum alterum, Lob. ico.

Lilium puniceum non bulbiferum majus flore

diluto, Cluf. hift.

Flores nonnunquam sexaginta vno caule.

V. Lilium Sandycis colore polyanthos.

Lilium cruentum polyanthos, Eyft.

Flores 84. in hoc obferuati.

VI. Lilium cruentum plantaginis folio.

Lilium cruentum latifolium, Tab. quid?

LILIUM BULBIFERUM.

I. Lilium bulbiferum latifolium majus.

Lilium cruentum bulbos majusculos squama-

tim compactos gerens, fummo alis diuifo

caule, Lob. ico.

Lilium cruentum bulbos gerens, Lugd.

Martagon bulbif. majus, Cluf. pan. vel primum,
Eid. hift.

Martagon rubrum, Tab.

Lilium cruentum latifolium, Ger.

II. Lilium bulbiferum angustifolium.

Martagon cruentum angustifolium, Lob. ico.

III. Lilium bulbiferum minus.

Lilium rubens vel croceum alterum, &

Lilium rubens semiferum, Gef. hor.

Lilium cruentum 4. fecundum caulem bulbu-

lis donatum, Lob. cruentum aliud, Lugd.

Lilium purpureum tertium, Dod.

Martagon bulbiferum minus, vel pratense,

Cluf. pan.

Martagon bulbiferum 3. vel lilium puniceum

bulbiferum 3. Cluf. hift.

Hemerocallis prima Matthioli bulbifera,

Camer.

Lilium cruentum bulbiferum, Eyft.

IV. Lilium bulbiferum incanum.

Martagon bulbifer. incanum, Cluf. pan. vel 2.

Eid. hift.

Hujus iconem Lobelius primo adjunxit, &

apud Lugdunensem, sub Lilio cruento bulbos-

gerente pingitur.

LILIUM FLORIBUS REFLEXIS latifolium.

I. Lilium floribus reflexis montanum.

Affodillus, Brunf.

Hyacinthus Poëtarum, vel 5. Trag.

Asphodelus femina, Fuch.

Lilium purpureum, Fuch. ico. Gefner. hor.

fyl. Thal.

Lilium fyl. Dod. Cam. alterum, Cluf. pan.

Lilium fyl. purpureo flore, Cæf.

Lilium alterum, Martagon Italis, quod Peti-

lium Plinius appellat, Ama.

Lilium montanum, Ad. Lob. five fyl. 2. minus,

Cluf. hift.

Martagon, Matth. Lac. Lugd. Caft. defc.

Martagon primum, Ang.

Hemerocallis, Dod. gal. Cord. in Diofc. Gef.

hor. Lon.

Lilium montanum flore purpurafcente pun-

ctatum, Eyft.

Variat floris colore, qui plerumq; subrubet,

aliquando dilutus albicans: sic & macule ru-

bræ inordinatæ florum folijs, & intus & foris,

maximè circa foliorum exortum, intrinsecus

K 3

asper-

asperguntur : hujus tres differentias Clusius agnoscit : huc referre oportet Martagon Pannon. flore suaverubente , ipsius Bry.

Reperitur etiam longiore spicâ, & dicitur Martagon montanum longiore spicâ, Bry : & etiam quasi duplici corolla ab eodem pictum, Francofurti natum.

II. Lilium floribus reflexis alterum, lanugine hirsutum.

Lilium purpureum mas, Gef. hor.

Lilium syl. primum & majus, Clus. pan. & hift.

Hemerocallis flore rubello, Lob. ico.

Lilium Saracenicum, Tab.

Flores priore plures, saturate purpurascen-tes, maculis nigricantibus distincti : aliquan-do dilute purpurascen-tes, maculis carentes ; Lilium flore purpurascen-tes non punctatum, Eyfett.

Pingit insuper Bry.

Martagon exoticum flore spadiceo, &

Martagon flore carneo.

III. Lilium floribus reflexis, varijs, sive tertium.

Lilium montanum sive syl. tertium, Clus. hift.

Lilium montanum maximum polyanthos varie-gatum, Eyf.

Simile est Clusiano.

Flos antequam explicetur, foris carneus : ex-plicatus, intus alb. notis purpureis insignitus.

Clusius & quartum genus addit, floribus sa-turate purpurascen-tes serius florentibus, & odore non insuavi præditis.

IV. Lilium fl. reflexis albis non punctatis.

Lilium montanum albo flore, Clus. hift. ap. alt. & cur. post.

Lilium mont. minus alb. non punctatum, Eyf.

Martagon imperiale niveum sine maculis, Bry.

V. Lilium flor. reflexis albis punctatis.

Lilium montanum albis floribus maculis pur-pureis insignitis, Clus. cur. post.

Lilium montan. majus album punctatum, Eyf.

VI. Lilium flor. reflexis polyanthos album punctatum.

Lilium mont. maximum polyanthos album varijs maculis rubris maculis aspersis, Eyf.

VII. Lilium Byzantinum miniatum.

Lilium rubrum Zuphiniare, sive miniatum Chalcedonicum, Clus. pan.

Lilium rubrum sive miniat, Byzant. Eid. hift.

Hemerocallis Byzantina altera, Lob. ico.

Lilium Chalcedonicum miniatum serotinum, Lob. ad. par. alt.

Hemerocallis Constantinopolitana phoenicea unico flore, Lugd.

Flos colore elegantissimi minij aut ceræ rubræ recentis, rarius prorsus nivei, aliquando flavi coloris : modò unus, modò duo, quatuor, quinque, sex, tredecim.

VIII. Lilium Byzant. miniat. polyanthos.

Lilium Byzantinum miniatum saturatiore flore *moderatis*, sive Zuphiniare, Clus. hift.

Lilium Chalcedonicum miniatum præcox, Lob. ad. par. alt.

Flores quinos, senos, denos ut plurimum profert, rarius 20. 30. vel 40. in caule duorum triumve digitorum latitudine, aliquando saturatiore, aliquando dilutioris coloris, hocque Lilij Byzantini miniat dilutioris floris nomi-ne pingitur à Clusio in hift.

Lilium Byzantinum serotinum, Eyf.

Lilium Byzantinum flore multiplici, Eid.

Hoc florum foliorum numero duodenario, & staminum multitudine à priore discrepat.

Varietas in folijs : quæ flore est dilutior, caulem & folia viridiora habet : quæ verò saturatiore, hujus caulis & folia plerumq; ex pur-pura nigricant. Aliquando flores in modum corollæ dispositi nascuntur, ut Bry pingit, no-minans Martagon corollam præbens.

IX. Lilium purpuro sanguineum fl. reflexo.

Hemerocallis altera, Matth. Lugd. quam cum Lilio Zuphini eandem vult, Clus.

Lilium sylvestre alterum, Dod. ico.

Hemerocallis Chalcedonica purpuro sangui-neo polyanthos, Lob. Cam. (cui idem cum Lilio Zuphini Clusij) Bry.

X. Lilium pyramidale moschatum.

Lilium sylvestr. sive Hemerocallis moschata polyanthos, &

Martagon imperiale nuperor. Lob. ad. par. alt.

Martagon imperiale moschatum, Eyf.

Est florum centum & viginti & plurimum, rosæ moschatæ odore, qui diluti & lividi colo-ris maculis ex fusco purpureis notati : florum 210. ferax in horto Eyf. conspectum fuit.

LILIUM FLORIBUS REFLEXIS angustifolium.

I. Lilium rubrum angustifolium.

Lilium

Lilium rubrum præcox, Clus. hist. Bry.

Uno, duobus, tribus est floribus: & quia aliquando angustioribus est folijs, vel latioribus, idcirco Clusius in hist.

Lilium rubrum præcox 1. & 2. facit.

II. Lilium brevi & gramineo folio.

Lilium rubrum præcox 3. angustifolium, Clus. hist.

Lilium miniat. tenuifol. Clus. hist. ap. alt.

Hemerocallis Macedonica & Martagon Pomponicum, Lob. ad. par. alt.

Lilium montanum rubrum præcox, Eyst.

Floribus aliquando 35. 46. & 48. sed in plano caule, vel miniati, vel cruenti coloris.

III. Lilium miniatum odorum angustifol.

Lilij miniati tenuifol. aliud genus, Clus. hist. ap. alt.

Martagon Pomponij, Eid. & cur. post. & Eyst.

IV. Lilium flavum angustifolium.

Lilium montanum flavo flore maculis distinctum & non distinctum, Clus. hist. ap. 1. & alt.

Lilium montan. flavo flore, Lob. ad. par. alt.

Lilium montanum flore luteo punctatum & non punctatum, Eyst.

Martag. five Hemerocallis punctata flavo fl. & Martagon non punctatum, flore flavo, & Martagon five Lilium de Canada auri colorem referens, fl. intus nigris maculis asperso, Bry.

Lilium montanum magis flavo flore & atrioribus maculis, Clus. cur. post.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore flavo, vel dilutiori quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etià subviridi fl. & dicitur Martagon subviridi flore, Bry.

Variat flos colore luteo, vel verius pallente, vel purpurei Lilij instar rubente, aut Sandaracæ colorem refert, & hæc dicitur

Tusai 2. Clusij hist.

At Lobelius ad. part. alt. varietatem in caule, flore & folio adfert: cui alia præcocior, alia serotina: præcocior altera folio lato dilutè vi-
rente, flore pallidior; altera media, quæ elatior, folio pallidior, angustior, flore dilutior. At serotina folijs latioribus, atrovirentibus, flore saturo phœniceo.

II. Lilium, five Corona imperialis multiflora latoque caule.

Tusai, five Lilium Persicum 3. & Tusai *πεδαν-
culis*, Clus. hist. pan. & rar.

Corona imperialis polyanthes, Eyst.

Corona platycaulis, five laticaulis, Lob. ad. par. alt.

Flores 20. 30. 40. 50. & etiam 70. in caule lato, qui sequenti anno caulem rotundum acquirit, cum 3. 5. 7. aut octo floribus.

III. Lilium five Corona imperialis duplici corona.

Corona imperialis phœnicea duplici corona, aut serie florum, Lob. ico.

Corona imperialis polyanthes, Tab. ico.

Corona imperialis florum classe duplici, Eyst.

Corona polyphyllis five foliosa, Lobel. ad. part. alt.

Tusai, five Lilium Persicum 2. du Bry.

Corona imper. duabus coronis ornata flore flavescente, Svvert.

Et hujus varietas apud Lob. caule numerosis folijs stipato, corona duplici nonnullis floribus in caulis fastigio: altera, flore dilutiori minus propendente, ob florum acervum caulem ambiente: & hæc est

Corona polyphyllis & polyanthes altera, Lob. ad. par. alt.

IV. Lilium five Corona imperialis non foetens.

Tusai quarta differentia, Clus. hist.

V. Lilium five Corona Imperialis ramosa.

Tusai *δινδρον*, Clus. hist.

Ramis singulis 11. flores: vel in altero 8, vel plures: in altera, 5. vel sex.

LILIUM PERSICUM.

Lilium Persicum, Dod. (& Hyacinth. *spurius* 6.) Lob.

6.) Lobel. (& Pannachio Persianorum) Lugd. Taber.

Lilium non bulbosum, sive arundinaceum flore subcroceo & alterum luteo, Cam, Eyst. Rob. Svvert. Bry.

Lilium Sulfianum, Clus. pan. & hist. Bry.

LILIUM ASPHODELI radice.

I. Lilium luteum asphodeli radice.

Lilium non bulbosum luteum, Dod. Lugd. Ger.

Liriosphodelus luteus liliiflorus, Ad. Lob.

Liliasphodelus luteo flore, Clus. pan. hist. Cam.

Liliago minor asphodelo affinis, Hemerocallis Dioscoridis videtur, Cæs.

Asphodelus liliaceus, Eyst. luteus, Tab.

Flöre est communiter luteo, rarius albo.

II. Lilium rubrum asphodeli radice.

Hemerocallis Diosc. Theoph. & Plinij.

Lilium rubens harundinaceum, Ges. hort.

Lilium non bulbosum obsoleto colore rubens, Dodon.

Liriosphodelus phœniceus, Lob.

Liliasphodelus puniceus, Clus. hist.

Lilium rubrum non bulbosum, Lugd.

Liliago major asphodelo affinis, Cæs.

Asphodelus liliaceus rubens, Tab.

Lilium non bulbosum sive arundinaceum, Camer. sive phœniceum, Ger.

Lilium fatuum, Eystet.



SECTIO SEXTA.

ORCHIS: SATYRIUM: DENS CANIS: OPHIRYS: OROBANCHE.

ORCHIS EJUSQUE DIFFERENTIÆ.

O *Phis* sive Testiculus, à Theophrasto 9. hist. 19. & Dioscoride l. 3. c. 141. proponitur: Dioscorides, inter Orchidem, & Satyrion differentiam hanc fecit: *ὅτι ἓξ ἄς* vocans, quæ radicem bulbosam habent, eamq. geminam, oblongam olivæ modo angustam, superiorem pleniorē, & inferiorem molliorem, ac rugosiorē. Satyrion autem, quod radicem habet unam, eamq. bulbosam, mali magnitudine.

Genera Orchidis, Dioscorides duo fecit; unum, *Κωδὸς ὀρχυ*, testiculum canis: alterum *στυριὰς* cognominatum. Sic Satyrion duplex, alterum *στυριὸν τε ἰσχυρὸν*; alterum *στυριὸν ἰσχυρὸν*, vel *ἰσχυρὸν*. Plinius l. 26. c. 10. Orchion Satyriorumq. descriptiones confundit: & l. 22. c. 8. Cynosorchidis nomine repetijt.

Lubet distinguere in eas, quæ radices habent, vel rotundas testiculorum forma, vel palmas manusve referentes. Illas, in eas quæ radices habent vel geminas, quas Orchides: vel unicam, quas Satyria nominabimus: has verò Orchides palmas appellabimus. Orchidis genera facimus, Cynosorchin sive Canis testiculum, Testiculum morionis, Orchin fetidam, sive Testiculum hircinum: Orchin Serapiada, vel Testiculum vulpinum & Testiculum odoratum: ad quæ genera quing. Orchidum species reduci possunt.

CYNOSORCHIS, SEU TESTI- culus canis.

I. Cynosorchis latifol. hiantē cucullo major.

Satyrion primum, Brunf. mas, Trag.

Orchis mas latifolia, Fuch. vel major, Lon.

Orchis & Testiculum canis officin: Ama. lati-

folia, Eystett.

Orchis sive Testiculum & Cynosorchis, Ang.

Orchis prior Dioscoridis, Corn.

Orchis primum genus, Dod. gal. Lugd. Thal.

Testiculum γ. Marth. 3. Lac.

Cynosorchis, Ad.

Testi-

Testiculus latifol. Taber. & Satyrion triphyl-
lon, Eidem.

II. Cynoforchis latifolia hianthe cucullo
altera.

Cynoforchis mas nostra, vel 4. testiculus, Trag.

Cynoforchis nostra major, Lob. Lugd.

Cynoforchis prior, Dod. media, Cam.

Cynoforchis major 3. Tab. & altera, Ger.

Serapias Dioscoridis, sive Basilica Siderites, vel
Erythraea, Gemmae.

III. Cynoforchis latifolia spica compacta.

Cynoforchis tertia, Dod. Lugd.

Cynoforchis major altera nostra, Lob.

Cynoforchis major quarta, Tab.

Cynoforchis palustris, Ger. ico.

Orchis, Cynoforchis & Testiculus canis major
flore incarnato, Cam.

Serapias Dioscoridis secunda, sive Orchis ba-
silica altera syderites flore candidiore, Gem.

Satyrion sive Orchis major rubra, Syvertius.
du Bry.

IV. Cynoforchis latifolia hianthe cucullo
minor.

Cynoforchis altera, Dod. Lugd. Tab.

Cynoforchis major, Ger.

Cynoforchis majoris secunda species, Lob.

Hæc communiter latioribus, rarius angustioribus
folijs reperitur.

V. Cynoforchis angustifolia hianthe cucul-
lo: quæ 1. in Prod.

CYNOSORCHIS MILITARIS

I. Cynoforchis militaris major.

an Testiculus 4. cum Cynoforchide 2. Trag.

Testiculus alius tertio loco, Cord. hist.

Cynoforchis quarta, Dod.

Orchis strateumatica sive stratiotes major, sive
militaris, Gemmae, quæ Basilica 3. Lob.

Orchis strateumatica major, sive Basilica tertia
Gemmae, Lugd.

Orchis latifolia altera, Clus. pan. & hist.

Testiculus 5. militaris, Tab.

Ornithophora candida, Ger. ico.

Orchis purpurea, du Bry.

II. Cynoforchis militaris media.

Orchis flore rubro elegantissimo, Clus. pan. at
secunda, Eid. in hist.

III. Cynoforchis militaris minor.

Orchis strateumatica minor Gem. Lob. Lugd.

Orchis strateumatica, Ger.

Testiculus strateumaticus minor, Tab.

IV. Cynoforchis militaris montana spica
rubente conglomerata: quæ 2. in Prod.

V. Cynoforchis militaris pratensis elatior,
floribus variegatis: quæ 3. in Prod.

VI. Cynoforchis militaris pratensis hu-
milior.

Orchis Pannonica 4. Clus. pan. & hist.

Orchis minor flore incarnato, Eyst.

Orchis Pannonica, du Bry.

Hujus species altera ampliore, crassiore &
longiore spica.

VII. Cynoforchis montana purpurea o-
dorata.

Orchis quinta odora Serapiada Diosc. Trag.

Orchis quarta Dodonæo, Lugd.

Testiculus primus, Matth. species 4. Eidem
comp.

Testiculus candidus, Cord. hist. ico.

Orchis foemina, major, Fuch.

Orchis foemina, Eid. ico. Tur.

Orchis tertium genus, Dodon. gal.

Testiculus 12. Taber.

Major & minor habetur, quare species duæ
Trago.

VIII. Cynoforchis obscurè purpurea o-
dorata.

Orchis Pannonica tertia, Clus. pan. & hist.

Cynoforchis flore purpurascete, Eyst.

IX. Orchis globoso flore.

Orchis rotunda Dalechampi, Lugd.

an Orchis species, floribus quasi in umbella,
Thal.

X. Chamæorchis alpina folio gramineo:
quæ 4. in Prod.

ORCHIS MORIO.

I. Orchis morio mas folijs maculatis.

Satyrion mas, Brunf. Cynoforchis, Eid. Ang.

Testiculus 1. Matth. icon. 4. Eidem folio, Lac.

Castor.

Orchis altera Dioscoridis, Corn.

Orchis mas angustifolia, Fuch. Tur.

Orchis mas minor, Lon.

Orchis Delphinia palustris, Gem.

Orchis 2. genus, Dod. gal. Thal.

Testiculus morionis mas, Dod. Lugd.

Cynoforchis morio, Lob. Franc.

Cynoforchis morio mas, Tab.

Cynoforchis maculata, Ger.

L

Saty.

Satyrium Apulei, Svvert. du Bry.

Flore est purpureo, vel ex roseo candido, purpureis maculis notato.

II. Orchis morio folijs sessilibus maculatis.

Cynorchis delphinia sessilibus maculosis obtusioribus folijs, flore purpureo violaceo, caule sesquicubitali, Lob. ico.

Cynorchis maculata, Tab.

Cynorchis morio mas, Ger. ico.

III. Orchis folijs sessilibus non maculatis. Orchis colore vario, vel s. Clusij, pan. & hist. descript.

Variat floris colore, modo purpureo saturatione, modo dilutiore, modo carneo, modo omnino lacteo; nunc maculis, interdum nullis, aspersis.

IV. Orchis morio femina.

Testiculi species tertia, Matth.

Testiculo alteri adjungit, Lac.

Orchis, sive Cynorchis femina minor, Fuch.

Orchis angustifolia femina altera, Fuch. ico.

Orchis tertium genus, Dod. gal.

Orchis delphinia montana, Gem.

Testiculus morionis femina, Dod. Lugd.

Cynorchis morio femina, Lob. Lugd. Ger.

Cynorchis morio; Tab. Cynorchis femina, Eyfster.

an Testiculus alius, Cord. hist. Ab hac sola radice, triplici bulbo constante differt, quae Triorchis Serapias mas, Fuch. Lugd.

Triorchis mas minor, Fuch. in ico. Tur. Tab.

Triorchis mas, Lon. in ico.

Orchis Serapias mas, Dod. gal.

Huc referri potest

Orchis angustifol. femina altera, Fuch. ico.

Orchis, sive Cynorchis femina minor, Fuch.

Orchis quartum genus, Dod. gal.

Orchis morio minor, folijs maculatis.

Cynorchis minimis & secundum caulem pe-

dalem & cubitalem maculosis folijs, floribus purpureis, Lob. ico.

Satyrium maculosum, Svvert.

VI. Orchis flore nudi hominis effigiem representans, mas.

Orchis Antrophora oreades altera, Colum.

VII. Orchis flore nudi hominis effigiem representans, femina.

Orchis antrophora oreades, Colum.

VIII. Orchis flore simiam referens.

Orchis Zoophora cercopithecum exprimens Oreades, Colum.

ORCHIS FOETIDA.

I. Orchis barbata odore hirci, brevior latioreque folio.

Tragorchis, Dod. gal. maximus, Ger.

Testiculus hirci, Dod. Lob. obs. primus, Tab.

Testiculus, sive Tragorchis, Ad.

II. Orchis odore hirci longiore angustiorque folio.

Testiculus hircinus vulg. & leporis testic. Lob.

Testiculus hircinus secundus, Tab.

Testiculus lingua bifurcata, Cæs.

Orchis saurodes, vel scincophora lacertarum amulatione, Gemmae, Lugd.

Testiculus hircinus vulgaris, Lugd.

Tragorchis mas, Ger.

III. Orchis odore hirci minor.

Tragorchis minor & verior, Gem. sive Coriophorites, vel cotiophora flore instar cimicum, Lob.

Tragorchis minor & verior, Lugd.

Testiculus hircinus tertius minor, Tab.

Tragorchis femina, Ger.

IV. Orchis odore hirci minor spica purpurea, rufescente.

Orchis Batavica sexta, Clus. hist.

V. Orchis spica purpurea foetida.

Orchis teterfimo odore foetida, Clus. pan. & hist.

ORCHIS SERAPIAS.

Serapiades dicuntur, quod horum flores insecta secunda & lasciva referant, tanquam Serapiade Alexandrinorum olim Deo nomen habentia: cujus templum excellens Canope erat, ubi lascivius cantibus & saltationibus colebatur, Strabone 17. sua Geographia referente.

I. Orchis bifolia latissima.

Orchis latifolia maxima, Clus. pan.

Orchis prima amplissimis folijs, Clus. hist.

Orchis bifolia latifolia, Thal.

II. Orchis bifolia altera.

Orchis latifolia altera, Clus. pan. & hist.

Orch. hermaphroditica, Lug. Ger. secund. Gem.

Testicul. vulpin. Eyfster. hermaphroditicus, Tab.

Orchis psychodes diphylla, Lob.

Orchis bifolia, Tab.

Testic.

Testiculi species quinta, Cam. epit.

III. Orchis alba bifolia minor calcare oblongo.

Orchis altera serapias, Ges. cat.

Orchis altera Satyrion vulgò, Ang.

Orchis serapias, Bras. at primus, Dod. Lugd.

Orchis bifolius, Cam. Orch. fl. albo minor, Eyst.

Testiculus bifolius, Cord. hist.

Testiculi tertij species prima, Matth. Lugd.

Testiculus vulpinus, Franco.

Testiculus vulpinus primus, Lob. latifol. Tab.

Satyrion trifolium, Eid.

Orchis Ornithophora, Ger. ico.

Orchis flore albo, du Bry. minor & Testiculus leucanthemos, Eyst.

IV. Orchis trifolia major.

Testiculus sacerdotis, Ruel.

Orchidis undecima species, Trag.

Testiculus candid. odorat. major, Cord. hist.

Testiculus vulpis, Dod. gal. Lugd.

Satyrion trifolium, Fuch. Tur. Lon. qui tres bulbos adpingit.

Triorchis trif. Tab. & triorch. major mas, Eid.

Satyrion trifolium, Ama.

Flore communiter est candido: reperitur & purpureo: si quis cum præcedenti eandem vollet, facile assentietur.

V. Orchis trifolia minor.

Culices minores triphyllæ, Lob. ico.

VI. Orchis hermaphroditica.

Orchis batrachites, Gem. Lob. Tab. Lugd.

Orchis Melittias, Ger. ico.

VII. Orchis fucum referens major foliolis superioribus candidis & purpurascens.

an Orchis Serapias Dioscoridis.

Satyrion quartum, Brunf.

Orchis sexta, & satyrion alterum, Trag.

Orchis sive Testiculus minor violaceis floribus, Cord. hist.

Orchis serapias femina, Dod. gall.

Orchis serapias secundus major, Dod. Lugd.

Orchis secunda species Dodonæi, Lugd.

Orchis sphegodes, Gem. Lob. ob. Lugd.

Testiculus vulpinus major, Lob. ico.

Testiculus 7. sphegodes, Tab.

Orchis strateumatica, Ger. ico.

Testiculi species 2. Matth. Lac.

Testiculus figura & colore apem referens, Cæs.

Orchis serapias 2. Dodonæi, Lugd. Eyst.

Triorchis femina, Fuch. Lon.

Satyrion floribus apes referens, Tur.

Satyrion, testiculus vulpinus, Svvert. du Bry.

VIII. Orchis fucum referens flore subvi-

rente.

Orchidis sextæ species altera, Trag.

Testiculus vulpinus minor, Ad.

Orchis serapias secunda minor, Dod.

Orchis melittias sive apis cadaverulum expri-

mens, Lob. Lugd. Tab.

Triorchis femina, Tab.

Orchis myodes & Testiculus vulpinus major,

Ger. ico.

X. Orchis fucum referens colore rubiginoso.

Testiculo vulpino similis minor, Ad.

Testiculus vulp. 2. sphegodes, Lob. ico.

Satyrion minus, Svvert.

Hæc non longè Monspelio in pratis à Lat-tes, cæruleis, punctatis, albis, pallidis, purpu-

reis, variegatis floribus, reperitur.

X. Orchis muscam referens major.

Orchis myodes altera, Gem. Lob. Lugd.

Testiculus muscarius quartus, Tab.

XI. Orchis muscæ corpus referens minor,

vel galea & alis herbis.

Satyrion exiguum & 7. Trag. Satyrion, Tur.

Testiculus pumilio, Cord. hist.

Orchis quintum genus, Dod. gal.

Orchis angustifolia femina tertia, Fuch. ico.

Orchis femina minor, Lon.

Orchis serapias tertius, Dod.

Orchis myodes prima, Gem. Lob. Lugd.

Testiculus muscarius primus, Tab.

Serapias batrachites, Ger. ico.

Triorchis serapias tertius, Lugd.

XII. Orchis muscam referens lutea.

Testiculus vulpinus luteus, Ad.

Orchis myodes lutea Narbonensis, Lob. Lugd.

Testiculus muscarius tertius luteus, Tab.

Orchis myodes minor, Ger. ico.

Orcheos genus humile, Lugd.

XIII. Orchis angustifolia.

Testiculus 16. minor, Tab.

Orchis andrachnites, Ger. ico.

XIV. Orchis papilionem expansum her-

bacei coloris referens.

Cynoforchis quintus, Dod.

Orchis Ornithophora, vel ornithes folio lævi,

Gem. Lob. Lugd.

Testiculus vulpinus, Tab.

Orchis Ornithophora folio maculoso, Ger. ico.

L 2

Orchis,

Orchis, du Bry.

XV. Orchis papilionem referens, folijs maculatis.

Orchis ornithophora folio maculoso, Gem. Lob. Lugd.

Testiculus 15. Ornithophorus, Tab.

Testiculus sphogodes, Ger. ico.

Variat foliorum forma, est prægrandibus, parvis, ovalis figuræ ex acuto in latum, vel in rotundum desinentibus: florum colore purpureo, subpurpurascente, albo.

XVI. Orchis papilionem referens angustifolia alba.

Ornithophora candida, Lob. ico.

Orchis ornithophora alba, Lugdun.

XVII. Orchis araneum referens.

Orchis andrachnitis, Lob. ico.

XVIII. Orchis montana Italica flore ferrugineo lingua oblonga: sub Orchide 5. in Prod. desc.

Testiculi tertij species prima, Matth. fig. major.

Testiculi 3. species Matthioli, Lugd. fig. 2.

Testiculus 13. Taber.

XIX. Orchis montan. Ital. lingua oblonga altera.

Orchis macrophylla, Colum.

MONORCHIS ET TRIORCHIS.

I. Orchis odorata moschata, sive Monorchis.

Orchis pusilla pallida odorata, vel 6. Clus. pan. at 7. in hist.

an Testiculi species minor bulbo singulari, Gesl. hort.

Variat folio brevior, latior, longior, & angustior.

II. Orchis lutea hirsuto folio.

Orchis Frisia littoralis, Lob. Lugd. qui & quintam junxit.

Orchis Frisia, Ger.

Testiculus luteus, Tab.

III. Triorchis lutea folio glabro.

Triorchis lutea, Gem. Lob. Lugd. Triorchis lutea 2. Tab.

Testiculus odorat. Ger. quem cum seq. junxit. Modò terni, modò quaterni pusilli, penduli testiculi subsunt.

IV. Triorchis lutea altera.

Orchis minor Leodienfis, Lob.

Triorchis lutea, Gem. Lugd. prima, Tab.

V. Triorchis lutea radice oblonga.

Triorchis lutea tertia Gemmæ, Lobel. (qui in icon. etiam 2. junxit, ut & Lugd.) Tab.

Orchis Leodienfis, Ger.

VI. Triorchis, vel Tetrorchis alba odorata major.

Tetrorchis, vel Triorchis alb. spiralis, vel autumnalis, Gem. Lob. Lugd.

Testiculus odoratus major, Dod.

Triorchis, Ger. Triorchis odorata, Tab.

Aliquando ternos, aliquando quaternos testiculos oblongos fibrosos obrinet.

VII. Triorchis alba odorata minor.

Satyrium 3. vel odoriferum, Brunf.

Testiculus candid. odorat. minor, Cord. hist. Testiculus odoratus, sive Orchis spiralis minor, Lob.

Testiculus odoratus, Ad Lugd.

Testiculus odoratus minor, Dod. Tab.

Orchis flore albo odorato, Cam.

VIII. Pseudoorchis.

Orchis minor radice repente, Cam.

Palma Christi radice repente, Ger.

Orchis repens, Eyst.

IX. Chamæorchis lilifolia.

Orchis lilifolia minor sabuletorum Zelandiæ & Bataviæ: sive

Chamæorchis aggerum Zelandiæ & Bulbo eriophoro similis bulbus, Lob. ad. part. 2.

an Pseudoorchis, Clus. hist.

ORCHIS PALMATA ET

Satyrium.

Quas Orchides palmatas vocamus, eas recentiores Satyria basilica nominant. Brunfelsius verò & Tragus, Orchidum seminas faciunt, eo quòd præter duas radices insistantium palmarum junctas (hinc vulgo Palma Christi) notam impudicam, vulva muliebri similem, habeant. Digitos citrinos Avicenna, Matthiolus censet.

Dioscor.

Dioscorides lib. 3. cap. 143. 144. *ὄσπιον duplex proposuit: alterum, quod alij ῥέσπων vocant, quod ut plurimum terna folia, rumici aut lilii similia, sed minora atque rubescens habeat, caule nudo cubitali: flore lilij candido: radice bulbosa mali magnitudine, rufa, intus alba, ovi instar, sapore dulci, orig. grato.*

Alterum *ἑρμῆον* sive *ἑρμῆον* cognominatum, quod semine est lini majore, firmo, splendens ac levis: radice cortice aliquantum gracili ac rufa, interne alba, dulci & gratâ: que non secus ac prior venerem potenter stimulat. Plinius, Satyrium cum Orchide confundit, ut lib. 26. cap. 10. videre est, & Satyrii aliud genus erythraicon appellari scribit.

Matthioli videtur ad descriptionem Dioscoridis, duplex Satyrium proposuisse: de utroque autem dubitatur.

Satyrium.

I. Satyrium primum, Matth. Lugd.

Satyrium trifolium, Cast.

Hoc alij Phallum Hollandicum, alij Fauvel, cui tria folia afficta sint, censent.

II. Satyrium erythronium, Matth. Lugd.

Cast.

De utroque dubij sumus, & Camerarius in suo emaculato Matthiolo omisit.

III. Satyrium à Guinea, Rob. Svvert. nec dum vidimus.

Orchis palmata.

I. Orchis palmata pratensis latifolia longis calcaribus.

Palma Christi major, Matth. desc. Franco.

Palma Christi altera, Cord. hist.

Palma Christi & Serapias mas lævi folio, Lob.

Palma Christi mas, Ad. Ger. prima, Tab.

Satyrium basilicum, Corn.

Satyrium basilicum mas, Ges. col. Dod. Lon.

descript.

Satyrium basilicum majus recentiorum, Lugd.

descript.

Satyrium recentiorum Græcorum, & basilicum mas latifolium alterum, Thal.

Palma Christi erecta variegata, Eyst.

Satyrium sive Palma Christi, Svvert.

Flores saturato rosei, maculis purpurascensibus insigniti.

II. Orchis palmata pratensis angustifolia

major: quæ 6. in Prod.

Palma Christi 3. Eyst.

III. Orchis palmata pratensis maculata.

Orchis femina altera, Trag.

Satyrium basilicum Græcor. & officin. Christi-

palma, Ruel.

Satyrii genus, basilicum Græcum, Ges. cat.

Satyrium basilicum femina, Ges. col. Lon.

Dod.

Palma Christi, Ama. Cord. hist. Cæs.

Palma Christi femina, Ad. Ger.

Palma Christi maculata, Tab. Franco, Eyst.

Palma Christi, serapias femina pratensis, Lob.

Satyrium femina folijs maculatis, Thal.

Serapias femina pratensis, Lugd.

Orchis serapias, Cam.

Satyrium femina, Svvert. du Bry.

Variat: flore, qui in purpura vel rubet, vel dilute ad cæruleum inclinat, vel albus est: vel

variegatus, albis maculis ac venulis rubescens: interdum maculis caret: huc

Palma Christi erecta flore candido & fl. variegato, &

Palma Christi candidis floribus, Eyst.

IV. Orchis palmata pratensis maxima.

Cynoforchis macrocaulos, sive conopsea, sive

galericulata, Gem. Lob.

Cynoforchis conopsea, Lugd.

V. Orchis palmata minor calcaribus ob-

longis.

Serapias minor, Lob. minor rubra Gemmæ,

Lugd.

Serapias minor nitente flore, Ger.

Palma Christi minor mas, Tab.

VI. Orchis palmata angustifolia minor.

Satyrium femina, Brunf.

Satyrium alterum, Trag. desc.

Orchis femina, Trag. ico.

Palma Christi major, Matth. ico. tertia, Cord.

hist.

Satyrium basilicum majus, Lugd. ico.

Satyrium basilicum mas, Fuch. Dod. gal. Lon.

ico.

Satyrium basilicum mas, tenuifol. Thal.

Satyrium regale, Tur.

Palma Christi femina, Tab.

Palma Christi peregrina flore rubro, Eyst.

VII. Orchis palmata angustifolia minor odoratissima: in Phytopinace, & sub 7, in Prod. descripta.

VIII. Orchis palmata caryophyllata.

Orchis serapias caryophyllata, Lob. ico.

IX. Orchis palmata sambuci odore.

Orchis serapias 7. Clus. pan. Pannonica 8. hist.

Duplex est: 1. floribus exalbidis, foliolis sub floribus pallidis. 2. floribus purpureis, foliolis purpurascensibus.

X. Orchis palmata batrachites.

Serapias batrachites, vel Myodes, Lob. ico.

XI. Orchis castrata.

Satyrium castratum vel eunuchum, Lob.

Satyrium castratum, Gemmæ, Lugd.

Testiculus sextus castratus, Tab.

Serapias castratum, Ger.

XII. Orchis palmata palustris latifolia.

Serapias palustris latifolia, Lob. Ger.

Satyrium basilicum foliosum, vel 3. Dod.

Satyrium basilicum mas latifolium 1. Thal.

Cynoforchis palustris platyphylla, Gemmæ, Lugd.

Palma Christi palustris, Franco 3. Tab.

Satyrium latifolium, Svvert. du Bry.

Palma Christi flore purpureo, Eyst.

XIII. Orchis palmata palustris altera.

Serapias palustris altera leptophylla, Lobel. Lugd.

Cynoforchis palustris altera, Gem. & Ger.

Testiculus galericulatus, Tab.

XIV. Orchis palmata palustris tertia.

Cynoforchis palustris lævi folio, Lob.

Cynoforchis leptophylla, Gem. Lugd.

Palma Christi palustris 2. Tab.

Serapias palustris latifolia, Ger.

XV. Orchis palmata palustris maculata.

Cynoforchis palustris altera lophodes, vel nephelodes, Gem. Lob. Lugd.

Palma Christi palustris 1. Tab. Ger.

XVI. Orchis palmata palustris tota rubra.

Cynoforchis Dracontias, Gem. Lob. Lugd.

Tragorchis, Tab. ico.

Serapias palustris leptophylla, Ger. ico.

XVII. Orchis palmata flore viridi: quæ 8. in Prod.

XVIII. Orchis palmata montana maxima: quæ 9. in Prod.

XIX. Orchis palmata montana altera.

Serapias montana folio lævi, & Cynoforchis montana, Lob.

Serapias maxima folio lævi, Gem. Lugd.

Serapias mont. Tab. Serap. garyophyll. Ger. ico.

XX. Orchis palmata montana maculata.

Cynoforchis mont. folio matuloso, Gem.

Serapias candido flore (montana) Lob. Lugd. Ger.

Palma Christi major, Cast.

Palma Christi maculata montana, Tab.

Satyrium folijs maculatis, Svvert.

XXI. Orchis palmata angustifolia alpina nigro flore.

Satyrium basilicum alpinum, Gef. hor.

Satyrium basilicum odoratiss. Gef. cat.

Satyrium basilicum minus, Dod.

Palma Christi minor, Matth. Lugd. Franco. Cast. descript.

Orchis minor odoratus, Ad.

Palma Christi minor femina, Tab.

Orchis serapias odoratiss. flore minima alpina, Cam.

ORCHIS ABORTIVA.

I. Orchis abortiva fusca.

Coagulum terræ Plinij quibusdam.

Satyrium nonum, Trag.

Orobanchæ, Gef. col.

Orchis sylvestris, Lon.

Neottia, Dod. Franco.

Nidus avis, Dod. gal. Lob. ico. Lugd. Eyst.

Satyrium abortivum (spec. Hypocistidis) Lob. ico. part. alt. & Ger.

Orchis abortiva Lobelij, Clus. hist. an Orobanchæ prima, Tab.

II. Orchis abortiva violacea.

L. modoron Austriacum, Clus. pan.

Pseudolimodoron, Eidem hist.

OPHRIS.

AD Orchides propter florum formam referenda videtur Ophris à Plinio lib. 6. cap. 15. nominata, quam vocem aliqui Supercilium reddunt.

I. Ophris

I. Ophris bifolia.

Perfoliata sylvestris mas, Brunf.
 Satyrium ro. & bifolium, Trag.
 Alisma, Cord. Gef. hort.
 Ophris, Matth. Fuch. Ang. Gef. cat. Cast. Tab.
 Cam. Cæf. Thal. Franc.
 Bifolium, Dod. gal. Ad. Lob. Lon. Cam.
 Pseudorchis seu bifolium, Dod.
 Ophris bifolia, Ger.

Est major & minor, tam in hac, quam in trifolia.

II. Ophris trifolia.

Perfoliata sylvestris foemina, Brunf.
 Ophris trifolia, Tab. Ger.

III. Ophris bifolia bulbosa.

Pseudorchis, seu Bifol. bulbosa, Dod. ed. Belg.
 & post.

IV. Ophris minima: in Prod. descripta.

an Ophris pumilum & tenellum genus, Clus.
 cur. post.

DENS CANIS.

I. Dens canis latiore rotundioreque folio.

Mithridatium Cratevæ Plinij. Ang. Cæf.
 Pseudohermodylus, Matth. Lugd. Tab.
 Hermodylus Mesuæi, folio maculoso, &

Dens canis, Gefn. hort.

Satyrium erythronium, Gef. col. Ad. Lob. ico.
 Taber.

Dens caninus, Dod. (Ephemerio Diosc. conveniens) Cæf. Cam. Ger.

Dentali 1. Clus. pan.

Dens caninus purpurascens flore, Clus. hist.

Satyrium & Dens caninus, Lob.

Satyrium rubrum Dalech. Lugd.

Dens canis flore rubro, Eyst.

Flos ex purpura rubet, aut candore micat,

aut purpura ex candore confusus pallet: qui flore rubro est, maculis rubris: qui albo, lacteis

maculis variegatur: sic folia aliquando macu-

lata, aliquando ijs carent: & communiter bina

habet: tantum bina, Cæsalp. plurimum terna,

Advers. raro terna, Clus. quina etiam, Lugd.

II. Dens canis angustiore longiore folio.

Erythronium flore albo angustioribus folijs,

Lob. ico.

Dentali 2. Clus. pan.

Dens caninus albo flore, Clus. hist. Cam. Eyst.

Satyrium trifolium & Satyrium Dalech. Lugd.

Flos lacteus, aut ex purpurascens alboque

mixtus.

OROBANCHE.

Oροβάνχη, *Ervangina Gazæ, quod οροβάνχη, ervum strangulet, dicitur. Duplex est, aliud Theophrasti 8. hist. 3. aliud Dioscoridis l. 2. c. 172. & Orobanchè Plin. l. 18. c. 17. & l. 22. c. ult. nominatur.*

I. Orobanchè major garyophyllum olens.

Limodorum (quasi famem adferens) Theophrasto.

Orobanchè, Dioscorid. Galen. Oribas. Æginet. Aërio.

Cynomorion, à canini genitalis similitudine, Plinio.

Leonina herba, Hermolao, & Legumen leoninum, Ruel.

Leoherba, Constantino.

Orobanchè, Matth. Ama. (herba tauri, vel vaccae) Ang. Cord. in Diosc. Lac. Gef. cat. (Leontobotanos) Lon. Lob. Cast. Thal. Cæf. Eyst.

Orobanchè vera, Gef. hort.

Limodorum, five Orobanchè, Dod.

Orobanchè 1. Clus. hist. altera, Lugd. Tab.

Rapum genistæ, Dod. gal. Ger.

Variat: quæ genistæ vulgari adnascitur, flore est subviridi: quæ Hispanicæ, floribus majoribus luteis.

Hæc semper alicujus vicinæ plantæ fibris adnascitur: observavi ad Genistam, florem tinctorum, Hieracium Sabaudum, Trifolium, Astragalum sylvaticum.

II. Orobanchè flore majore, ex cæruleo purpurascens: quæ 1. in Prod.

III. Orobanchè Monspeliciæ floribus oblongis.

Orobanchè major, Lob. ico.

Limodorum Monspelicium, Clus. pan.

IV. Oro-

IV. Orobanche majore flore.

Orobanche quarta, Lob. ico.

Orobanche, Eyfster.

V. Orobanche quæ Hypopytis dici potest: quæ 3. in Prod.

VI. Orobanche ramosa.

Orobanchæ f. Lob. ico.

Orobanche altera brevior & ramosa, Cæs.

Orobanche, Cam. ad Matth.

Orobanchæ 3. *polinatus*, Clus. hist.

Variat: floribus aliquando cæruleis, aliquando purpurascens, aliquando subalbidis, & libenter inter Cannabem nascitur.

VII. Orobanche radice dentata major.

Dentaria major, Matth. Lob. Lugd. Cam. Franco, Ger. Eyfster.

Anblatum (id est aphyllon, quod folijs caret)

Cord. hist. Dodon. (& radix squamata) Thal. Squamatia, Lon.

Dentaria major, five *δραμα* 1. Clus. pan. & hist.

Dentaria absque folijs, Cast.

Dentaria crocodilia, Tab.

Arachidum è genere Orobanches, Cæs.

Egoethros Plinij, malus Henricus vinitoribus, Gef. in hist. bovis & col.

VIII. Orobanche radice dentata minor.

Dentaria *δραμα* 2. altera, seu min. Clus. pan. & hist. an Anblati species minor, Thal.

Clusius, suæ flores ex albo purpurascens tribuit: Thalius, candidam totam scribit.

IX. Orobanche radice coralloide.

Dentaria *δραμα* 3. Clus. pan.

Dentaria coralloide radice, Clus. hist. Eyfster.

Dentaria minor, Ger. aphyllon minor, Tab.



CASPA

CASPARI BAUHINI
PINACIS THEATRI BOTANICI
LIBER TERTIVS.
OLERA ET OLERACEA.
SECTIO PRIMA.

RAPA: RADICES INDIS EDVLES: RAPVNCV-
lus: Campanula: Rapiſtrum: Napus: Raphanus: Lepidium: Ibe-
ris: Dracunculus eſculentus: Eruca: Sinapi: Rheſeda: Luteo-
la: Eryſimum: Hydropiper, ſive Perſicaria: Capſi-
cum, ſive Piper Indicum.

RAPA ET EJUS SPECIES.

Rapa, quaſi ruapa, quòd è terra eruatur, Varroni l.4. ling. Lat. at verifimilius à Græco
ῥάπης, Athenæo l. 9. c. 2. ῥαπῖς, Dioſcoridi l.2. c.134. à rotunda orbicularive radicis
figura. Genera: Theoph. l.7. hiſt. 4. ait alios diverſitatem generis putare, alios negare, ſed mare
tantum feminag. diſſere, & ambas ex eodem ſemine naſci, ſed ut effæminentur raras de-
ponendas: nam ſi denſa poſita ſint, omnes maſculeſcere: at 7. hiſt. 6. Rapa ſylveſtris meminit.
Sic Dioſcorides, ſativum & ſylveſtre agnoſcit. Plin. l.18. c.13. Græcos ſecutus, duo prima fecit
genera, maſculum, femineumq; & modum eas ſerendi ex eodem ſemine. Species verò omni-
um tres (addit) aut in latitudinem fundi, aut in rotunditatem globari; tertiam ſpeciem
ſylveſtrem appellavere, in longitudinem radice procurrente: & l.19. c.5. Medici, maſculini
ſexus faciunt in his rotunda: latiora verò concava feminini.

Dividimus in ſativam & ſylveſtrem: illam in longam & rotundam, ſive ſaminam
& marem: rotundam, in ſeſilem & orbiculatam. Raparum ſolum in India tam ſerax
eſt, ut ea in vijs quog. publicis ſponte proveniant: ita ut cum Indi in nonnullis locis agros
frugibus conſtituri eſſent, propter ingentem Raparum propaginem, ab inſtituto ipſis deſiſten-
dum fuerit: Joſeph. Acoſta l.4. c.18.

I. Rapa ſativa rotunda.

Rapa mas, Theoph. Plinij: Rapum, Dioſcorid.
Rapa ſativa, Brunf. Cord.
Rapum ſativum, Fuch. Ruel. vulgare, Trag. Dod.
Rapum vel Rapa, Ang. Tur. Lac. Gef. hōr. Caſt.
Rapum rotundum, Matth. Lon. Ama.
Rapum ſeſili rotunditate, Caſ.

Rapum majus orbiculat. ſeu turbinat. ad. Lob.
Rapum ſativum orbiculatum, Lugd.
Rapum orbiculatum, Franco, Taber.
Rapum rotundum, utrumque majus & minus,
Taber.
Rapum majus & minus rotundum, Ger. atro-
tundum Rapum utrumq; ſub Buniade.

M

Variat

Variat colore externo radicis, viridi, candido, puniceo, obsoleto nigricante: habentur aliquando in Alfatia, quæ foris & intus flavescent: magnitudine & parvitate, Plinius & Tragus 40. Amatus verò 50. & 60. libras excedentes viderunt: communiter forma tuberosa, raro globi instar orbiculata, frequentius in latitudinem effusa.

II. Rapa sativa oblonga, seu scemina.
Rapa scemina, Theoph. & Plinio.
Rapum oblongum, Trag. oblongius, Dod.

Rapum longum, Matth. Lon. Cast. Lugd. Franc. Tab. qui majus & minus facit: utrumque sub Raphano sativo Gerardus habet.

Rapum tereti, rotunda, oblongaque radice, Ad. Lobel.

Rapa oblonga, Ama. Cæf.

Aliquando cubitalis, rarius sesquicubitalis est: sic 30. librarum Matthioli notavit.

III. Rapa sylvestris: & Cæf.

Rapum sylvestre, Matth. Lugd. Rab. Ger.

Rapum sylvestre non bulboium, Ad. Lob.

RADICES VARIÆ, QVIBVS INDI vescuntur & utuntur.

Quemadmodum varijs fructibus ob insignem arborum fructiferarum varietatem vescimur: sic in India Occidentali, varijs radicibus in cibis utuntur. Quare Josephus Acofta lib. 4. c. 18. vel par. 9. Ind. Occid. recenset, Papas (de qua inter Solana agemus, Solani tuberosi esculenti nomine) quæ ipsis præcipua est, Manihot, Ocas, Yanocas, Camotes, Batates, Xiquimas, Yuca, Cochuchos, Cavi, Torora, Mani: addens & alias infinitas esse, & inter cæteras Batates, quæ instar cibi delicati & suavisissimi comeduntur. Sic etiam radices ex Hispania ad Indos delatas magis propagari, quam Indicas, si in Europam deferantur. Et Ulricus Faber, ut in par. 7. Amer. cap. 9. habetur, apud Carios Indiae populos, Triticum Turcicum, vel Meijs & Mandeochade, Padades, Mandeoch parpij, Mande poere, Manduris, VVache Ku, &c. invenisse refert.

I. Rapum Americanum folijs Bryoniae.
an Oetum Plinij l. 21. cap. 15. mandunt (scilicet Aegyptij) & Oetum, cui pauca folia minimaq; verum radix magna.

οὐρίον (alii ὄριον legunt) sive Vingum ut Gaza reddit, Theophr. l. 1. c. 11. quod Aegyptij Vingum appellant, folia habet ampla & germen pusillum, sed radix longa & in modum fructus, & cibo idonea.

Hetich Indis & Aethiopibus, Dalech. in Plinium.

Hetich Americanum Theveti, Lugd. Lerio desc. Bras. c. 12.

Radix rapis magnis similis, longitudine sesquipedali, crassitudine amborum pugnorum: cujus tres species Lerijs censet: nam inter coquendum alia violaceum, seu pastinacæ: alia aureum, ut coronea mala: alia denique album colorem acquirit.

II. Rapum Brasilianum, sive Americanum alterum.

Igname in Insula S. Thomæ, Scalig. Lugd.

Ignames, Advers.

Iniamos in Guinea cibus Negritarum vulgarissimus, quo & panis loco utuntur: par. 6. Ind. Or. c. 38. & 57. & Linscot. par. 4. Or. c. 11.

Ingnamos, par. 6. Ind. Or. c. 12. & 23.

Inhame Lusitanorum, sive Igname, Clus. hist. & notis in Garzi.

Tres species propter medullæ colorem: arlutea, Carotæ colore in pretio est: magnitudine etiam variat: ac Clusius duplex genus agnoscit.

Alterum à priore differens cortice inequali & tuberculis obsita, cum viticulis spinosis, quam Ycam Peru nominant.

III. Mandioca: radix in Insula S. Catharinæ: hist. Brasil. sive par. 3. Amer. c. 4. 9. 11 15. 17.

IV. Manihot Indorum, sive Yuca folijs canabinis.

Arachidna, Theoph. & Aracidna Plin. quibusd. Manihot, Theuero, Lugd. Lerio desc. Bras. c. 8.

Yuca, Gomara. hist. gen. Lugd. Joseph. Acoftæ l. 4. c. 17.

Yuca

Yuca Peruana, Frag.

Jucca, Benzoni, l. i. c. 28. vel par. 4. Ind. occid.

Mandechade radix apud Carios: par. 7. Am. 7.

Mandioca: par. 3. Amer. l. i. c. 4. 9. 17.

Cocushavv, Harior in Virginea.

Hujus folium latum in septem lacineas di-

visum esse scribunt: at radix brachij crassitie,

ex qua Indi farinam conficiunt, (par. 2. & 3.

Amer.) qua cum carne & piscibus, ut nos pane

utuntur: ex ea & placentas & panem confi-

ciunt, quem Cazabis, Benzo: at Monardes &

Acofta, Cacavi nominant: sic in Hispaniola

ex hac secundarium panem, quem Cazabi

vocant, conficiunt, (par. 5. Ind. occid. 12.) ex

hujus succo potionem parant: par. 3. Amer.

lib. 2. cap. 15.

Huc referre oportet

Maniel folijs pœoniæ; par. 3. Am. ep. 2. de Bras.

V. Hatle radix in Florida, ex cujus farina

in annonæ penuria panis fit: par. 2. Amer.

VI. Aypi Brasilianorum, radix sesquie-

palis, femoris crassitudine, ex qua farinam du-

plicem conficiunt: aliam percoctam & duram,

quo diutius conservetur: aliam minus coctam

& molliorem, panis candidi medullæ saporem

referens: illam Ovy-entan, hanc Ovy-pou ap-

pellant folijs pœoniæ similitudine: Lerio de-

script. Brasil. sive par. 3. Amer. c. 8.

VII. Yuca folijs Aloës.

Yuca, Gerardo.

Yuca nova gloriose elata & opinata, Lob. ad

altera parte.

VIII. Batatas, Camotes Hispanorum, Cluf.

hisp. & hist. Lugd. Cast.

Battades, Ad.

Batata Hispanorum, Camotes sive Amotes &

Ignames, Lob.

Batatas Indiæ occid. Benzoni, Monard.

Potates & Potate, quas Camotes nominant:

par. 8. Ind. occid.

Camotes, Joseph. Acoftæ, lib. 4. cap. 18. Frag.

Batates radix: par. 9. Ind. occid. l. 4. c. 18. cibus

Nigritarum vulgaris: par. 6. Ind. orient. 38.

Batatas fructus in Angra; Lincot. par. 7. Ind.

orient. 6. & par. 4. cap. 12. & par. 8. & par. 9.

addit. Ind. occid.

Pina sive Batata radix: par. 8. Ind. occid.

Sisfarum Peruvianum, Tab. Ger.

Radix Raphani prægrandis amplitudine:

genera tria, corticis colore vel purpurascen-

te, vel pallente, vel candido, quæ allata fructuum,

vel leguminum loco Indis est.

IX. Hajas Indiæ occident. similis Batate,

nisi quod minor & suavior sit: Benzoni. sive

par. 4. Amer. cap. 28.

Aies, Clusio.

X. Cochucho, radix parva, dulcis, quam

aliqui, quo magis in delitijs sit, condiunt: Jo-

seph. Acoft. lib. 4. cap. 18.

XI. Xiquimas, radix qua æstate utuntur ad

refrigerandum sitimque sedandam: Idem, l. c.

XII. Mandech parpie, radix Castanea-

rum sapore: par. 7. Ind. occid. 7.

XIII. Mandech Mandapore, radix ex qua

vinum conficiunt, l. c.

XIV. Bacheku radix: par. 7. Ind. occid. c. 18.

XV. Mandues, Carios populi edunt par. 7.

Ind. occid.

XVI. Mandepore: apud Siberos radix su-

pra terram eminens amplissimis folijs, quæ

aquam continet, non secus ac si in vase asserva-

retur, & ex radice sæpe dimidius cantharus

exprimitur, qui colorem lactis habet, par. 7.

Ind. occid. cap. 26. etiam ex hac radice vinum

conficiunt: Idem cap. 7.

XVII. Cardes radix, qua Indi ad levan-

dam sitim utuntur: par. 7. Ind. occid. c. 3 & 21.

XVIII. Cassavi radix: par. 8. Ind. occid.

XIX. Tagari, radix in Naupon pro lavan-

do corpore: par. 4. Ind. orient. cap. 8.

RADICES VARIE IN INSVLA

Virginea.

Radices quarum in Insula Virginea pro cibus usus est, Thomas Harior recenset, & sunt
Opinavvk, Okcepenauk, Koishucpenauk, Tsinavv, Cocushavv, Habacon.

I. Opinavvk; idem cum Papas Acofte, quod scibus in panis penuria comedunt: Harior.

Solanum tuberosum esculentum nominamus. III. Koishucpenauk; radix alba, ovi gal-

linacei magnitudine & forma, qua elixa ve-

mani magnitudine, quam cum carnibus & pi-

M 2

IV. Tfi-

IV. Tfinavv; radix, Chinæ similis, ex cuius succo cum aqua, panis pinfitur, & puls, gelatinæ similis, conficitur, Hariot.

V. Cocuschavv, Hariot; est Manihot

Indorum, de quo antè.

VI. Habafcon; radix magnitudine & figura pastinacæ, quæ cum alijs coquitur! Hariot.

RAPUNCULUS ET CAMPANULA GLABRA.

Rapunculus vulgò dictus, γογγόλη ἀγρία, rapum sylvest. Dioscoridis, lib. 2. cap. 13 s. male censetur: & à Plinio lib. 20. cap. 3. Rapi sylvestris nomine proponitur. Alijs f. asione ejusdem, l. 22. c. 22. creditur, cujus tamen verba, ut quidam censent, rectius ad Smilacem levem referuntur. Erinus Nicandri & Dioscorid. l. 4. Erineon Plinij, l. 23. c. 7. ex Columnæ sententia. In hanc Classsem & Campanule, à floris forma nominatæ, referenda sunt.

I. Rapunculus esculentus.

Raponeoli, Brunf.

Rapunculum vulgare, Trag.

Rapunculus, Matthiol. Lac. Dod. Camer. Tab.

Cast. Cæs. Portæ.

Rapum sylvestre, Gef. hort. Fuch. Dod. gal.

Rapuntium parvum, Ad. Lob. (& pes locustæ Avicennæ) Ger.

Rapunculus minor, Matth. & Dodonæi, Lugd.

Erinus Nicandri & Diosc. Colum.

Flore est cæruleo, purpureo, aliàs candidante.

II. Rapunculus minor folijs incisif.

Erinus, Cæsalp.

Erini seu Rapunculi minimum genus, Colum.

III. Rapunculus spicatus.

Rapunculum sylvestre, Trag. Lon.

Rapi syl. genus, in syl. & mont. Gef. hor.

Rapum sylvestre majus, Dod. gal.

Rapunculum alopecuron & Rapi sylvestris 6. genus, Dod.

Rapuntium majus alopecuron comofo flore, Ad. Lob.

Rapunculus alopecuroides longa spica, Clus. hist.

Rapunculus syl. spicatus, Thal.

Rapunculus major Dodonæi, Lugd.

Phyteuma folijs Rapunculi, Cæsalp.

Rapunculus flore spicato purpureo & albo, Camer.

Rapunculus nemorosus primus, Tab.

Rapuntium majus, Ger.

Spica vel longior, vel brevior alba, vel cinericea; hæcque variat folijs modo maculis nigris ad umbilicum notatis, & marem; modo non maculatis, & fœminam dicunt; est & coloris violacei elegantis & saturi.

IV. Rapunculus folio oblongo spicâ orbiculari.

Rapunculus Alopecuroides orbiculari penè spica, Clus. hist.

Rapuntium corniculatum montanum, Colum. Spicâ est orbiculari; folijs etiam variat.

V. Rapunculus scabiosæ capitulo cæruleo.

Scabiosæ 3. genus sive ovium, Dodon. gal. Gef. hort.

Scabiosa minor, Dodon. ico. 3. descript. minor 5. Tab.

Scabiosa media servato angustifolio flore globulariæ, Ad.

Scabiosa media, Lob. Lugd.

Scabiosa ovilla, Cam.

Aphyllantes 1. Theoph. Lugd.

Rapuntium alterum leptophyllon capitatum, Colum.

Scabiosa syl. minor cærulea, Eyft.

Caulis habet 5. 7. etiam 30. flores cæruleos; rariùs albos: folia aliquando crenata, aliquando solum hirsuta.

Huc pertinet:

Rapunculus syl. spicatus cæruleus, Thal.

VI. Rapunculus umbellatus Sonchi folio.

Rapunculus Sonchi folio, Clus. hist.

VII. Rapunculus umbellatus latifolius.

Rapunculus syl. cæruleus umbellatus minor, Thal.

Rapunculus syl. umbellatus 2. Cam.

VIII. Rapunculus umbellatus angustifol.

Rapunculus syl. cæruleus umbellatus major, Thal.

Rapunculus syl. umbellatus 1. Cam.

IX. Rapunculus umbellatus foliogramineo.

Rapunculus syl. umbellatus 3. Camer. ico. ad. Thal.

Rapuna-

Rapuntium alterum angustifolium alpinum, Colum.

X. Rapunculus perficifolius magno flore. Phyteuma, Matth. Lugd. Cam. Cæs.

Campanula cærulea fativa, Dodon. gal. sive hortens. Lugd.

Campanula media, Dod.

Campanula hortensis perficæfolia lacticiniosa flore volubilis, Ad.

Campanula Perficæfolia, Lob. Clus. hist. Ger.

Rapunculus campanulatus Nerijfolius 1. Thal.

Campanula angustifolia, Tab.

Flore est cæruleo, aliquando albo, & sub Campanula alba & cærulea perficifolia, Eyft.

XI. Rapunculus nemorosus angustifolius magno flore major.

Rapunculus nemorosus 2. Tab. nemorosus, Ger.

Rapunculus campanulatus Nerijfolius 3. Thal.

Rapunculus syl. major, Eyft.

XII. Rapunculus nemorosus magno flore minor.

Rapuntium sive Erinus magno flore, Colum.

XIII. Rapunculus nemorosus angustifol.

parvo flore.

Rapunculus nemorosus 3. Tab.

Campanula lutea linifolia, Ger. ico.

XIV. Rapunculus hort. latiore folio seu

Pyramidalis.

Campanula major, Dodon. major lactescens, Lob. Lugd.

Campanula lactescens foetidior, Clus. hist.

Pyramidalis, Cast. Lugd. Lutetiana, Eyft.

Campana Pyramidalis, Cam.

Campanula lactaria, Tab.

Campanula lactescens pyramidalis, Ger.

Folio est oblongo, quandoque subrotundo.

XV. Rapunculus Creticus, seu Pyrami-

dalis altera.

Petromarula seu lactuca petræa Cretica Belli,

Ponæ: & apud Clus. in epist. 1. Belli. Petramarula, Rapunculus Creticus, Imperato.

XVI. Rapunculus alpinus, seu pyramida-

lis minor: qui 1. in Prod.

an Campanula, folijs ferratis cærulea, Eyft.

XVII. Rapunculus alpinus corniculatus,

quem sub Rapunculo alpino spicato simili, in

Phytopinace & Matthiolo, & 2. in Prod. de-

scripsimus.

Trachelium petræum minus, Ponæ.

Rapuntio corniculato affinis, Colum.

XVIII. Campanula alpina latifolia flore pullo.

Rapunculi alpini latifolij nomine, Doct. Burserus ex Austria misit; sub 3. in Prod.

XIX. Campanula alpina linifolia cærulea: in Phytopin. sub. 3. in Prod. sub. 4. descripsimus, quæ cum sequenti minimè confundenda.

XX. Campanula minor rotundifolia vulgaris.

Rapi syl. genus minus, quod Campan. cærulea, agrestis, Gef. hor.

Campanula sylvestris minima, Dod.

Campanula minor, Ad. (Clus. hist. solo nomine) sive minor rotundifolia, Lob. Lugd.

Campanula minor alpina rotundioribus imis folijs, Clus. hist. ico.

Rapunculus campanulatus linifolius seu 7.

Thal.

Rapunculus sylvestris minor, Tab.

Campanula rotundifolia, Ger.

Rapuncula minor sylvestris flore cæruleo,

Eyftett.

Floribus communiter cæruleis, subinde

candidis.

XXI. Campanula minor rotundifolia flore in summis cauliculis.

Rapunculus sylvestris flore ex purpureo candicante, Tab.

Rapunculus sylvestris flore albo, Eidem.

Rapunculus sylvestris minor, Eyft.

Campanula minor alba: & purpurea, Ger.

XXII. Campanula minor rotundifolia alpina.

Campanula minor alpina, Clus. pan. & hist.

descrip.

Phyteuma alterum montanum, Cæs.

Flos nunc cæruleus, nunc purpureus, aut

violaceus, modò colore dilutiore, & quasi cinereo, interdum niveo.

XXIII. Campanula rotundifolia minima: Cantabrica Plinij, Ang.

In Phytop. & in Prod. sub. 5. descripta.

XXIV. Campanula Cymbalaria folijs, vell

folio hederaceo: in Phytop. & in Prod. pro 6. descripta.

XXV. Campanula serpillifolia.

In Phytopinace, & in Prod. pro 7. descripta.

TRACHELIVM SIVE CAMPA-

nula hirsuta.

T *Trachelium dicitur, quod in colli affectibus commendetur; hinc Cervicaria, imò & Uvularia: & à forma, Campanula.*

I. Campanula maxima folijs latissimis.

Trachelium majus Belgarum, Lob. (& Trachelium majus Anglicum septentrionale candidum, Eid.) Clus. hist.

Hæc instar suffruticis est & perennis, florum colore varians, albo, cæruleo, & etiam cinereo.

II. Campanula hortensis Rapunculi radice.

Trachelium in maritimis, Ad.

Trachelij genus molliorib. fol. Clus. pan. & hist.

Cervicaria 4. Dod. major syl. Eyft.

III. Campanula folijs subrotundis: pro campanula hirsuta prima in Prod. describitur.

IV. Campanula hortensis folio & fl. oblongo.

Medium, Matth. Ges. hor. vulgare, Cam.

Viola Mariana, Ges. hor. Ad. Lob. Dod. cui &

Rapum syl. Diosc. Lugd. Clus. hist. Tab. alba

& purpurea, & Ger.

Rapunculi alterum genus grandius, Cæs.

Flore est communiter cæruleo, est & purpureo, subalbido & lacteo: hinc figuræ quatuor apud Eyft.

Medium fl. albo: cæruleo: purpureo & argenteo. (flore pleno reperiri asserunt.)

V. Viola mariana laciniatis folijs peregrina. Medium Dioscor. vel Mindium Rhafis, Rauvolf. in Itin. & Lugd. & Cam. in Matth.

VI. Campanula Drabæ minoris folijs; est

Campanula hirsuta, 2. in Prod.

VII. Campanula vulgator folijs urticæ,

vel major & asperior.

Uvularia major, Trag.

Campanula, Ang. major, Fuch.

Trachelium majus, Dod. gal. Lugd. Ger.

Cervicaria, Lon. & Digitalis purp. altera, Eid.

Cervicaria major, Dod. Tab.

Trachelium sive Cervicaria, Ad. Lob.

Trachelium folijs urticæ, Clus. pan. sive vul-

gare, Clus. hist.

Archangelica, Cæs.

Rapi syl. genus majus folijs ferè urticæ, Ges.

hort.

Cervicaria maxima, Thal.

Flore est communiter subcæruleo, est dilute

purpureo, est & candido; tota planta strigosior reperitur, hinc tres figuræ apud Tabernæmontanum & Gerardum: & apud Eyft. duæ,

Cervicaria hortensis flore cæruleo.

Cervicaria hortensis flore albo.

VIII. Campanula urticæ folijs oblongis

minus asperis.

Cervicaria major altera, Dod.

IX. Campanula media folijs inferius can-

dida lanugine vestitis.

Cervicaria media, Thal.

X. Campanula folijs Echij.

Cervicaria major tenuifolia, Thal.

Trachelium *buguoides* Clusij, ipsi Cam.

XI. Campanula folijs Echij floribus villo-

sis: quæ 3. in Prod.

XII. Campanula folijs Anchusæ floribus

oblongis.

Trachelium montanum, Lugd.

XIII. Campanula alpina pumila lanugi-

nosa.

Trachelium pumilum alp. Clus. pan. & hist.

XIV. Trachelium saxatile folijs pulmo-

narie Gallorum.

Pyramidalis villosa saxatilis latifolia, vel Ra-

punculus montanus pulmonarie Gallorum

folio & Trachelij flore, Clus. cur. post.

XV. Campanula alpina sphaerocephalos.

Trachelium majus petraeum, Pona.

XVI. Campanula Alpina Tragopogi folio.

Trachelium montanum, Colum.

Trachelium Tragopogi folijs, Clus. hist.

XVII. Campanula pratensis flore conglo-

merato.

Uvularia exigua, Trag.

Rapi syl. genus, Uvularia in pratis, Ges. hort.

Trachelium minus, Dod. gal. Ad. Lob. Clus.

hist. Lugd. Ger.

Cervicaria tertia, sive minor, Dod.

Cervicaria minor, Thal. Tab.

Duplex est: alteri flores in summo caule

confertim in orbem nascuntur: ijque vel ma-

jores, vel minores: alteri singulares per caulem

sparguntur, &

Cervi-

Cervicaria sphaerocephalos duplex, Clus. hist.
XVIII. Trachelium Gignanteum &
XIX. Viola Calathiana, apud Gerard. quid?

XX. Cervicaria Valerianoides cærulea.
Trachelium umbelliferum cæruleum, Ponæ
Ital.

RAPISTRVM.

Rapistrum, à similitudine cum Rapa folijs dictum viderur: unde quibusdam Rapa syl.
altera nominatur: alij Erysimum Theoph. censent: alij ad Sinapi: alij ad Lampsanam
referunt, & recte, cuius Dioscorides lib. 2. c. 142. inter olera sine descriptione meminit. Et Plin.
l. 20. c. 9. inter syl. Brassica & Lampšana est, pedalis altitudinis, hirsutis folijs, napi similibus
nisi candidior esset flore.

I. Rapistrum flore luteo.

Rapistrum, Brunf. Dod. Gef. hor.

Rapistrum arborum, Ad. Lob. & Thal.

Sinapi agreste quartum, Trag.

Irion, Fuch. Corn. Cord. Tur. sive Erysimum,
Dod. gal. Cam. ep. Cast.

Lampšana, Matth. (quibusdam etiam Irion e-
jusdem) Gef. hort. Ang. Lugd. Lon. Ger.

Lampšana vera, Lugd. floremelino, Tab.

Rapa sylvestris altera, Cæs.

Folij aliquando incis, vel sinuatis: ali-
quando minime: hinc quidam duas species
faciunt.

II. Rapistrum flore albo filiqua articulata.

Sinapi agreste tertium, sive Lampšana vete-
rum, Trag.

Lampšana, Tur. Cæs.

Rapistrum flore albo Erucae folijs, Lob. ico.

Armoracia, quibusdam Rapistrum album, Tab.

Raphanus sylvestris, Ger. ico.

Rapistrum purpureum, Tab. arborum, Ger.

Flore est albo, subcæruleo, aliquando pur-
purascete.

III. Rapistrum flore albo lincis nigris de-
picto.

Lampšana Apula, Plinij & Dioscoridis, Colum.

IV. Rapistrum floribus Leucoij marini: hoc

1. est in Prod.

V. Rapistrum Italicum filiquis longissimis.

Rapistrum montanum sive sylvestre Irionis fo-
lio, Colum.

VI. Rapistrum monospermon.

In Phytopinace & Matthiolo: & in Prodr.
pro secundo descripsimus.

NAPVS.

Boniad, Dioscoridi l. 2. cap. 136. significatione à tumente figura deducta, quare Rapis, hoc
nomen magis competere, sunt qui velint: γογγύλις species Galeno.

Differentias duas & in Medicina Græcos servare, Plinius l. 20. c. 4. scribit, alterum Bu-
nion, alterum Buniada vocantes: sunt qui Buniaden, Napum sylvestrem esse velint. At l. 19.
c. 5. Naporum genera quinq. facit, ubi legendum est Raphanorum, cum ex Theophrasto 7 hist. 4.
desumpta sint, ubi τὸν παρὰ τοὺς ὄνους genera quatuor dicit.

I. Napus sativa.

Napus, Brunf. Ang. Matth. Tur. Gef. hort. Dod.

Iac. Cord. in Diosc. Cast. Cam. Lon. cui prima.

Rapum sativum alterum & Napus veterum,

Trag.

Napus Bunias sativus, Fuch. Lugd.

Bunias sive Napus, Ad. Lob. Ger. def.

Radix colore albo, vel luteo, sive buxeo est; ra-
rius nigro.

II. Napus sylvestris.

Rapum sylvestre, Trag.

Napus agrestis, Tur. sylv. Dod. Lugdun. cui &
Bunias.

Bunium & Napus sylv. Ad.

Napus Bunias sylvestris, Fuch.

Napus 2. Lon. Bunias sylv. Lob. ico.

an Napum sylv. Cæs.

Nascitur etiam ex non transplantatorum se-
mine.

III. Napus syl. Cretica: in Prod. descripta.

RAPHA.

RAPHANVS.

PΑΡΑΝΙΣ (quasi radix perspicua) Dioscoridi l.2. c.137. Posteribus dicitur παρὰνις, παρὰνις παρὰνις, quia satum statim oriatur. Theophrastus utrag. voce usus quidem est, sed quem Raphanum vocamus, ipse παρὰνις appellavit: at παρὰνις, ipsam Brassicam nominavit: quae causa erroris fuit Plinio, dum l.19. c.15. scribit, Græcos Raphani genera tria fecisse, foliorum differentia, &c. quæ de Brassica intelligenda, cum ex Theoph. 7. hist. 4. desumpta sint. Latinis radix (παρὰνις Theophr.) quod ceteras amplitudine corporis superet, vel quam paucissimis magnitudine cedat: siquidem in frigidis locis, quibus gaudet, sicuti in Germania, infantium puerorum magnitudinem æquet. l.19. c.5. teste. Sic in regno Congiano, crassitudine humane tibia, gratiæ, saporis sponte provenire, Pigafettus in ejus regni descript. l. & cap.1. testatur: alias copiosissime in India provenire, assertit Linsc. part.4. Ind. Orient. 10. part. 7. cap.19. & part.8.

Genera duo Dioscoridi, sativum & sylvestre: at Theoph. sex, Corinthium, Cleonæum, Lithalassium, Exorium, & genus quod folijs eruce simili constat: hac Theophrasti, Plin. l.19. c.5. Naporum nomine recenset, posterius genus sylvestre statuens: at ibidem, ex Romanorum sententia, inquit, nostri Raphani alia fecere genera, Algidenis à loco, longum atq. translucidum: alterum Rapi figura, quod vocant Syriacum, suavissimum ferè ac tenerimum, &c. etiamnum subjungit, unum sylvestre, Græci agrion vocant, nostri Armoraciam.

Quare observavimus alium præcozem, serotinum alium: præcox, corpore est oblongo, gracili, semine majore, in quod facile abit. Serotinus albus, qui vel oblongus, vel orbicularis: niger, qui rotundus, rarius oblongus, siliquis quidem majoribus, sed semine minore: ruber, oblongus, cortice rubro, fibris nonnullis rubentibus, per substantiam dispersis. Radice lutea Cameraarius notavit: meminit & Byzantini. semine Constantinopoli accepto, qui postea in communem degeneravit, radice penitus languescente.

I. Raphanus major orbicularis, vel rotundus.

Raphanus, Brunf. Trag. Ang. Cord. in Diosc.
Raphanus vulgaris, Gef. hort. primus, Matth.
Raphanus magnus, Ad. & Lob. sive Radicula
fativa, Dod.

Raphanus sativus, Fuch. Lac. Cast. Lugd.

Raphanus rotundus, Lon. Tab. & orbiculatus,
Tab. Ger. & pyriformis.

Radix vulgò, quibus Radicula, Cæs.

Floribus purpureis aut candidis, & radice
rotunda, vel orbiculata, variat. In India fre-
quentes sunt: & licet brachij humani crassitu-
dine proveniant, tamen substantiæ teneræ &
suavis saporis sunt, quibus pro vulgari cibo u-
tuntur: Joseph. Acofta. l.4. c.18.

II. Raphanus niger.

Raphanus cortice nigricante, Gef. hort.

Raphanus niger, Lobel. icon. radice nigra,
Camer.

Raphanus sylvestris, Cast. ico.

Radix & parva & crassa, pro sationis tempore.

III. Raphanus minor oblongus.

Raphanus Cleonæus, Theophrast. Algidenis,
Plinij.

Raphanus longus, Trag. Matth. Lon.

Raphanus prælongus, Gef. hort.

Raphanus secundus, Matth. Lugd.

Raphanus minor purpureus, Ad. Lobel.
Lugd.

Radicula fativa minor, Dod.

Cortice est albo, rubello, præsertim parte quæ
extra terram eminet.

**IV. Raphanus Creticus: de quo in Pro-
dromo.**

V. Raphanus rusticus.

Thlaspi alterum, Diosc. l.2. c.186.

Raphanis sylv. Dioscorid. l.2. c.138. &

Raphanus sylv. seu Armoracia Plinij, quibus
Armoracia aut Raphanus major, Brunf.

Rapha-

Raphanus major, Trag. Gef. hort.
 Raphanus syl. Fuch. marinus, Tab.
 Raphanus vulgaris & rusticus, Matth.
 Armoracia Plinij, Lac.
 Thlaspi majus, Cord. in Dioscorid. Lon. ma-
 gnum, Cæf.
 Raphanis magna, sive Radicula magna, Dod.
 Raphanus rusticus, Ad. Lobel. Ger. rusticus,
 Cam. Lugd.
 VI. Raphanus aquaticus folijs in profundas
 lacinias divisus.

an Raphanus cujus folia Erucæ similia Theoph.
 & Napi sylv. genus, Plinij.
 Radicula sylvestris, Dod.
 Raphanus sylv. officin. aquaticus, Lob. ico.
 Raphanus aquaticus, Tab. Ger.
 Raphanus syl. & Raphanus palustris, Lugd.
 an Raphanus sylv. Cord. in Diosc.
 Sifymbrium sylv. Cæf.
 VII. Raphanus aquaticus Rapiſtri folio.
 Rapiſtrum aquaticum, Tab. Ger.
 an Raphanus sylv. Cæf.

LEPIDIVM.

Λεπίδιον Dioscoridi l. 2. c. 205. sic dictum, quod λεπιδία, seu squamas & maculas faciei de-
 leat: vel ἀπὸ τῆς λεπιδίου, id est, ἐκ δειρῶν dictum, quod suā acrimoniam urenti ulceret,
 excoriet, eaq; facultate, vel ferro notas fronti servorum iniustas deleat; de quo forsā Colu-
 mella l. 10. Lepidium Plinio l. 20. c. 17.

I. Lepidium latifolium.
 Piperitis, Brunf. Lon. Dod. gal.
 Lepidium sive Piperitis, Trag. Matth. Cam.
 Lepidium magnū Fuch. Tur. majus, Cord. hist.
 Lepidium Dioscorid. Ang.
 Lepidium Pauli & Plinij, Matth. Lugd. Cæf.
 Lepidium Æginetæ, Gef. hort. Tab.
 Lepidium Plinij, Lac. Dod.
 Raphanus sylv. officin. Ad. Lob. Ger.
 II. Lepidium glastifolium.
 Lepidium annuum, Lob. Lugd.
 III. Lepidium Dentellaria dictum.
 Dentellaria Monspel. & Flamula, Gef. hor.

Herba S. Antonij Romæ, Gef. ap. ad. Cord. hist.
 in Chamaenerio.
 Molybdæna Plinij, Ang. Cam. cui & Crepanel-
 la Italarum.
 Sarcophago Cretenſibus: Phrocalida in Le-
 mmo: Mauronia Lesbij, Bellonio.
 Dentaria, sive Dentillaria Rondeletij & Nar-
 bonensium, Ad. Lob.
 Plumbago, Clus. hisp. & hist. Cast. Tab.
 Dentellaria & Enneaphyllon Plinij, Lugd. &
 Dentellaria Rondeletij.
 Glastum sylvestre, sive Ifatis sylv. Diosc. secun-
 dum ipsius notha, Cæf.

IBERIS.

Ιβέρης ἢ καρδὰ ἀμυγδαλὴ Dioscoridis l. 1. c. 189. Galenus ejus descriptionem ex Damocrate in
 curatione doloris ischiadici proponit. folia Nasturtij, cum Dioscoride, tribuens. Plinius Ibe-
 ridis remedia diversis in locis recenset.

I. Iberis Nasturtij folio.
 Iberis & Lepidium, Matth. fig. folio major.
 Iberis, Cast. Cæsalp. cui Lepidium sylv. forte
 Columellæ, secunda, Tab.
 Iberis Cardamantica, Ger.
 Lepidium campestre, Ang.
 II. Iberis latiore folio.
 Iberis & Lepidium, Matth. fig. min.

Iberis, Lugd. Dod. Lac. Gef. hort.
 Lepidium hortenſe, Ang.
 Iberis Cardamantica, Ad. Lob. cui & Lepidium
 Iberis Pauli.
 III. Iberis nasturtij folio minor.
 Iberidis pusillæ seu Nasturtij sylv. nomine ex
 Thuringia D. Fürerus misit.

DRACUNCVLVS ESCVLENTVS.

Tagxov Simeonis, Serhi lib. de alim. facult. reliquis Græci & Mauritanis indicta, aliqui ad Drabam, alij ad Chrysocomen Dioscoridis referunt.

I. Dracunculus hortensis.

Draco, Ruel. Hermol. Scal. Dod. gal. Ad. Lob.

Dracunculus hortensis, Matth. Cast. Tab. Eyf.

Tarchon Avicen. & Sethi, Gef. hort.

Draco herba acetaria, Cord. ob.

Draco herba, Dod. Ger. hortensis, Gef. hort. seu

acetarius, Lugd. (& Chrysocoma, Diosc.) Cam.

Dragone vulgo, Cæs.

Tragum vulgare, Cluf. hist.

II. Dracunculus pratensis serrato folio.

Pyrethrum, Brunf. ico. Gallorum, Ruell.

Tanacetum album seu acutum, Trag. (& Mil-

lefolium ?) Tab.

Parmica, Matth. Fuch. Tur. Gef. hor. Lon. Cast.

Lugd. Cam. Ger.

Parmica folio Tarac. vel Sternutator. Ad. Lob.

Parmica vulgaris sive pratensis, Cluf. hist. Lo-

bel. (& Parmica folio Taraconis, vel Sternu-

tamentoria) Lugd. Cluf. hist. (& Parmica pra-

tensis) Cam. Ger.

Pyrethrum syl. Dod. gal. syl. ac parvum, Cord.

Tarchon syl. vel aquaticum, Gef. hor. & col. &

Draco aquaticus.

Parmica syl. Germanica, Thal.

Draco syl. sive Parmica, Dod.

Menta Saracenica Myconi, Lugd.

Parmica vulgaris, Eyf.

III. Dracunculus pratensis flore pleno.

Parmica vulgaris pleno flore, Cluf. hist.

IV. Dracunculus alpinus folio Scabiosæ: in

Prod. descriptus.

ERVCA ETEJVS SPECIES.

Eruca, quæ vellicando linguam quasi erodat: *Erucæ* Dioscoridis l. 2. c. 170. & Theoph. 1. hist. 9. ob suavi-
tatem quæ ei in condiendis obsonijs inest, Plinio l. 20. c. 13.

Genera duo Dioscoridis, sativum & agreste, cuius semine pro Sinapi in Iberia utuntur. Et Plinius l. 20. c. 13.

Eruca sylvestris meminit. At Theoph. 7. hist. 4. *Eruca* generis differentias omnino deesse volunt.

I. Eruca latifolia alba: sativa Dioscoridis.

Eruca, Brunf. Hermol. Ruel. Corn. Matth. Ang.

Cord. in Diosc. Gef. hort. Cast.

Eruca, sive Rucula marin. maj. & Sinapi, 8. Trag.

Eruca sylvestris, Fuch. ico. Lon.

Sinapis alterum genus, Fuch.

Sinapi hortense, Tur. syl. Dod. gal.

Erucula major, Cord. hist. ico.

Eruca sativa, Matth. Lac. Ad. Lob. Dod. Lugd.

Sinapi hortense, Lugd. ico.

Eruca folio latiore, Cæs.

Eruca major, Cam.

Flores pallentes: venas nigras aliquando
obtinent; Et hæc est

Eruca, sive Rucula marin. maj. & Sinapi 8. Trag.

Eruca major, Cord.

II. Eruca latifolia semine nigro.

Eruca gentilis, sive Erysimon Marnardo, Port.

Eruca major sive Hispanica, Ad.

Eruca altera fruticosa, Cæs.

III. Eruca latifolia: pro Eruca 1. in Prod. des-

an Eruca tertia Anglica, Cam.

IV. Eruca sylvest, major lutea caule aspero.

Eruca syl. Matth. Ad. Lob. Dod. Lugd. (cujus E-

rysimum verum etiam videtur.) Cast. Tab. Ger.

Erucæ genus, sponte nascens, Cæs. qui flores

albos tribuit.

Flore majore, circa Monspelium in horto

Dei, crescit.

V. Eruca sylv. minor luteo parvoq; flore.

Sinapi 1. genus syl. Fuch. ico.

Eruca sylv. Fuch. Tur. Lugd.

VI. Eruca palustris & Nasturtij folio, fili-

qua oblonga.

Eruca sylv. foetida, Gef. col.

Eruca palustris minor, Tab.

Sinapi palustre, Ger.

VII. Eruca syl. minor lutea bursæ pastoris

folio: quæ 2. in Prod.

VIII. Eruca syl. minor incana: quæ 3. in Prod.

IX. Eruca lutea latifolia, sive Barbarea.

Herba S. Barbaræ (& Sinapi agreste 5.) Trag.

Lon. Cast.

Scopa regia (sive Sideritis latissima) Fuch.

ico, Ang.

S. Barbaræ herba, Fuch. Gef. hort.

Pseu-

Pseudobunias, Dod. gal. Ad.
Carpentorum herba, Ruel.
Nasturtium palustre, Gef. hor. hybernium, Thal.
Barbarea, Dod. Lob. Tab.
Eruca palustris, Lugd.
Bunium adulterinum, Cam.

Variat foliorum magnitudine, nam in hortis ad acetaria culta, acutiora habet, quæ femina dicitur, Tabernæmontano: nonnunquam rubent & nigrescunt.

X. Eruca lutea sive Barbarea pleno flore: quæ Eruca 4. in Prod.

XI. Eruca cærulea in arenosis crescens.

Hæc est Eruca palustris cærulea, in Phytopinace, & Matthiolo (& in Prod. pro s.) descripta pictaque: magnitudine & parvitate variat.

XII. Eruca maritima Italica siliquâ hastæ cuspidi simili.

Cakile Serapionis, Anguil. Ad. Lobel. Lugd. Camer.

Eruca maritima, Lugd.

Nasturtium maritimum, Eid.

Erucae genus in maritimis, Cæs.

Eruca Kackile dicta, Colum.

Habetur latifolia & angustifolia: hæc si in hortis feratur, oblongo angustoque folio excrescit.

XIII. Eruca maritima Cretica, siliquâ articulata: quæ 6. in Prod.

XIV. Eruca Monspelica siliquâ quadrangulâ echinata: quæ 7. in Prod.

Sinapi echinatum, Lugd.

XV. Eruca angustifolia Austriaca.

Eruca fyl. angustifolia, Lob. Lugd.

XVI. Erucae folia napi radice.

Pycnocomon Ang. quid?

SINAPI ET EJVS SPECIES.

Sinapi, dicitur Dioscoridi l. 2. c. 184. & Theoph. 7. hist. 3. & 6. *μαγά τῃ σίνοσιν τοῦς ὀφθαλμοῖς*, oculos enim ledit: dicitur etiam Theoph. v. 27. *quasi immite, ob vehementem ejus acrimoniam*: & Athenienses Napy appellasse, Plin. l. 19. c. 3. *author est, Sinapi nominans*.

Unius Dioscorides & Theoph. meminere: at Plinius, genera tria facit: unum gracile, alterum simile rapi folijs, tertium Erucae.

I. Sinapi rapi folio.

Sinapi Diosc. & Theoph. Sinapi alterum Plinij.

Sinapi, Ang. Gef. hort. Cast. primum, Matth.

Lac. Cæs. Port.

Sinapi hort. Cord. in Diosc. Lon. Lugd. desc.

Sinapi sativum prius, Dod.

Sinapi sativum Erucae aut Rapi folio, Ad. Lob.

II. Sinapi hortense semine albo.

Sinapi sativum album, Trag.

Sinapi alterum sativum, Ad. & Lob.

Sinapi album, Cam. & Eyll.

III. Sinapi apij folio.

Sinapi gracile, Plinio.

Sinapi, Brunf. luteum sativum, Trag.

Sinapi primum, Fuch. Tur. Cast.

Sinapi alterum, Matth. Lac. Cæs.

Sinapi hortense, Fuch. ico. Dod. gal.

Sinapi sativum, Lugd. sativum alt. Dod. Ger.

Sinapi agr. apij aut potius laveris fol. Ad. Lob.

Sinapi fyl. luteum, Lon.

Eruca palustris major, Tab.

IV. Sinapi Erucae folio.

Eruca sive Rucula mar. min. & Sinapi 9. Trag.

Eruca, Dod. gal. sativa, Fuch. hortensis, Tur.

Eruca fylvestris, Gef. hor.

Sinapi tertium, Matth. Cast. Cæs.

Sinapi fylvestre, Dod. Lugd.

Sinapi fyl. minus irionis veri folio, aut bursæ pastoris, Ad. Lob.

V. Sinapi parvum siliquâ asperâ.

In Phytopinace & Prod. descriptum est.

VI. Sinapi umbellâ purpureâ.

Sinapi alterum agreste nostras, Colum.

VII. Sinapi Indicum.

Safeni, semen est Sinapis, magna copia in Sundan: par. 4. Ind. orient. 8.

VIII. Sinapi simile Indicum semen.

Nachani semen nigrum minutum sapore Secales, ex cujus farina panes conficiuntur, Garz.

Semen sinapi simile sed nigrius, cujus farinâ in panes orbiculares subactâ vescuntur tota Æthiopia ora maritima, Clus. in notis.

R E S E D A.

Reseda à doloribus sedandis dicta, cum collectiones & inflammationes omnes discutere, Plin. l. 28. c. 12. scribat: propter saporem Erucae, & quod aliqui ex Erucarum fyl. genere esse censeant, huc relata est.

N 2

I. Reseda

I. Reseda maxima.

Reseda, quæ Sefamoides majus Ghino, Gef. hort.

Sefamoides magnum, Lac. at alterum, Cæs.

Reseda maxima, Lob. Ger.

Reseda tenuifolia, Tab.

Reseda Plinij, Eyft.

Reseda lutea, Lugd. recta, Cam.

Erucago vulgaris, Col.

II. Reseda vulgaris.

Rheseda Plinij Neotericorum. Eruca peregrina Italica, vel Cantabrica, Ad. Lob. Rheseda Plinij, Ger.

Reseda latifolia, Tab. at supina, Cam.

Reseda major, Thal.

Reseda lutea, Lugd.

Sefamoides primum, Cæs.

Ludit folijs simplicioribus, & in unoquoque pediculo plurimis: major & minor est.

III. Reseda linariæ folijs in prodromo descripta.

IV. Reseda alba minor.

Sefamoides parvum Salmanticum, Cluf. hisp. & hist. (quam duplicem facit) Lob. Tab. Ger.

V. Reseda lapidea.

Plantamarina Resedæ facie, Cluf. exot.

VI. Resedæ affinis Phyteuma.

Phyteuma Monspelienfium, Gesner. Ad. Lob. Narbonenfium, Lugd.

Sefamoides parvum, Lac. tertium, Cæs.

Erucago Apula, Colum.

Variat folijs nunc oblongis, nunc in aliquot lacinias, & quidem frequentius quatuor, modo quinque divis.

LUTEOLA.

Cum Luteolam aliqui Resedam Plinij faciant, & in multis cum Reseda conveniat, de ea nunc; quæ sic dicta, quod eâ panni lancei & tela lineæ, candida quidem, colore luteo, virente verò, qui ante caruleo tincti, insciantur. Quare Plinius, lib. 33. cap. 5. Luteam. Virruvius 7. Architect. 14. Luteum, & Virgil. Ecolg. 4. Lutum nominat. At Casalpini, lib. 9. cap. 35. Myagron seu Melampyrum Dioscoridis statuit.

I. Luteola herba falicis folio.

Antirrhinon, Trag. Lugd. Thal.

Pseudostruthium, Matth. Cast. Lugd. Eyft.

Struthium, Lac. Gef. hor.

Lutea vel Luteum Vitruvij, Gef. hor. Cam.

Herba lutea, Dod. gal. Lugd.

Lutum herba, Dod.

Luteola, Ad. Lob. Ger.

Guadarella vulgo, Cæs.

Catanance, Lon. Tal.

II. Luteola Cretica.

Struthium legitimum Dioscoridis quæ *Xanthium* in tota Græcia appellatur, quâ fullones in tingendo serico luteo utuntur, Hon. Belli ep. 2. ad. Cluf.

II. Luteola herba folio cannabinæ.

Lutea maxima Cretica Belli, Ponæ in Bal.

Lutea major frutescens Cretica, Ponæ ed. Ital.

IV. Luteola herba sterilis.

Lutea major sterilis Cretica, Ponæ ed. Ital.

ERYSIMVM.

Ερύσιμον Dioscoridi, lib. 2. cap. 188. alijs *ἀνὰ τὸ ἰσχυρὸν*, foliorum multiplici sectione: alijs *quasi ἰσχυρὸν*, quod est pretiosum: alijs *ἀνὰ τὸ ἰσχυρὸν*, quod ob suam caliditatem trahendi facultate pradium sit, dictum: nam Sinapis sapore est, & multis Sinapis syl. species est. Plin. lib. 22. cap. 25. Irio, Erysimum Græcis: ubi Erysimon Dioscoridis, cum Eryximo fruge Theophrasti 8. hist. 1. & 4. caus. 16. (Gaza Trionum vertit) confundit.

I. Erysimum vulgare.

Hierobotane scæmina, Brunf. 4.

Verbena scæmina & Sinapi 7. Trag.

Sinapi alterum genus syl. Fuch. ico.

Verbena, Tur. recta five mas, Fuch. Lugd.

Erysimum, Synapi syl. species, Gef. hort.

Erysi

Erysimum Dioscoridis, Dod. gal. Ger.
 Irio, Matth. Cord. in Diosc. Lac. Lugd. Lon.
 Cæsalp.
 Irio sive Erysimum, Ad. Lob. Dod. Cast.
 Cleome Octavij, Ang.
 Erysimum nostrate, Thal. primum, Tab.
 II. Erysimum alterum filiquis Erucae.
 Erysimum 2. Tab. sub Eruca sativa, Ger. ico.
 Majus est & minus.
 III. Erysimum polyceration, vel corniculatum.
 Irio alter, Matth. Lugd. Cam.
 Erysimum verum, Ang.
 Dentilaria alia, Irio aliquibus, Gef. hor.
 Erysimum alterum Italicum, Ad. Lob.
 Irionis tertia species, Cæf.
 Saxifraga Romanorum, Lugd. desc. figura sub
 Saxifraga aurea.

IV. Erysimum latifolium majus glabrum.
 Irio Apulus alter lævi folio Erucae, Colum.
 an Irio altera, Cæf.
 Ex semine Irionis nomine, à D. Imperato
 misso, & nomine Rapistris Hispanici non scri
 pti, à D. Gillenio, in horto meo crevit.
 V. Erysimum angustifolium majus.
 Rapistrum sylvestre Irionis folio, Colum.
 VI. Erysimum similis lævis laciniata fl. luteis.
 Herba S. Alberti, Cæf.
 an Barbarea minor, Lob. ob.
 VII. Erysimum similis hirsuta non laciniata
 alba.
 Variat folijs latioribus, angustioribus: ma
 gis minusve crenatis & hirsutis: icon & de
 script. in Marth. & Prodromo habetur.
 Barbarea muralis, Joh. Bauhino, lib. de Plan
 tis à Sanct.

HYDROPIPER SEV PERSICARIA.

Y *ὑδροπiper*, Dioscoridi lib. 2. cap. 191. id est, *Aquaticum piper*, à loco & sapore nomen
 habet: *Latinis Persicaria*, à foliorum forma: hac vel mitis acidule sapore, vel acris
 est: illa folijs maculosis, vel ijs carentibus.

I. Persicaria mitis maculosa & non ma
 culosa.
 Pulicaria femina, Brunf. Persicaria femina,
 Eid. Ruel. Lon.
 Persicaria, Fuch. Dod. Ang. Cast. Lugdun. cui
 & Plumbago Plinij quibusdam.
 Persicaria altera, Trag. Matth. Tab.
 Persicaria maculata, Ericio Cord. Ger.
 Persicaria maculis nigris, Gef. hor.
 Persicaria mitis, Ad. Lob. ico. maculosa, Lob.
 Persicaria prima, Britannica Plinij, Cæf.
 Cratæogonum, Lac.
 Plumbago Plinij, l. 25. c. 13. quibusdam: alijs
 Britannica ejusdem, l. 25. c. 3. alijs Lapathum
 quoddam videtur.
 Floribus est communiter purpurascens, ali
 quando candidis: folijs aliquando macu
 lam nigram in medio habentibus, aliquando
 ea carentibus.

II. Persicaria urens seu Hydropiper.
 Persicaria mascula, Brunf. Ruel. cui & major,
 mas, Lon.
 Persicaria primum genus, Trag. Tab.
 Hydropiper, Fuch. Ang. Dod. Matth. Cord. in
 Diosc. Lac. Cast. Cæf. Lugd. Ger.
 Cratæogonon, Ang.
 Persicaria hydropiper, sive aquatile piper
 urens, Ad.
 Persicaria urens, Lob. mordax, Thal.
 Flore est ex roseo rubicundo: colore Persi
 lico: candido: aliquando folijs macula rubra
 aspersa est.
 III. Persicaria angustifolia: in Prod. desc.
 Persicaria major, Lob. ob. Thal.
 IV. Persicaria minor.
 Pulicaria pusilla repens, Lob. Lugd.
 Persicaria pumila, Tab.
 Floribus est albis, aut purpureis.

CAPSICVM SEV PIPER INDICVM.

K *ἄλaxov* Actuarius, à *ἀλάω* mordeo, quod semen comestum mordeat, imò adurat. Plin.
 lib. 19. cap. 12. *Siliquastrum*, quod ob piperis saporem Piperitidis nomine sit acceptum:
 Axi, Indis. Piper: Piper Brasilianum: piper Indicum in Guiana: piper Indicum cornutum,
 & quibusdam *Siliquastrum*: Auctoribus historiar. Indicarum.

Differentia in foliorum latitudine, vel angustia; in fructus colore & forma: colore, qui in initio alijs viridis, alijs niger; in maturitate, aut ruber, aut croceus, flavusve; rarius albus. Figura alijs longa, eaq; vel crassa, vel gracili, vel incurvata: alijs brevis eaq; lata, cordata, vel rotunda cerafi forma, vel angulosa: & vel erecta, vel dependens: deniq; & caule piloso.

Axi aroma in Ind. Occid. quod in Cusco, Veho: in Mexico, Chili: in Castilia, piper Indicum appellatur. Est viride, & rubrum, & croceum. Aliud vehementius mordicat, quale Caribbe vocatum: aliud lenius, & moderatius: est & genus quoddam dulcissimum, quod è manibus vellunt, & edunt: & quoddam aliud exilius, quod moschum frangat, & gustu admodum sapidum. Joseph. Acosta lib. 4. c. 20. vel part. 3. Ind. Occid.

I. Piper Indicum vulgatissimum. Siliquastrum, Trag. (una figura tres species proponit) Lac. Tab. Capsicum rubrum & nigrum, Fuch. ico. Siliquastrum majus & minus, Fuch. Piper Indicum, Matth. Gesn. hort. (cui & Calcuticum) Cæs. (cui Circea Dioscorid. forte) Cast. Cam.

Cardamomum Arabicum, Gesn. hort. Piperitis seu Siliquastrum Peruvian. Cord. hist. Piper Indic. 3. rubrum & nigrum, Gesn. hort. Capsicum, Clus. in Mon. Capsicum vel Piper Indicum longioribus filiquis, Lob. Capsicum Actuarij, Eid. ico. & Ad. Capsicum sive Piper majus & minus. Lugd. Piper Americanum vulgatius, Clus. cur. post. Piper Indicum medium, Eyft. Piper Indicum Occid. quod Axi vocant, Frag.

II. Piper Indicum propendentibus filiquis oblongis recurvis. Capsicum oblongius, Fuch. ico. Dod. gal. Lugd. Capsicum longioribus filiquis, Ger. Siliquastrum tertium, Fuch. Capsicum oblongiorib. & recurvis filiquis, Dod. Piper oblongum recurvis filiquis, vel 9. Regio. in Clus. cur. post.

Hujus differentiae tres sunt.

1. Siliquis longissimis, deorsum spectantibus in mucronem recurvum abeuntibus, quod Piper Indicum maximum longum, Eyft. 2. A priore sola magnitudine differt, quod Piper Indicum minus, recurvis filiquis, Eyft. Piper decimum, Regio. 3. Siliqua flava, vel aurea, eaque oblonga vel lata, vel ovali figura, quod Piper duodecimum, Regio. Piper Indicum filiquis flavis, & Piper Indicum aureum latum, Eyft.

III. Piper Ind. propendentib. filiquis rotund.

Siliquastrum latis filiquis, Trag. Capsicum latum, Fuch. ico. Dod. gal. Lugd. Siliquastrum quartum, Fuch. Piper Indicum rotundum, Gesn. hor. Capsicum cordatum, Cam.

Siliquastrum fructu propendente rotundo, Regio, in Clus. cur. post.

Et hujus differentiae quatuor sunt.

1. Siliqua lata, rugosa, quod Piper octavum, Regio. 2. Cordata, eaq; oblonga vel rotunda, quod Piper Indicum cordatum oblongum, & Piper Indicum cordatum, Eyft. Piper sextum, Regio.

3. Siliqua olivari.

4. Siliqua rotunda Ceraforum modo, eaque majore vel minore rubri vel nigri coloris, quod Piper minimum filiquis rotundis, Eyft. Piper septimum, Regio.

IV. Piper Indicum fructu dependente pomi amoris forma.

Piper Indicum rotundum maximum, Eyft. an Piper ex Ind. Melopeponis forma Monard. Folia sunt Solani vulgaris, fructus rotundi, sulcis aliquot distincti pendunt, rubore coralli.

V. Piper Indicum fructu aculeato.

Majus est & minus: illud rotundum, hoc orbiculatum, utrumq; rubet: & innoxium quasi in aculeum abit, quod Piper Indicum rotundum aculeatum, & Piper Indicum orbiculatum medium, Eyft.

VI. Piper Indicum filiquis surrectis & oblongis.

Piper oblongum erectum majus pyramidale vel secundum, Reg. in Clus. cur. post.

Hujus differentiae quatuor.

1. Pyramidale majus.

2. Pyramidale minus: quod

Piper erectum minus pyramidale vel 3. Regio. Piper

Piper Indicum medium longum erectum, Eyst.
 3. Oblongum surrectum majus & min. quod
 Piper oblongum exiguum erectum pyramida-
 le, vel quartum, Regio.
 Piper Indicum minimum erectum, Eyst.
 4. Siliqua bifurcata, quod
 Piper undecimum, Regio.
 Piper Indicum bifurcata siliqua, Eyst.
 VII. Piper Indic. siliquis surrectis rotundis.
 Piper rotundum majus surrectum, Reg. in Clus.
 cur. post.

Hujus quoque differentiae quatuor:

1. Rotundum maximum obtusum, quod
 Piper majus surrectum vel primum, Regio.
 Piper Indicum maxim. rotund. erectum, Eyst.
2. Rotundum minus parum acuminatum:
3. Cordatum majus:
4. Cordatum minus angulosum.

Verum Piperis Indici differentias novende-
 cim, du Bui in suo Florilegio proposuit: at scul-
 ptor linguae Latinae ignarus, omnes siliquis
 propendentes sculpsit, licet recte depicta: & no-

minibus notatas ad ipsum transmisissimus.

VII. Piper Ind. siliquis surrectis cerasi forma.

Capficum brevioribus siliquis, Lob.

Capficum Brasilianum, Clus. ad Monard. Lugd.

Capficum minimis siliquis, Dod. Ger.

Siliquastrum rotundum, Cam. ep. Matth.

Piper Indicum surrectis corniculis, Cam.

Siliquastrum rotundum angustifolium, Tab.

Huc referendum

Piper oblongum erectum minimum, Regio.

Piper Indic. surrectis corniculis parvulis, Cam.

IX. Piper Indic. caule piloso flore majore.

Piper Indic. caule pilis albis praedito, Cam.

X. Piper Indicum radice eduli.

Piperis tertium genus minoribus granulis,
 cui sunt radices lettiki dictae, satis boni saporis,
 quas in minima frusta conscindunt & plantant,
 & sarmenta in modum Lupuli, supra terrae su-
 perficiem spargunt: Stad. par. 3. Americae.

XI. Tomates, grana sunt recentia & viridia
 quae cruda esitare solent. Et ex ijs plerumque con-
 dimenta parantur: par. 8. Ind. Occid. l. 4. c. 20.

SECTIO SECUNDA.

NASTURTIIUM: THLASPI: BURSA PASTORIS: MYAGRUM: DRABA: AL- LIARIA: COCHLEARIA.

NASTURTIVM EJVSQVE SPECIES.

Nasturtium καρδαιον Dioscoridi lib. 2. c. 135. Theophr. 7. hist. 1. quasi καρδαιον, quod ca-
 put calore suo & acrimonia tentet: vel καρδαιον, quod cordatos faciat; vel
 quod in Syncope Cardiaci dicta, plurimum valeat. Latinis Nasturtium, à naribus torquendis;
 quod odore & seminis acrimonia sternutamenta provocet: hinc Plinio l. 19. c. 8. (& Varroni)
 à narium tormento velut torporem excitans.

Genera, Theophr. 4. hist. 7. plura esse dicit. Dioscorides tantum Nasturtium Babylonicum
 optimum esse scribit. Plinio l. 20. c. 13. est hortense sive sativum, latioribus folijs, est & sylve-
 stre: illud album, hoc nigrum, ubi de semine cum loqui censemus. Dividimus in hortense,
 pratense, aquaticum, montanum.

NASTURTIVM HORTENSE.

- I. Nasturtium hortense latifolium.
- Nasturtium Hispanicum, Ges. hort. Tab. Ger.
- Nasturtio, tale folium Cam. ep. Matth. adpin-
 git: descripto & figura Matthiolo addita.

II. Nasturtium hortense vulgatum.

Nasturtium album, Plinio.

Nasturtium, Brunf. Ang. Matth. Cæsalp. Cast.
 Tabern.

Nasturtium hortense, Trag. Fuch. Tur. Lac. Ad.
 Lob. Dod. Lugd. Ger. Cam.

Aliud est folijs simplicibus, quod laeve & al-
 bius, vel subhiguitum minusque album; aliud fo-
 lijs valde divisis, & vel majus, vel minus.

III. Na-

III. Nasturtium hortense crispum. Hujus semen etiam nuper Nasturtij Mauritanij nomine Lugduno Batavorum accepimus.

Est latifolium & angustifolium, utrumque in Matth. descriptum & depictum, sicut & in Prod.

Nasturtium pratense.

Nasturtium pratense magno flore.

Flos cuculi, Brunf. Dod.

Nasturtium pratense (vel 3.) Trag. Gesn. Tur.

Hiberis, Fuch. ico.

Nasturtium agreste, Fuch. sylvestre, Lon.

Lepidium minus, Cord. in Diosc.

Sisymbrium Cardamine, Dod. gal. Lac. tertium, Dod. Lugd.

Sisymbrium aquaticum alter. quoad folia, Matth. Tab. & Lugd.

Cardamine altera, Lob. Lugd. Ger.

Cardamine 1. & Sisymbrium alt. Diosc. Tab.

Cardamine altera simplici flore, Clus. hist.

Cardamine latifolia, Ger. quoad folia.

Sisymbrium aquaticum non abfimis, Cæs.

Iberis five Cardamantica nasturtij folio 1. Thal.

Nasturt. aquat. simplici flore, Eyst.

Flos communiter ex candido, leviter purpurascit, aliquando prorsus albus est.

II. Nasturtium pratense flore pleno.

Cardamine altera pleno flore, Clus. hist.

Nasturt. aquaticum flore pleno, Eyst.

III. Nasturt. prat. parvo flore: quod 2. in Prod.

Sisymbrij aquat. alterius nomine, Matth. Lugd.

& Tab. Si flores species exprimere videntur.

Nasturtij siliquosi sylvatici, seu montani majoris Thalij nomine, D. Futerus.

Nasturtij pratensis congereris, D. Jungermannus Liphian misit.

IV. Nasturt. prat. folio rotundiore, fl. majore.

Cardamine five Sisymb. alterum Diosc. Ad. Lob.

Cardamine, Ger. secunda, Tab.

Et hæc floris colore variat, hinc

Cardamine 2. species altera florib. lacteis, Tab.

Cardamine lactea, Ger.

V. Nasturt. prat. rotundifol. minuto flore.

Sisymb. alter. seu Nasturt. aquat. 3. species, Thal.

VI. Nasturtium pratense odoratum radice granulibus tuberosa.

Cardamine quinta, Dalech. Lugd.

VII. Nasturt. sylv. minus: quod 3. in Prodr.

Nasturtium aquaticum.

Nasturtium aquaticum supinum.

Sisymbrium alterum vel Cardamine, Diosc.

Nasturtium aquat. (& 2.) Trag. Lon. Dod.

Vella Galeni, Ang.

Sium & Laver, Dod. gal.

Cardaminum Sion, Ruel.

Cresso, Laver odoratum, Eri. Cordo.

Sisymbrium Cardamine, Fuch. Lugd.

Sisymbrium aquaticum, Matth. Cæs. Cast. primum, Tab. & Portæ.

Sisymb. alterum, Cord. in Diosc. Gesn. hor. Thal.

Sisymbrium tertium, Lac.

Sion Cratevæ, Sisymb. 2. Diosc. & Senecio Serapionis, Ang.

Sion Cratevæ Erucæfolium, Ad. Lob.

Sium majus, Ger.

an Nasturtio similis herba Scorbutum curans:

par. 9. Ind. occid. additam.

II. Nasturt. aquatic. majus & amarum.

Sisymbrij alterius species secunda, Thal.

III. Nasturt. aquat. erectum folio longiore.

Sium, Lac. Cast. vulgare, Matth. Lugd.

Sion Matthioli & Italarum, Lob.

Hoc licet glabrum sit, tamen caule & foliorum cauliculis villosis habemus.

IV. Nasturtium aquaticum minus.

Sisymbrium aquaticum alterum vel minus,

Cam. ep. Matth.

Cardamine quarta Dalech. Lugd.

Variat magnitudine & parvitate, fortè ratione loci: nam in aquaticis major est: in vineris verò Wilensibus riguis, uti & Patavij minorem multò observavimus: sic caule erecto, &

penè aphylo, in arenosis prope Wisam fluvium, reperitur.

Nasturtium Montanum.

I. Nasturtium montanum luteum.

Sium alterum aquaticum luteum, vel Cardamine tenuifolium montanum, Colum.

II. Nasturt. montanum luteum folijs sativi.

Nasturtium montanum minus, Thal. quid?

III. Nasturtium alpinum trifolium.

Cardamine trifolia, Lob. Lugd. Tab. Ger.

Cardamine alpina 1. trifolia, Clus. pan. & hist.

IV. Nasturtium alpinum minus refedè folijs.

Hoc in Phytopinace, sub Nasturtio 2. in Prod.

sub 4. descripsimus, quod aliquando altius, aliquando ad tres tantum uncias exurgit.

V. Nasturt. alpin minus fol. in orbem sparsis.

Cardamine alpina media, Clus. pan. & hist.

VI. Nasturt. petræum folijs bursæ pastoris.

Nasturt.

Nasturtium petraeum, Tab. Ger.

VII. Nasturtium alpinum inspidum, Cardamine alpina insipida, Colum.

VIII. Nasturtium alpinum tenuissimè divisum.

Nasturtium, Ges. in epist.

Cardamine alpina 3. minima, Clus. pan. & hist.

Cardamine alpina, Tab. Ger.

Thlaspi montanum minimum, Lugd.

Cardamine pusilla saxatilis montana *Augusti*, Colum.

IX. Nasturtium pumilum vernum, quo nomine Montpelio accepimus.

Hoc rarius palmare, frequenter unciam folium altum reperitur.

X. Nasturtium alpinum capsulâ Nasturtij hortensis. Hoc Cardamidij montani verni nomine D. Furerus misit.

In Phytopinace sub Nasturtio 9. in Prod. sub 5. descripsimus.

XI. Nasturtium alpinum bellidis folio majus 6. in Prod.

XII. Nasturtium alpin. bellidis folio min.

Plantula Cardamines æmula, &

Sinapi pumilum alpinum, Clus. pan. & hist.

Folij est modò longioribus, modò rotundioribus.

XIII. Nasturtium Barbareæ folijs: quod 7. in Prodr.

Nasturtium sylvestre.

I. Nasturtium sylv. O. yridis folio.

Bursa pastoris minor, Brunf.

Thlaspidij genus & Nasturt. 5. Trag.

Bursa pastoris 2. & 4. Eidem.

Thlaspi angustifol. Fuch. Lug. minus, Dod. Ger.

Thlaspi minus hortense vulgare, Lob. ico.

Thlaspi minus tenuifolium, Lon.

Iberis, Tur.

Nasturtium sylvestre, Thal.

Thlaspi minus Germanicum, Tab.

Luteum est & album, & quia acerrimum ad Nasturtium referimus.

II. Nasturtium sylv. tenuissimè divisum.

Seriphium Germanicum, Trag.

Nasturtium sylv. Fuch. ico. Ges. hort.

Seriphium absinthium, Fuch. Lon.

Thalietrum, Dod. gal. Lugd.

Thalictrum, Thal. (cui Nasturt. *μυριόφυλλον*) Tab.

Sophia Chirurgorum, Ad. Lob. Dod. Ger.

Accipitrina, Cæf.

Folio est latiore, angustiorëve, hinc

Thalictrum latifolium & angustifolium, Tab.

Sophia duplex, Gerardo.

Accipitrina duplex, Cæf. alpino.

III. Nasturtium sylvestre Erucæ affine.

Nasturtium sylv. Clus. hisp. & hist. Lugd.

Eruca Nasturtio cognata tenuifolia, Lob.

THLASPI ET EJVS SPECIES.

Nasturtio Dioscorides lib. 2. c. 186. *ῥάσιν* subjungit, quod à fructus forma, que veluti infractus & contusus, à *ῥάσιν* infringo, nomen accepit: ἡ *ῥάσιν* ὀνιον, quasi fructum clypeatum; ἡ *ὀνιον* ἀγριον.

Genera duo Dioscoridi & Plinio lib. 28. c. 13. alterum angustis, alterum latis folijs, quod Persicum Sinapi Cratœa dicatur: fortè Raphanus rusticanus.

Thlaspi arvense.

I. Thlaspi arvense filiquis latis.

Thlaspi & Thlaspidium vulgare, &

Bursa pastoris prima, Trag.

Thlaspi, quod vulgo Nasturt. tectorum, Ruel.

Thlaspi latifolium, Fuch.

Thlaspi cardamoides, sive Nasturtiarium,

Cord.

Thlaspi minus latifolium, Lon.

Thlaspi Dioscoridis (& Scorodathlaspi) Dod.

gal. Lugd. Ger.

Thlaspi 2. Matth. Lugd. majus, Tab.

Thlaspi 1. Diosc. Creticum Galeni, Ang.

Thlaspi drabæ folio, Ad. Lob.

Thlaspi Dioscor. Drabæ & Chamelinæ folio,

Eidem ico.

Thlaspi latius Dod. platicarpon, Cam.

Thlaspi, & Thlaspi nigrum Galeni, Cæf.

Varietas in filiquis: aliud majoribus, aliud exilioribus reperitur.

II. Thlaspi arvense Acetosæ folio.

Thlaspi majus, Tab. Ger.

III. Thlaspi Vaccariæ folio burse pastoris filiquis: primum in Prod.

O

IV. Thla-

IV. *Thlaspi arvense Vaccariæ incano folio* majus.

Thlaspi primum, Matth. Lac. Cast. Lugd.

Thlaspi alterum, Dod. Lugd. 3. sive *Cratervæ*, Ang.

Thlaspi minus, Cord. in Diosc.

Thlaspi vulgarissimum Vaccariæ folio, Ad. & Lobel.

Thlaspi vulgariss. Ger.

Thlaspi verum cujus semine in *Theriaca* utimur, Camer.

Thlaspi officinarum, Colum.

Folij est aliquando leviter crenatis, aliquando ijs caret: hinc diversa authorum figura: quare apud Matthiolum posuimus *Thlaspi* 1. & *Thlaspi serrato folio*.

V. *Thlaspi Vaccariæ incano folio minus*: quod 2. in Prodomo.

VI. *Thlaspi villosum capsulis hirsutis*.

In *Phytopinace*, & pro 3. in Prodr. descripsimus, & in Matthiolo nostro sub *Thlaspi villosa* figura habetur.

VII. *Thlaspi arvense perfoliatum majus*.

Thlaspi oleraceum, Tab. sub *Thlaspi incano*, Ger. ico.

Thlaspi primum Dalech. Lugd.

Thlaspi alterum mitius rotundifolium bursa pastoris fructu, Colum.

In *Phytopinace* sub 5. descripsimus.

VIII. *Thlaspi perfoliatum minus*.

Thlaspi pumilum, vel *Thlaspi montanum minus*, Clus. pan. & hist.

Thlaspi minimum, Tab. minus, Ger.

Thlaspi umbellarum.

I. *Thlaspi umbellat. arvense Iberidis folio*.

Thlaspidij aliud genus, vel 3. Trag.

Thlaspi amarum, Tab. Ger.

Thlaspi Allobrogicum Cretico, par. Clus. hist.

Flores è cæruleo alboq; communiter mixti, rarius penitus albi, vel flavescentes: in *Phytopinace* sub 11. descripsimus.

II. *Thlaspi umbellatum Creticum Iberidis folio*.

Draba sive *Arabis*, aut *Thlaspi Candia*, Dod. Ges. hort. Lugd.

Thlaspi 4. Matth. Lugd. cui & *Thlaspi* 4. *Donæi*.

Thlaspi Cappadocicum, Ang. flore incarnato & flore albo, Eyst.

Thlaspi Creticum, Gesn. hort. Cæsalp. Taber. Camer.

Thlaspi Candia umbellatum Iberidis folio, Ad. & Lob.

Thlaspi Candia, Ger.

Flore est purpureo, aliquando albo, luteo haberi ajunt & communiter in umbella, rarius in oblonga spica.

III. *Thlaspi Cretic. flore albo majus*: sive 4. in Prodr.

IV. *Thlaspi umbell. Cretic. flore albo odor. minus*.

Thlaspi quartum parvum odorato flore, Clus. histor.

Thlaspi Cappadocici minoris annui nomine, D. Doldius misit.

V. *Thlaspi umbell. nasturij folio* *Monspeliacum*.

Thlaspi alterum minus umbellarum *Nasturij hortensis folio* *Narbonense*. Ad. Lobel. icon.

Thlaspi aliud umbellatum *Penæ*, Lugd. &

Nasturtium sylv. Dalechampi, Eidem.

Thlaspi Narbonense umbellatum, Tab. Ger.

Thlaspi montanum.

I. *Thlaspi montanum glasti folio majus*.

Thlaspi prim. vel montanum peltatum, Clus. pan. & hist.

Thlaspi pannonicum, Lobel. icon. Camerar. Tab. Gerard.

II. *Thlaspi montanum glasti folio minus*.

III. *Thlaspi alpinum bellidis cæruleæ folio*.

Thlaspi secundum & *Badense*, Clus. pan.

Thlaspi montanum 2. Clus. hist.

Thlaspi album supinum, Lob. ico. Tab. Ger.

Thlaspi montanum bursa pastoris fructu *primum*, Colum.

Siliquis non nihil variat, hinc apud Tab. & Ger. figuræ duæ ad Clusij & Lobelij imitationem: sic & flores aliquando in umbella, ut restè Columna pinxit: communiter in modum spicæ dispositi.

IV. *Thlaspi montanum semper virens*.

Thlaspi montanum candidum, Lugd.

V. *Thlaspi saxatile rotundifolium*, quod 5. in Prodr.

VI. *Thlaspi alpinum majus*.

Thlaspi tertium, Matth. Lugd. Thal. qui tamē diversum describit.

Ut Matthiolus pingit ex Italia habemus: verum ut in nostris alpihus provenit, ab illo planè diversum, in nostro Matthiolo & Prodromo figura exhibetur.

VII. Thlaspi alpinum minus capitulo rotundo.

Thlaspi tertium saxatile, Cam. epit. Matth. & hort.

Thlaspi petraeum myagroides, Ponæ.

Thlaspi saxatile minore folio, in nostro Matth. ubi figura & descriptio: ut & sub 6. in Prod.

VIII. Thlaspi alpinum repens: pro 7. in Prodromo descript.

IX. Thlaspi parvum saxatile flore rubente. Lithothlaspi quartum carnosum rotundo folio, Colum.

Ex Provinciæ saxosis & hoc, & 9. & 11. à D. Burfero habemus: simile cum 11. sed folijs & thecis majoribus, ex Hispania D. Albinus attulit.

X. Thlaspi saxatile Polygalæ folijs: cauliculis est pedalis, folijs polygalæ forma, sed longe minoribus: flosculis exiguis, albidis, thecis rotundis infractis, semine minutissimo in saxosis circa Monspelium.

XI. Thlaspi saxatile vermiculato folio. Lithothlaspi montanum fruticosum vermiculato acuto folio, Colum.

XII. Thlaspi montanum incanum luteum serpilli folio majus.

Thlaspi supinum luteum, Lob. ico.

XIII. Thlaspi saxatile incanum luteum serpilli folio minus.

Jonthlaspi luteo flore, incanum montanum *non nescies*, Colum.

Thlaspi Alysson dictum, sive Alysson.

I. Thlaspi Alysson dictum campestre majus. Alysson, Matth. Ang. Lugd. Cam.

Thlaspi Græcum, Ad. & Lob. ico. Ger.

Thlaspi Græcum polygonati folio, Tab.

Alysson minimum, Clus. pan. & hist.

Flosculis est albis, interdum luteis.

II. Thlaspi Alysson dictum campestre minus.

Thlaspi 4. Dod. gal.

Alysson minus Dalech. Lugd.

Thlaspi minus clypeatum, Tab.

Polium alpinum flore luteo, Eyst.

Si cum præcedenti non idem, saltem affine.

III. Thlaspi Alysson dictum maritimum.

Thlaspi Narbonense centunculi angustifolio,

Ad. Lob. ico. Lugd. Tab.

Thlaspi umbellatum Narbonense, Ger. ico.

Thlaspi maritimum Dalech. Lugd.

Thlaspi fyriacum, vel Græcum alterum anguloso bifori pericarpio lentifolio, Adversaria

proponunt: sed quid?

Thlaspi clypeatum.

I. Thlaspi biscutatum asperum Hieracifolium & majus.

Thlaspi parvum hieracifolium, sive Lunaria lutea Monspelienfium, Ad. Lob.

Thlaspi clypeatum, Clus. pan. & hist.

Thlaspi quoddam genus, in monte S. Juliani, Cæsalp.

Lunaria lutea Dalech. Lugd.

Thlaspi bifurcatum, vel Lunaria bifurcata, Camer.

Thlaspi majus clypeatum, Ger.

Thlaspi minus clypeatum 1. Tab.

Leucoium montanum 1. Thal.

Leucoium alissoides umbellatum montanum, Colum.

Hoc ipsum ex Creta Thlaspi nomine, Honorius Belli misit, quod folijs minus asperis, sed tota planta incana est.

II. Thlaspi biseuratum asperum minus.

Jondraba alissoides Apula spicata, Colum.

Folij est brevioribus, crassioribus incanis, totaque planta humilior: ex Hispania D. Albinus attulit: at multò minoribus, minusque asperis ex montibus Tyrolensibus habemus.

III. Thlaspi biscutatum villosum flore calcarati donato.

Leucoium montanum flore pedato, Colum.

Hoc sub 8. in Prodromo describitur.

IV. Thlaspi clypeatum serpilli folio.

Thlaspi alterum minus clypeatum serpilli folio, Ad. Lob. ico.

Thlaspi minus clypeat. Penæ, Lugd.

Jonthlaspi minimum spicatum, lunatum, Col.

Lunaria Græca quarta, Cæf.

Aliquando thecæ veluti in longam spicam dispositæ sunt, quemadmodum D. Columna misit, aliquando magis in summo compactæ, ut Monspelluli legimus.

Thlaspi fruticosum.

I. *Thlaspi fruticosum* Leucoij folio latifolium: hoc 9. est in Prod.

Est majus circa Mafsiliam à D. Bursero: est minus pauloque angustioribus folijs, in Italia collectum.

II. *Thlaspi fruticosum* Leucoij folio angustifolium.

Thlaspi fruticosum folio Leucoij marini minoris, Lob. Lugd. Tab.

Thlaspi semper virens, Cam.

III. *Thlaspi fruticosum* folio thymbræ hirsuto.

Thlaspi fruticosum alterum, Lob. Lugd. Tab.

Thlaspi fruticosum minus, Ger.

Thlaspi 5. Hispanic. albo flore, Clus. hist.

IV. *Thlaspi fruticosum* spinosum.

Thlaspi fruticosum spinosum Narbonen. Lob. Lugd.

Thlaspi spinosum 5. Tab. Ger.

Folia habet Leucoij oblonga, incana, obruta, ut in monte Lupi observavi: at in hortum Monspeliensem translaturum, unde D. Burserus attulit, breviora & rotundiora obrinet.

V. *Thlaspi fruticosum* incanum.

Thlaspi incanum Mechlinense, Lob. Lugd. Clus. pan. & hist.

an *Thlaspi incanum fruticosum* Francoicum, Cam.

an Iberis prima, Tab. quod sub *Thlaspi fruticoso*, Ger. ico.

Thlaspi exoticum.

I. *Thlaspi repens* hederæ folio.

Thlaspi hederaceum, Lob. Lugd.

II. *Thlaspi Alexandrinum*.

Hoc in *Phytopinace* sub 12. in Prod. sub 10. descripsimus.

BURSA PASTORIS.

Thlaspi species apud antiquos fuit, que nunc Bursa pastoris, à marsupiolis compressis (alijs Capsella) dicitur: quibusdam Sanguinaria & Crispula.

Bursa pastoris folijs sinuatis.

I. *Bursa pastoris* major folio non sinuato: in *Phytopinace* & *Prodromo* sub prima descripta.

II. *Bursa pastoris* major folio sinuato.

Bursa pastoris major, Brunf. Trag. Gef. hor. cui & *Thlaspi fatuum*.

Bursa pastoris, Matth. Lac. Lon. Corn. (cui Medica, Diosc.) Cord. in Diosc. Ad. Lon. Lob.

Thal. Cæs. (& *Thlaspi* genus antiquorum) Lugd. Cast. & herba Canceri, Ger.

Pastoria bursa, Fuch. Dod. major, Tab.

Folij variat: aliquando eleganti est folio, instar Coronopi repentis.

III. *Bursa pastoris* media.

Bursa pastoris sexta, Trag. minor, Gef.

Bursa pastoria minor, Tab. minima, Ger.

IV. *Bursa pastoris* minor folijs incis: & Thal. qui alterius, folijs integris meminit.

Pastoria bursa minor, Dod. minima, Lob. ico.

Hæc aliquando ad duas tresve solùm uncias apud Monspelienfes exurgit, aspectu ob foliorum incisuram elegantissimo, quam *Thlaspi* minus nominant.

Bursa pastoris folijs integris loculis oblongis.

I. *Bursa pastoris* major loculo oblongo.

Draba minima, muralis Dioscoridis, Colum.

Thlaspi Veronicæ folio, Richerio.

In *Phytopinace* sub 6. in Prod. sub 2. descripsimus.

II. *Bursa pastoris* minor loculo oblongo.

Gensblum id est, anserum flos, Brunf.

Paronychia alfinefolia, Ad. Lobel. Lugdun. Camer.

Paronychia vulgaris, Dod. latifolia, Ger.

Herbula burse pastoris affinis, Cæs.

Thlaspios minima species, Thal.

Alfine minima, Tab.

Pilosella filiquata minima, Cam. ad Thal.

Myosotis parva Dalech. Lugd.

Folij communiter integris, rarissimè laciniatis.

III. *Bursa pastoris alpina* hirsuta: quæ 3. in Prod.

IV. *Burse pastoris* similis filiquosa major, seu majoribus folijs.

Pilosella

Pilosella filiquata major, Thal.
Aizoon telephium Dalech. Lugd.
V. Burfæ pastoris similis filiquosa minor,
feu minoribus folijs.

Paronychia altera myagri folio, Gefneri,
Camer.
Pilosella filiquata minor, Thal. & Cam. fig.
hort. D.

MYAGRUM.

M *Myagros* Diosc. l. 4. c. 117. meminit, cui *Rubia* folia tribuit: & *Plinio*, l. 27. c. 12. *Myagros* dicitur: verum quid sit, nunc non decernimus. Sunt qui nostrum *Myagrum*, *Erysimum* *Theoph.* & *Galen* velint: alijs *Sesamum*, ob seminis similitudinem, & olei ubertatem.

I. *Myagrum* filiqua longa.

Viola lutea syl. Trag.

Myagrum alterum *Thlaspi* effigie, Lob. Lugd.

Myagrum 2. Tab. *Erysimum* 3. Eid.

Camelina, Ger. *Eruca* syl. angustifolia, Eid.

Ratione soli variat, cubitalis, folijs latis, aliquando trium quatuorve unciarum angustis: & inter hæc est medium.

II. *Myagrum* fativum.

Linaria quinta, Trag.

Sesamum, Trag. Lac. Lon. *Sesamum* non est

Gef. hor.

Myagrum *Dioscoridis*, Ruel. Ang. Dod. gal.

Ad. Lob. Lugd. Ger.

Myagrum primum, Tab.

Pseudomyagrum, Matth. Lugd.

Camelina sive *Myagron*, (& *Erysimum* cereale) Thal. Dod. Thal.

Dorella, Cæsalp.

Aliquibus in locis feritur olei causa, & latioribus folijs est: multis locis spontè provenit.

& hoc strigosius, hinc figurarum varietas, ut in *Matthiolo* nostro videre est.

III. *Myagrum* sylvestre.

Pseudomyagrum alterum, Cam. in Matth.

Paronychia 2. Tab.

Huic simile minus, quod

Myagrum 3. in arvis, Cam.

IV. *Myagrum* fœtidum; quod 1. in Prod.

V. *Myagrum* monospermon latifolium.

Myagrum hortense monospermon, Eyft.

Bricourres nomine semen missum fuit; *Pseudofaridem* *Alpinus* nominabat.

Hoc in *Phytopinace* sub 5. & in Matth. ubi & figura exhibetur, & sub 2. in Prod. habetur.

VI. *Myagrum* monospermon minus: 3. in Prod.

VII. *Myagro* similis filiqua rotunda.

in *Phytopinace* sub *Myagro* 6. in Prod. sub 4. descripta, *Thlaspi* nomine *Norinbergâ*: *Le-*

pidij, *Monspelio*: *Myagri* *Montbelgardo*, habemus.

DRABA.

D *Rabam* *Ῥάβαν* *Dioscorides*, lib. 2. cap. 186. ipsi *Thlaspi* subjungit, unius factâ mentione.

I. *Draba* umbellata, vel *Draba* major capitulis donata.

Arabis sive *Draba*, Matth. Ang. Ad. Lob. (& *Nasturtium* *Babylon*) Lugd.

Arabis, Lac. Lon. *Arabis* verior, Cam. *Drabe*, Matth.

Draba vulgaris prima, Clus. pan. & hist.

Draba *Dioscorid.* Cæf. Cast. Colum.

Folijs dentatis observavimus; sunt qui non dentatis pingant.

II. *Draba* tenuifolia velut spicata: 1. in Prod.

Drabæ serventis vernæ nomine, *Phorenia* *Doct.* *Agerius* attulit.

III. *Draba* minor capitulis orbicularibus.

Draba minor, Clus. hist.

IV. *Draba* alba filiquosa.

Draba secunda, Clus. pan. & hist.

V. *Draba* alba filiquosa repens.

Draba altera, Lob. ico.

Draba 3. succulento folio, Clus. pan. & hist.

Arabis seu *Draba* altera, Lob. ob. Lugd.

Eruca muralis, Lugd.

an *Thlaspi*os generibus cognata filiquosa,

Thal.

VI. *Draba* *Erysimi* flore & filiquis.

Sinapi & *Thlaspi* media *Provincialis* planta,

Ad. Lob. ico. Lugd.

O 3

VII. *Draba*

VII. Draba lutea siliquis strictissimis.
Arabidis quorundam, Cam. ep. Matth. & hor.

VIII. Draba flore caeruleo galeato : hæc
2. est in Prod.

ALLIARIA.

Alliaria ed quod folia digitis comminuta, Allium seu Porrum sectivum cum Nasturtio redolent : quibusdam, Thlaspidium secundum Cratæva : alijs Alektorolophos Plinij, lib. 25. cap. 5.

Alliaria, Trag. (cui & Thlaspidium cornutum) Fuch. Matth. Dod. (cui & Pes asininus Pandect.) Lac. Ad. Lob. Cast. Lugd. Cæsalp. Thal. Lon. Tab. Cam. Ger.
Alliaria altera, Ama.
Alliastrum, Gesn. hort.

Rima marina, Euricio Cordo. Rima maria, Anguillaræ.

Alektorolophos Plinij quibusdam, Dalech. in Plinium.

Folio latissimo amplissimoque & subrotundo, quandoque reperitur.

COCHLEARIA.

Cochlearia, à foliorum forma modicè cava, parvum & non valde profundum cochleari referentia, dicta : quam aliqui Telephium, alijs Britannicam Plinij, lib. 25. cap. 3. volunt, (licet forma & sapore Thlaspi & Nasturtijs affinis sit) ed quod ei malo, quod Stomacacen & Scelotirben vocant (Scorbutum esse volunt) auxilio esse Britannicam Plinius scripsit.

I. Cochlearia folio subrotundo.
Cochlearia, Dod. Gesn. hor. Lugd. Cam. epit. Matth. & hor. & par. 3. Ind. orient. navig. 3.
Telephium, Lac.
Britannica, Gesn. hor.
Cochlearia Batava, Ad. & Lob.

II. Cochlearia folio sinuato.

Cochlearia Anglica Atriplicis folio, Ad.
Cochlearia Britannica, Ad. Lob. Dod. Lugd. Ger.

III. Cochlearia minor erecta : quæ 1. in Prod.
IV. Cochlearia Danica repens : quæ 2. in Prod.

SECTIO TERTIA.

BRASSICA EJVSQVE SPECIES.

Brassica Theophrasto 1. hist. 19. inter Olera est, quæ ἀπὸ τῆς βράζειν ἀπὸ βορᾶν, à vorando. Dioscoridi lib. 2. cap. 14. καυρβη, quasi καυρβη, quod oculorum pupillas ledat, dicitur. Theophrasto & παρὰ βορᾶν dici, in Raphano monuimus.

Genera : Dioscoridi sativa, sylvestris & maritima. At Theoph. 7. hist. 4. alia crispata, alia levis, alia sylvestris. Plinius, cum lib. 19. cap. 8. Brassica cauliumve tria genera ex Cato, cap. 157. enarrasset, plura adhuc esse refert, Cumanam, Aricinam, Pompejanam, Sabellianam, Lacuturrem. At lib. 20. cap. 9. Græcos in tres species divisisse scribit : Crispam, quam Selinada, à similitudine foliorum apij vocarint : alteram leam, latis folijs, quæ Caulodes quibusdam : tertiam propriè Crambem appellatum.

Recentioribus differentie sunt pro foliorum colore, crispitudine, densitate, alijsq. qualitatibus. Alijs enim color viridis, alijs candicans, alijs purpurascens. Crispitudo & levis, tam in candida, quàm in viridi, quàm nigram vocant, rarius in purpurea, reperitur. Summa genera sunt Sativa, sylvestris : Sativa, alba & rubra, &c.

Brassica

*Brassica capitata.*I. *Brassica capitata alba.*

Brassica alba, Brunfels. quæ capitata & sessilis, Cord. in Diosc.

Brassica alba sessilis & glomerata, Lob. ico.

Caulis capitatus, Trag.

Caputium Brassicæ 3. genus, Cumanum Plinij, Eric. Cord.

Brassica capitata, Matth. (& Lacuturris) Lac. Gef. hort. Lon. Tab. Lob. Cast. alba, Ger.

Brassica alba sessilis glomerata, aut capitata *Lactucæ habitus*, Ad.

Brassica capitata albida, Dod. (cui Tritiana) Lugd.

Brassicæ 4. genus, Fuch. Tur.

Brass. capitata 1. genus, & Cumana Plin. Cæs.

Hæc candida est, quæ Lacuturris Plinij: est & viridis, quæ Tritiana.

II. *Brassica alba capite oblongo non penitus clauso.*

Brassicæ albæ 2. species, Lacuturris, Dod. gal.

Brassica patula, Sabauda vulgo, Ad.

Brassica Sabauda hyberna, Lob. ico.

Brassica Sabauda, Tab. Ger.

III. *Brass. ex capitibus pluribus conglobata.*

Brassica capitata polycéphalos, Lugd.

In hac aliquando quinquaginta capita ovorum magnitudine numerantur.

IV. *Brassica capitata rubra.*

Brassicæ rubræ 2. species, Dod. gal. Lugd.

Brassica convoluta & arctè occlusa rubro colore, Ad.

Brassica capitata rubra, Dod. Tab. Ger.

V. *Brassica gongyloides.*

Brassicæ albæ 4. species, Dod. gal.

Brassica thyrsuta, Gef. hor.

Caulorapa, *Brassica peregrina*, medio caule turbinata & rapata, Ad.

Brass. caule rapum gerens, Dod. rapicaulis, Cam.

Brassica raposa, Rapitius colis Catoni, Lugd.

Caulorapum, Matth. Scalig. Lob. ob. Cam. ep.

Rapa Brassica peregrina, caule rapum gerens, Lob. ico.

Brassicæ capitata 2. genus, Lacuturris Plinio, Cæsalp.

Variat rapo rotundiore & longiore: illa

Caulorapum rotundum: hæc *Caulorapum longum*, Tab. & Ger.

IV. *Napopraßica*, in Proxomo descripta.VII. *Brassica cauliflora.*

Brass. Pompejana aut *Cypria*, Dod. gal. Lug. Cam.

Brassica florida, Ad. Ger.

Brassica cauliflora, Dod. Cam. ep.

Brassica florida botrytis, Lob.

Brassicæ capitata genus 3. Cæs.

Brassica prolifera florida, Tab.

An hæc Theophrasti, qui nullum aut parvum semen producere scribit?

*Brassica non capitata.*I. *Brassica alba vel viridis.*

Brassica, Brunf. lævis, Matth. Cæs. Cast.

Brassicæ sativæ majoris species altera, Trag.

Brassica candida, Gef. hort. lata alba, Lon.

Brassica alba vulgaris, Lugd.

Brassica vulgaris, Ad. fativa, Lob. Dod. Ger.

Brassica prima, Tab.

Brassica in India, folia semper hiantia servat, nec unquam capita profert: part. 4. Ind. Or. c. 10.

Hæc est *Brassica lævis* Theoph. & Plinij, cui & *Caulodis*.

Hanc altitudine arbores adæquantem Monardes Florentiæ vidit.

II. *Brassica rubra.*

Brassicæ 1. genus, Fuch. rubræ 1. genus, Lugd.

Brassica Cumana sive rubra, Dod. gal.

Brassica prima, Tur. vulgaris, Cord. in Diosc.

Brassica rubra, Gef. hort. Ad. Lon. Tab. Ger.

III. *Brassica spinosa*: hujus in Phytopinace & Matthiolo (ubi & icon) mentio fit: & in Prod. sub 2. describitur.

IV. *Brassicæ folia peregrina.*

Achanaca Theveto, & Lugd. qua in regno Melj, ut nos Guajaco, utuntur.

V. *Brassica Brasiliæ folijs Nymphææ.*

Cajova brassicæ genus, Cajov-a Lerio descript. *Brass. cap. 12.*

*Brassica crispa.*I. *Brassica alba crispa.*

Brassica crispa, Matth. Lac. Gef. hort.

Brassica alba crispa, Lugd.

Brassica Sabauda, Dod.

Brassica Sabauda crispa, Tab. Ger.

Brassica patula crispa Sabauda æstiva, Lob. ico.

quibusdam Lacuturris, alijs Sabellica Plinij.

II. *Brassica asparagodes crispa.*

Brassica asparagodes, Dalech. Lugd.

Brassica crispa prolifera, Tab. Ger.

Brassica epiphyllitis.

Folia

Folia modò laciniata, modò plana & expansa: vel tota viret, vel venæ & costæ rubent: hinc prolifera, & prolifera crispa, Tab. & Ger.

III. *Brassica fimbriata*.

Brassica 2. genus, Fuch.

Brassica Sabellica five crispa, Dod. gal.

Brassica crispa, Dod. Lugd.

Brassica nigra, Dod. Lugd.

Brassica nigra crispissima, Cæf.

Brassica fimbriata, Lob. tophosa, Tab. Ger.

IV. *Brassica fimbriata pumila*.

Brassica Anglica, minima, Ad.

Tota nivea, oris fimbriatis purpureis, maculis aspersis.

Brassica Apij folio.

I. *Brassica lato Apij folio*.

Brassica folijs laciniatis, Matth.

Brassica tenuifolia laciniata (prior,) Lob. Lugd.

Brassica Selinifolia latifolia, Tab. Selinifolia, Ger.

II. *Brassica angusto apij folio*.

Selinada & *Apiana*, Plinio.

Brassica crispa seu *Apiana*, Trag. Lon. Lugd.

Brassica rubra 3. species, Dod. gal. Lugd.

Brassica Selinoides, Dod. Selinifolia angustifolia, Tab.

Brassica Selinoides, Ger. scissis folijs, Cæf.

Brassica Apiana crispa, Cam.

Brassica sylvestris.

I. *Brassica arvensis*.

Brassica syl. Trag. *Crambe dicta*, Dod. Tab.

Brassica 3. Fuch. Lugdun. 7. species, Dod. gal.

1. Tur.

II. *Brassica sylvest. Dioscoridis*, Dod. Port.

Brassica sylvestris, Ang. Matth. Lugd. Cæf.

Subhirsuta alijs, alijs lævis, alijs Hyoscyami modo hirsuta, Matth. Amat.

III. *Brassica maritima monospermos*.

Brassica sylvestris, Tur.

Brassica marina monospermos, Lob. ico. sylv.

multiflora, monospermos, Ad. Lob. ico. Lugdun. Ger.

Brassica marina Anglica, Ger. ico.

Brassica Anglica, Tab.

IV. *Brassica campestris perfoliata flore albo*.

Perfoliata, Lon. altera, Trag.

Perfoliata filiquosa five major Tragi, Cam.

Brassica agrestis, Cord. hist. Lugd. cui altera species.

Perfoliata minor, Ges. hort.

Brassica campestris 1. Clus. hisp. & hist. Cast. Lugd.

Brassica sylv. five *campestris*, Cam.

an *Brassica* sylv. folio betæ, Thal.

Perfoliata Napifolia Anglorum filiquosa, Lob. icon.

Perfoliata filiquosa, Ad. Lob. ob. Ger. Napifolia, Tab.

Brassica sylv. *perfoliata*, Dod.

V. *Brassica campestris perfoliata flore purpureo*.

Brassica campestris altera, Clus. hisp. & hist.

VI. *Brassica* syl. latifolia folijs non sinuosis.

Brassica sylv. major latifolia, Thal.

VII. *Brassica* sylv. ramosa glabra.

Brassica sylv. virgata, Cord. hist.

Brassica sylv. procera, Thal.

Brassica sylv. prima Cordi, Lugd.

VIII. *Brassica sylvestris folijs circa radicem cichoraceis*.

Sinapi album, Lugd.

Brassica sylvest. longifolia, Thal.

IX. *Brassica sylvestris hispida non ramosa*.

Turritis, Lob. ico. Tab. Ger.

Turrita vulgarior, Clus. hist.

Vaccaria, Taber.

X. *Brassica* sylv. ramosa hispida.

Turrita rarior, Clus. hist.

XI. *Brassica* syl. folijs membranaceis: sylvestrem mediam, & sylv. minorem Thalius habet, quas non novi.

XII. *Brassica* sylvest. alpina: quæ sub 3. in Prod. describitur.

Turritis alpina nomine D. Burserus misit.



SECTION

SECTIO QUARTA.

ISATIS SIVE GLASTUM: LAPATHVM: ACETOSA: SPINACHIA: RHACENTAURIUM MAJUS.

ISATIS SIVE GLASTVM.

Ἰσάτις sativa (Dioscoridi l.2.c.215.) folia habet plantaginis sylvestris, lactuce similia: quare genera duo fecit: & Plinio l.20.c.7. lactuce spontaneae tertium genus, quod isatim vocant: & quartum quod Glastum vocitant, folijs priori simile aut laphato sylvestri.

I. Isatis sativa vel latifolia.

Isatis domestica, sive Glastum, Matth. Cast.

Isatis sativa, Trag. Fuch. Dod. ut Cord. in Diosc.

(cui & Latinorum Lurea & Glastum) Gesl. hor.

Lac. Lon.

Glastum sativum, Tur. Ad. Lob. Cam.

Glastum, vulgo Guadam, Cæs. cui & Isatis syl.

Dioscorid.

Isatis Græcorum, Nil Avicennæ, Indicum of-

ficinorum, Fragofo, & Aniraliud.

II. Isatis sylvestris vel angustifolia.

Isatis syl. Trag. Matth. Fuch. Dod. ut Gesl. hor.

Lac. Lon. Lob. Lugd. Tab.

Glastum, sive Isatis sylvestris, Ad.

Isatis agrestis, Cord. in Diosc.

Glastum syl. Tur. Cam.

III. Isatis Indica folijs Rorismarini, Glasto

affinis.

Anil herba folijs Mungiriqua (ocymo Clusi-

us vertit) similibus, Garziæ & Acoftæ: cum

Isatide multum convenire, addit Clus. & Nil

apud Avicennam, interpres Glastum vertit.

Nil sive Anil, Cam.

Annil sive Indigo, Gali sive Nil, herba roris-

marini facie, Linsc. 4. par. Ind. Or. 25.

Herba anil sive Enger, 4. per. Ind. Or.

Planta ex qua Annil sive Indigo conficitur, par.

9. Ind. Occid. l. 4. c. 23.

Agnir, Fragofo.

Pastellus herba ad colorandas lanas expetita,

& cujus venditione in Insulis Azores victum

comparant: Linscot, par. 3. Ind. Or. 6.

Indigo in Sian crescit maxima copia: part. 8.

Ind. Or.

Color Indicus quem in Cambaja Anil vocant

par. 2. Ind. Or. 11.

IV. Isatis montana.

Glastum montan. Dalechamp. Lugd. quid est?

V. Wassevvovv herba quam decoquunt pro

rubri coloris tinctura in Virginea.

RAPATHVM ET EJVS SPECIES.

*L*apathum à Theophr. l. hist. 9. inter olera numeratur: & 7. hist. 2. sylvestris tota forma cum

perfectum est, Beta proximum cernitur. Λαπάθιον Diosc. l. 2. c. 140. ab effectu nominatur,

à λαπάειν exinamendo, quod foliorum decoctum album emolliat, & exinaniat: Latinis Ru-

max, ut Plinio l. 19. c. 21. qui Laparho sativo & l. 20. c. 21. Oxalidi tribuit.

Genera quinque Dioscoridi, ὀξυλάπαθον, κυπρίων, ἄρειον, ὀξάλιδα & ὑπολάπαθον,

Theophr. 7. hist. 6. in sylvestrem & urbanam partitur. Plinius lib. 20. cap. 21. meminit sativi,

sylvestris, quod Oxalidem vocat. Oxylapathi, Hydrolapathi, Hippolapathi, & Bulapathi. Lu-

bet ab Acetosa ordiri.

ACETOSA.

I. Acetosa pratensis.

Capathum 4. Diosc. sylvestre, Plinio.

Oxylapathum, Gal. Manardo.

Oxalis sive Rumex proprie, Hermolao.

Rumex acetosus, Ruel.

Acetosa, Brunf. Lon. major, Cast. Colum.

Oxalis, Trag. Matth. Lac. Fuch. Dod. Amat. Ad.

(& Lapathum oxalida) Lobel. Cæf. Tab. Ger.

Portæ major, Thal. Lugd.

Rumicis 4. genus, Tur. Cord. in Diosc.

Lapathi alia species, *εξάριδος* dicta quibusdam

Lapathum acutum, Ang.

Lapath. minimum, Oxalis dicta major, Gef. hor.

Acetosa major altera, herba S. quibusdam, Ren.

Hujus folia aliquando media parte virent, altera

verò candida sunt: aliquando in imo utrinq;

bifurcata: nonnunquam folia crispantur, & hæc

Oxalis crispa, Tab. & Ger.

II. Acetosa montana maxima.

Oxalis major Brokenbergensis, Thal.

an Oxalis altera, Cæf.

III. Acetosa montana geniculis nodosis.

Oxalis amplissimo folio, Clus. pan.

Oxalis montana maxima, Eid. hist.

IV. Acetosa montana bulbosa.

Acetosa quarta, Colum.

V. Acetosa tuberosa radice.

Oxalis tuber. Lob. Dod. Lugd. Tab. Ger. Cam.

an Acetosa altera minor bulbosa radice, Colum.

VI. Acetosa Americana, folijs longissimis

pediculis donatis: hæc 1. in Prod.

Acetosa vesicaria peregrina, Eyst.

VII. Acetosa calthæ folio peregrina.

Oxalis Zarynthi, Alpino.

VIII. Acetosa rotundifolia hortensis.

an Lapathum tertium, Diosc.

Oxalis Romana & Veterum, Dod. gal.

Oxalis rotundioribus folijs, Gef. hort. rotundi-

folia, Dod. rotunda, Lugd. Tab.

Oxalis fativa Franca rotundif. repens, Ad. Lob.

Oxalis Franca seu Romana, Ger.

Oxalis tertia, Cæf.

Acetosa rotundis folijs, Cam. qui &

Acetosa Hispan. grandissimis folijs meminit.

Acetosa major quæ & repens, Renod.

Ludit folijs, communiter subrotundis, rari-

us ad formam foliorum Boni Henrici oblongis

& in acutum desinentibus.

IX. Acetosa rotundif. alpina; quæ 2. in Prod.

X. Acetosa scutata repens: hæc 3. in Prod.

XI. Acetosa Cretica femine aculeato.

Hæc in Phytopinace sub 10. in Prodr. sub 4.

descripta, & Matth. una cum figura adposita.

XII. Acetosa Ocimi folio Neapolitana.

Acetosa tertia, vel Acetosa ocimi folio Neapo-

litana *βουφάδις*, Colum.

Hanc D. Columna misit.

XIII. Acetosa arvensis lanceolata.

Oxalis minima, Trag. (& Lapatiolum) Dod.

Oxalis minor, Matth. Gef. hort. Lugd.

Oxalis tenuifolia sinuata vervecina, Ad. Lob.

Acetofella, Lon.

Acetosa minor, Cast.

Rumicis seu Lapathi 6. genus, Cord. in Diosc.

Oxalis spontè nascens, Cæf.

Oxalis ovina, Tab. tenuifolia, Ger.

Acetosa syl. omnium minima, Renod.

Ratione loci pinguioris aridiorisve, major

minorve, latioribus angustioribusve folijs re-

peritur.

XIV. Acetosa lanceolata angustifolia re-

pens: hæc 4. in Prod.

Hujus species minor videtur, quæ dicitur

Oxalis minima 1. Tab. minor, Ger.

XV. Acetosa arvensis minima non lanceolata.

Oxalis minima 2. Tab. minima, Ger.

XVI. Acetosa folijs similis villosa.

Herba Joh. infantis, Monardi, Lugd. Frag. Cast.

LAPATHUM.

Lapathum hortense.

I. Lapathum hortense folio oblongo, sive

secundum Dioscoridis.

Rumex hort. vel 2. Trag. fativus, Cord. in Diosc.

Lapathum hortense, Gef. hort. Lugd.

Lapathum fativum, Ang. Dod. descr.

Hippolapathum syl. Matth. edir. prima, Lugd.

II. Lapath. hort. seu Spinacia femine spinoso.

Spinachia Manardo, & Atriplicis forte genus

Bras. Brunf. Fuch. Dod. Tab.

Spinacia, Hermol. Matth. Ad. Lob. Cæf. Ger.

mas, Cam.

Spinachia, Atriplex Hispaniensis Ruellio, &

Seutlomalachon, Lon. Cast.

Spinachium, Matth.

Spinacia fativa mas, Lugd.

Oxus Hispanicum Spinachia vulgaris, Trag.

Spinaceum olus, & Spinachia mas, Gef. hort.

Spinachia, ob semina dura & spinosa, Græcis

recent.

recentioribus *σπινάχια* à raritate in usu Medico, alijs Seutolapathum, hoc est, mediæ naturæ inter Betam & Lapathum: alijs Seutomalache.

III. Lapathum hortenfe seu Spinacia semine non spinoso.

Spinachia nobilis & r. Trag.

Spinachia sylvestris, Lugd.

an Spinachia sylvestris, Cæsalp.

Hujus figuram in Matthiolo exhibemus.

IV. Lapathum hortenfe seu Spinacia sterilis.

Spinachia tertia, Trag.

Spinachia foemina, Ruel. Scalig. Lugd. Cam.

Lapathum syl.

I. Lapathum folio acuto plano.

Oxylapathum, Diosc. & Plinij.

Lapathum acutum, Lob. Ger. desc.

Lapathum acutum, Trag. five acutifolium, Ad.

Oxylapathum, Herm. Corn. Amato, Ruel. Fuch.

Dod. gal. Matth. Lac. Cast. Lugd. Portæ.

Rumicis 1. genus, Tur.

Rumex & Lapathum sylv. Bras. acutus, Cord.

in Diosc.

Lapathum syl. Gef. hort. Dod. sativum, Cam.

Lapathum seu Rumex, Matth. ico. Lon. Cast.

Cæsalp.

Hippolapathum syl. Tab. videtur.

Hydrolapathum magnum, Ger. ico.

II. Lapathum folio acuto crispo.

Lapathum acutum crispum, Tab.

Hydrolapathum minus, Ger. ico.

Rumex minor, Thal.

III. Lapathum folio acuto rubente.

Lapathi tertij altera species, five Lapathum ni-

grum, Dod. gal.

Rumicis species folijs rubentibus venis distin-

ctis, Cord. ob.

Sanguis draconis herba, Gef. hort. Lon.

Lapathum sanguineum, Ad. Lob. Cam. Ger.

sine icone seu maculatum Renod. rubens, five

nigrum, Dod.

Lapathum rubrum, Cam. in Matth.

Lapathi syl. 3. genus, Lugd.

Folij paulo latioribus, rotundioribusque

vulgari scribit Cæsalpinus,

Lapathum rubrum Cretense, nominans.

IV. Lapathum folio acuto flore aureo.

Lapathi syl. 4. genus, Dalech. Lugd.

V. Lapathum minimum.

Lapathum acutum minimum, Lob. ico. Ger.

Lapathum minimum, Tab.

VI. Lapathum unctuosum, folio triangulo.

Bonus Heinrichus, Brunf. Trag. cui & Spina-

chia sylvestris, Matth. Tab. Ger.

Rumicis 2. genus, Tur. 3. genus, Trag. Fuch.

Atriplicis syl. species, Gef. col.

Atriplex canina, Lon. ico.

Tota bona Spinaciæ facie, Ad.

Tota bona, Lob. Dod. (quibusdam Chrysolachanum) Thal.

Lapathi syl. secundum genus, Lugd.

Piger Heinrichus spinaceum olus syl. Renod.

Folij maximis Aaronis instar aliquando

reperitur.

VII. Lapathum folio minus acuto.

Lapathi 3. species, Dod. gal.

Lapathum syl. Ang.

Rumex agrestis, Cord. in Diosc.

Lapathum folio retuso, Ad.

Lapathum folio minus acuto, Lob. ico.

Lapathum hortenfe five Theophrasti.

I. Lapathum hortenfe latifolium.

Hippolapathum Dioscoridi, Galeno, Plinio,

& Rumex urbana, Theoph.

Rhabarbarum, Brunf.

Rhabarbarum in hortis Germaniæ, Corn.

Rhabarbarum Monachorum (Franciscano-

rum) Trag. Gef. hor. Cam. Portæ, Thal.

Hippolapathum, five Rhabarbar. Monacho-

rum, Ang. Gefn. (aut ejus species) Dod.

Hippolapathum, & Hippolap. hortenfe Mat-

thiolo: sativum, Cast. Tab.

Hippolapathum longifolium Alp. sativum la-

tifolium, Ad. Lob. (& Patientia vulgi) Lugd.

cui & Hippolapathum hortenfe, Matthiol. &

Lob. figura,

Rumicis 2. genus, Fuch. 3. genus, Tur.

Lapathum sativum, Dod. gal. hort. Lac. Lon.

maximum, Gef. hort. magnum, & Hippolapa-

thum, Cæf.

Lapathum latifolium, Cam. Hippolapathum

veterum Bulapathum, Scalig.

Lapathi species, Cord. in Diosc.

Rumex major, idem cum Rhab. nisi quod sit

sylvestrior, Thal.

II. Lapathum hortenfe rotundifolium five

montanum.

Lapathum rotundum, Ang. an Lapathum fo-

lij fere rotundis, Gef. hort.

Lapathum rotundifolium, Clusio pan. Cam.

Hippolapathum rotundifolium, & Pseudo-
Rharentiorum, Ad. Lob. Lugd.
Lapathum montanum, Cæs.
Rumex latifolius, Clus. hist.
Rhabarbarum Monachorum triplex vidi 1. folio
oblengo, radice longa, fibris oblongis, in-
trinsecus rufescente: 2. folio rotundo: 3. folio
subrotundo, fibris transvers. radice intus flava.

Lapathum aquaticum.

I. Lapathum aquaticum folio cubitali.
Rumex palustris, Trag. aquaticus, Thal.
Rumicis 5. genus, Cord. in Diosc.
Lapathum 1. Ang. palustre, Tab. sub Lapatho
acuto, Ger. ico.

Hippolapathum, sive Lapathum 4. loco descri-
ptum, Dod. gal. Matth. Ges. hor. Lon.
Hippolapathum sylv. Matth. desc. Cast. Thal.
cui & Hydrolapathum.
Hydrolapathum magnum sive aquaticum,
Ad.
Hydrolapathum majus, Lob. Lugd.
Lapathum sativum, Dod. ico. qui in descri-
ptione confundit, Hippolapathum & Hydro-
lapathum.

II. Lapathum aquaticum minus.

Hydrolapathum minus, Lob. Lugd. Tab.
Hippolapathum sativum, Ger. ico.

III. Lapathum maritimum foetidum: hoc
in Prodomo describitur.

RHA ET EJVVS SPECIES.

Cum Hippolapathi utriusque radix, pro Rhabarbaro, sed in dupla, triplave dosi usurper-
tur, nunc de Rhabarbaro: dein Rhapontico, quod quibusdam ex Lapathi generibus:
rum de Centauro magno, cum id vulgo Rhaponticum & nominetur, & pro eo vendatur, & et
aliqui Hippolapathi rotundi folij radicem substituant.

Rhabarbarum, Dioscoridi, lib. 3. cap. 2. p. 2. & p. 3. Rha, & Rheum, cujus tantum radicem
describit, dictum voluit. Romanis. Rhaponticum appellatum: Arabibus, Raved & Rhabar-
barum: cujus tria genera Mesueo 2. med. purg. 5. Indicum quod optimum & Rhavedseni
vocant: alterum Barbarum: tertium Turcicum, quod deterius, in quo genere Rhaponticum
fuerit, quale est Rhabarbarum acerbum officinarum, colore minus vario, minus croceo, minus
odorato, minus densum, ac facultate minus solvente. Verum videtur Dioscorides suo Rha,
non Rhabarbarum nostrum, cujus Mesues meminit, sed Rhaponticum, cujus iconem Lobelius
proposuit, intelligere.

I. Rhabarbarum Officinarum.

Rhabarbarum nostrum, sive Raved Seni Ara-
bum: idem genere cum Dioscoridis Rhaponti-
co, tantum loco differens, Cord. in Diosc.
Rhabarbarum seu Indicum, Cord. hist.
Rhabarbarum & Rhaponticum idem, nisi
quod hoc immaturum sit. Ang.
Reobarbarum, Lac.
Rhabarbarum cholagoga, Ad.
Rhabarbarum Garzia, Acoftæ, Frag. Lob.
Rhabarbarum tertium, Tab. secundum, Ger.
Rhabarbarum Americanum, Monar.
Rheon offic. Dod.
Rhabarbari 2. nomine, aliam cum folijs & ra-
dice pingit Tab. sub Hippolapatho rotundi-
folio apud Ger.
Rhabarbaricum verum, Lapathorum generis
videtur, Gesl. hort.

Rhabarbaricum, Cord. hist.

Rhabarbarum, nullibi, nisi in China prove-
nit, quæ inde per Usbeken in Turciam, hinc
Venetias deferitur; & quidem vel navibus,
quod citius corrumpitur, vel itinere terrestri,
quod durabilius & carius, Linsc. par. 4. Ind.
orient. 29. quæ forte ex Pauli Veneti, lib. 2. de-
sumpta.

II. Rhabarbarum Matthiolus pingit, quem
sequuntur, Lon. Lugd. Cast. Tab. & Ger. an
idem sit cum superiore, cum Rhabarbari nec
folia, nec flores visa sint, ignoramus: meminit
quoque Alpinus Rhabarbari, quod habeat fo-
lia Rumice latiora, crassiora, & lanugine alba
obscita, Cam. suo Matthiolo radicis fragmen-
ta addit.

III. Rhaponticum folio Lapathi majoris
glabro, Rha & Rheum Dioscoridis.

Ponti-

Ponticum Rha antiquorum, Ad. Lob.
an Rhapontica, Lon. Rhaponticum verum
offic. Tab.
Rha Græcis cognitum Monardi.
Rhaponticum siccatum, Ger.
Rhaponticum Thracicum, Alpino.
an Rhaponticum, vetusto Codice, Tab.
an Rheum antiquis appellatum, Cæs.
IV. Rhaponticum folio Helenij incano.
Rha, Rhecoma & Rhacoma Plinij, Dod. gal.

Rhaponticum, Lac. Cast.
Centaurium majus montanum folijs Enulæ,
forte, Gefn. hort.
Rha capitatum folio Enulæ Centaurij majoris
facie, Ad. Lob.
Rha five Rhei, ut existimatur icon, Dod.
Rhapontici icon alia, Tab.
Rha capitatum, Ger. Helenij folio, Lugd.
V. Rhaponticum angustifolium incanum.
Rhaponticum alt. angustiore folio, Lob. Lugd.

CENTAURIUM MAJUS.

Centaurei majoris Dioscoridis, lib. 3. cap. 8. & Plinius, lib. 25. cap. 4. & 6. Item, l. 26. c. 15.
& alibi meminere, Theophrastus 1. hist. 19. ubi Fel terra Gaza reddit, ut & 9. hist. 14. at
3. hist. 5. Centaurium vertit.

I. Centaurium majus folio in laciniis plu-
res diviso.
Rhapontica, quæ hodie Centaurea major,
Trag. Er. Cord.
Centaurium majus, Ang. Tur. Lac. Ad. Lon.
Lob.
Centaurium majus alterum, Gefn. hort.
Centaurium magnum, Matth. Dod. Cast.
Centaurium majus, Rhaponticum Pharma.
Cord. in Diosc. & hist. Cam. Tab.

Centaurea major, Cæsalp.
Centaurium majus 1. vulgare, Clus. hist.
II. Centaurium majus folio non dissecto.
Centaurium majus alterum, Clus. hisp. & hist.
Dod. Ad. Lob. Lugd.
Rheu Baldense quonondam Ponæ.
III. Centaurium Alpinum luteum.
In Phytopinace sub 3; & in Prodrom. descrip-
tus, & postmodum Rhapontici Lusitanici
nomine, ex horto Patavino accepimus.

SECTIO QUINTA.

BETA: BLITVM: ATRIPLEX: HALI-
MVS: AMARANTHVS: PARIETARIA:
MERCVRIALIS: PHYLLON.

BETA ET EJVS SPECIES.

Betam Dioscorides, l. 2. c. 149. πούλον nominat, dicitur & πούλον ab impulsu, quod facile
exerescat: Beta vero, quoniam figuram literæ β dum semine turgere referre videatur.
Genera: Dioscorides nigram & candidam fecit: & Theoph. 7. hist. 4. candida sapore
nigra præstantior, quæ Sicula (nunc Cicla Practicis) appellatur: at 6. hist. 3. & sylvestris
in genere Carduorum meminit, quæ tamen folia aculeata non habeat. Plinius, lib. 19. cap. 8.
ex Theoph. Beta à colore duo genera Græci faciunt, nigrum & candidius, quod præferunt
appellantiq. Siculum: nostri (subjungit) Beta genera faciunt Vernal & Autumnale. Idem,
lib. 20. cap. 8. Candida nigraq. usum proponit, & sylvestrem, quam Limonium vocant,
addit, quam Dioscorides, lib. 4. cap. 16. λεμόνιον nominat.

Beta minor.

I. Beta communis sive viridis.

Beta agreftis, Trag.

Eandem cum Beta sequenti qui volet, dicat.

II. Beta alba vel pallefcens, quæ Cicla offic.

Beta, Brunf. Tab. Ger. candida, Trag. Fuch.

Tur. Cord. in Diosc. Dod. Lac. Lugd.

Beta alba, Matth. Anguil. Gef. hort. Lon. Ad.

Lob. Cast. Cam.

Beta folio brevior & viridior, Cæf.

Variat foliorum colore, viridi, vel ex obscuro magis virente, quam nigram vocant etiam Adverf. & Lob. in obfer.

III. Beta rubra vulgaris.

Beta rubra, Brunf. Trag. Lon. Dod.

Beta nigra, Ang. Matth. Fuch. Dod. gal. Lac.

Gef. hort. (& rubra) Cast. Lugd.

Beta rubra vulgarior, Ad. Lob. Lugd.

IV. Beta rubra radice rapæ.

Beta rubra, Matthiol. Gefn. hort. (cui & Seustaphylinum) Ad. Lob. Cast. Lugd. rubra

Romana, Dod.

Rapum rubrum, Fuch. Gef. hort.

Rapum fativum rubrum, Fuch. ico.

Beta nigra, Cord. in Dioscor. nigra Roman.

Dod. gal.

Beta species 3. Ang. Cæfalp.

Beta erythrorrhizos, Lugd.

V. Beta Cretica semine aculeato.

In Phytopinace sub 6. & Matthiolo & Prodr. (addita figura) descripsimus.

VI. Beta lato caule.

Beta πλατύκαυλος, Dalech. Lugd.

VII. Beta syl. maritima.

Beta syl. spontanea marina, Lob. ob.

Beta major folijs latissimis.

I. Beta pallide virens major.

Beta altera, Cæfalp.

II. Beta rubra major.

III. Beta lutea major.

Beta flava, Gefn. hort. lutea, Cam.

Beta quarta radice buxæ, Cæfalp.

BLITVM ET EJVS SPECIES.

Bλῖτον Dioscoridi, lib. 2. cap. 143. quasi βλατὸν abijciendum, vel propter inerriam & vilitatem, vel ob insulsum fativumve saporem. Festus, à βλαξ̄ pisce omnino inutuli, deducit: licet & stolidum & insulsum significet: Blitum, Plinio, lib. 2. cap. 22.

Genera Theoph. 1. hist. 9. plura dixit, at nec Dioscorides, nec Plinius, differentias proposuere. Aliud majus est, aliud minus: utrumque album & rubrum.

I. Blitum album majus.

Blitum album, Matth. Cast. majus, Dod.

Blitum majus album, Dodon. gal. Ad. Lobel. Lugd.

Blitum, Lac. fativum album, Gefn. hort.

II. Blitum album minus.

Blitum, Trag. ico. Fuch. Tur. Dod. gal. Lon.

Blitum minus, Dod. minus album, Ad.

Blitum sylv. album, Gefn. hort. sylv. minus, Thal.

III. Blitum polyspermon à seminis copia.

Blitum 3. Trag. syl. Cam. in Matth.

Polyspermon Calsiani, Anguil. Lugd. Lobel. observ.

Polyspermon, Lob. icon. Tab.

Atriplex sylv. sive Polyspermon, Ger.

IV. Blitum rubrum majus.

Blitum rubrum, Matth. Ad. Lob. ico. Camer. Cæfalp.

Blitum rubens, Dod. majus rubrum, Dod. gal. hortense rubrum, Gefn. hort.

Blitum rubrum minus, Matth. in ico. Lugd.

Blitum nigrum, Ang.

Blitum, Lob. ob. Tab. Ger.

V. Blitum rubrum minus.

an Sanguinaria, Brunf.

Blitum nigrum, Trag. minus rubrum, Dod. gal.

Blitum sylv. rubrum, Gefn.

Blitum rubrum minus, Ad. rubrum supinum, Lob. ico.

Blitum alterum sylv. Cæfalp.

Hoc vel caule tantum, vel omnibus partibus rubet.

ATRI

ATRIPLEX ET EJV S. Species.

A Τρεῖς φάξις, παρὰ τὸ ἀθρόως αὐγεῖν, cū octavo die à satū prodeat, Theoph. 7. hist. 1. χρυσαύχενον, olus aureū, à luteo flore, quem ferr, Diosc. lib. 2. cap. 145.
Genera duo Diosc. & Plinio, lib. 6. cap. 20. sylvestri & sativum. Dividimus in hortensem, sylvestrem & maritimam.

Atriplex hortensis.

I. Atriplex hort. alba sive pallide virens.
Atriplex sativa, Trag. Dodon. gal. Lac. Ad. Lugd.
Atriplex sativa alba, Lob. ico.
Atriplex, Matth. ico. Cæsalp. hortensis, Fuch. Cast.
Atriplex domestica, Ang. Matth. fol.
Atriplex alba, Gefn. hort. sativa viridis, Cord. in Diosc.
Atriplex alba viridis, Lon.
Folio est in luteum languescente, vel pallide virente: est & nigricante.
II. Atriplex hortensis rubra.
Atriplex sativa folio rubicundo, Trag.
Atriplex rufo folio, Cord. in Diosc.
Atriplex sativa altera, Dod. gal. Lugd.
Atriplex hortensis, Dod. hortensis rubra, Lon.
Atriplex sativa, Lob. ob. sativa altera folio & flore purpureo livens, Ad. Lob. ico.
Atriplex rubra, Tab. sub sativa alba, Ger. ico.
Atriplex purpurea grandis, Cam.

Atriplex sylvestris.

I. Atriplex sylv. folio sinuato candicante.
Atriplex sylv. 2. Matth. Lugd.
Atriplex sylv. Ang. Cord. in Diosc. Gefn. col. Cæf. Tab. sub Atrip. marina, Ger. ico.
Atriplex sylv. sinuata, Ad. vulgatio sinuata, Lobel.
Atriplex fimetaria major, Thal.
II. Atriplex sylv. altera.
Atriplex agrestis, Trag. sylv. prima, Matth. edit. 2. Lugd.
Atriplex sylv. Fuch. Dod. Lon.
Atriplex fimetaria minor, Thal.
Cynocrambe 1. Cæsalp.
III. Atriplex sylv. latifolia.
Blitum 4. & Solanum 4. Trag.
Atriplex sylv. 3. Matth. Lugd.

Atriplex sylv. sive Pes anserinus latifolia, laceris lacinijis, Ad. Lob.

Pes anserinus, Fuch. Dod. Lon. Lugd. Cam.
Cynocrambe alterum genus, Cæsalp.

Chenopodium 1. Tab.

IV. Atriplex sylv. latifolia acutiore folio.

Blitum 5. & Atriplicis sylv. genus, Trag.

Bliti species, Lon.

Chenopodium 2. Tab. sub Atriplice sativa purpurea, Ger. ico.

V. Atriplex syl. fructu compresso roseo: hæc 1. est in Prod.

VI. Atriplex sylv. mori fructu.

Atriplex sylv. baccifera, Clus. hist.

VII. Atriplex sylv. lappulas habens.

Hæc in Phytopinace sub 8. & in Prod. sub 2. descripta, in Matthiolo quoque nostro depicta. In monte Ventoso Gallie Narbonensis, major existit.

VIII. Atriplex fœtida.

Atriplex canina & Blitum fœtidum, Trag.

Tragium Germanicum, Dod. gal.

Garosimum, Cord. hist. Dod.

Atriplex sylv. altera, Gefn. hort.

Atriplex pusilla, olida, hircina, Ad.

Atriplex olida, Lob. Ger. canina, Lon.

Vulvaria, Cast. Tab. Lugd.

Cynocrambe affinis, Connina vulgo, Cæf.

IX. Atriplex angusto oblongo folio.

Atriplex sylv. altera, Dod. gal.

Atriplex sylv. 1. Matth. & 2. Lugd.

Atriplex sylv. polygoni aut Helxines folio,

Ad. Lob. Cam.

Atriplex sylv. humilime, Dod.

Atriplex sylv. 3. Cam. in Matth.

Folij est oblongis angustis non sinuatis, rarius foliorum principio alis duabus appositis.

X. Atriplex Virginiana.

Atriplicis genus, ex cuj. semine pulicula fit, ex caulis cineribus Sal, quo ad faciendos cibos utuntur; in desc. Virginie, vel Ind. occid. par. 1.

Atriplex

Atriplex maritima.

I. *Atriplex maritima laciniata.*
Atriplex marina, Matth. Cast. Dod. Lugd. Cam.
Atriplex marina repens, lutea & xerampelina, Ad.
Atriplex marina repens, Lob.

Cynocramez, genus, Cæs.
 Reperitur rubro & etiam herbaceo semine.
 II. *Atriplex halimi folio.*
Atriplex halimoides, Lob. ob.
 III. *Atriplex maritima angustifolia*: hæc
 3. in Prodromo.

H A L I M V S.

Ἀλμυρ Dioscoridi l. i. c. 121. id est, *marinus*, eò quòd in maritimis proveniat: vel rectius, ut Plinius l. & cap. 22. *Olus maritimum salsum*, & inde nomen, nam & alibi quam in maritimis provenit: quòd verò Plinius sine aspiratione legat, fortè factum quia Solinus, *Alimon* in Creta nasci prodidit, mirabili effectù, quòd ea admorsa interdum nulla fames sentiat, ut inde ei nomen impositum sit, quòd famen arceat. Et apud Theophr. 4. hist. 20. ἄλμων legitur, ubi *Gaza Auronem* vertit.

Generum duorum Plinius l. c. scribit, *sylvestre* & *mitius*: per *mitius* *sativum* intelligens, quem *Tholosani*, ut Lugd. historia vult, in hortis habent, & ab effectù herbam *Colicam* vocant: sic & *sylvestris* non longe *Tholosà*, in quibusdam sepibus nascitur.

I. *Halimus latifolius* sive fruticosus.
Halimus, Dioscoridi. *Alimus mitius*, Plin.
 an *Halimus*, Ang.
Halimus, Ad. Lob. primus, Clus. hisp. & hist.
Halimus alter latiore folio, Cæs.
Portulaca marina, Dod. ico.

II. *Halimus verus Dalech.* Lugd. quid? cuius Clusius in hist. meminit, ejus fidem dubiam scribens.

III. *Halimus angustifolius procumbens.*
Halimus 2. Clus. hisp. & hist. descr.
 sub *Portulaca obiter*, Dod.

IV. *Halimus seu Portulaca marina.*

Halimus vulgaris, Matth. Eyst.
Halimialia species, Sandalida Cretens. Ang.
Portulaca marina, Dod. ut. Tur. Lem. Ad. Lob.
 Lugd. Tab.
Halimus 3. Clus. hisp. & hist. sed figur. in hist. est sub 2.

Halimus 1. tenuiori folio, Cæs.
 Videtur *Alimus sylv.* Plinij: licet *Lemnium* *Halimum esse* neget: & Advers. & Lobelius *Crithmum Dioscoridis* suspicentur.

V. *Halimus minor*: qui in Prodr. describitur, & nomine *Halimi aurei arvi* D. Feurerus *Northusà* misit.

A M A R A N T H V S E T E J V S
Species.

Ἀμαρανθ dicitur, quasi *immarcescibilis*, eò quòd hujus flos decerptus non marcescat, & cum cuncti flores defecere, aqua madefactus reviviscat, & hybernas coronas faciat, ut habet Plin. l. 21. c. 8. At Theophr. 6. hist. 6. φλόξ dicitur, *Gaza Flammam* vertit.

I. *Amaranthus maximus.*
Blitum, Matth. in ico. majus, Eid. fol.
Blitum rubrum majus, Cast. Lugd.
Amaranthus purpurascens 3. Dod. gal.
Amaranthi species arborecens, Gei. hor.
Amaranthus major floribus paniculosis spica-

tris purpureis, Ad. Lobel.
Amaranthus major fl. obsoleti coloris, Dod.
Bliti peregrini genus 1. Cæs.
Blitum Indicum, Tab.
Amaranthus magnus, Cam.
Amaranthus paniculà sparsà, Ger.

Qui-

Quinoa sive Blitum majus Peruanum, Clus. hist.
Amaranthus major paniculis rubris, Eyst.

Petrus Cieca. granis dicit rubris, quo se Quinto incolae sustentent; noster alba fert.

Variat: altera hujus species paulo humilior, dilutior panicularum colore & folijs angustioribus.

II. Amaranthus paniculâ incurvâ.

Amaranthus purpureus 2. Dod. gal.

Amaranthus holosericeis sanguineis reticulatis floribus, Ad. Lob.

Amaranthus holosericeus, Lugd. cristatus, Camer. Eyst.

III. Amaranthus paniculâ conglomeratâ.

Amaranthus, Cæs. primus, Cast.

Flamma, Ang.

Amaranthus Plinij major, Gef. hort.

Amaranthus purpureus saturo coccineus, Ad. Lob.

Amaranthus saturo cocci colore, Dod.

Amaranthus purp. Lugd. Ger. purp. major, Tab.

IV. Amaranthus simplici panicula.

Circæa, Trag.

Amaranthus, Matth. parvus, Cam.

Amaranthus purpureus, Fuch. Tur. Dod. gal. Cord. in Diosc. & hist.

Amaranthus Plinij minor, Gef. hort.

Amaranthus communis minor, Eid. col.

Amaranthus angustifolius simplici spicatâ paniculâ, Lob.

Amaranthus angustifolius, Lugd.

Amaranthus vulg. Tab. sub Amarantho coccineo, Ger.

Amaranthus spicatus, Eyst.

V. Amaranthus folio variegato.

Celosia, Trag.

Blitum maculatâ peregrinum, Theombrotum

Plinij quibusd. Corchoro cognatum, Gef. hort.

Blitum maculosum & herba Papagalli, Dod.

Amaranthus tricolor, Ad. Lob. Tab. Ger. Eyst.

Amaranthus altera, Cast.

Amaranthus pictus, Cam.

Symphonia Plinij & Gomphrena, Lugd.

Bliti peregrini alterum genus, Cæs.

Varietas colorum, in altero hilarior extremo flavo, medio puniceo, reliquo viridi; aliquando viridi, luteo, rubro: in altero obscurior, illum foeminam, hunc marem faciunt.

PARIETARIA.

E ^{Asib} Dioscoridi l. 4. c. 86. à semine aspero vestibus tenaciter adhaerente: ^{neptinon} Galeno 6. simpl. quoddam Perdicis hac delectentur. Plinio l. 22. c. 17. Helxine & Perdicium. Parietaria, quoddam in parietinis exeat: unde Muralis herba, Cels. l. 2. c. 33.

I. Parietaria Officinarum & Dioscoridis.

Helxine, Brunf. (cui & Parthenij 7. species)

Matth. Dod. gal. Fuch. Lac. Gef. hor. Lon. Cast.

Lugd. Cam. cui & Urceolaris Scribonij.

Helxine, Ad. (Vitriola, sive Perdicium) Lob. Cæs.

Helxine altera, Cord. in Diosc.

Parietaria, Brunf. Tur. Cord. hist. Dod. Tab. Ger.

Parietaria vulgaris & major, Trag.

II. Parietaria minor ocimi folio.

Parietaria exigua vel i. Trag.

MERCURIALIS.

A ^{ισφωρις, παρθενιον, ηγουη βοτανον} Dioscoridi l. 4. c. 91. Linozostis sive Parthenium, Mercurij inventum (Plin. l. 25. c. 5.) ideo Græcis, hermu-poa, apud nos Mercurialis: Theoph. 9. hist. 19. ^{φωδον} censetur.

Genera: Dioscoridi, femina est & mas, & Linozostis syl. mas, quam ^{νωτον} nwoion à ^{νωτον} nwoion & ^{αυλο} αυλο vocat. Theophrasto, feminifica & masculica: Plinio, masculus & femina.

I. Mercurialis testiculata, sive mas, Diosc. & Plinij.

Mercurialis, Brunf. (cui parthenij 6. species)

Trag.

Mercurialis mas, Ang. Matth. Fuch. Dod. Lac.

Gef. hort. Lon. Ad. Lob. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Camer.

Mercurialis mascula, Tur. Cord.

Mercurialis fructum ferens, Cæs.

Phyllon arrhenogonon Theop. Cord. in Diosc.

II. Mercurialis spicata, sive femina, Diosc.

& Plinij.

Mercurialis vulgaris & i. Trag.

Mercurialis femina, Ang. Matth. Fuch. Dod.

Tur. Gef. hor. Lac. Cord. in Diosc. Ad. Lob. Cast.

Lugd. Tab. Ger.

Mercurialis florens, Cæs.

Phyllon Theligionon Theop. Cord. in Diosc.

Q

Hæc

Hæc unciam vix superans, Monspessuli locis
sterilibus reperitur.

III. Mercurialis montana testiculata.

Mercurialis syl. Trag. Lon. quæ Cynocrambe,
Gef. hort.

Mercurialis mascula syl. Cord. hist. Thal. Cyno-
crambe, Matth. Fuch. Dod. Lac. Ad. Lob. qui una
figura utramq; expreſsit, Caſt. Lugd. Cam.

Mercurialis mas, Fuch. Cam. ep. Matth.

Mercurialis altera vel montana, Cæſ.

Mercurialis canina mas, Colum.

IV. Mercurialis montana spicata.

Cynocrambe sive Mercurialis fœm. syl. Cam.

Cynocrambe fœmina, Eid. ep. Matth.

Mercurialis canina fœmina, Colum.

Mercurialis syl. fœmina, Cord. hist. Thal. at
Cordo in Diosc. fœmina non invenitur.

Hæc aliquando magis folioſa eſt.

V. Cynocrambe Dioscoridis.

In Matthiolo nostro & Prodromo descripta fi-
gurâ additâ.

Alſine, Cæſalp.

Alſines facie planta nova, Colum.

Cynocrambe legitima, Belli apud Ponam.

PHYLLON.

Φύλλον ἀρρενωγένης ἢ θηλυγόνον Theoph. 9. hist. 19. habet: quem secutus Diosc. l. 3. c. 140. hic ἡ, ἀρρενωγένης quod
nominavit, ad differentiam Mercurialis, quæ etiam Phyllon dicitur: videntur autem ambo subiectâ plan-
tam intellexisse: in hoc solum dissentiunt, quod Theophr. ἀρρενωγένης, Dioscorid. θηλυγόνον vocat, & contrâ.

I. Phyllon testiculatum.

Phyllum, Matth. qui marem, at Cam. in Matth.
utrumq; proponit.

Phyll. mas seu Arrhenogonum, mariparum, Ad.

Phyllum Arrhenogonon, Lob. ico. Lugd.

Phyllon marificum, Clus. hisp. & hist. mas, Lob.

ob. Dod. (fœminam exprimit) Caſt. Tab. sub.

Cynocrambe, Ger.

II. Phyllon spicatum.

Phyllon theligonon, Dod. in ico. Ad. (sive fœ-
miniparum) Lob. ico. Dod. Lugd. Ger.

Phyllum, Gef. hort.

Phyllon fœminificum, Clus. hisp. & hist. Tab.

Phyllon fœmina, Caſt.

Et si oleæ folio sit, aliquando tamen, licet rari-
us, ferratis folijs circa Monspelim observatur.

SECTIO SEXTA LACTUCA, SONCHVS, LAMPSANA, ENDIVIA, CICHORIUM, DENS LEONIS, HIERACIUM, CHON- DRILLA, SENECIO, JACOBÆA,

LACTUCA ET EJUS SPECIES.

Lactuca, quod copia lactis exuperet, & lac augeat, ὀψιδαξ Dioscoridi l. 2. c. 165.
Genera: Dioscoridi sativa eſt & sylvestris: Theophr. 7. hist. 3. genera plura sunt, candida, cujus tria
genera: laticaulis, rotundicaulis & Laconicum: de sylvestr. 7. hist. 6. agit: sic Plinius l. 19. c. 8. Lactuca tria ge-
nera Græci fecere, unum laticaulis, alterum rotundicaulis, tertium sessile, quod Laconicum vocant. Alij colore &
satus tempore genera discernere: nigras, quæ Januario seruntur: albas, quæ Martio: rubentes, quæ Aprili: di-
ligentiores: plura genera faciunt, purpureas, crispas, Cappadocicas, Græcas, &c.

Dividimus in sativam & sylvestrem. Sativam, in crispam, rotundam, capitatam Cypriam: Folio enim
alia eſt latiore, alia longiore, crispo, plano, sinuato: colore, alia obscurius, vel etiam pallide virente, rubro, vel
etiam maculis purpureis aspersis: sic capitata, alia alba, alia rubra, ac si vinum aspersum eſset, alia nigra: sitis
duobus posterioribus semina nigra, alijs verò candida sunt.

Lactuca hortensis.

I. Lactuca sativa.

Lactuca, Trag. Gef. hor. Cæſ. Tab.

Lactuca floreſcens, Matth. Lac.

Lactuca sativa, Ang. Dod. Cord. in Diosc. Lug-
dun: Taber.

Lactuca sativa folio Scariolæ, Ad. Lob.

Lactuca capitata, quoad ico. Fuch. Tur.

Lactuca rotunda, Lon. ico.

II. Lactuca folijs Endiviæ.

Endivia major, Trag. desc. & Lon.

Lactucæ 4. genus, Matth.

Lactu.

Laetuca intybacea, Tab. Ger.

III. Laetuca maculosa.

Laetuca quinta, Dod. gal.

Laetuca Romana, Matth. Ges. hort.

Laetuca rubra, Cæs.

Laetuca fusci ac rubente purpurei coloris, rubens Plinij, Dod.

IV. Laet folio obscuri virente, semine nigro.

Laetuca 2. folijs obscurius virentibus, nigra Plinio, Dodon.

Laetuca Romana dulcior, nigriore & Scariolæ hortensis folio, Ad.

Laetuca nigra, Cæs. Laetuca Romana, Cast.

Folia simul ligata ut in Endivia albescunt.

V. Laetuca folio oblongo acuto.

an Laetuca Gallica, Cast.

Hanc in Phytopinace, Prodr. descripsimus.

VI. Laetuca Italica laciniata: de qua in Prod.

VII. Laetuca capitata.

Laetuca sativa major, quæ in caput coit, Trag.

Laetuca 3. Dod. gal.

Laetuca capitata, Matth. Dod. Cast. Tab. Ger.

Laetuca sessilis, Ges. hort. Lon.

Laetuca capitata crispis brasiæ folijs, Lob. ob.

Laetuca sativa sessilis, sive capitata, rugosis crispis brasiæ folijs, Ad. Lob. ico.

Laetuca caputia cognominata, Cæs.

VIII. Laetuca crispa.

Laetuca crispa & 3. Trag.

Laetuca, Tur. crispa, Matth. Dod. Lugd. Cæs.

Laetuca sativa crispa, Fuch.

Laetuca crispa non capitata, Ad. Lob.

Laetuca crispa 1. & 2. Tab. Ger.

Folij latoribus & paulo angustioribus variat: hinc duæ apud Tab. & Ger. icones. Habetur alba & rubra: hæc verò durior est.

IX. Laetuca crispa altera.

Laetuca Intybacea crispa, Tab.

Laetuca Sabaudica crispa, Ger.

X. Paravas herba refrigerans: par. 4. Ind. or 8.

Laetuca sylvestris.

I. Laetuca sylvestris costâ spinosâ.

Laetuca sylvest. Diosc. Theophr. & Plinij, quæ Thridacine Galeni videtur.

Endivia, Brunf. sylv. Lon. desc.

Laetuca syl. prior, Trag. Endivia vulg. & 2. Eid.

Laetuca sylv. Ang. Matth. Fuch. Tur. Dod. Lac.

Lon. Cast. Lugd. Thal. Cæs. Col.

Laetuca agrestis, Cord. in Diosc. & hist.

Seris domestica, altera Laetucina Dioscor. Ad.

Chondrylla prima forte Dioscor. quæ Endivia sylv. quibusdam Ruellio.

Seris domestica, Lob.

Laetuca sylv. vera, Lugd. desc.

Scarriola & Serriola, Eric. Cord.

II. Laetuca sylvestris odore viroso.

Endivia major & 1. Trag. Lon. ico.

Laetuca sylv. verior & Theophr. Lugd. ico.

Laetuca agrestis, Cord. hist. ico. Lob. ico.

Laetuca agrestis, Scariolæ hortensis folio, Laetucæ flore, Opij odore, Ad.

Laetuca sylv. Anglica, odore Opij similis, Cam.

III. Laet. montana purpureo cærulea major.

Laetuca sylv. purpureo flore, Ges. hort.

Laetuca sylvatica, in Cord. hist. cap. de Soncho.

Sonchus arborefcens puniceo flore, Ges. hort.

Laetuca sylv. *spinosissima*, Thal.

Libanotis Theophr. sterilis, Tab.

Sonchus 3. Eid. sub Eryfimo sylv. Ger. ico.

Sonchus mont. purpur. *τὸ παλαιόν*, Col.

IV. Laetuca mont. purpureo cærulea minor.

Sonchus 2. vel lævis purp. flore, Cluf. pan.

Sonch. lævior Pannonic. 4. purp. flore, Eid. hist.

V. Laetuca sylvestris Peruana.

Laetuca sylv. pumila, Monardi & Lugd. quid?

VI. Laetuci folia renalis.

Herba ad renum morbos utilis Monardi, & Lugd. quid?

SONCHUS EJUSQUE SPECIES.

Σ' ο' x' ο' Dioscoridi l. 2. c. 159. & Theophr. 6. hist. 4. ἀνὰ τὸν σὸν χέειν, quod succum salubrem, qui stomachi rationes lenit & nutritibus lac auget, fundat, Latinis Cicerbita, Laetucella, Laeteron, quod caule dissecto, lac copiosum destuat.

Genera duo Diosc. alter sylvestrior, magis spinis horrens: alter, qui ténerritate quadam mollescit: Theophrastus spinosi meminit. Plinio l. 6. c. 22. Sonchus albus & niger, Laetuca similes ambo, nisi spinosi essent.

I. Sonchus asper non laciniatus.

Intybus sylv. seu erratica acutis folijs, Trag.

Sonchus asper major, Cord. hist.

Sonchus tenerior aculeis asperior, aut horridiuscula, Lob. ob.

Sonchus lævis tenerior, Ad. Lob. ico.

Sonchus asperior, Lugd. 3. asperior, Dod.

Sonchus alia in rudibus, Cæsalp.

II. & III. Sonch. asper laciniat. & non lacin.

Cicerbita asperior, Eri. Cord.

Sonchus spinosus, Ang.

Sonchus aspera, Matth. Fuch. Tur. Lac. Gefn. hort. Lob. ico. Cast. Lugd. asper, Lon. Tab. sub lævi habet, Ger.

Sonchus sylvestrior aspera, Dod. gal.

Sonchus asper, Eid. fol.

Sonchus, Cord. in Diosc. Cæf. cui & Sonchus alter Dioscoridis.

Sonchus asper minor, Cord. hist.

Sonchus lævis tenerior latifolia, Ad. Lob. ob.

Sonchus lævis latifolius, Lugd.

Andryala major, Dalech. Lugd.

Folia habet laciniola dentis leonis, ubi folo squalidiore oritur: at si lætiore, non laciniata, Dipfasi aut Lactucæ: & senum septenūve cubitorum proceritatem aliquando assequitur.

IV. Sonchus asper laciniatus Creticus: qui 1. in Prodomo.

V. & VI. Sonchus asper subrotundo folio: est major & minor: qui 2. in Prod.

VII. Sonchus asper arborefcens.

Sonchus 3. Cluf. Pan. vel 3. lævis altissimus, vel

Sonchus lævior Austriac. 5. altissimus Eid. hist.

Sonchus arborefcens, Tab. & Ger.

Sonchus lævis.

I. Sonchus lævis laciniatus latifolius.

Intybus sylv. seu Erratica tertia, Trag.

Sonchus lævis, Matth. Gef. hor. Dod. Cast. Lug.

Sonchus lenis seu lævis, Cord. hist.

Sonchus non aspera, Fuch. tener, Ang.

Sonchus tenerior non aspera, Dod. gal. &

Lactuca leporina Apuleij.

Endivia sylv. Lon. ico.

Sonchus lævis vulgaris, folijs laciniatis dentis Leonis, Lob.

Sonchus lævis laciniatis folijs, Lugd.

Sonchus in collibus umbrosis, Gefn.

Andryala minor, Dalech. Lugd.

Sonchus lævis alter flore luteo, & tertius flore niveo, Tab.

Sonchus lævis flore albo, & alter fl. niveo, Ger.

Flore est luteo, rarius niveo, vel albo.

II. Sonchus lævis in plerimas & tenuissimas lacinias divisus: hic 3. in Prod.

III. Sonchus lævis laciniatus muralis parvis floribus.

Scariola sylv. Lactucæ species Galeno, Ang.

Sonchi genus læve, Gefn. hort. Eid. in ap.

an Sonchus lævis alter, Matth. Cast. Lugd.

Sonchus alter folio profundis lacinijs sinuato hederaceo, Lob.

Sonchus 4. lævis alter, Lugd.

Sonchus lævior vulgaris, Cluf. hist.

an Lactuca montana, Cæsalp.

Sonchus sylvaticus 4. Tab.

Major & minor reperitur.

IV. Sonchus lævis minor pauciorib. lacinijs.

Sonchus lævis latifolius, Tab. Ger.

Est angustioribus folijs in incultis: latioribus in vinetis.

V. Sonchus lævis angustifolius.

Sonchus lævis Matthioli, apud Lob. ico.

Sonchi genus, terra crispa, Gefn. hort.

Terracrepulus in Hetruria, Cæf.

Crepis Dalechampi, Lugd.

VI. Sonch. angustif. maritim. qui 4. in Prod.

Sonchus montanus.

I. Sonchus lævis laciniatus cæruleus, vel

Sonchus alpinus cæruleus.

Intybus *αλαξίφυλλον* & Harynica, Thal.

Sonchus lævis flore cæruleo, Cluf. pan. &

Sonch. lævior Austriac. cæruleo flore, Eid. hist.

Sonchus cæruleus & Sonchocichoreum, Cam. in Matth.

Sonchus cæruleo flore, Eid. hort. (qui duum generum dicit.) & Ger.

Sonchus lævis 4. flore cæruleo, Tab.

Floribus etiam albis Thalius notavit.

II. Sonchus lævis laciniat. luteo. mont. major.

Sonchus Dendroides Dalechampi, Lugd.

III. Sonchus lævis laciniatus luteus minor: qui 5. in Prod.

Sonchus hirsutus sive villosus.

I. Sonchus villosus luteus major.

Sonchus lanatus Dalechampi, Lugd.

Magnitudine variat, caule aliquando sesquicubitali, cubitali & pedali.

II. Sonch. villos. luteo. minor: hic 6. est in Prod.

III. Sonchus latifolius leviter hirsutus.

Cichoreum syl. alterum *ἀνμυγνός*, sive Cichoreum dulce, Colum.

Soncho affinis Lampfana vulgò, sed malè.

I. Soncho affinis Lampfana domestica.

Chrysolachanum Plinij, Ruel.

Lampfa.

Lampsanam negant, Advers.
Lampfana, quibusdam Napium, Dod. gal.
Sonchis cognatum, Gefn. hort.
Cichorium vel Sonchi genus, Eid. col.
Lampfana, Ad. Lob. Dod. Lugd. Thal. Cam.
cui & Papillaris in Prussia.

Sonchus sylv. 1. Tab. & 3. Eid. ico.
Sonchus sylvaticus, Ger.
Folij aliquando prorsus integris, aliquando
in lacinias aliquot dissectis, Thalius notavit.
II. Soncho affinis Lampfana sylvatica.
Sonchus sylvaticus 2. Tab.

INTYBUS SIVE ENDIVIA, CICHOREVMYE

ejusque species.

Soncho subjungit Dioscorides, l. 2. c. 260. *Σέπω*, cujus verba sic interpretamur: Seris duum generum, quorum sylvestris Picris, & Cichorium vocatur: quæ verò ex hac latioribus est folijs stomacho commodior est hortensi: Et hujus etiam duas species sunt, quarum hac lactuca similior & latifolia: altera verò angustiore est folio & amaro. Intubi meminit Theoph. 7. hist. 7. inter olera numerando, & universa genera Intyborum amara dixit, 2. caus. plant. 7. Cichorea quoque mentio 7. hist. 9. uti & Intybi erratici 1. hist. 15. Plinio, l. 20. c. 8. Intubum erraticum Ambugiam appellavere: in Aegypto Cichoriam vocant, quod syl. sit, sativum autem Serin, quod est minus & venosius. Et syl. genus alij Hedyphnoida vocant, latioris folij. Seris & ipsa Lactuca similia duorum generum est: sylvestris melior, nigra ista & æstiva: deterior hyberna & candidior.

I. Intybus sativa latif. sive Endivia vulgaris.

Seris domestica latifolia, Dioscoridi.

Intubum & Seris hyberna, Plinio.

Scariola Arabam interpretibus.

Cichorea sativa, Trag.

Intubus, Tur. major, Matth.

Intubum sativum latif. Fuch. Dod. gal. Lob. Lug.

Intubum sativum, Cord. in Diosc. Dod. Ger.

Intubum latifol. Italicum, Gefn. hort.

Cichorium sativum, Eid.

Intybus hortensis, Lac.

Seris hortensis altera, Ang.

Intybus sativa major, Cast.

Seris (sive Endivia alba) Gefn. hort. Lob. ico.

Seris sive Intybum sativum latifolium, Ad.

Endivia, Gef. hor. cui & Hypochæis Theoph.

hortensis, Cam.

Intyb. major sativa, sive Cichor. domestic. Tab.

Florib. est cæruleis, raro cædis, ut & minor.

II. Intybus sativa angustifolia.

Intubus sive Endivia minor, Matth.

Intybum sativum angustifol. Euch. Dod. gal.

Lugd. qui & Dod. & Matth. figuram habet.

Intybus hortensis alter, Lac.

Intybum angustif. scariola aliquibus, Gef. hor.

Cichorium sativum, Cord. hist.

Cichorium angustifolium, Lon.

Seriola, aut Endiviola, Ad.

Intybus minor 1. & Intyb. minus album, Tab.

Serium, Cichorium sativum minus, Eid. ico.

Intybum syl. & Intyb. syl. latifolium, Ger. ico.

Intybus sativa minor, Cast.

an Cichorium Romanum Cæsalp. cui Apate

Theoph. quia femina nigra habet,

III. Intybus crispa: Matth. Tab.

Seris sive Intybus crispa, Ad.

Intybum crispum, Lugd.

Endivia crispa, Ger. Romana crispa, Cam.

CICHORIUM.

I. Cichorium sativum.

Seris sylv. quæ colitur & sativa dicitur, Ang.

Seris, Lob.

Cichorium domesticum, Matth. Cast.

Cichorium hedyphnois, Lac.

Cichorium sativum cæruleum, Ad. Lob. ico.

Cichorium latioris folij, Dod.

Cichorium sativum latifolium, Lon.

Intubum syl. latifolium, Lugd.

Cichorium sativum duplici figura & album

sativum, tres fig. apud Tab. & Ger. sub sativo,

sativo latifolio, & sylv.

II. Cichorium sylv. sive Officinarum.

Seris *πικρὸν* Dioscoridi: cichorea Theoph. *πικρὸν*

Amarugo Gaza vertente, Theoph.

Intubum erraticum, Plinio.

Solsequium, Brunf.

Cichorea, Trag. sylvestris, Matth.

Seris sylv. Ang. Lob. Seris picris, Lob. ico.

Seris sylv. picris, Cichorium, Ad.

Cichorium syl. Gef. col. Dod. Cast. agreste, Lon.

Intybum agreste, Er. Cord. Gefn. hor. sylv. Fuch.

Dod. gal. (cui & Ambubeja) Cord. Diosc. Thal.

Intubum sylv. angustifol. Matthioli, Lugd.

Hypochaeris Dalechampii, Lugd.

Cichorium, Lac. Cord. hist. Cæf. Tab.

Hieracium latifolium, Ger. ico.

Duplex est, alterum folio prors. integro, un-

Q 3

ciarum

ciarum duarum quandoq; latitudine: alterum, in lacinias diviso, Thal. At hujus floris color communiter caeruleus, est & candido & roseo: aliquando caulis latitudinem digitorum quatuor acquirit.

III. Cichorium spinosum, quod in Matthiolo, Tabernæmontano emaculato, & in Prodromo, addita figura descripsimus.

Cichorium spinosum Creticum Belli, Ponæ.

Cichorium spinosum, vulgè *garumydsi*, h.e. Hydrie spina, Belli in ep. 4. ad Clus. (hist.

Chondrilla genus elegans caeruleo flore, Clus.

Cichorium syl. luteum,

I. Cichorium pratense luteum hirsutie asperum, vel Hieracium hirsutum folijs caulem ambientibus.

Cichorea 3. five lutea, Trag.

Hieracium prat. asperum, Gesn. col.

Cichorium luteum, Tab. Ger.

Intybus syl. seu Cichorium syl. fl. luteo, Thal.

Lactariola altera, Cæs.

Variae: nam aliud folijs est integris, aliud divisis: illud, quadruplex est: 1. caule & folijs spinulis horret: 2. folia inferne aspera, superne glabra in ambitu exasperata: 3. folijs angustioribus asperis: 4. caule brachiato folijs palmariibus, in ambitu profunde, ut Dentis leonis, divisis: ut Thal. monet. flore albo noravit, Tab. & Cichorium luteum 2. facit.

II. Cichorium prat. hirsutum vesicarium, Cichorium syl. vesicarium pratense, Colum.

III. Cichorium montanum angustifolium hirsutie asperum.

Hieracium intybaceum asperum, vel 9. Tab.

Hieracium asperum, Ger.

IV. Cichorium prat. luteum laevius.

Hedypnois Plinij, Dod. gal. Ad. cui & Cichorium luteum, Lob. cui & Aphaca, Theoph.

Dentis leonis 3. species, Dod. Tab.

Aphace Dalechampiij, Lugd.

HIERACIUM EJVSQVE SPECIES.

Itequar Dioscoridi, l. 3. c. 72. Latinis Accipitrina, ab accipitre, qui *heax*, nomen habet. (Hieracia ab alijs Plinio) quoniam accipitres scalpendo eam succoq; oculos tingendo, obscuritatem eum sensere discunt, Plin. l. 20. c. 7. ubi inter Lactucam sylvaticam refert, & cum ea confundit: dicitur & *Σογγίτρος*. Genera: magni & parvi Diosc. meminit: recentioribus plures sunt differentie.

Hieracium dentis leonis folio acuto.

I. Hieracium majus folio Sonchi, vel Hieracium Sonchites.

Intybus syl. 2. acutis folijs, Trag.

Endivia syl. Cæs.

Dens leonis cichorizata, Ger.

Dens Leonis.

I. Dens Leonis latiore folio.

Aphaca ex oleru genere, Theoph. 7. hist. 7. & 10.

Aphace, Plin. lib. 21. cap. 15. & 17. & Hedypnois, Plin. lib. 28. cap. 8.

Dens leonis, Brunf. Matth. Dod. Lob. (& corona & caput Monachi) Tab. Ger.

Hieracium maj. Trag. parvum, Cord. in Diosc.

Hieracium minus, Gesn. hort.

Hedypnois major, Fuch.

Chondrilla Galeni, Ang. quibus, Taraxacon.

Chondrilla altera & rostrum porcinum, Dod. gal. Thal.

Dens leonis vulgi, five Urinaria, Ad.

Taraxacon minus, Lon.

Aphaca, Cæsalp.

Hedypnois Dalechampiij, Lugd.

Habetur & major & media quæ vulgarior est: folio acutiore, aliquando obtuso.

II. Dens leonis angustiore folio.

Aphaca angustioris folij, Cæs.

III. Dens leonis asphodeli bulbulis.

Cichorium Constantinopolitanum, Matthiolo.

Cast. Lugd. sic Matthiolo appellatum, Colum.

Dens leonis Monspelienis, Ad. Lob. ob.

Chondrilla altera Dioscoridis, Lob.

Dens leonis altera, Tab.

IV. Dens leonis latifolium caulescens, qui 1. est in Prod.

V. Dens leonis tenuissimo folio: qui 2. in Hieracium fetidum 3. Colum. (Prod.

VI. Dens leonis minor folijs radiatis: 3. in an Trinciarella, Cam. (Prod.

VII. Dens leonis minus aspero folio: hic 4. in Prod.

VIII. Dens leonis minimus.

Cichorium syl. pumilum five Hedypnois, Clus. cur. post.

Taraxa-

Taraxacon majus, Lon.

Hieracium minus Dalechampi, Lugd.

an Hieracium magnum, Cæf.

Aliquando folio asperiore inter segetes reperitur: communiter erectum: nonnunquam reclinatum.

II. Hierac. majus folio Sonchi angustiore.

Hieracium alterum, Dod.

III. Hieracium majus folijs Sonchi femine curvo.

Hieracium majus Creticum sativum, Gef. hor.

Hierac. Cretic. pro Endivia lutea missum, Cam.

IV. Hieracium majus erectum latifolium caule aspero.

V. Hieracium majus erectum angustifolium caule aspero.

Huic ut & priori, aliquando prima folia obtusa sunt.

VI. Hieracium majus erectum angustifolium caule lævi.

Hieracium majus Dioscor. Tab. Ger.

VII. Hieracium dentis leonis folio, flore suaverubente.

Hieracium Apulum, suaverubente flore, Colum.

VIII. Hieracium dentis leonis folio monoclono sub asperum.

Hieracium intybaceum, vel 6. Tab.

Variat: culmo unico nudo ex radice: rarissime culmo bipedali ramoso, subaspero, cujus modi in Italia reperitur.

IX. Hieracium dentis leonis folio monoclono glabrum.

X. Hieracium minus glabrum, folijs elegantioribus: hoc 2. est in Prod.

XI. Hieracium asperum flore magno dentis leonis.

Hieracium folijs & floribus dentis leonis bulbosi, Lob. ico.

Viperea vel Scorzonera Italica, Cast. ico.

XII. Hieracium dentis leonis folio hirsutius asperum minus laciniatum.

Hieracium alterum saxat. montan. Colum.

XIII. Hieracium dentis leonis folio hirsutius asperum magis laciniatum: quod in Prod. 1. est.

XIV. Hieracium hirsutum ferè umbellatum, Hieracium nonum, Clus. hist.

Hieracium dentis leonis folio obtuso.

I. Hieracium dentis leonis folio obtuso majus.

Hieracium minus primum, Dod. gal.

Hieracium longius radicum, Ad. Lob. Ger.

Hieracium 3. Dod.

Hieracium macrorrhizon, Tab.

Apargia Dalechampi, Lugd. quoad descript.

II. Hieracium dentis leonis folio obtuso minus, flore magno: hoc 3. in Prod.

III. Hieracium dentis leonis folio floribus parvis: quod 4. in Prod.

IV. Hieracium dentis leonis folio bulbosum: hoc 5. est in Prod.

V. Hieracium minus dentis leonis folio subaspero.

Hypochaeris. Porcellia, Tab. Ger.

Hieracium pumilum 4. Colum.

VI. Hieracium minus dentis leonis folio oblongo glabro.

Hyoseris altera vel angustifolia, Tab.

VII. Hieracium minus flore ex albo carneo.

Hieracium parvum Creticum, Clus. hist. ap. 1.

VIII. Hieracium minus folio subrotundo.

Hieracium minimum vel 8. Clus. pan. in hist. 9.

icone, at descriptione II.

Hyoseris latifolia vel mascula, Tab.

Hyoseris mascula, Ger.

Variat ratione loci: nam in siccioribus natum minus est, quemadmodum Clusius pingit:

at locis lætioribus, pluribus est caulibus palmaribus.

an Hieracium minus Hyoseridis latifoliae facie, Eyst. Sed hoc semen papposum fert.

IX. Hieracium Bæticum, Clus. in cur. post.

Hieracium Chondrilla folio.

I. Hieracium maximum Chondrilla folio asperum: quod 7. est in Prod.

II. Hieracium Chondrilla folio hirsutum.

Hieracium folijs & facie Chondrilla, Lob. ico. Camer.

Hieracium 11. Tab.

Variat: in German. hirsutius & majus, Monspessuli minus & lævius: at utrobique folijs laciniatis: in Italia & minus & lævius, & folijs solum dentatis, provenit.

III. Hieracium Chondrilla folio glabrum.

Hieracium 5. five aphacoides, Tab. Ger.

IV. Hieracium Chondrilla folio glabro radice succisâ, majus.

Hieracium minus, Trag. Ang. Matth. Fuch. Lac. Gef. Cast. Tab. minus alterum, Dod. gal.

Succisa tertia, Trag. hirsuta folia tribuit.

Hieracium minus præmorsâ radice, Ad. Lob.

Hieracium 4. Dodon.

Sonchus,

Sonchus, Lon.

Picris Dalechampij, Lugd.

Hieracium leporinum, Ger.

Variat foliorum incisuris profundioribus, & hoc Hieracium higrum, Tabern. & Ger. (quod Hieracium folijs Coronopi dici posset) nominant: vel minus profundis.

V. Hieracium Chondrillæ folio glabro radice succisâ, minus.

Lagopus 3, vel Lactuca leporina, Trag.

Lactuca leporina Apuleij, Ang.

Hieracium quintum, Dod.

Apargia Dalechampij, Lugd.

At si quis 4. & 5. folium magnitudine, foliorum latitudine, & angustia differre velit, facile assentiar.

Hieracium Intybaceo folio.

I. Hieracium intybaceum flore luteo: hoc ro. in Prodr.

II. Hieracium intybaceum flore magno albedo: hoc 11. est in Prodr.

III. Hieracium intybaceum flore ex purpurea rubentibus.

Hieracium intybaceum ro. Clus. hist.

Hieracium Cichoraceo folio semine adunco.

I. Hieracium capitulum inclinans semine adunco.

Hieracium facie hedypnois, Lob. ico.

Rhagadiolus, Cæs.

Magnitudine & parvitate, folijs magis minusve sinuosis, ad agros Monspelienses variat: & in hortum translatus asperitatem penè amittit.

II. Hieracium siliquâ falcatâ.

Hieracium Narbonense falcatâ siliquâ, Lobel. Lugdun.

Rhagadiolus alter, Cæs.

Hieracium Monspeliac. & Narbonense, Tab.

Hieracium falcatum, Ger.

Quod Monspelij crescit, folijs est latioribus: quod Patavi, angustioribus, à quibus Sonchus stellatus, Chondrilla stellata, & Cichorium stellatum nominatur.

III. Hieracium proliferum falcatum: quod 12. in Prodr.

Hieracium calyce barbato, Colum.

IV. Hieracium minimum facultatum: quod 13. in Prodr.

Hieracium montanum hirsutum.

I. Hieracium echiodides capitulis Cardui benedicti.

Hieracium montanum folio Cycopsis, Ad.

Buglossum echiodides luteum Hieracio cognatum, Lob. ico.

Buglossum luteum, Cam. Ger.

Hieracium echiodides, Tab.

II. Hieracium mont. rapifolium: quod 14. in Prodr.

III. Hieracium alpin. asperum conyzæ facie. Hieracium Britann. vel 4. Clus. pan. & hist.

IV. Hieracium mont. dentis leonis folio incano, vel laciniatum lanuginoso folio.

Hieracium mon. laciniato folio, vel 7. Clus. pan.

Hieracium 8. folio hedypnois, Eid. hist.

Hierac. mont. angustif. folijs Cichoraceis, Tab.

Hieracium 7. Clusij, Ger.

V. Hieracium alpinum folijs dentatis flore magno: quod 15. in Prodr.

VI. Hieracium alpinum latifolium hirsuticincanum flore magno.

Hieracium 1. latifolium, Clus. pan. & hist. Ger.

Hieracium phlomoides, Tab.

Hieracium latifolium Pannonicum, Cam.

an Pilosella major Gallorum, Thal.

an Costa, Cam.

Folio est interdum sinuoso, interdum laciniato: maculis aliquando lividis insignitis, plerumq; carentibus.

VII. Hieracium alpinum latifolium villosum magno flore.

Hieracium alpin. hirsuto folio, vel 5. Clus. pan.

Hieracium 5. villosum, Eid. hist.

Hieracium latifolium montanum, Tab.

Hieracium 5. Pan. Cam. 5. Clusij, Ger.

VIII. Hieracium ramosum magno flore: quod 16. in Prodr.

IX. Hieracium montanum hirsutum ramosum parvis floribus.

X. Hieracium alpinum non laciniatum flore fusco: quod 17. in Prodr.

Hieracium Germanicum 1. Colum.

XI. Hieracium hortense floribus atropurpureascentibus: quod 18. in Prodr.

Hieracium latifolium peregrinum phlomoides, Eyf.

Pilosella major quibusdam.

XII. Hieracium pumilum saxatile asperum radice præmorsa: quod 19. in Prodr.

an Hier.

XIV. Hieracium mont. lanuginosum laciniatum parvo flore: quod 20. in Prodr.

XV. Hieracium alpinum pumilum folio lanuginoso.

Hieracium pumilum 2. Colum.

XVI. Hieracium montanum angustifol. nonnihil incanum.

Hieracium mont. vel 6. Clus. pan. & hist. Cam.

Hieracium montanum angustifol. 2. Tab.

Hieracium 6. Clusij, Ger.

Variat folijs magis minusve incanis, iisque integris vel minimum laciniatis: est & tertia folijs integris, atrovirentib. minimeq; incanis.

Hieracium montanum glabrum.

I. Hieracium mont. latifol. glabrum majus.

Hieracium montanum majus latifolium, Tab. sub Chondrilla Hispanica, Ger. ico.

II. Hieracium montanum latifolium glabrum minus.

Hieracium montan. latifol. minus, Tab. Ger.

III. Hieracium alpinum pumilum chondrilla folio: quod sub 7. in Prodr.

IV. Hieracium Tragopogonis folio.

Scorfonera 4. Clus. pan.

Hieracium 7. vel pumile, Eid. hist.

V. Hieracium capillaceo folio: quod 21. in Prodr.

Hieracium murorum, Pulmonaria Gallica dicta.

I. Hieracium murorum folio pilosissimo.

Alfine seu Auricula muris major, Trag.

Pulmonaria Gallica, Scopa regia fortè Plinij, Gefn. hort.

Sideritis Plinij latissimo folio, Eid.

Pulmonaria Gallor. flore Hieracij, Ad. Lob.

Clus. hist. Lugd. cum figura Carthon.

Pulmonaria Gallica sive aurea, Tab.

Corchorus Dalechampij, Lugd.

Lactariola, Cæsalp.

Variant in pictura; Tragus, Lugd. & Tab.

folijs subrotundis & pilosis: at Lobelius, glabris & oblongis pingit: sic folia quandoque

parte inferna rubent: aliquando albis maculis aspersa, conspiciuntur.

II. Hieracium murorum laciniatum minus pilosum.

Pulmonaria Gallica femina, Tab.

Lobelij figura melius huic, quam præcedenti convenit.

Hoc folio est modò latiore, modò angustiore, & hæc

Pulmonaria Gallica tenuifolia, Tab. dicitur.

III. Hieracium murorum angustifolium non sinuatum: quod 22. in Prodr.

Hieracium pratense.

I. Hieracium profundè sinuatum pubescens: quod 21. in Prodr.

II. Hieracium pratense latifolium non sinuatum majus.

Intybus *apud nos* major, Thal.

III. Hieracium prat. latifol. non sinuatum minus.

Intybus *apud nos* minor, Thallio.

Hieracium fruticosum.

I. Hieracium fruticosum latifolium folijs dentatis glabrum: quod 22. in Prodr.

Hieracium majus latifol. vel 2. Clus. pan. & hist.

Intubi 6. species, Thal.

Hoc etiam caule graciliore & folijs angustioribus, in reliquis conveniens, reperitur.

II. Hieracium fruticosum latifol. hirsutum.

Erinus, Matth.

Basilicum aquaticum, Cast.

Hieracium frutescens latifol. polyanthos, Eyft.

Variat: 1. folijs uncias quinque longis, sesquunciam latis, subrotundis, dentatis & asperis,

quemadmodum Patavij provenit, & à Guilandino, Militaris Galeni & Lactaris Plinij, dicebatur, 2. folijs est multò longioribus, angustioribus, parum dentatis, molli lanugine pubescentibus, quod apud nos reperitur, licet rarius.

III. Hieracium fruticosum subrotundo folio: quod 25. in Prodr.

Hieracij foliati nomine D. Jungerm. misit.

IV. Hieracium fruticosum angustif. majus.

Hieracium Sabaudum, Ad. Lob. Lugd.

Hieracium alterum grandius, Lob. ico. Cam.

Hieracium primum, Dod.

Hieracium majus angustifol. vel 3. Clus. pan.

Hieracij 3. genus alterum angustif. Eid. hist. ico.

Intubi 7. species Thal.

Hieracium montanum angustifolium 1. Tab.

Hieracium intybaceum, Ger. ico.

Caule est aliquando magis, aliquando minus aspero, folijs magis minusve crenatis, longioribus & angustioribus, brevioribus, & latioribus.

V. Hieracium fruticosum minus: quod

26. in Prodr.

CHONDRILLA ET EJUS SPECIES.

X *ὄνδριλλαν ἢ νυχόριον* Diosc. l. 2. c. 161. dicitur: & propter formam, quibusdam Seridis agrestis speciem. Ansorte apud Theoph. 7. hist. 9. & 11. Ἄνδρον, Fraus CAZ. a.

Genera duo Dioscoridi: Plinius, l. 6. c. 22. unus meminit.

Chondrilla lutea.

I. Chondrilla juncea viscosa arvensis: quæ prima Dioscoridis.

Cichorea procera vel 5. Trag.

Chondrilla, Tur. altera, Cord. in Diosc.

Chondrilla viminea viscosa vinearum. Ad. Lob. ico. Lugd.

Cichoreum syl. luteum, Dod.

Chondrilla species in collibus & vineis, Cæf.

Chondrilla viminalibus virgis, Clus. hist.

an Chondrilla Bellonio.

Chondrilla juncea, Tab. Ger.

Chondrilla prima Dioscoridis, Colum.

II. Chondrilla viminea viscosa Monspeliaca: quæ i. in Prod.

III. Chondrilla viscosa caule foliis obducto.

Chond. faxatilis viscosa caule *ἡνυμυδαφώγος*, Col.

IV. Chondrilla viscosa humilis: quæ 2. in

V. Chondrilla viscosæ affinis. (Prod.)

Ixopus, Cord. hist.

Seris longifolia Mutoni, an Chondrilla altera

Dioscor. Lob. ob. quid est?

VI. Chondrilla bulbosa. five Chondrilla 2.

an *νεφελίνιον*, Theoph. 1. hist. 11. (Diosc.)

Chondrilla pusilla marina lutea bulbosa, Ad.

Lob. ico.

Cichorium bulbosum Dalechampi, Lugd.

Cichorium strumosum Myconi, Lugd.

Herba terræ crepolæ similis. Cæf.

an Chondrilla 2. species, cui florem purpureum tribuit, Ang.

Chondrilla altera Diosc. putata, Clus. hist.

Chondrilla altera Diosc. Clus. hist. Columb.

Chondrilla marina, Tab. Ger.

VII. Chondrilla bulbosa major & ramosa.

Chondrilla secunda, Cæfalp.

Hæmorrhoidalis, Cast.

VIII. Chond. bulbosa Syriaca foliis latiorib.

Chond. alterius aliud genus, Rauvv. Clus. hist.

Chondrilla aliud genus, Diosc. Lugd.

IX. Chondrilla bulbosa, Cyriaca foliis angustioribus.

Chondr. Diosc. altera, Rauvv. Lugd. Clus. hist.

X. Chondr. verrucaria fol. cichorij viridibus.

Cichorium verrucarium, Matth. Cast. Clus. hist.

Zacintha Matth. ico. Cast. Lugd.

Verruca Chondrilla, Ad.

Verrucaria, Seridis species, Ges. hort.

Chondrilla species in ruderibus, Cæf.

XI. Chondrilla foliis Cichorei tomentosis.

Chondrilla prior, Diosc. legitima, Clus. hisp.

Chondrilla verrucaria, Lob. Lugd. (& hist.)

Chondrilla prior, Dod. Clus. Lugd.

Hieracium magnum Dalechampi, Lugd.

Chondrilla græca, Tab.

XII. Chondrilla tota hirsuta, Cam. quid?

XIII. Chondrilla prior Matthioli, Cast. &

Chondrilla altera, Lac. (Lugd.)

Figmentum ex Cichorio, aliqui existimant.

Chondrilla cærulea & purpurea.

I. Chondrilla cærulea latifolia laciniata.

Chondrilla altera, Matth. Cast. prima, Lac.

Chondrilla prima Cichorio similis, Cord. in

Chondrilla tenera, Eid. hist. (Diosc.)

Chondrilla latifolia cærulea, Tab. Ger.

Chondrilla purpurascens flore, Lugd. ico.

II. Chondrilla cærulea altera, Cichorij syl. fol.

Chondrilla cærulea Belgarum, Ad. Lob.

Chondrilla, Dod. gal. altera, Eidem.

Apate Dalech: Lugd.

Chondrilla cærulea & alba, Tab.

Chond. cærul. & lutea, Ger.

Chond. cæruleo flore, Caccialepore Italici, Cam.

Chondrilla, Cæf. & prima, Ang.

Flore est cæruleo, rarius albo.

III. Chondrilla foliis laciniatis ferratis purpurascens flore.

sub Superba recetiorum anonymos habent Ad.

Chondrilla rara purpurante flore semine nitido deciduo, Lob.

Chondrilla rara purpurea Lobeli, Lugd.

Chondrilla Hispanica Narbonensis, Tab.

Senetio Carduus Apulus, Colum.

In hortis latioribus est foliis, ut Tab. pingit;

Columna optima est, prout sponte provenit.

IV. Chondr. purpureo flore, radice crassa, jaceis congener, Cam. quid?

V. Chondrilla purpurascens foetida.

Chondrilla rubra foetida, Eyft.

In Phy. opinace & in Prod. pro 3. descripta.

VI. Chondrilla cærulea cyani capitulo.

Sefamoides parvum, Matth. Cast. Cam. Tab.

Ger. minus Matthioli, Lugd.

Corono-

Coronopus quidam flore cæruleo, Gefn. col.

Sesamoides parva Diosc. Ad. Lob.

Chondrillæ species tertia, Dod.

Catanance quorundam, Lugd.

Cyanus forsan Plinij, Colum.

VII. Chond. cærulea cyani capitulis altera.

Sesam. parvū fl. magis completo, Cam. ad Matt.

Chond. Sesam. dicta cærulea fl. completo, Eyst.

SENETIO EJVSQVE SPECIES.

Senecio ἡγρίων Dioscoridi, l. 4. c. 97. quasi Vernus senex quod flores Vere capillorum ritu canescant, & in lanuginem abeant. Theoph. 7. hist. 7. inter olera & intubacea numerat: quod per totum annum penē assiduū germinat floribus productione, 7. hist. 10. semper enim alterum alteri succedens, tempora omnia occupat, idē, propter alimentum quandam mediocritatem, ut loquitur 1. caus. plant. 27. Plinio, l. 25. c. 13. Erigeron, quod a nostris vocatur Senecio. At nullas differentias, Theoph. & Diosc. proponunt. Plinio vero monente quidam & alterum genus fecere, non quale esset demonstrare.

I. Senecio minor vulgaris.

Erigeron, Dioscoridis ac Plinij.

Verbena foemina, Brunf. qui in postremā editione seerrasse fatetur.

Senecio vulgaris & 1. & Herbulum Trag.

Senecio minus Matth. Fuch. Tur. Cord. in Diosc.

Ang. Gefn. hort. Lac. Lon. Ad. Lob. Lugd. Cæf.

cui & Carduncellus. Senecio minor, Cæf.

Erigeron secundum, Dod. gal. minus, Eid.

Senecio 1. Tab. sub Erigero tomentoso, Ger. ico.

Erigeron seu Senecio vulgaris, Thal.

II. Senecio minor latiore folio sive montana.

Senecio in montibus, Cæf.

Senecio 2. vel montana, Tab.

Erigeron, Ger.

III. Senecio incanus pinguis.

JACOBÆA ET EJVS SPECIES.

I. Jacobæa vulgaris laciniata.

(Lon. Flos S. Jacobi, Brunf. Trag. & Senecio major,

Senecio major sive flos S. Jacobi, Matth. Cæf.

Lugd. qui & Fuch. & Matth. figuram habet.

Herba S. Jacobi, Fuch. Cæf.

D. Jacobi herba vel flos, Gefn. col.

Jacobæa, Dod. Ger. vulgaris, Clus. hist.

Jacobæa Senecio, Ad. Lob.

Herba Jacobæa, Tab.

Artemisia πολύδενδρον Dodonæi, Thal.

Variat folijs: alterius sunt instar Erucae laciniata: alter. ad Raphani fol. accedunt, sed minus

hirsuta: tert. querc. tenuifol. instar divisa sunt.

Senecio major, Cam.

II. Jacobæa subrotundo min. laciniato folio.

Verbasculum minimum, Lugd.

III. Jacobæa maritima.

Jacobæa marina, vel Chrysanthemum, & Ar-

temisia marina neotericorum, Ad. Lob. ico.

Cineraria, Dod. Lug. Cæf. (cui Artemis. 1. Diosc.)

Jacobæa maritima Penæ, Lugd. (Cam.)

Eruca cinerea, Eid.

Erigeron primum, Dod. gal. majus, Eid.

Senecio foetidus, Gefn. hort. Lugd.

Erigeron tomentosum alterum, Lob.

Erigeron foetidum seu majus, Thal.

Jacobæa 1. vel Pannonica mollior, Clus. pan.

Jacobæa Pannonica 1. Eid. hist.

IV. Senecio hirsutus.

Senecio 2. Trag. Aphaca, Theoph.

Erigeron tertium, Aphace, Theoph. Thal. Dod.

Erigeron tomentosum & Senecio incana, Lob.

Senecionis species Dodonæi, Lugd.

Senecio tomentosa 3. Tab.

V. Senecio ambrosiæ odore.

Senecio flore odorato, Cam.

VI. Senecio folio non laciniato.

Senecionis genus Myconi, Lugd.

Achavon abiat, id est, Artemisia alba, Alpin.

IV. Jacobæa incana altera.

Jacobæa marina, Dod. gal. Lugd.

Jacobæa altera, Dod.

Cineraria marina, Eyst.

Eandem cum præcedenti dicerem, nisi Do-

donæus edit. lat. à Cineraria distingueret: & in

Eyst. horto, à Cineraria Lobelij alia dicitur.

V. Jacobæa marit. sive Cineraria latifolia.

In Phytopinace, & sub 1. in Prod. descripta.

VI. Jacobæa alpina laciniata fl. buphthalmi.

Jacobæa 3. Clus. pan. & Jacobæa Pannon. 3.

latifolia 1. Eid. hist. (ratis.)

VII. Jacobæa alpina folijs subrotundis ser-

Conyze alpinae genus, Gefn. hort. & fract.

Conyza montana, Gefn. col.

Jacobæa latifolia altera, Clus. pan.

Jacobæa 4. vel latifolia 2. Eid. hist.

VIII. Jacobæa mont. lanuginosa angust non

Jacobæa Pannonica 2. Cl. pan. & hist. (laciniata.

IX. Jacobæa rotundif. incana: quæ 2. in Prod.

R 2 LIBER

132 (86)

CASPARI BAVHINI PINACIS THEATRIBOTANICI LIBER QVARTVS. SECTIO PRIM A.

TANACETUM; PARTHENIUM; CHRYSANTHEMUM;
BUPHTHALMUM; CHAMÆMELUM; COTULA.

TANACETUM EJUSQUE SPECIES.

Tanacetum, forte à Tannaco, quo nomine Parthenium appellatum fuisse, Plin. l. 21. c. 30. testatur: Parthenion microphyllon forte Hippocratis, Hermolao. Ἀρτεμίου μικροφύλλον & Dioscoridis l. 3. c. 128. quibusdam videtur, nobis non item.

Tanacetum odoratum.

I. Tanacetum vulgare luteum.
Tanacet. Matricariæ 2. species & Parthenium,
Tanacetum vulgare, Trag. Eyf. (Brunf.
Tanacet. Matth. Gef. hor. Lon. Dod. Cæl. Ger.
Tanacetum citrin. Thal. maj. Dod. gal. (fol.
Artemisia tenuif. Fuch. in ic. monoclonos, Fuch.
Ambrosia Amato: recentiorum, Cord. in Diosc.
Athanasia vulgaris, Lac.
Tanacetum millefolij folijs, floribus Abrotani
fœminæ, aut Agerati, Ad. Lob.
Athanasia seu Tanacetum, Lugd. Cast.
Artemisia Dioscoridis, Tab.

Flore est luteo, rarius albo, & dicitur
Artemisia flore albo, Taber.

II. Tanacetum folijs crispis.
Tanacetum argutioribus fimbrijs, Ad.
Tanacet. specios. cristat. Anglic. Lob. Lug. Eyf.
Tanacetum crispum, Dod. crispum & Angli-
cum, Cam. in Matth. & hort. Ger.
Artemisia sativa Anglica, Tab.

III. Tanacetum minus album odore cam-
phoræ, five Achillæa, Diosc.
Millefolium nobile & stratiotes vera, Trag.

TANACETUM AFRICANUM.

Plantam hanc aliqui Othonnam Diosc. l. 2. c. 213. & Plin. l. 27. c. 12. alij majorem quidem Othonnam, mi-
norem vero Argemonem Diosc. l. 2. c. 208. & Argemoniam, l. 25. c. 9. alij Lycopersicum Gaeni: alij Caltham
Plin. l. 21. c. 6. quam gravis odoris dicit: alij Petritium florem Plin. l. 21. c. 8. suspicantur: alij ad Chrysanthemi ge-
nus referunt, ut Matth. Afric. vel Tunetanus flos dicitur, eod quod primum hic flos in German. fuerit illatus, quan-
do Carol. V. Imp. ad Tunetum victoria potitus est; cum in Africa sponte proveniat. Tanacetum appellare lubet.

I. Tanacet. five flos African. major flore pleno, Caltha Africana fruticosa, Eid.
an Othonna Dioscoridis & Plinij.
Caryophyllus Indicus major, Matth. Lugd.
Flos Africanus major, Dod. gal. multiplex, Eid.
Rosa Indica magna, Gef. hort.
Flos & Caryoph. Indic. & Pœdua Punica lingua, Flos Africanus major aureus multiflorus, Tab.
Flos

Achil. Mar. Lac. Cord. in Diosc. & hist. Thal. Cast.
Millefolium stratiotes, & Stratiotes, Gef. hort.
Achillea five millefolium nobile, Tab. Ger.
Tanacet. minus, Dod. candidis florib. Lob. Lug.
Achillea sideritis, Lugd.

Scopa regia Plinij, Dalech. in Plin.
Floribus candidis, purpureis & aurum æmul-
lantibus, Matthiolo.

IV. Tanacetum alpinum odoratum.
Iva moschata Rhætis, Tanaceto cognata her-
bula, Gef. hort.

Tanacetum parvum alpinum, Lugd.

Tanacetum inodorum.

I. Tanacetum mont. inodor. minore flore.
Sideritis 3. Marthioli, quoad folia, & Lugd.
Tanacet. inodor. Dod. Ger. fl. bellidis maj. Eyf.
Tanacetum non odorum sylv. Ad.
Tanacet. inodor. 2. Clus. pan. & hist. (Lob.
Tanacet. non odor. perperam sideritis italorum,
Tanacetum album seu inodor., Thal.
Athanasia Leucanthemos, Lugd.
Tanacetum Leucanthemum, Tab.

II. Tanacetum inodorum flore majore.
Tanac. inodor. 1. vel ampliore fl. Clus. pa. & hist.

Flos Africanus major polyanthos, Ger.

Caryoph. Indic. fl. multip. luteo pleno major, &

Caryoph. major Indic. fl. multip. aureo, Eyf.

Caryophylli Hispan. dicti prima varietas, Col.

Variat flore, qui aliquando ad Pugni magnitudinem crescit, & in globum colligitur; hinc Svvert. & Bry.

Aphricanus flos max. flore aurantij colore.

Aphricanus major flore pleno: addit Bry.

Caryophyllum Indicum majorem luteum, vel

aureum; sic & colore est luteo, pallido, aureo. Aliquando in uno flore observata folia 230 bifida

& trifida, & per margines punctis notata.

II. Tanacet. African. majus simpliciflore.

Caltha Africana flore simplici, Gef. hort.

Flos Africanus major simpliciflore, Lobel. ico.

Tab. Ger.

Flos Ind. major flore simplici, Cam.

Africanus flos maximus simplex flore luteo,

Svvert. Bry.

Caryophylli Hispanici dicti tertia & quarta varietas, Colum.

Variat: colore est croceo, est pallente: petalis octonis, aliquando novenis.

I. Tanac. African. seu flos Africanus minor.

an Argemone Dioscorid. Argemone Plinij.

Caryophylli Indici, Trag.

Flos vel Caryophyllus Indicus minor, Gef. hort.

Caryophyllus Indicus minor, Matth. Gef. col.

Lugd. Cast.

Flos Africanus, Dod. Lob. Indian. minor, Lon.

Flos Indianus seu Viola flammea, Fuch.

Tagetes Indica, Eid. Lugd.

Othonna, Lac. alorum & ocellus African. Ad

Tanacetum Peruvianum, Cord. hist.

Caltha Africana minor flore simplici, Gef. hort.

Viola flammea quibuldam, Eid.

Flos Portugalicus vel Indicus minor, Eid. col.

Pedua Pœnorum, Guil. pap.

Flos Indiæ alter minor, Argemone veter. Cæf.

Flos Africanus minor flore simplici & multiflorus, Tab. Ger.

Flos Ind. minor flore simplici & pleno, Cam.

Caryophyllus Indicus fl. luteo, simpl. minor &

Caryoph. Indic. fl. aureo simpl. minor, Eyf.

Variat flore simplici & pleno: quamvis multiplex rarus sit: croceos, melleos & albos reperiri, Amatus scribit; adde & rubros: aliud citius, aliud tardius floret.

Africanus flos simplex & Africanus flos alter

pleno flore, Svvert. Bry.

Caryoph. Indic. fl. luteo rubefcente simp. min. &

Caryoph. Indic. plenus fl. luteo rubefcente minor, Eyf.

Caryophylli Hisp. dicti altera varietas, Colum.

IV. Tanacetum Africanum minimum sericea hirsutie oblitum.

Caryophylli Hispanici dicti varietas septima & octava, Colum.

Variat flore simplici quinis petalis, & altera polyanthos, Colum.

V. Tanacetum sive Flos Mexicanus flore fistuloso simplici.

Caryoph. Mexican. fistuloso flore simp. Colum.

VI. Tanacetum sive Flos Mexicanus flore fistuloso pleno.

Caryophyllus Mexicanus alter polyanthos fistuloso flore, Colum.

VII. Tanac. African. folijs tenuissimè divis.

Caryophylli Hisp. dicti varietas nona, Colum.

VIII. Flos Indicus.

Jolo Suchil, id est, flos cordialis, figura & magnitudine cor representans: Joseph. Acosta l. 4.

hist. Ind. Occid. cap. 27.

IX. Angiers, Indiæ flores holosericum tactu referentes, modori, aspectu amabiles: Idem.

PARTHENIUM.

Parthénium, quasi Virginalis, quod morbis mulierum uterinis medetur (hinc vulgo *Matricaria*) Diosc. l. 3. c. 155. cui & *Αμαραντος*, ut & Galeno & Aegineta. Plin. & Artemis. l. 25. c. 6. & Mercur. l. 25. c. 5. & huic, Parthen. nomen tribuit: at de *Matricaria* agit l. 21. c. 30. quod in hortorum sepib. flore albo nasci scribit. Unius meminere.

I. *Matricaria vulgaris*, seu *fativa*.

Amaracus Galeno & Aegineta, Crispula Man.

Matricaria, Parthenij i. species. Brunf.

Artemisia tenuifolia, Fuch. Tab.

Artemisia ramosa altera species, Fuch. ico.

II. *Matricaria sylvestris* flore toto luteo.

Matricaria sylvestris, Trag.

Artemisia tenuifolia altera species, Thal.

Matricaria, Trag. Lon. Dod. Lugd. Cæf. Camer.

Ger.

Matricaria nostras, Ad. Lob. fl. simplici, Eyf.

Parthenium, Matth. Dod. gal. Lac. Cord. in Dioscor. Gef. hort. Cast. Thal. 2. Tur.

Amaracus Galeni, Eric. Cord.

III. Matricaria odorator.

Matricaria altera ex Illua, Cam.
Artemisia tenuifolia odorata, Tab.

IV. Matricaria flore pleno.

Matricaria duplici flore, Lob. ico. Ger.

Matricaria pleno flore, Cam. Eyst.

Parthenium pleno sive polyphylo flore, Clus.
pan. & hist.

Artemisia tenuifolia flore pleno, Tab.

V. Matricaria inodora.

Achaovan, Parthenium inodorum, Alpi.

VI. Matricaria alpina Chamæmeli folijs.

Parthenium alpinum, Clus. pan. & hist.

Matricaria sive Parthenium alpinum, Cam.

VII. Matricaria folijs abrotani.

Parthenium *αμπροτάνιον*, Myconi, Lugd.

VIII. Matricaria maritima.

Cotula sive Parthenium marinum minimum,
Ad. Lob. ico.

Parthenium maritimum minimum, Lugd.

Chamæmelum minimum, Dalech. Eid.

CHYSANTHEMUM ET BUPHTHALMUM.

X *Χρυσάνθεμον*, propter flores luteos aureo fulgore splendentes, Dioscoridi, l. 4. c. 58. & quia orbem oculi imitantur, etiam *βυφθαλμὸν* dicitur.

βυφθαλμὸν adjungimus, quod flore simile sit boum oculis, Plin. l. 25. c. 8. de quo Dioscorides, l. 3. c. 156. post Parthenium egit, qui utrique planta *βυφθαλμὸν* nomen tribuit. Dein, quia forma & viribus plurimum conveniunt, ita ut dubitari possit, sint ne apud Diosc. & Plinium diverse plantæ, an verò eadem, quod ex capitulis utriusque collatione clarum fiet: quare Galenus & Aegineta, Buphtalmi, non verò Chrysanthemi, meminere.

Genus Chrysanthemi unicum est Dioscoridi & Plinio, licet, l. 26. c. 8. Chrysanthemi primi meminere, nisi pro primo, potum legendum censuimus.

I. Chrysanthemum folijs matricariæ.

Tinctorius flos 4. Trag.

Chrysanthemum, Matth. Lac.

Chrysanthemum & Chalcitis, Tab.

Chrysanthemum segetum, Ger.

II. Chrysanthemum flore partim candido, partim luteo.

Buphtalmi altera species, Gesn. hort.

Chrysanthemum Creticum mixtum, Eyst.

III. Chrysanthemum majus folio profundius laciniato magno flore.

Chrysanthemum Creticum 1. Clus. hist. luteum, Eystett.

IV. Chrysanthem. majus folio in minores lacinias diviso.

Chrysanthemum Creticum 2. Clus. hist.

an Chrysanthemum, quod crudum edant in Lemno insula, Bellon.

an Chrysanthemum quod *μαλινάδα* vocatur & à rusticis edicitur, Belli epist. 1. ad Clusium.

Chrysanthemum alpinum.

I. Chrysanthemum alpinum incanum folijs laciniatis.

Chrysanthemum alpinum 1. Clus. pan. & hist.

II. Chrysanth. alp. folijs abrotani multifidis.

Achillæa montana Artemisiæ tenuifoliæ facie, Ad. Lob. ico.

Achillæa montana, Lugd. Tab.

Ageratum ferulaceum, Lugd.

Chrysanthemum alpinum 2. Clus. pan. & hist.

III. Chrysanth. alp. fol. longis tenuiter incis.

Chrysanthemum alpinum 3. Clus. pan. & hist.

Buphtalmum.

I. Buphtalmum, Tanacetii minoris folijs.

Buphtalmum, Trag. Matth. Lac. mille folijs

folio Chrysanthemi flore, Ad. Lob. Cast. Lugd.

Cam. Tab. sub Buphtalmo albo, Ger.

Buphtalmus & Chrysanthemum, Gesn. hort.

Buphtalmus qui & crispula herba, Amato.

Buphtalmum vulgare, Clus. pan. & hist.

Chamæmelum chrysanthemum, Fuch.

Cotula lutea, sive tertia, Dod.

Chrysanth. Cord. in Diosc. Tur. tenuifol. Eyst.

Chrysanthemum verum, Ges. col.

Aster Atticus, Cord. hist. ico.

Cotula non foetida, Lon.

II. Buphtal. fl. luteo subtus purpurascens.

Buphtalmum Narbonense, Clus. Pan. & hist.

Buphtalmum tenuifolium Narbonense, Lob.

obs. descript.

Buphtalmum verum, Dalech. Lugd.

Buphtal. flore purpurascens, Cam. in Matth.

III. Buphtalmum cotulæ folio.

Buphtalmum alterum folio & facie cotulæ

foetidæ, Ad. Lob. ico.

Buphtalmum alterum Penæ, Lugd.

IV. Chry-

IV. Chrysanth. fruticosus subcandidum.
Chrysanthemum alterum ex Sicilia, Cæs.
Bupthalmum, Camer. in Matth. icon. verum,
Tab. Ger.
Chrysanthemum primum, Cæs.
V. Bupthalm. lanuginos. folijs millefolij.

an Dioscoridis?

Chrysanthemum Valentinum, Clus. Hispal.
pan. & hist. Lob. ico. Ger.
Bupthalmum tenuifolium Narbonense, Lob.
ob. quoad icon.
Chrysanthemum Hispanicum, Tab.

CHAMÆMELVM ET COTVLA.

A *Nobis Dioscoridi, lib. 3. cap. 15. 4. αὐθεντὶν Theoph. 7. hist. 13. dicitur & χαμαιμελον, quod mali odorem habeat, Plinio, lib. 22. cap. 21. cui & Anthemis.*

Genera plura Theophrasto: at Dioscoridi & Plinio tria, flores tantum distantia: flores in medio aurei, orbiculato ambitu candidi & λευκάδιον: melini & χερνυβιον: aut purpurei, & proprie ἡγάδιον vocatur.

I. Chamæmelum vulgare, Leucanth. Diosc.
Chamæmelum (Parthenii 3. species) Brunf. Lac.
Cæs. Cast. Thal. Tab. Ger.
Chamomilla Amato 3. & vulgaris Trag. Lon.
Chamæmilla Ang. Chamæmelon, Thal.
Chamæmelum Leucanth. Fuch. Gefn. hort.
Chamæm. syl. Dod. gal. vulgare Gef. hor. Dod.
& arvense Cam.

Chamæmelum Romanum flore multiplici,
Cam. in Matth. Tab. Eyf.
Chamæmelum Anglicum flore multiplici, Ger.
Floribus variat, qui altero globosus albus, ut
apices lutei non conspiciantur: in altero adhuc
conspiciuntur: est 3. & 4. species, Tab. aliquan-
do flores latitudine Ducatum Ungaricum ex-
æquant.

Chamæmelum vel Anthemis vera, Gef. hor.
Anthem. Tur. Cord. in Diosc. Matth. Gef. col.
Anthemis vulgarior sive Chamæmill. Ad. Lob.
Chamæmelum sylv. Matthiol. & Dod. utrius-
que figura posita, Lugdun.

VI. Chamæmel. luteum capitulo aphylo.
Chamæmelum Chrysanthemum, Dod. gal.
Chamæmel. Chrysanth. odoratum, Eid. post.
Anthemis Chrysanthemus herbariorum, Ad.
Lob. Lugd.

II. Chamæmelum nobile sive Leucanthemum odoratus.
Parthenium Diosc. & nobilis Chamom. Trag.
Chamæmelum Leucanthem. Dod. gal. Tur.
Leucanthemum odoratum, Dod.
Chamæmel. hortense, Gef. hor. vel nobile, Eid.
Chamæmel. leucanthemum odoratum, Dod.
Parthenium nobile, Eid. ap.
Chamomilla nobilis, Lon.

Chamæmelum hort. alterum, Gefn. hort.
Chamæmelum luteum odoratum, Eid. ap.
Chamæmelum luteum, Tab. fig. trans.
Chamæmelum nudum odoratum, Ger.
Chamæm. inod. & foetidum, sive COTULA.

III. Chamæmelum leucanthemum Hispanicum magno flore: quod. i. est in Prod.
IV. Chamæmelum Chrysanthemum Hisp.
odorat: quod 2. in Prod.

VII. Chamæmelum inodorum.
Cotula, Brunf. Tab.
Chamomilla fatua, & 4. Trag.
Bupth. Fuch. Er. Cord. majus, Cord. in Diosc.
Cotula non foetida, Dod. gal. Gef. ap. Lugd.
Cotula inodora, Ad.
Cotula alba non foetida, an Melandrium Plinij,
Dod. post.

V. Chamæmelum nobile flore multiplici.
an Leucanthemum Plinij, Ang.
Leucanthemum niveum Anglorum flore mul-
tiplici, Ad. Lob. ico.

Solo odore à Chamom. vulgari distinguitur.
VIII. Chamæmelum foetidum.
Parthenion lephophyllon Hippocratis.

VI. Chamæmelum Chrysanthemum Hisp.
odorat: quod 2. in Prod.

Cotula foetida, Parthenij 4. species Brunf.
Chamomilla 2. & sylv. Trag.
Cotula foetida, Dod. gal. Er. Cordo (cui & ca-
ninum anethum Germ.) Lac. Gefn. hort. Guil.
Lon. Lob. ico. Lugd. Cast. Cam. Eyf.
Parthenium, Fuch. Ad. Tab. primum, Tur.
Bupthalmum minus, Cord. in Diosc.
Cotula alba, Dod.

V. Chamæmelum nobile flore multiplici.
an Leucanthemum Plinij, Ang.
Leucanthemum niveum Anglorum flore mul-
tiplici, Ad. Lob. ico.

Κυανόθεις, Parthenium vel virginea, Lob.

Chamæmel. leucanth. odorat. multiplex, Dod.
Anthemis leucanthemon nivea Angl. flore
multiplici, Lugd.

Chamæ

Chamæmelum album seu foetidum, Thal. Pyrethrum alpinum, Gesn. hort.
 Cora vulgo, Bupthar. Diosc. Gal. & Plinij, Cæs. Leucanthemum alpinum, Clus. pan. & hist.
 Flore pleno, aliquando etiam in agris reperi- X. Chamæmelum Leucanthemum: inca-
 IX. Chamæmelum alpinum. (tur. num Hispanicum minus: quod 3. in Prod.



SECTIO SECUNDA
 ABROTANVM; ARTEMISIA; AMBROSIA;
 BOTRYS; ABSINTHIUM.

ABROTANVM EJVSQVE SPECIES.

Aβροτανος Dioscoridi, l. 3. c. 29. sic dictum Nicandri interpreti, αβροτὰ πρὸς ὁλν ἀλφὸν ἢ ἀπὸ αὐτῶν γαίαν δαί-
 αλφον ἢ αὐτὰ πρὸς ὁλν αὐτῶν αἰνῶν: Hoc est, quod conspectu tenerum, molle & delicatum appareat: aut
 quod gravem, acrem, & diffusilem halitum spiret.

Genera duo Theoph. urbana, 6. hist. 1. & agrestis, 6. caus. 24. Dioscoridi semina & mas. Sic Plinio
 l. 21. c. 7. mas, Abrotanum campestre: semina verò, montanum. At Dioscoridi semina, Chamæcyparissus
 id est, pumile Cupressi nomine, Plin. l. 24. c. 15. donasse videtur.

I. Abrotanum latifolium arborefcens.

Absointhium del Comasco, Ang.

Abrotanum foemina arborefcens, Dod.

Absointhium arborefcens, Lob. Lugd. Tab. Ger.

II. Abrotanum latifolium inodorum.

Abrotanum inodorum, Lob. Lugd. Ger.

Absointhium inodorum & inspidum, Dod. ico.

Abrotanum latifolium, Tab.

Artemisia tenuifolia 2. Clus. hist. ico.

III. Abrotanum mas angustifolium majus.

Abrotanum mas, Brunf. Dod. cui etiam 2. &

minus, Matth. Lac. Gesn. hort. Corn. Ad. Lob.

Cast. Lugd. Tab. (sive masculum majus) Cam.

Franco, Ger. Eyf.

Abrotanum primum & minus, Trag.

Abrotanum vulgare mas, Fuch.

Abrot. nigrum seu mas, Cord. in Diosc. & hist.

Abrotanum mas Diosc. montanum Plinij, Cæs.

Abrotanum mas vulgare montanum foemina

nostras forte, Colum.

Abrotanum foemina, Dod. gal. Ang.

IV. Abrotanum mas angustifol. maximum.

Abrotanum majus, & 2. Trag.

Abrotanum magnum camphoratum, quibus-

dam Incensaria, Cam.

Abrotanum mas magnum, Franco.

Abrotanum mas vulgare magnum in hortis

cultum, Colum.

V. Abrotanum mas angustifolium incanum.

Abrotanum mas minus, Tab.

an Abrotanum mas incanum, Colum.

VI. Abrotanum mas angustifolium minus.

Abrotanum tertium, Dod. gal.

Abrotanum odoratum humile, Eid. Lugd.

Abrot. odorat. humile dense fruticosum, Lob.

Abrotanum humile, Tab. Ger.

VII. Abrotanum campestre.

Abrotanum syl. vel 4. Trag.

Ambrosia, Lac. Lon. Cast. altera, Matth. Lugd.

Cam. tertia, Tab.

Ambrosia tenuifolia, Lob.

Artemisia leptophylla, Gesn. hort.

Artemisia tenuifolia, Dod. Thal. 3. Clus. hist. def.

Artemisia 3. Diosc. leptophyllon, Ad. Lob. ico.

Abrotanum campestre, Tab. Ger. (Lugd.

Duplex est: nam alteri cauliculi sunt albi-

cantes, alteri rubentes: illud

Artemisia tenuif. 1. vel incana, Clusij in Pan. at

secunda in hist. hoc verò, 2. vel purpurascens, E.

jusdem in Pan. at in hist. tenuif. 3. esse videtur.

VIII. Abrotanum campestre incanum Car-

linae odore: in Prodomo descriptum.

an Artemisia tenuifolia, 1. Clus. hist.

Abrotanum foemina vulgi.

I. Abrotanum foemina folijs retetibus.

Chamæcyparissus Plinij, Trag. Fuch. Eric. &

Val. Cord. Dod. gal. Tar. Gesn. hort. Lon.

Santolina, Ang. prima, Dod.

Abrotanum foemina, Brunf. Matth. Lac. Ad.

Lob. Cast. vulg. 1. Clus. hisp. & hist. Lugd. Tab.

Ger. Cam. in Matth. Eyf.

Santonium minus, Cord. hist.

Centonia, Gesn. hort.

Polium, Theoph. Diosc. & Arabum, Colum.

Santo-

Sanctolina vulgo, aliis Crespolina, Cæs.
Abfinthium marinum, Tab.

II. Abrotanum fœmina flore majore, folijs villosis & incanis.

Santonicum majus, Cord. hist.

Santolina altera, Dod.

Seriphium Diosc. abrotani fœm. facie, Ad. Lob.

Seriphium verum Penæ Lugd.

Abfinthium marinum 1. Tab.

Abrotanum fœmina 3. Clus. hist.

Polij altera species major, Colum.

III. Abrotanum fœmina folijs Ericæ, vel Santolina 3. Dod. (Sabinæ.)

Chamæcyparissus Dalechampij, Lugd.

Unguentaria Lutetianorum.

IV. Abrotanum fœmina folijs Cupressi.

Abrotanum peregrinum Cupressi folijs, Ad.

Santolina 4. Dod.

V. Abrotanum fœmina Sabinæ folio.

Hujus Lobelius in observationibus meminit.

VI. Abrotanum fœmina repens canescens, Santolina 5. Dod.

VII. Abrot. fœmina folijs minus incanis.

Abrotanum fœm. 2. Clus. hist.

Abrot. fœm. folijs magis viridibus, Cam. hort.

Polij altera species non ita incana, Colum.

VIII. Abrotanum fœmina viridis.

Abrotanum fœm. Salmantic. 2. Clus. hisp. at

6. in hist.

IX. Abrotan. fœm. folijs rorismarini majus.

Abrotanum fœmina Salmanticensis prima,

Clus. hisp. at 4. in hist.

X. Abrotanum fœmina folijs rorismarini

minus.

Abrotani fœminæ Salmanticensis 1. altera spe-

cies, Clus. hisp. & Abrot. fœmina 5. Eid. hist.

ARTEMISIA EJVSQVE SPECIES.

A ^{Ἀρtemisia} Dioscoridis, l. 3. c. 127. sic dicta ab Artemisia Mausoli Caria Regis uxore, quæ hanc sibi, ut loquitur Plin. l. 25. c. 7. adoptavit, cum antea napævis id est, Virginalis; quod virgo Dea illi nomen dederit, vocaretur: quare Apulejus etiam ^{ναρπηvis} dici affirmat. Sunt qui ab Artemide Ilythia cognominatam putent, quoniam privatim seminarum malis, quibus ^{ἀρtemis} æqueus, id est, Diana præest, medeatur.

Genera duo Diosc. proposuit: in quibusdam vero codicibus Græcis, ut Marcelli, Goupylij, Assulani, Saracenii, sequitur & aliud caput de Artemisia, quod spurium videtur: quare Ruellius, in sua interpretatione omisit. Marcellus Virgilius, ut adscititium damnavit: Cornarus, ut supposititium ex textu Latino removit: non immerito, cum nec apud Galenum, Oribasium, Aeginetam, Aëtium, nec apud Serapionem, de tertia specie quidquam legatur, qui tamen simplicia ex Dioscoride enumerant. Sic Plinio genera duo, alterum folijs latioribus, alterum tenuioribus.

I. Artemisia vulgaris major.

Artemisia, Parthenij 8. species, Brunf.

Artemisia, Trag. Ang. Matth. Lac. Cord. in Diosc.

Amat. Gesn. hort. Ad. Cam. communis, Dod. gal.

Artemisia vulgaris, Tur. Clus. hist. Thal.

Artemisia major, Cord. hist.

Artemisia latifolia, Fuch. Lon. Dod.

Artemisia mater herbarum, Lob. Ger.

Artemisia 1. vulgaris, Lugd.

Artemisia vulgaris, & Artemisia altera poly-

clonos dicta, Diosc. Cæs.

Artemisia rubra & alba, Tab.

Variat colore caulis & floris: una, caule & fl.

rubro purpurascens, seu subpurpurascens:

altera, caule ex viridi albicante, vel subpallente

spadiceo: hinc apud Tab. & Ger. figuræ duæ.

II. Artemisia vulgaris minor.

Artemisia minor, Matth. Cast.

Priore minor est & unum tantum caulem

producit.

III. Artemisia montana.

Artemisia leptophyllos montana, Lugd.

IV. Artemisia polyspermos.

Artemisia monoclonos quorundam, alijs Am-

brofia, Lugd.

an Ambrosia 2. Tab.

AMBROSIA.

A ^{Ἀμβροσία} Dioscorid. lib. 3. cap. 120. Artemisia subjicit, Veteribus τὸ τὰν θεῶν βρώμα, id est, Deorum cibis dicitur, quod mortales eam non edant: vel quod, qui eam ederint, immortales evadant, ita eximia fragrantia gratia, etiam Dijs expetita. Sunt qui Ambrosiam Dioscorid. Conyzam Hipp. de morbis mulieb. & Artemisiam secundam Plinij velint.

S

Ambro-

I. Ambrosia maritima.

Conyza Hippocratis, Ang. ut quidam nominant, Gef. hort. Cam. (Gef. hor.

Ambr. quibusd. dicta, Artemisia forsan species,

Ambrosia sativa horrensis, Lob.

Ambrosia, Dod. Ad. Cæs. Cam. prima, Tab.

Ambrosia horrensis procerior, Lugd.

Artemisia monoclonos, Eid.

Plerunque ramosa est, rarius unicus; hinc duæ figuræ in hist. Lugd.

II. Ambrosia campestris repens.

Ambrosia, Matth.

Ambrosia spontanea strigosior, Lob.

Ambrosia prima Matthioli, Lugd.

Coronopus Ruellij, Dod. gal. Gef. hor. Lugd.

Coronopus repens, Lob. Lugd. Tab. Cam.

Cornu cervi alterum repens, Dod.

Pseudoambrosia, Nasturtium verrucarium quibusdam, Cam. in Matth.

Carara, Cæs. alp.

BOTRYS.

Botrys Diofcoridi l. 3. c. 130. quam Cappadoces Ambrosiam, alij Artemisiam vocarunt: Botrys Plinio l. 27. c. 4. quam l. 25. c. 7. cum Artemisia confundit: sic dicta à semine, quod racematim ramulis adnascitur.

I. Botrys Ambrosioides vulgaris.

Botrys, Trag. Matth. Fuch. Tur. Ang. Dod. Lac.

Amat. Ruell. Cord. hist. Gef. Ad. Lob. Cast. Cæs.

Lugd. Tab. Cornaro. Ger. Cam. cui & Patientia

Italorum.

Botrys Artemisia Turcica, Eyft.

Botrys, altera Ambrosiæ species, cujus semen

Amomum officin. quibusdam, Cord. in Diofcor.

II. Botrys Ambrosioides Mexiocana: cujus

semen Parote Mexiocanæ nomine missum, in

horto D. D. Plateri, feliciter Anno 1619. & se-

quentibus crevit.

III. Botrys Chamædryoides.

Chamæcyparissus agrestis & Chamæpitys al-

tera Diofcoridis, Trag.

Chamædrys altera, Matth. Cast. Lugd. Thal.

Chamædrys fœmina, Dod. gal. Tur. Cæs. Lugd.

Cam. Ger. vera fœmina, Fuch. ico.

Trixago vera, Lon.

Chamædrys laciniatis folijs, Lob.

Chamæpitys altera, Dod.

Chamædrys minima, Lugd.

Iva moschata, Tab.

Aiuga, vel Chamæpitys multifidis fol. Clus. hist.

ABSINTHIUM EJUSQUE SPECIES.

Absinthium Diofcoridi l. 3. c. 26. Sic dictum quasi ἀνίσθη Comici, quasi impositibile, propter insignem amarorem, ὅθεν αὖ τῷ τῆς αὐτῆς ἀνίσθησι: unde ὁ τῆς ἀνίσθησι, intensa amaritudinis.

Genera tria Diofcoridi. Ponticum, Marinum, sive Seriphium, & Santonicum, & Galeno & Plinio lib. 27.

cap. 7. Theoph. 9. hist. 18. Absinthij in Ponto proveniunt tantum meminit.

Absinthium Ponticum.

I. Absinthium Ponticum, seu Romanum officinarum, seu Diofcoridis.

Absinthium, Brunf. Matth. Cord. in Diofcor. & hist.

stor. Lon. Cæs.

Absinthium Pontic. Ruel. legitimum, Bellon.

Absinth. vulgare, Trag. Fuch. ico. Lac. Gef. Guil.

Ad. Lob. Cast. Tab. Lugd. seu Rom. Pontic Eyft.

Absinthium commune, Tur. Gefn. Cam. quod

Ponticum Trincavellæ dicit.

Absinthium nostrum rusticum, Thal.

Absinthium Santonicum, Dod. gal.

Absinthium majus & vulgare, Clus. pan.

Absinthium latifolium, Dod. Ger.

II. Absinthium Ponticum montanum.

Absinthium commune minus, Gef. hort.

Absinth. mont. Cam. in Matth. seu Roman. Tab.

Absinthium tenuifolium pont. Galeni, Ger. ico.

Absinthij alterum genus, tale quale Ponticum

traditur, Cæs. alp.

Simile vulgari, nisi quod exilicior omnia, & amaritudo gratior.

III. Absinthium pont. Creticum grati odoris.

Absinthium in Græcia communissimum, quod

ἀνίσθη vocant, Ang.

Absinthium Ponticum Belli, quod ἀνίσθη non ἀνίσθη in Græcia vocatur: ut ad me Honorius

Belli, & scripsit, & plantam misit, ut in Appen-

dice Phytopinacis & sub i. in Prod. videre est.

IV. Absinthium Pontic. tenuifolium incanum.

Abrotanum minus & i. Trag.

Abrotanum fœmina, Fuch. à Cordo existimat.

Absinthij genus potius, Gef. hor. Lon. Lugd.

Abrotanum album, sive fœmina, Cord. in Diofcor.

Absinthium Santonicum, Ruel. Cæs.

Absinthium Pontic. Matth. Fuch. ico. Dod. gal.

Fuchij Gef. hor. append. Guil. Lug. Tab. vulgare,

re, Clus. pan. & hist.

Absin-

Abfinthium Roman. Mesuei, Tur.

Abfinthium tenuifolium, Dod.

Abfinth. Galatium Sardonium Diosc. Ad. Lob.

Abfinthium Romanum vulgare, Cam.

Abfinthium Ponticum album, Eyst.

Hoc medium est inter Abfinthium & Abro-
tanum, & est duum generum : 1. planè inca-
num : 2. cauliculis purpurascens, folijs su-
pina parte viridioribus.

V. Abfinth. Pont. tenuifolium Austriacum.

an Abfinth. Pont. Trident. herbarior. Lob. Lug.

Abfinth. tenuifol. Austriacum, Clus. pan. & hist.

Abfinthium Seriphium, Dod.

an Abfinthium Nabathæum Avicennæ, Tab.

an Abfinthium tenuifol. seu Romanum, Ger.

VI. Abfinth. Pontic. repens vel supinum.

Abfinthium supinum, Gefn. hort.

Abfinth. Pont. supinum Herbariorum, Lob. ob.

Abfinthium repens, Tab.

Abfinthium marium latifolium, Ger. ico.

VII. Abfinth. inspidū abfinthio vulgari simile.

Abfinthium inspidum, Gefn. hort. Lob. ob.

an Abfinthium dulce, Clus. hist.

Abfinthium inodorum, inspidum, vel fatuum,

Dod. desc.

Abfinthium Seriphium sive maritimum.

I. Abfinth. maritimum Lavendulæ folio.

Abfinth. marium sive seriphium, Matth. Lugd.

Abfinthium Seriphium, Lac.

Abfinthium maritimum Volmaro, Gefn. ap.

an Abfinthium Seriphium, Amat.

Abfinthium marium, Tur. Cæs.

Artemisia marina, Ad. Lob. Lugd. Tab. Ger.

Artemisia folio Lavendulæ, Clus.

Abfinthium angustifolium, Dod.

Seriphia Paludio, Lugd. (Eyst.)

Abfinth. latifol. marin. aromatico odore, Cam.

Hoc folijs ludit, superioribus in aliquot laci-
nias divis, potissimum si in hortos transfera-
tur : & hujus peculiaris figura habetur, nomine

Artemisæ marinæ folijs superior. incis, Lob.

Artemisia marina Lobelij, Lugd.

Abfinth. angustifolij ramul. folijs scissis, Dod.

Abfinthij marini Patavini, Clus. pan. & hist. ubi

scribit ab Artemisia folio Lavend. differre.

Artemisia marina minor, Tab.

an Abfinth. latifol. rarius Artemisæ folio, Col.

II. Abfinthium Seriphium Germanicum.

Abfinthium Seriphium, Gefn. hort.

Abfinthium marium Misenfæ, Seriphium

Belgic o simile, Clus. pan. & hist.

III. Abfinthium Seriphium Belgicum.

Abfinthium Seriphium seu marium, Ang.

Abfinthium Seriphium, Dod. gal. Lugd.

Abfinth. Seriph. vulg. perperam Diosc. Lob. ico.

Abfinthium Seriphium, Dod. descript. vulgo

dictum, Cam. in Matth.

Abfinth. marium sive Seriph. in Belgicis &

Anglicis maritimis, Clus. pan. & hist.

IV. Abfinthium Seriphium Gallicum.

Abfinth. Seriphium tenuifolium Monspelienf.

Joh. Bauhino lib. de Abfinth.

Abfinth. Seriph. vulgo dictum, Cam. in Matth.

Abfinth. Seriph. Narbon. Clus. pan. & hist. Dod.

Abfinthium Santonicum.

I. Abfinthium Santonicum Judaicum.

Abfinthium Santonicum, Scheha Arabum, un-

de semen lumbricorum colligitur, Rauvv.

Scheha Arabum, Lugd. ap.

II. Abfinth. Santonicum Alexandrinum.

Abrotaum mas, Ang.

Semen Sanctum sive sementina, Matth. Semen

Sanctum, vel contra, Ad. (& Semen Zedoariae,)

Lob. Lugd. Cast.

Abfinthium Seriphium, Alexandrinum se-

men, aut Zinæ semen, Cord. in Diosc. & hist.

Sementina, Dod. Tab. (cui & Santonicū vulg.)

Santonicum, Semen Sanctum, Lon. (Ger.)

III. Abfinthium Santonicum Ægyptiacum.

Abfinth. Seriphium Ægyptium, Matth. Lugd.

Abfinth. aliud peregr. sive Ægyptium, Ad. Lob.

Abfinthium Ægyptium, Dod. Tab. Ger.

IV. Abfinthium Santonicum Gallicum.

Abfinthium Xantonicum vulgare, Lob. ob.

Abfinthij Santonici species, Cam. in Matth.

Abfinthium montanum.

I. Abfinthium Seriphium mont. candidum.

Abfinthij genus, in Valesia herba alba dicta, &

Abfinthium Seriphium foemina, Gefn. hort.

Abfinthium album è Valesia, Eid. ap.

Abfinth. externum & spurium primum, Dod.

Abfinthium Santonicum nonnullis, Cam.

II. Abfinth. alpin. incanum : quod 2. in Prodr.

Abfinthium alpinum 2. Ponæ in Baldo Ital.

an Abfinthium parvum & incanum quod Gef-

nero humile, Cam.

Abfinth. pumilum Camerarij, Clus. Pan. & rar.

III. Abfinth. alpinum candidum humile :

quod 3. in Prodr.

IV. Abfinth. alpinum umbelliferum latifol.

S 2

Abfin-

Abfinthium album capitulis squarrosis, florib.
 albis, umbella Achilleæ montanæ, Lob. ob.
 Abfinthium album, Lob. ico. Tab. Ger.
 Abfinthium album capitulis scabris, Lugd.
 Abfinthium Alpinum seu umbelliferum flor.
 albis, Pona in Balde.
 Abfinth. alp. umbelliferum, Clus. pan. & hist.
 Abfinthium pannonicum flore albo, Cam.
 Abfinthium umbelliferum, Clavenæ, Pharma-
 copæi Bellunenſis.

Hujus varietatē, sub 4. in Prod. exhibuimus.
 V. Abfinthium umbelliferum hortense.
 Abfinth.umbellifer, alterum Italicum, Lob.ob.
 VI. Abfinthium alpinum umbelliferum te-
 nuifolium & minus.
 Abfinthium 3. alp. umbelliferum, Ponæ Ital.
 VII. Abfinthium montanum Chamæmeli
 flore magno.
 Abfinthium montanum abrotani fœminæ flo-
 re, Colum. in Phytobas.



SECTIO TERTIA.

ACHILLEA SIVE MILLEFOLIUM TERRE-
 STRE; MILLEFOLIUM AQUATICUM SIVE VIOLA
 AQUATICA; CONSOLIDA REGALIS; FVMARIA;
 CHELIDONIA; AQUILEIA; NIGELLA.

ACHILLEA SIVE MILLEFOLIUM.

Millefolium χιλιόφυλλον, à foliorum multitudine, recentioribus triplex est, majus, minus, & aquati-
 cum. Majus χιλλειον, ἢ χιλλειον σιδηριδιον Dioscoridis, lib. 4. cap. 36. censetur, cui umbellam floribus
 candidis & aurum emulantibus (addit interpres & purpureis) tribuit: quin & Achilleam, odore multo &
 medicato, dicit: quare Achilleam Dioscoridis, Tanacetum minus censemus. At Achillea, ab inventore Achille,
 Chironis discipulo nomen habet, Plin. lib. 25. cap. 5. Minus verò τριανθον ἢ χιλιόφυλλον, Millefolium Strati-
 otes, Eidem, lib. 4. cap. 103. quod floribus parvis & candidis esse scribit. Aquaticum ipsi, lib. 4. cap. 113. με-
 λεσπονδιον, Millefolium, quod folijs sit plurimis fœniculo similibus.

Plinius Achilleas sideritides plures habet: cujus prima eadem est cum Dioscoridis: secunda μελεσπονδιον
 Dioscoridis; tertia, Sideritis Heraclea, prima Dioscoridis: quarta & quinta, Sideritis Heraclea Cratæva, &
 tertia Dioscoridis: sexta, Sideritis secunda Dioscoridis.

Millefolium terrestre.

I. Millef. max. umbellâ alba: quod 1. in Prod.
 II. Millefolium vulgare album.
 Millefolium album, Brunf. flore albo, Eyst.
 Millefolium vulgare, Trag. Gesn. hort.
 Stratiotes 2. Ang.
 Stratiotes terrestris, Eric. Cord.
 Stratiotes millefolia, Fuch. Lac. Cast.
 Militaris, five Millefolium flore albo, Ad.
 Stratiotes major, Lugd.
 Millefolium terrestre majus, Cord. hist. Tab.
 Achillea, Dod. gal. Lon.
 Millefolium Stratiotes, Cord. in Diosc.
 Millefolium five Achillea, Dod.
 Millefolium, Thal. Cam. majus, Cæf.

III. Millefolium purpureum majus: quod
 5. in Phytopinace & 2. in Prod.
 Millefolium majus, Matth.

Millefolium rubro flore, Clus. hist. Eyst.

IV. Millefolium vulgare purpureum minus.
 Millefolium vulgare flore diluti ruboris, Trag.
 Millefolium minus, Matth. parvum, Cæf.
 Millefolium flore purpureo, Ad.
 Millefolium terrestre purpureis floribus, Lob.
 Millefolium purpurei floris, Dod. purpur. Tab.
 Millefol. rubro colore, Clus. hist. fl. rubro, Ger.
 Stratiotes millefolia minor, Lugd.

V. Millefolium incanum Creticum.
 Stratiotes millefol. Hon. Belli ep. 2. ad Clus.
 In Phytopinace sub 8. at in Prod. sub 3. de-
 scripsimus.

VI. Millefolium alp. incanum carneo flore.
 Millefolium rubrum, Gesn. hort.

Millefolium alpinum, Clus. pan. & hist.
 an Millefolium purpureum minus five 5. Tab.

VII. Millefolium tomentosum luteum.
 Stratiotes

Stratiotes vel militaris millefolia, Dod. gal.
Helichrysum Italicum Matth. Cam. Lugd.
Stratiotes lutea, Clus. hisp. Lugd.
Stratiotes millefolia flavo flore, Clus. hist.
Millefol. minus sive Stratiotes Chiliophyllos,
Dodon.
Millefolium luteis floribus, Gesn. hort. Cam.
Millefolium luteum, Ad. Lob. Tab. Ger.
Tanacetum lanuginosum, Lugd.

Millefolium aquaticum.

I. Millefol. aquat. umbellat. Coriandri folio.
Millefolium aquaticum, Matth.
Millefolium aquaticum alterum Coriandrifo-
lium, Ad.

Stratiotes Millefolium aquaticum, Lugd.
Folij Coriandri & umbella subpurpu-
scent, necdum videre licuit.

II. Millefolium aquaticum umbellatum
capillaceo brevique folio.
Myrioph. Matth. Lac. Cast. prius Matthioli,
Lugd.

Millefolium aquatile, Dod.
Myriophyllum aut Maratryphyllum palustre,
Ad. Lob.

Myriophyllum alterum, Cæs.
Millefolium, Lon. Ger. Tab. cui & Fœniculum
aquaticum.

III. Millefol. aquat. f. osculis ad folior. nodos.
Myriophyllum aquat. minus, Clus. pan. & hist.

IV. Millefolium aquat. seu Viola aquatica,
caule nudo.
an Potamogeton Castoris apud Plin. l. 26. c. 5.

Myriophyllum alterum, Matth. Lac. Lugd.
Stratiotes fluvialis, Gesn. hort.
Viola aquatilis, Dod. palustris, Ger.

Myriophyllum, Cæs. equisetifolium fluviale,
Ad. Lob. ob.
Fœniculum aquaticum 2. Tab.

V. Millefol. aquat. equisetifol. caule nudo.
Myriophyllum equisetifol. palustre, Lob. ico.
Viola aquatilis altera ico. Dod.

Viola palustris, Lugd.
Sunt qui cum priore idem velint: at illud
folio latiore, hoc vero angustiore multo est.

VI. Millefolium aquat. folijs abrotani, ra-
nunculi flore & capitulo.

Alga prima, Trag.
Alga palustris & fluvialis, Gesn. col.

Millefolium maratryphyllum tertium, flore &
semine ranunculi aquatici Hepaticæ facie,
Lob. ico. Ger.

Fœniculum aquaticum 3. Tab.
Millefolium aquat. flore albo, Clus. hist.

Ranunculus tricophyllum aquaticus mediolu-
teus, vel
Ranunculus aquat. fœniculaceus *τρυφύλλος*,
Colum.

VII. Millefolium aquat. folijs fœniculi ra-
nunculi flore & capitulo.

Myriophyllum maratryphyllum palustre alte-
rum, Lob. ico. ubi flores omittuntur, nec capi-
tula rectè exprimentur.

Fœniculus aquaticus Dalech. Lugdun. figura
imperfecta.

Myriophylli species coliculis fluitantib. Thal.
Peucedanum aquaticum, Tab.

Ne quis hoc cum præcedenti, vel cum Ra-
nunculo, aquatico folio capillaceo, confundat:
nam ab illo folijs longissimis, floribus quadru-
plo majoribus: ab hoc, quod Ranunculo & ro-
tunda & capillacea sint folia: & flos minor.

VIII. Millefol. aquat. pennatum spicatum.
an Alga 3. Trag.

Hoc, quemadmodum & subsequens in Mat-
thiolo & Tab. ac pro 4. & 5. in Prodro mo ad-
dita figura, descripsimus.

IX. Millefol. aquaticum cornutum majus.
X. Millefolium aquaticum cornutum mi-
nus, necdum descriptum.

XI. Millefolium aquat. lenticulatum.
Lentibularia, & Meon aquaticum, Gesn. col.

Millefolium aquat. flore luteo galericulato,
Lob. ico.

Fœniculum aquat. galericulatum, Tab.
XII. Millefolium marinum filicis folio.

Myriophyllum pelagium Cortusij; Clus. hist.
XIII. Stellaria aquatica, Lob. ico.

Fœniculum aquaticum stellatum, Tab.

CONSOLIDA REGALIS, EJVSQVE SPECIES.

Consolidam regalem, Veteres inter flores coronarios reposuere, Hyacinthum nominantes, cuius Diosc.
l. 3. c. 85. in Delphinio altero, quod & Hyacinthum vocetur, meminit. Siquidem Plin. l. 21. c. 11. scribit di-
scurrentes notas inesse, ut Græcarum literarum figura. A. I. inscripta legatur: quod in Consolida regali borrensi
S 3 observa-

observatur, cum in floribus folium sit implicatum, quod in albo characteres habet occultatos, ex virgulis cartuleis duas literas. A. I. aut tres A. I. A. exprimentes. Delphinium duplex est Dioscoridi, cujus altera species Romanus Buccinum dicitur. Quare si apud Dioscoridem, vox *disphymos* ad flores referatur, tum Consolida regalis hortensis disphymos erit: at Consolida regalis segetum, alterum ejusdem Delphinium.

Variat: est major & minor, utraque flore simplici vel pleno: colore cæruleo pallido, cæruleo intenso, puro, puro, incarnato, albo, variegato ex albo & cæruleo.

I. Consolida regalis hort. flore majore & simplici.

Delphinium, Dod. gal.

Delphinium 4. & majus, Gesn. hort.

Consolida regalis, Matth. ico. Ang. Cast.

Consolida regalis fativa, Tab. Ger.

Cuminum sylv. alterum, Matth. in prim. edit.

Lac. Lugd.

Consolida regia five Calcaris flos recentiorum,

Ad. Lob.

Flos regius, Dod.

Delphinium elatius flore cæruleo, Clus. hist.

Consolida regalis flore cæruleo majore, Cam.

Flos qui vulgo in Hetruria Fior capuccio, Cæs.

Flores communiter cærulei elegantiss. aut ex cæruleo purpurei, carnei, vel saturati, vel diluti, nivei vel exalbidi, cineracei, purpurei seu violacei: hinc figuræ quatuor.

1. Delph. elatius fl. incarnato, Bry, Svvert.

2. Consolida regalis simpl. fl. rubro, Eyft.

3. Delphinium elatius purpureo violaceum, Svvert.

4. Delphinium elatius flore albo, Bry.

II. Consolida regalis hort. flore minore.

Calcatrippa, Cord. hist.

Delphinium 2. flore candido, & 3. flore roseo, Gesn. hort.

Consolida regalis flore rubro, Lob. ico.

Consolida regalis fativa, fl. albo: rubro, Tab.

Flos regius flore purpureo, Dod.

Consolida regalis flore incarnato, purpureo albo, Cam.

Delphinium elatius simplici flore, Clus. hist.

Flos cæruleus, cinereus, albus, rubeus, incarnatus.

III. Consol. regal. fl. majore & multiplici.

Delphinium elatius pleno flore, Clus. hist.

Consolida regalis flore pleno, Cam.

Flores cærulei, albi, nullo, aut perexiguo, calcari præditi: hinc

1. Consolida regal. fl. pleno incarnato, Eyft.

2. Consolida regal. fl. pleno purpureo, Eyft.

3. Consol. regal. multiplici fl. argenteo, Eyft.

Delphinium elatius albo flore, Bry, Svvert.

4. Consol. regal. fl. multiplici cineraceo, Eyft.

5. Consolida regal. fl. pleno albo, Eyft.

6. Consolida regal. fl. pleno rubro, Eyft.

7. Consol. regal. multiplici incarnato fl. Eyft.

8. Consol. regal. multiplici violaceo fl. Eyft.

IV. Consolida regalis arvensis.

Consolida regalis, Brunf. Lac. Gesn. hort. Cast.

Consolida regia, Trag. Fuch. Lon. Thal.

Chamæmelum eranthemum, Fuch.

Buccinum & Delphinium alterum, Dod. gal.

Segetum consolida regia strigosior tota, Lob.

Flos regius 2. vel sylv. Dod.

Anthemis eranthemos, five Consolida regalis,

Cuminum sylv. Gesn. hort. (Lugd.

Delphinium sylv. Eid. vulgare, Clus. hist.

Consolida regalis arvensis, Tab. sylvestris, Ger.

Consolida regalis flore cæruleo minore, Cam.

Flore est cæruleo, albo, candicante, rubro &

dilatius rubente, violaceo, & hoc est

Consol. regal. arvensis fl. simpl. violaceo, Eyft.

Consolida regalis fl. variegato.

Delphinium arvense flore versicolore, Clus. ap.

alt. ad l. 6.

Flores quidam tam simplices quam multiplices media parte cærulei: altera parte suaviter rubentes, vel cæruleis punctis notati: sic partim cærulei, partim albi: & in eadem plantata flores varij coloris, ita ut vix bini flores ejusdem coloris conspiciantur: hinc

Delphin. elatius fl. albo cæruleo distincto, Bry.

Delphinium elatius purpureo viol. distincto, Bry.

Delphinium elatius pleno variegatum, Svvert.

V. Consolida regalis vulgaris fl. multiplici.

Delphinium humilior five vulgare pleno flore,

Clus. hist.

Consolida arvensis fl. rubro pleno vel suaviter

bente, Eyft.

VI. Consolida regalis latifolia parvo flore.

Delphinium Dioscoridis, Imperato.

In Phytopinace sub 5. & in Prodromo, in

Matthiolo quoque & Tabernæmontano, figura

adposita descripsimus.

FUM A.

FUMARIA EJUSQUE SPECIES.

Fumaria, *καπνίς* Diosc. l. 4. c. 110. ed quod herba succus oculis inditus, instar fumi oculos molestando, lacrymas moveat. Genera: Diosc. i. flore purpureo, meminit: at Plin. l. 25. c. 13. Capnos duplex est: prima, quae pes gallinaceus vocatur, & altera Capnos fruticosa, illam Fumariam bulbosam, hanc vero Capnon Diosc. censemus.

Fumaria non bulbosa.

I. Fumaria officinarum & Dioscoridis.
Fumus terrae, Brunf. Cam. Thal.
Fumaria, Trag. Matth. Fuch. Cord. in Diosc. Gef.
hor. Dod. Lon. Cæf. Lugd. 1. & 2. flore albo, Tab.
Capnos, Ang. Ad. Lob.
Fumaria major, Cast. ico.
Fumaria purpurea & alba, Ger.
Flos coloris purpurei violacei, pallefcantis,
albi: alia circa Monspelium, folijs tenuissimis
floribus albis reperitur.

II. Fumaria viticulis & capreolis plantis vi-
cinis adherens.

Fumaria phragmites, Dod. gal. Lugd.
Fumaria altera, Cæf.

Flosculi candidi, caeruleo colore aliquando
distincti, circa Monspelium in sepibus ad Fron-
tignanum: at circa Neapolim flosculis subfla-
vis, in summitate nigricantibus.

III. Fumaria minor tenuifolia.

Capnos minor, Ad.
Capnos tenuifolia, Clus. hisp. & hist. Lob.

Fumaria minor, Cast. ico.
Fumariae species Myconi, Lugd.

Fumaria tenuifolia, Tab. Ger. Eyst. fl. niveo.
Fumus terrae seu Fumaria tenuifol. Hisp. Cam.

Fumaria rubra tenuifolia, Eyst.
Variat floris colore, hilari purpura rubet, est &
variegato, ex rub. albo, viridi & luteo: cauliculis
modo surrectis, modo procubentibus. & caducis.

Similem Montis pessuli observavimus, quam
Fumariam nobilem vocant.

Fumaria minor, Ad.
IV. Fumaria minor folio oblongo capillaceo.

Fumaria altera tenerior Syriaca, Cam.
Selterays nomine ex Syria D. Paludan. attulit.

an Capnos Cret. florib. candidis fuscâ maculâ,
V. Fumaria lutea. (Clus. hist.)

Fumaria corydalis, quibusdam Split, Matth.
Fumaria montana, Gef. hor. Tab.

Fumaria phragmitis altera, Eid.
Fumaria lutea montana, Ad. Lob. (cui & Cheli-
donium capnites Aëtij) Lugd. Ger.

Split vulgo, Cæf.
Corydalis, Cast. Cam. (hæc est

Florib. commun. luteis, aliquando candidis, &

Fumaria fl. albis, Ad.

Fumaria Illyrica alba, Tab.

VI. Fumaria claviculis donata.

Capnos Plinij & phragmites, Dod. gal. Gef. hor.
Capnos alba latifolia & Splith album quorun-
dam, Lob. Lugd.

Fumaria altera, Dod.

Capnos altera Belgica albo flore, Clus. hist.

Folij latioribus & angustioribus variat, flo-
ribus est albis & dilute admodum rubentibus.

Fumaria latifolia major & minor, Tab. Ger.

Fumaria Clematites & Clematis minim. Cam.

Fumaria bulbosa.

I. Fumaria bulbosa radice cava major.

Capnium sive Fumaria phragmitis, Aëtio.

Aristolochia rotunda, Brunf. Eric. Cord.

Aristolochia rotunda vulgaris, Trag. Fuch. (cui
& Pistolochia) Gef. hor. Cam.

Hyacinthus 3. candidus & purpureus, Trag.

Fumaria altera, Matth. Cast.

Capnos phragmitis, Tur.

Pistolochia Fuchij, Apios species videtur, Lac.

Aristolochia phragmites, Gef. col.

Capnos chelidonia, Lon.

Capnos sive Capnium phragmites major, & Pes

gallinaceus, Cord. in Diosc.

Chelidonia phragmites altera, Cord. hist.

Radix cava major, Dod. Cast. Clus. hist.

Radix cava herbariorum, Ad. Lob. Clus. pan.

Fumaria bulbosa, Lugd.

Lentopetalum genus quibusd. haud planè ineptè,

Lentopetalon alterum, Cæf.

(Guil.) Chelid. capnites quorundam rad. pertusa, Thal.

Aristolochia vulgaris flos purpureo, Eyst.

Est major & minor: huic folia angustiora, illi

paulo latiora, sed solum loci ratione differunt.

Variat colore floris albo, pallido, subflave-

scente, rubro dilutior, vel egregie rubente:

quod si flos minor sit, saturatius rubet, & pro-

mascula habetur: si major, languidioris colo-

ris. Figuræ 8. apud Tab. & Ger.

Fumariae bulbosae purpureo flore nomine, qua-

tuor: totidem flore albo.

Viridi flore Lobelius observavit, & nomine

Radix cavae viridi flore, in iconib. proposuit.

Radix

Radix cava, Cast.

II. Fumaria bulbosa radice non cava major. Aristolochia rotunda vulg. radice solida, Trag. Arist. rot. altera species radice solida, Gef. hort. Capnos five Capniū phragmites min. Cord. in Chelid. Capnites radice integra, Thal. (Diosc. Aristolochia rotunda fl. albo, Eyst.

A prima diff. radice, quæ in illa cava, in hac solida: dein in illa, folia quæ flores intercedūt, integra sunt, in hac verò incisa: tum in illa flores pauciores & majores colore variâtes: in hac minores, copiosiores, eleganti purpura rubêtes;

alterius coloris hæten. non observavi: tandem, nunquam utramque eodem loco reperimus, illa enim pinguiori solo delectatur.

III. Fumaria bulbosa radice non cava minor. Chelidonia phragmitis 1. Cord. hist. Fabaceâ radice Capnos altera, Ad. Lob. Radix cava minor. Dod. Cast. Clus. hist. Ger. Capnos fabacea radice, Lugd.

Fumaria bulbosa seu tuberosa minor, Tab. Aristol. rotunda vulgaris minima, Cam.

A majore diversa est, & florum herbaceis rudimentis variat.

CHELIDONIUM.

XΕΛΙΔΟΝΙΟΝ Dioscoridi l. 2. c. 211 cui χελιδὼν, id est, hirundo avis, nomen imposuit: vel quod hanc primum invenierit, oculis pullorum excacatorum, visum hæc restituens, ut ex Dioscoride. Plin. l. 25. c. 8. refert: vel ut idem l. 8. c. 27. Chelidonium visui saluberrimum hirundines monstravere, vexatis pullorum oculis eâ medentes: quibusdam sic dictum, quod in hirundinum adventu floreât, & discessu marcescat. Apud Theophr. 7. hist. 1. 4. Hirundinariam Gaza vertit.

Genera duo Diosc. & Plin. l. 25. c. 8. majus & minus, quæ cum figurâ multum differant: de minore alibi agem.

I. Chelidonium majus vulgare.

Chelidonia, Brunf. major, Ang.

Chelidoniū majus, Trag. Matt. Fuch. Tur. Lac.

Cord. hist. Gef. hor. Dod. Ad. (& Hirundinaria major) Lob. Cast. Cæs. Lugd. Tab. Ger.

vulgare, Clus. hist.

II. Chelidonium majus foliis quernis.

Chelid. majus laciniato flore, Clus. hist.

In Phytopinace, Mathiolo, & Tabern. descriptimus.

AQVILEGIA.

Aquilegia, quæ quibusdam Chelidonia sylvestris, videtur dicta quasi Aquilina, ob florum mucrones admodum, ut sunt aquilini ungues Veterum Porphyrius Costæo; Jussone Theophrasti 1. hist. 21. Cæsalpino: Jovis flos, Dalechampio in Athenæum: Isopyrum Dioscoridis l. 4. c. 121. Columne: at Gesnero Leontostemon dicitur. Variat poris. flore: est communiter majore, rarius minore ex corniculis composito, colorum diversorum, rarius roseo est flore eoque, vel simplici vel pleno.

Aquilegia simplex.

I. Aquilegia sylvestris.

Aquilegia, Treg. Fuch. Lugd. Lon. Cæs. (columbina quibusdam) Ger. fl. cæruleo, Svvert.

Aquileia, Fuch. Er. Cord. Gef. h. Dod. syl. Thal.

Aquileia simplex, Cam.

Aquilina, Matth. Ad. Lob. Cast. Tab.

Isopyrum Dioscoridis, Colum.

Flore est cæruleo, & vix alterius quam punice coloris, in sylvestribus reperias.

II. Aquilegia hortensis simplex.

Aquilina rubra, Lob. ico.

Aquilina. Cast. alba, Tab.

Aquileia rubra, Ger.

1. Aquilegia fl. albo simplici, Bry. Eyst.

Aquilegia alba cærulea, Svvert.

2. Aquilegia castanei coloris, Svvert.

Hæc diversorum colorum reperitur, cæruleo, candido, incarnato, rubro, variegato ex cæruleo & purpureo: candido, nonnullis veluti lituris cæruleis aspersis.

III. Aquilegia mont. magno fl. quæ 1. in Prod.

IV. Aquilegia montana parvo flore, Thaliætri folio: quæ 2. in Prod.

Aquilegia pleno flore.

I. Aquilegia hort. multiplex flore magno. Aquileg. multiflora variegata, Lob. ico. & multiplici vario colore flore, Eid. pleno f. re, Cam. Aquileia multiplici flore, Dod. multiplex, Ger. Aquilina pleno flore, Clus. hist. multiplex five 4. 5. 6. 7. & 8. Tab.

Flos cæruleus, violaceus, cinereus, blandè vel saturè rubens, albus, ex albo cæruleo, violaceo variè mixtus, maculatus.

1. Aquil.

1. Aquilegia fl. cæruleo pleno, Eyst.
2. Aquilegia fl. albo pleno, Eyst.
3. Aquilegia fl. pleno incarnato, Eyst.
4. Aquilegia flore purpureo, Eyst.
5. Aquilegia flore rubro, Eyst.
- Aquilina flore rubro, Bry. Svvert.
6. Aquileia variegata, Bry.
- Aquilegia fl. variegata duplici, Svvert.
- II. Aquilegia hort. multiplex flore parvo.
- A prioris floris magnitud. & pullo colore differt.
- III. Aquilegia hort. multiplici flore inverfo.
- Aquilina plenis multiplicib. flor. Lob. ico. Lug.
- Aquilina inverfa multipl. albo colore, Lob. ico.
- Aquilina pleno inverfo flore, Cluf. hist.
- Aquilegia inverfa, Cam.
- Aquilina 9. Tab.
- Aquilina carnei coloris, Bry.
- Aquilegia alba, Svvert.

- Aquilegia cærulea inverfo flore, Eyst.
- IV. Aquilegia flore roseo multiplici.
- Aquilina pleno roseo flore, Cluf. hist. Bry.
- Floris color communiter cæruleus, est & albus, rarissim. carneus five blandè rubens: vel albus nigris punctis aspersis: hinc
1. Aquilegia stellata flore purpureo, Eyst.
 2. Aquilegia stellata rubescens, Eyst.
 3. Aquilegia stellata flore violaceo, Eyst.
 - Aquilegia stellata cæruleo violacea, Svvert.
 4. Aquilegia stellata flore albo minutissimis nigris punctis ornata, Eyst.
- V. Aquilegia degener virescens: & Cam.
- Aquilegia degener virescens. Lob. ico.
- Aquilina degener, Cluf. hist. Bry.
- Aquilina 10. Tab.
- Aquilegia stellata rosea, Svvert. (rascens.)
- Flos vel viridis omnino, vel ex viridis purpu-

NIGELLA SEU MELANTHIUM, ejusque species.

Nigella, à nigro seminis colore communiter dicta, Dioscorid. l. 3. c. 93. *Melancholion* est: de qua Theoph. 7. hist. 9. Plinio l. 20. c. 17. *Githex* Græcis, alij *Melanthion*, alij *Melauspermon* vocant, & quod odoratissimum & nigerrimum, optimum est.

Genera: Dioscorides & Veteres unius meminere: nobis, sativa est & sylvestris: Sativa, simplici & pleno, magno & parvo flore: semine nigro, subflavo, luteo.

- I. Nigella arvensis cornuta.
- an Melanthium & Gith Dioscoridis.
- Nigella sylv. & 2. Trag.
- Melanthium sylv. Fuch. Dod. Ger.
- Cuminum syl. alterum, Fuch. ico. Cord. in Diof.
- Melanthium sylv. alterum, Matth. Cast. Lugd.
- Nigella sylv. altera, Dod.
- Melanthium capitulis reflexis aquilegiæ, Lob.
- Nigella cornuta, Cord. hist.
- Nigella vulgò dicta, Cæs.
- Nigella sylv. Gesn. hort. Lon. Cam.
- Melanthium agreste, Tab. arvense, Cluf. hist.
- Meminit Tab. Melanthij agrest. alterius, quod folis capitulis magis reflexis, à priori differat.
- II. Nigella latifolia flore majore simplici cæruleo: quæ i. in Prod.
- Melanthium Hispanicum majus, Eyst.
- III. Nigella angustifolia flore majore simplici cæruleo.
- Nigella Damascena, Trag. Cord. hist.
- Nigella, Cord. in Diof.
- Nigella hort. altera, Euch. Lon.

- Melanthium five Nigella, Ad.
- Melanthium sylv. Matth. Lac. Lob.
- Melanth. sylv. quod Damascenum cognominatur, Cluf. hist.
- Melanth. sylv. prius Matthioli, Lugd. qui duas figuras habet.
- Melanthium Damascenum, Dod. Tab. Cam.
- Melanthium Damascenum alterum, Fuch. ico.
- Melanthium sativum flore simplici, Eyst.
- Isopyrum, quod Matth. Durantes, Lugd. & Taber. pingunt: nil aliud censemus, nisi quod folia Anisi infernè sint adpicta, quo Dioscoridis Isoporum exprimere videatur.
- IV. Nigella flore majore pleno cæruleo.
- Nigella flore majore & numerosioribus folijs, Suneg. Ægyptijs, Alpino.
- Melanthium Damascenum pleno flore, Cluf. hist. Eyst.
- V. Nigella flore minore simplici candido.
- Nigella hort. Trag. sativa, Lon.
- Melanthium sativum, Matth. Lac. Dod. Cast. Lugd. Tab.

T

Melan-

Melanth. r. Fuch. ico. hortense primum, Eid. fol.
Melanthium sive Nigella Romana odora, Lob.
Git sive Nigella Romana, Tur.
Nigellæ alterum genus, Cord. hist.
Melanth. Ger. sativum simplici flore, Clus. hist.
Nigella, Gef. nostra, Ang. altera, Cæs.
Melanth. Damascenum semine pallido.

Semine est nigro, aliquando pallide flavente: semine luteo in horto habuimus: rarius candido reperitur.

VI. Nigella flore minore pleno & albo.
Cardamomi 3. species, & Nigella citrina, Lac.
Nigella citrina, Ad. flore albo multip. Lob. Lug.
Nigella flore candido, Cæs.
Semen ex Oriente adfertur, inter Cardamomi

genera, & Nigella citrina dicitur, Cæs.
Melanthium citrinum multiflorum, Taber. sub
Damasceno, Ger. ico.
Melanthium pleno flore, Clus. hist.
Melanth. sive Nigella flore pleno, albo, Cam.
Nigella peregrina flore multiplici, Eyst.

VII. Nigella Cretica.

Melanthium simplici flore, Creticum, Clus. hist.
Hujus descriptionem in Phytopinace sub 6.
in Prod. sub. 2. & in Matthiolo cum figura exhibuimus: in Tabern. nostro figura sub titulo Nigellæ flore pleno, malè posita fuit.

VIII. Nigella Cretica folio fœniculi.
Melanthium peregrinum sive Creticum, Pona
in Baldo Ital.

SECTIO QUARTA. UMBELLIFERÆ.

CUMINUM; FOENICULUM; ANETHUM; MEUM; PYRE-
THRUM; FERULA; THAPSIÀ; TURPETUM; PEUCEDANUM;
Daucus; Pastinaca tenuifolia; Gingidium; Chærophyllum; Scandix;
Caucalis; Apium; Sison; Sion.

CUMINUM.

K *Κύμινον* Dioscoridi l. 3. c. 68. Theophr. 7. hist. 4. at Plinio l. 19. c. 8. & l. 20. c. 14. & 15. Cuminum.

Genera: Dioscoridi sativum est, cui Aethiopicum, quod Hippocrates regium vocavit, præfert: secundum locum tenet Aegyptium, reliqua sequuntur. Est & sylvestre: alterum, capitulis in cacumine rotundis: alterum, quod à singulis floribus, cornicula in sublime erecta promit. Theophrasto genera plura sunt: quare Plinio l. 20. c. 15. Sativum est & sylvestre, Aethiopicum & Africanum: at l. 19. c. 8. alterum sylvestre rusticum vocatum, alijs Thebaicum: Aethiopicum, Africanum, palma est: quidam huic Aegyptium præferunt.

I. Cuminum semine longiore.

Cuminum sativum, Brunsf. Trag. Matth. Lac.
Cord. hist. Lob. Cast. Lugd.
Caminum, Tur. Lon. Ad.

Cumin. Officin. Cumini syl. i. genus Diosc. Cæs.
Cyminum, Ang. Cord. in Diosc. (cui & Cyminum Romanum) Tab. sativum, Cam.

Cuminum Aethiopicum, Carnabadium Calsi
Balsi & Myrepsij, Guil.

II. Cuminum semine rotundiore & minore.
Cuminum dulce Melitenisibus.

Hujus plantam non vidimus: at cum Dalecham-
pij in Plin. l. 20. c. 15. notus legissemus, ex Melita
duplex Cuminum, ut pore acre & dulce adferri:
& apud Megiserum in Melitæ descriptione, idem
invenissemus, ejus nomine ut haberemus labo-

ravimus: quare, utriusque semen è Melita in insula
transmissum fuit: alterum oblongum, acuminatum,
coloris sordidi, graveolens & sapore acris,
cui Cimonagero, i.e. Cuminum syl. inscriptum
erat: quod cum Cymino Aethiopico officinarum
convenit. Alterum verò multò minus, Aniso simile,
candicans, gustus lenioris & subdulce, quod
nomine Cimonagero dulce, missum. Apud Meliten-
ses copiosè feritur, ad panem condiendum
& ad mercaturam cum eo exercendam.

III. Cuminum sylv. capitulis globosis.

Cuminum sylv. i. Matth. Lugd. Cast.
Cuminum sylv. Ang. Dod. Ad. Lob. ico. Ger.
Lago chymeni, id est, lepore cubile in insula
Lemno, Bellon.

Cym. syl. five erraticum, Tab. syl. globos. Cam.

FOENI-

M Agathos Dioscoridi, l. 3. c. 81. ἀπὸ τῆς ἀρετῆς αὐτοῦ, à marcescendo, quod ejus cum inaruerit, ad condienda plurima, multus usus sit. Plinio, l. 19. c. 9. Feniculum anguibus gratissimum, ad condienda plurima cum inaruit: & l. 20. c. 23. Feniculum nobilitare serpentes, gustatu senectam exuendo, oculorumq; aciem succo ejus resciendo. Latinis Feniculum, quod satum magno cum fanore semen reddat: vel potius Græcorum imitatione, quod quasi senum in hyemes arefactum ac marcidum reponatur.

Genera: Dioscoridi est sativum, sylvestre, quod in τὸν αἰθέρα & duplex est: alterum semine magno, Cathrisimile: aliud semine Coriandri. Idem Plinius, l. 20. c. 23.

Recentioribus est vulgare sive sativum, dulce, rotundum, & erraticum, sive Hippomarathrum.

I. Feniculum vulgare Germanicum.

Fenicul. Brunf. Trag. Fuch. Dod. gal. Tur. Cord. in Diosc. Tab. commune. Gef. hor. vulgare, Ger.

Fenicul. syl. cujus semen exilius & acrius, Cæs.

Feniculum nostrum vulgare, quibusdam Hippomarathrum putatum, Cam. hort.

Huic accedit Mediolanense, quamvis vulgato Germanico gratius sit.

Variat foliorum colore: nam commune folijs est virentioribus, altera subnigricantibus, rubentibus, aliàs non differens: quare

Feniculum 1. & 2. facit Dodonæus.

II. Feniculum vulgare Italicum semine oblongo gustu acuto.

Fenicul. Matth. Lac. Cast. vulgare, cujus semen pallidum sive luteum oblongum, Lugd.

Feniculum acre, Ang.

III. Feniculum dulce.

Feniculum dulce, Matth. Lac. Ang. Gefn. hort. Ad. Cast. Ger. desc.

Fenic. 3. Dod. solo sapore à primo distinctum.

Fenicul. sive Marath. vulgatius dulce, Ad. Lob.

Fenicul. hort. semine crasso in rotunditate oblongo, Cæs. quod anno secundo in sylv. transit.

Fenicul. dulce semine majore, gustu anisi, Lugd.

Feniculum Romanum cujus semen pallide luteum, Tab. quod tertio anno in comunet transit.

Feniculum Italicum fortè hort. veterum, quod etiam in nostrum transit. Cam. ep. Matth.

Feniculum majus, Eid. hort.

Hoc semine est vel rotundiore, quod Romanum & Florentinum dicitur: vel in rotunditate oblongo, quod omnium gratissimum & dulcissimum, & Bononia adfertur.

IV. Feniculum semine rotundo minore.

Feniculum rotundum, Tab. vulgare, Ger. ico.

A vulgato sapore & odore non differt, sed humilior est, umbella candida, semenque vulgari minus & Carui forma.

V. Feniculum sylvestre.

Feniculum erraticum, Matth. Lac. sponte virens in agris Narbonensium, Adv.

an Hippomarathrum, Ang.

VI. Hippomar. Creticum: de quo in Prod.

an Hippomarathrum cujus semina magna cathrysimilia, Hon. Belli ep. x. ad Cluf.

VII. Chaa, herba in Japonia, ex cujus pulvere decoctum preciosum parant, & hospitibus dignioribus propinant: & olla in qua hujus herbae decoctio facta, in eo apud ipsos precio, in quo apud nos Adamantes sunt: Lincor. par. 2. Ind. Orient. cap. 28.

A N E T H U M.

A Nycter Dioscoridi, l. 3. c. 67. ἀπὸ τῆς ἀρετῆς αὐτοῦ, quod cito crescat: Theoph. 1. hist. 18. cui 7. hist. 4. plura ejus genera, qua non recenset. Plinio l. 20. c. 18. Anethum.

I. Anethum hortense.

Anethum, Brunf. Trag. Matthiol. Fuch. Tur. Cord. in Dioscoridi. Gefn. hort. Ang.

Lac. Ad. Lob. Cast. Lon. Cæsalp. Lugd. Tab. Cam. Ger.

Abinthium dulce, Punde. Monach. in Mef. Toxites.

II. Anethum sylvestre majus.

Aneth. syl. grandius sativo, folijs feniculi Cæs.

III. Anethum sylv. minus: in Prod. desc.

M E U M.

M ἢ ἐν ἀθλαμάντιν ἢ αἰθῶν, Meum Athamant. Diosc. l. 1. c. 3. Similiter à Plinio, l. 20. c. 23. nominatum, Mef. scribit, in Italia non nisi à Medicis feritur, & ijs admodum paucis. Duo genera ejus (Macedonicum scilicet & Hispan. non quidem ea duo diversa genera sunt: ceterum ijs in locis plurimum gignitur: hec

T 2

addit

addit ex Dioscoride Dalechampsius in notis) nobilius, Arhamanticum vocant, illi, tanquam ab Athamante inventum; hi, quoniam laudatissimum in Athamante (monte Phthiotidis Thessaliae) reperiatur.

- I. Meum folijs anethi.
Daucus Creticus, Trag. Fuch. vel alpinus, Gesf. col. Lob. ico.
Meum, Matth. Ang. Gesf. hort. Lac. (cui & Anethum sylv.) Dod. Ad. Lob. Cast. Cæsalp. Lugd. Tab. Cam. Ger.
Libanotidis 1. genus, & Foeniculus porcinus, Dod. gal.
Seseli Creticum, Fuch. ico. Lon.
Tordylion, Cord. in Diosc. & hist.
Daucus, Cast. ico.
- II. Meum Dauci Cretici facie.
Meum aliud, Lugd.
III. Meum alpinum umbella purpurascens. Muttellina vulgo in alpinis, Caros vel Daucus alpin. videtur, Gesf. hor. & frac. Cam. ep. Matth. an Daucus montanus, Clus. pan. & hist.
IV. Meum latifolium adulterinum.
Meum secundum, Matth. ed. secunda.
Meum spurium alterum Italicum, Lob. Lugd.
Meum adulterinum, Tab.

PYRETHRUM.

Pyrethrum Diosc. l. 3. c. 86. ab igne nomen habet, ob radicis ejus fervorem igneum. Salivaris Romanis, quod mansa Salivam eliciat. Apud Plin. l. 28. c. 9. Pyrethri nomen solum habetur.

- I. Pyrethrum flore bellidis.
Pyrethrum, Brunf. Trag. Fuch. Tur. Dod. Lac.
Pyrethrum Germanicum, Gesf. hort.
Pyreth. alter. Matth. Lugd. Cæf. Cam. primum.
Pyrethrum majus, Lon. verum, Cast. (Tab.
Pyrethrum Officinarum, Ad. Lob. Ger. Eyf.
- II. Pyrethrum umbelliferum.
Foeniculum montanum, Trag.
Pyrethrum verum, Matth. Lugd.
- Pyrethrum Italicum, Gesf. hort. ap.
Pyreth. alterum, Ad. Lob. Cast. Tab. sylv. Ger.
an Pyrethrum, Cæf.
Saxifragæ species, Dod. 8.
Pyrethrum Dioscoridis 1. Cam.
Umbella variat, quæ alba: at Patavino in horto lutea, longioribusque folijs, collegimus.
III. Pyrethrum folijs anethi.
Pyrethrum Gesneri, Lugd.

FERULA.

Narbecæ Diosc. l. 3. c. 91. νάρβεκα ἢ νάρβανος, Theoph. 6. hist. 2. id est, Gazæ interprete, Ferula & Ferulago. Plin. lib. 13. cap. 22. Ferula.

Genera duo Ferula Plinio: Narbeca Græci vocant, in altitudinem assurgentem. Narbeciam vero semper humilem: & Ferula sine dubio est Thapsia, sed sui generis &c. Et l. 20. c. 23. Ferula, quæ ab uno caule dividitur in cacumine, fœmina putatur.

- I. Ferula fœmina Plinij.
Ferula, Matth. Ang. Tur. Lac. Cord. in Diosc.
Gesf. hort. Lon. Ad. Lob. Dod. Cast. Lugd. Tab.
Ferula mas, Cæf. (Cam.
Libanotis prima Diosc. ferulacea, Gesf. hort.
- II. Ferulago latiore folio.
Ferulago, Gesf. Dod. Cam.
- Ferula galbanifera, Lob. Lugd. Tab.
Ferula fœmina, Cæf.
Quibusdam Narthecia Theoph. & Thapsia Dioscoridis.
III. Ferulago tenuiore folio.
Narthecium Theoph. Ferulago Gazæ, Lugd.
Ferulago, Tab.

THAPSIA.

Thapsia, quod in Thapso, ejus nominis Insula primum inventa, Diosc. lib. 4. cap. 157. quæ tota natura Ferula similis: meminere Thapsia Theoph. 9. hist. 8. & Plin. l. 13. c. 22.

- I. Thapsia maxima latissimo folio.
Thapsia 3. Clus. hisp. & hist.
- II. Thapsia latifolia villosa.
Thapsia latifolia, Clus. hisp. Tab.
Thapsia 1. Clus. hist.
Seseli Peloponense majus, Lob. peloponense ut putatur, Dod.
- Seseli peloponense 1. Tab.
Seseli peloponense folio cicutæ, Ad. Lugd.
III. Thapsia folijs libanotidis foetidissima.
Tuero, Clus. hisp.
Thapsia 4. Clus. hist.
IV. Thapsia fœniculi folio.
Thapsia Diosc. Ad. Lob. Lugd.

Thapsia

Thapsia 2. vel tenuifolia, Clus. hisp. & hist.
Thapsia angustifolia, Tab. tenuifolia, Ger.

V. Thapsia carotæ folio.

Thapsia, Matth. Ang. Lon. Lug. Cast. Cæs. cui &
Turbit album Mesuei.

Thapsia major, Cord. hist.

Thapsia vera & Turbith montis Gargani, Gef.
hort.

Thapsia vulgaris carotæ effigie, Ad. Lob.

An hæc Ferula Sagapenifera.

Huj. radix sæpè pro Costo, magno errore ven-
ditur, uti supra inter Costi genera ostensum fuit.

TURPETVM.

Turbith vox Arabica est, ab Avicenna & alijs usurpata, quàmvis aliqui à turbando deducant, quòd pro-
pter magnam violentiam, purgando corpus turbet. Duplex est, aliud Arabicum, aliud Indicum. Ara-
bicum, Mesueo 2. simplex est radix herbae, folia Ferulae minora ferentis & lacteo succo turgentis: qua sanè causa,
cur alij Pityusæ, alij Alypi, nonnulli Tripolij Græcorum radicem esse voluerint: cujus genera varia Mesueo,
domesticum, sylvestre, magnum, parvum, album, nigrum & flavum. Indicum, radice non est magna, nec
longa, caule hederæ modo per solum extenso, digiti crassitudine: folijs & floribus Altheæ similibus, cujus tan-
tum caulis pars inferior juxta radicem gummosa, utilis est, Acoftæ, Frag. Dodoneo ex Garzia monentibus.
Quare hoc ab eo, quo in Officinis vulgo utuntur, longe aliud est, monente etiam Clusio in Garziam. Idcirco
inter se differre volunt, Turbith Avicenna, & Turbedh aut Tarbadh.

I. Turpetum Arabum, seu Turbit Officin.

Turbit Mesuæi, Matth.

Turbitum sive Turbit Arabum, Cord. hist.

Turbith Alexandrinum, Ad. Lob. ico. Ger. Cast.

Tripolium Diosc. si Serapioni credimus, nil
aliud est quam Turbith, Cord. in Diosc.

Turpetum Mesues, rithymalli myrsinitis ra-
dix, Bras. at Fuch. Thapsiæ radix.

Turbith. Off. & Hispaniæ officinæ, Thapsiæ ra-
dice pro Turpeto legitimo utuntur, & multis

per Europam locis, Scammoneæ radicem con-
cisam pro Turpeto legitimo ostendunt, Clus. in

Turpetum, Tab. (Garz. etarijs, & secundum aliquos Thapsia, Acoftæ.

Addit Fragosus Turbit aliud genus, à paucis
annis in Officinis usitatum, quo vocitent de la
Tierra, quod quarundam arundinum radicem
esse dicant.

II. Turpetum repens folijs Altheæ, vel Ind.
Turbith Garziæ, Acoftæ, Trag. Dod.

III. Pseudoturpetum Garganicum.

Turpetum, quod potius Pseudoturpetum di-
xeris, ex Gargano Apuliæ monte duplex, u-
num de Thapsiæ, alterum de Pityusæ radici-
bus, impostores concinnant, Garz.

Turbith ex Apulia, turbith non est, sed ex la-
etarijs, & secundum aliquos Thapsia, Acoftæ.

PEUCEDANVM.

Peucoledon & Dioscorid. l. 3. c. 92. Theoph. 9. hist. 14. et si sint qui velint, nomen ab amaritudine sortitum esse,
tamen à πένυ, quæ Lat. Pinus, dictum videtur, cum hujus folia cum Pini folijs similitudinem quandam
habeant: unde & Pinastellum aliquibus nominatur. Peucedanum Plin. lib. 25. c. 9.

I. Peucedanum majus Italicum.

Peucedanum, Matth. Ang. Lac. Lugd. Cæs. Cast.

Peucedanum Italicum, Tab.

Peucedanum majus Italicum, Lobel. Lugd.

majus, Ger.

Peucedanum folijs longioribus, Dod.

II. Peucedanum Germanicum.

Peucedanum, Trag. Fuch. Dod. Cord. in Diosc.

& hist. Gefn. hort. Tur. Ad. Lob. (cui & Fœni-
culum porcinum) Lon. desc. Lugd. Ger. Tab.
cui & cauda porcina.

III. Peucedanum minus.

Saxifraga 3. Matth. Lugd. Cast.

Saxifragum, Lac.

Peucedani facie pusilla planta, Lob. ico.

Peucedanum Pannonicum, Clus. pan. & hist.

DAUCVS.

Δaucus & Diosc. lib. 3. cap. 83. Daucus, Daucum, & Daucium Latinis.

Genera tria Diosc. primum Creticum folijs fœniculi: alterum apio sylvestri simile: tertium folijs Co-
riandri. Diocles verò, l. 3. de salub. quartum addidit nempe Staphylinum. Plin. l. 25. c. 9. ait. Dauci genera qua-
tuor, Petronius Diodorus fecit, cum sint differentiæ duæ: probatissimum in Cretæ fœniculi similitudine: alterum
T 3 folijs

folijs Coriandri: si tertium genus facere libeat, est simile Staphylino, quod Pastinacam erraticam appellant. Idem, lib. 19. cap. 5. Pastinaca quartum genus, quam nostri Gallicam vocant, Græci verò Daucon, cuius genera etiam quatuor fecere. De Dauco Theophrasti capite sequenti.

I. Daucus folijs foeniculi tenuissimis.

Daucus 1. Matth. Lugd.

Daucus, Lac.

Daucus Cretensis verus Diosc. Ad. Lob. ico. Ger.

Daucus Creticus, Cast. desc. Gesn. Tab.

II. Daucus alpinus multifido longoque folio, sive montanus umbella candida.

Daucus Creticus, Gesn. hort. Cam. ep. Matth.

& hort. Clus. pan.

Daucum montanum, Cæs.

Variat aliquantum: nam qui in Baldo, folijs est brevioribus compactioribus: qui verò in Helvetiorum alpib. & monte Basserfall/ longioribus & rarioribus: & hujus Gesn. in ap. meminit, quem cum eo in Baldo eundem, aut certe similem, & earundem virium scribit.

III. Daucus mont. multifido breviq; folio. Saxifraga Pannonica, Clus. pan. & hist.

IV. Daucus montan. multifido folio Selini femine.

Selinum mont. pumilum, Clus. pan. & hist.

Oreoselinum, Tab. ico. Ger. tertium, Tab. fol.

V. Daucus mont. apij folio major.

Daucus 2. Trag. (cui & Sefeli 2.) Matth. Lugd.

Dauci 3. genus, Fuch.

Libanotidis alterum genus, Dod. gal. Lugd.

Libanotis nigra Dodonæi, Gesn. hort.

Sefeli peloponense, Fuch. ico. Gesn. hort. Cam.

Elaphoboscum nigrum, Lon.

Saxifraga Venerorum, Ad.

Daucus Selinoides 2. Ad. Lob.

Sefeli pannonicum 2. Clus. pan. ico. 2. montanum, Eid. hist. ico.

Libanotis nigra, communiter Cervaria nigra, Thal.

Libanotis Theoph. nigra, Tab. Ger. 1

Varietas: 1. est folijs pallide virentibus & splendentibus. 2. folijs latioribus, forte ob culturam, quam Pseudo-costum Cortusius nominabat. 3. folijs minus divisib. supina parte dilutius virentibus & aliquantulum splendentib. prona subcinereis, quam Cervariæ nigræ nomine, Lipsiâ D. Jungermannus misit.

VI. Daucus mont. apij folio minor.

Apium mont. & Oreoselinum nigrum, Gesn. hort.

Dauci secundi Selinoidis varietas, sive Selinoides Cordi, Lob. obs.

an Daucus Selinoides latifolius, Cord.

an Apium sylvaticum, Thal.

VII. Daucus mont. apij folio albicans.

Seli 2. mont. pannonicum, Clus. hist. desc.

Sefeli peloponensis Jenensium nomine, D. Jungermannus misit.

VIII. Daucus mont. apij folio flore luteo: qui 1. in Prodomo.

IX. Daucus prat. apij folio: qui 2. in Prod.

X. Daucus campestris apij folio.

Dauci 2. genus Dalechampi, Lugd.

An fortè Pimpinella Saxifraga.

XI. Daucus petroselinii vel coriandri folio. Bunium Dalechampi, Lugd.

XII. Daucus Cret. nodosus umbella lutea.

Daucus 3. Cret. Belli, Ponæ & ep. 1. ad Clus.

XIII. Daucus pratensis millefolij palustris folio.

Daucus prat. Dalechampi, Lugd.

Hic folijs & umbellâ, quæ tamen alba est, cum Millefolio aquatico Matthioli convenit, folijs tamen inferioribus, Coriandro similibus, exceptis.

PASTINACA.

Σταφυλίνος Diosc. l. 3. c. 59. fortè à colore uvæ nigricantis, cuius coloris, unius radix est: qui sylvestris, in cuius umbellâ candida medio, exiguum quid coloris purpurei, cernitur: & etiam sativi meminit. Δακύνος Theophrasto (Pastinacam Gaza vocat) 9. hist. 15. cui Daucus specie Lauri colore croci apud Archades nascitur: & in Patrensi agro præstantior ceteris: huic vis calefactoria est, radix nigra: & c. 22. Daucum agro Spartensi Achaje laudatissimam referunt: naturâ calefactoriam, radice nigram.

Pastinaca (quæ à pascendo dicta videtur, cum corpus alat) nomine, Latinis quatuor plantas significari, Plin. l. 19. c. 5. ostendit: Pastinacæ, inquit, unum genus agreste, spontè provenit. Staphylinus Græcè dicitur: alterum feritur radice, vel semine: est & quartum genus in eadem similitudine Pastinacæ, quam nostri Gallicam vocant, Græci verò Daucon: at l. 29. c. 5. Staphylinus, pastinacam erraticam appellant.

Duplex

Duplex est *Pastinaca*, tenuifolia & latifolia: de tenuifolia tam sativa, quam sylvestri nunc: de latifolia, sectione quinta.

- I. *Pastinaca* tenuifolia syl. Dioscoridis, vel
Daucus Officinarum.
Daucus agrestis, Gal. de alim.
Pastinaca erratica, Plinio, Fuch. Cord. in Dio-
 scorid. Tab.
Staphylinus sylv. Trag. Dod. gal. Cæs.
Pastinaca sylv. Matth. Lac. Lon. Cast. Lugd. syl.
 tenuifolia, Dod. Ger.
Daucum Officin. usitarius, Ad.
Pastinaca sylv. genuina Diosc. Lob.
Pastinaca 2. Tur. 4. Plinij, Cam.
Dauci 3. genus, Dod. gal. Thal.
Daucus vulgaris, Clus. hist.
 Differt magnitudine & parvitate: sic & ratio-
 ne umbellæ, in cujus medio aliquando macula
 purpurea, subnigræ, aliquando crocea: folijs
 etiam, aliquantum latoribus, in altera multo
 tenuioribus: quare Thalius illam, *Daucum* 3.
 Dodonæi, hanc verò *Daucum* 3. tenuifolium
 nominat.
 II. *Pastinaca* tenuifolia syl. umbella majore.
Pastinaca sylv. daucoides Apula, Col.
 Umbellæ est majore, obscure purpurascens,
 quæ non in totum, ut in priore, conglobatur.
 III. *Pastinaca* sylv. hirsuta echinato fructu.
 an *Daucus* angulosus, Cordi hist.
Daucus *laetion* id est, hirsuto caule, Thal.
 IV. *Pastinaca* syl. angustifol. fructu echinato.
Pastinaca echinophora Apula, Colum.
 Hanc ad D. Columna accepimus.
 V. *Pastin.* tenuif. sativa radice lutea, vel alba,
Staphylin. sativus & *Daucus* domesticus, Gal.

Staphylinus 1. & 2. Trag. luteus, Dod. gal.
 Sifer, Lac. alterum, Matth. Tab.
 Carota crocea malè Sifer, Guil.
Pastinaca sativa 1. Fuch. sativa flava, Lon.
Pastinaca sativa 1. & 2. Tab.
Pastinaca radicibus luteis, vel albis, Ges. hor.
Pastinaca sativa Diosc. Lob. Cord. in Diosc.
Pastinaca tenuifolia sativa, Dod. Ger.
 Carota vulgaris radice flava, Ad.
 Carota radice buxæ coloris, Cæs. ex albo fla-
 vescens, Cast. nostra lutea, Cam.
Pastinaca 3. *Daucus* *Staphylinus* altis & hor-
 tensis, vulgo Carotta, Cam. hor.
 Variat solum radicis colore, quæ vel alba, vel
 pallide lutea, vel lutea est.
 VI. *Pastinaca* tenuifolia sativa, radice atro-
 rubente.
Staphylinus sativus Dioscoridi.
Daucus radice nigra, Theophrasti.
Pastinaca sativa, Plinij.
Staphylinus 3. Trag. niger, Dod. gal.
 Carota, Matth. altera, Lugd. radice sanguinei
 coloris, Cæs. radice rubra, Cast.
Pastinaca sativa altera, Fuch. prima, Tur. sativa
 rubens, Dod. Tab. atrorubens, Lob.
Daucus niger Theoph. Carota vulgaris, Ad.
Pastinaca radicibus purpureis, Ges. hor.
 Been rubrum & album, an *Daucus* sativus &
 sylv. Galeni, Ang.
 Carota Italæ radice rubra & alba, Been rubri &
 albi *αντιβαλινουρα* esse volunt aliqui, non malè,
 Camer.

GINGIDIUM

Γυγιδιον Dioscorides lib. 2. cap. 167. herbam sylvestri *Staphylino* similem dicit: & Plin. lib. 20. cap. 5.
Gingidium similitum *Staphylino*.

- I. *Gingidium* folio fœniculi.
Gingidium Dioscoridis, Rayv. Lugd. ap.
Gingidium Syriacum, Cam.
 II. *Gingidium* umbella oblonga.
 Sefeli, Trag. ico.
 Vifnaga, Matth. Ad. Lob. Lugd. Cast. & *Pastin.*
 sylv. major.
Gingidium, Ang. Cord. in Diosc. & hist. Dod.
 gal. Clus. hist. cui & *Bifnaga*.
 Sefeli Mafsiliense, Fuch. Dod. gal. ico.

Dauci genus tertium, Fuch. ico.
 Cumini sativi alterum genus, Cæs.
Gingidium alterum, Dod. tertium, Tab.
Gingidium Hispanicum, Ger.
 III. *Gingidium* folijs Chærefolij.
Gingidium, Matth. Lugd. Cast. primum, Tab.
 IV. *Gingidium* folijs *Pastinacæ* latifoliæ.
Gingidium folijs *Bauciæ* Syriacum, Lob. Lugd.
Gingidium primum, Dod. secundum, Tab. (&
 latifolium) Ger.

CHÆRO-

CHÆROPHYLLUM.

Cherophyllum Columella habet: an Plinij l. 19. c. 8. sit Cerephyllum, quod Paderota Græci vocient, propter brevitatem asserere non licet: & potius ejusdem Anthriscus, lib. 6. cap. 22. sortè Theophr. 7. hist. 7. c. 4. Enthusium Gaza vertit. O'geodivov Dioscoridis quibusdam videtur.

I. Chærophyllum sativum.

Cherofolium, Brunf. Dod. sativum, Trag.

Cerefolium, Matth. Cast. Lugd. vulgare, Ger.

Cerefolium, Ang. Dod. gal. Gef. hort. Lon. Ad.

Lob. (cui Gingidij species) Cæf. Cam. Tab.

Oreoselinum, Ang. & Cæf. putant.

Gingidium, Fuch. Tur. Lac.

II. Chærophyllum sylvestre.]

Dauci sylv. genus, Gef. ap.

Daucus sepiarius, Gef. col.

Anthriscus Plinij, Lugd.

Cerefolium sylv. Tab. Apium sylv. Ger. ico.

III. Cærophylo nonnihil similis.

Perchepier (i.e. Saxifraga) Anglorum, Ad. Lob.

Scandix minor, Tab.

Alchimilla montana minima, Col.

SCANDIX.

Scandix Dioscoridi lib. 2. cap. 168. sylvestre olus est, quod Gingidio subjungit: Theophrast. 7. hist. 8. Plinio lib. 6. cap. 22.

I. Scandix umbella ex apicibus coagmentata.

Scandix, Lugd.

II. Scandix semine rostrato vulgaris.

Pecten Veneris, Matth. Ang. Gef. hor. Ad. Lob.

Cast. Lugd. Cam. Ger.

Scand. Dod. Lac. Cord. in Diof. Gef. h. Cæf. Tab.

Pecten Veneris, & ygonovisina vulgo dicitur, Hon.

Belli ep. 1. ad Cluf.

III. Scandix Cretica major: quæ 4. in Phytopin. prima in Prod.

IV. Scandix Cretica minor: quæ 3. & 5. in

Phytopin. at. 2. in Prod.

Anthriscus Plinij, Cluf. hist.

Anthriscus vulgo & ygonovisina, quod vulvæ pur-

gamentum significat, cum Venerem excites,

Hon. Belli ep. 1. ad Cluf.

an Scandix legitima quæ hæc & ygonovisina quæ

comeditur, Eid. l. 1.

Anisomarathrum Apulum, Colum. & Cluf. hi-

stor. ap. alt.

an Apium sylv. Dalech. Lugd.

Duplex est odora & inodora.

CAUCALIS.

Kaucalis apud Dioscorid. lib. 2. c. 169. Scandicem sequitur, quam aliqui Daucum sylv. nominant. Plinio lib. 21. c. 15. secutus Dioscoridem, inter Olera recensuit.

I. Caulis maxima Sphondilij aculeato femine.

Caucalis major, Cluf. hist.

II. Caulis lato apij folio.

Caucalis, Matth. Lac. Cast. Lugd.

an Caulis, Cord. in Diof.

Daucoides majus, Cord. hist. Thal.

Caucalis vulgatiore, Ad.

Caucalis flore rubro folio latiore, Lob.

Caucalis rubello flore, Cluf. hist.

Gingidium, Cæf.

III. Caulis arvensis echinata latifolia.

Echinophora major platyphyllos purpurea,

Colum.

an Caulis saturè rubente flore, Cluf. hist.

IV. Caulis arvensis echinata magno flore.

Lappa agrestis, Trag.

Lappula canaria Plinij, Ang.

Caucal. Dod. (& Daucus sylv.) Gef. hor. Tab. Ey.

Caucalis alia vulgaris, Lugd.

Caucalis albis flor. vulgaris, Lob. Ger. albo flo-

re proximè ad Dioscoridis accedens, Cluf. hist.

Caucalis coronata umbella, Cam.

Tribulus sylv. & Lappa campestris, Lon.

Myrrhis lappa Dalechampi, Lugd.

Dauci genus arvense, Gef. cat.

Daucus & ygonovisina seu & ygonovisina, sive & ygonovisina

naxp & minor, Thal.

Echinophora & ygonovisina, an Gingidium Dio-

scor. Col.

V. Caulis arvensis echinata parvo flore

& fructu.

Caucalis flore minuto, Cam.

an Echinophora 3. leptophyllon purpurea, Col.

VI. Cau-

VI. *Caucalis Monspelica echinato* ma-

gnofructu.

Lappa boaria Plinij, Lugd.

Caucalis secunda, Tab.

Daucus ἐχινάκη, aut *καυκάκη* major, Thal.

Echinophora alt. asperior *καυκάκη*, Col.

VII. *Caucalis semine aspero flosculis ru-*

bentibus.

Daucoides minor, Cord. hist. Thal.

VIII. *Caucalis nodoso echinato semine:*

quod. 7. in *Phytopin. at. i.* in Prod. & in Matth.

nostro depictum.

Scandix, Colum.

IX. *Caucalis peregrina semine rugoso.*

Caucalis Hispanica, Cam. Clus. hist.

Gingidio congener, Cæf.

X. *Caucalis tenuifolia montana: quæ 2. in*

Prodr.

XI. *Caucalis pumila maritima.*

Caucalis pumila, Clus. cur. post.

XII. *Caucalis folio peucedani.*

Caucalis Anguil. Ad. Lob. tertia, Tab.

Caucalis Anglica, Eid.

Caucalis Penæ, Lugd.

A P I U M.

Σελινον Dioscorides l. 3. cap. 74. & seq. proposuit; hortenfe, *ἐλασέλιον*, in humidis: *ἀγροέλιον* in montosis: *πετροέλιον* in Macedonia: *ταπιδέλιον* tandem *αυθόνιον* in Cilicia proveniens. Theoph. i. hist. 4. de Selino egit, cujus plura esse genera 6. cauf. 22. scribit: hæc 7. hist. 4. inter se cum folijs, cum caulibus differunt: aliud enim folio spisso, crispo, densog: aliud rariore, latioreq; cauleq; majore: horum iterum aliud candidi caulis, aliud purpurei, aut versicoloris. Plinius lib. 20. cap. 11, de Apio, Hippofelino, Eleofelino, & Oreofelino: & cap. seq. de petrofelino & bufelino egit.

I. *Apium hortenfe*, seu *Petrofelinum* vulgo.

Selinon seu *Apium*, Theoph. & Diosc. *Apium*

mas, Plinij.

Petrofelinum, Brunf. Trag. Cord. in Dioscor.

Anguil.

Petrofelinum vulgare seu *fativum*, Lon.

Petrofelinum sylv. Fuch. ico. vulgo *Apium* ve-

terum, Gef. hort.

Oreofelinum, Fuch.

Apium hortenfe, Matth. Lac. Dod. Ad. Lobel.

Castor. Ger.

Apium commune, non rectè *Petrofelinum*, Gef.

Petrofelinum vulgi, *petrofelinum* verum pri-

scorum, Guil.

Apium domesticum, Cæf. *fativum*, Tab.

Apium fativum vulgare seu *Petrofelinum*, Col.

II. *Apium vel Petrofelinum crispum.*

Petrofelinum crispum, Cam.

Apium hortenfe crispum, Ad. Lugd.

Apium crispum vel multifolium, Tab. Ger.

Apium fativum Sardum, Col.

III. *Petrofelinum Creticum.*

Agriopastinaca vulgo in Cræta, Belli ep. s.

Duplex est, colore corticis radicum tantum

differens: nam unius rufus, alterius niger con-

spicitur.

Bufelinon fortè Plinij l. 20. c. 12.

IV. *Apium hortenfe latifolium.*

an *Apium* verum, Ang.

an *Apium fativum Anglicanum*, Col.

Hoc in *Phytopinace*, Matth. & Prodr. de-

scripsimus.

V. *Apium montanum folio tenuiore.*

Petrofelinum Dalechampij, Lugd.

an *Petrofelini succedaneum*, quod in Apulia

Anethum sylv. dicitur, Col.

VI. *Apium montanum folio ampliore.*

Oreofelinum five *Veelgutta*, id est, multibona,

Dodon.

Oreofelinum, Ad. Lobel. (five *Petrofelinum*)

Clus. hist. Ger.

Oreofelinum primum, Tab.

Apium montanum, Cast. Lugd.

Variat ratione loci, nam folijs tenuius divisus,

in nostris pratis udus Michelfeldæ reperitur.

VII. *Apium sylv. lacteo succo turgens.*

Apium sylv. Dod. Lugd.

Daucus palustris, Gefn. hort.

Olsenichium, Cord. hist. Thal.

Thyselinum Plinij, Lob.

VIII. *Apium montanum nigrum.*

Oreofelinum Parisiensium, Lugd.

IX. *Apium peregrinum folijs subrotundis.*

Selinum peregrinum 1. Clus. hisp. & hist.

Saxifraga tertium, Cæf.

Daucus tertium Diosc. 2. Plinij, Col.

X. *Apium peregrinum cicutæ folio.*

Selinum peregrinum 2. Clus. hisp. & hist.

Oreoselinum aliud, Lugd.

XI. Apium palustre, & Apium Officinarum.

Apium, Brunf. Fuch. Lon. vulgare, Trag.

Apium palustre, Matth. Fuch. ico. Gef. hor. Lac.

Cast. Lugd.

Apium sativum & palustre, sola cultura differens, Cord. in Diosc. & hist.

Eleoselinum, Tur. Dod. Lob. Ger. spontan. Col.

Paludapium, Ad. Tab.

Apij aliud genus, Cæs.

XII. Apium Macedonicum.

Petroselinum Macedonicum, Matth. Ad. Lob.

Dod. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Apij alterum genus peregrinum, Cæs.

Daucus secundus Dioscoridis, Col.

XIII. Hipposelinum Theophr. vel Smyrnium, Dioscor.

Petroselinum Alexandr. Trag. Macedonicum

verum, Ger.

Smyrnium, Matth. Cord. in Diosc. Gef. hor. Cast.

Lugd. Cam. Col. qui Dioscoridis vult.

Hipposelinum, Ang. Dod. Fuch. Lac. Cord. hist.

Gef. hor. Ad. (five Olusatrum) Lob. Tab.

Alexander, Tur.

Olusatrum, Cord. in Diosc. Gef. hort. (quibusdam Petroselinum Macedonicum) Lon. Cæs. & Macerone vulgi.

XIV. Smyrnium peregrinum rotundo folio.

Smyrnium Creticum, Matth. Cast. Lugdun. Camer. Ger.

Smyrnium Creticum putatum, Col. cui Hipposelinum aliud Diosc.

Smyrnium, Dod. gal. Ad. Lob. Tab. verum, Gef. hort. Lugd.

Smyrnium Amani montis, Dod.

Olusatri alterum genus peregrinum, Cæs.

Perfoliata altera, Lugd.

XV. Smyrnium peregrinum folio oblongo: hoc in Prodomo descripsimus.

Pingit Columna sub titulo an Hipposelinon.

S I S O N

Σίσων Dioscoridi lib. 3. cap. 64.

Sison, quod Amomum Officinis nostris.

Amomum Germanicum, Trag.

Amomum Officin. falsò dictum, Gef. hort.

Sison, Ang. Tur. Gef. hort. Lugd. Tab. Cam.

Sison five Sison, Cord. in Diosc. & hist.

Petroselinum Macedonicum, Fuchij, Dodon. Lon.

Ammi parvum, Gef. hort.

S I O N

Σιον Diosc. lib. 2. cap. 154. & πρὸ τῆς οὐλῆς, quod in aquis vacillando, ab aquis praeclabentibus succutitur: vel potius ab excutiendis calculis. Plinio l. c. c. 22. Sion forte ejusdem l. 26. c. 8. Laver.

I. Sion five Apium palustre folijs oblongis.

Sion odoratum, Trag.

Sium, Cord. hist. Gef. hort. Dod. primum minus, Taber.

Sium verum, Matth. Thal. Lugd. cui & Sium

Cratervæ majus.

Sij primum genus quod Laver, Fuch.

Laver, Dod. gal. Tur.

Apium palustre, Fuch. ico. Gef. col. Lon. Lugd.

Silaum Plinij, Ang.

Sium five Laver Diosc. Olusatri folio, five aqua-

rica pastinaca, Ad. Lob.

Crescione vulgo, Cæs.

II. Sium latifolium.

Sium majus latifolium vel 3, & Sium medium, vel 2. Taber.

Sium majus, Ger.

III. Sium erucæ folio.

Sium alterum, Dod. Olusatri facie, Lob.

Sium alterum erucæ folio, Lugd.

Sium majus angustifolium, Tab.

Cicuta maxima quorundam, Eyst.

an Crescionis alterum genus, Cæs.

SECTIO

SECTIO QUINTA

PASTINACA LATIFOLIA; SISARVM; ANGELICA; IMPERATORIA; LASERPITIVM; PANAX; SPONDYLIVM; LIBANOTIS; CARVI; CORIANDRVM; ANISVM; AMMI; PIMPINELLA; Myrrhis; Cicuta & Cicutaria; Sefeli; Ligusticum; Bulbocastanum; Oenanthe & Filipendula; Pedicularis seu Fistularia, & Barba Capræ.

PASTINACA LATIFOLIA.

Eλαφοβοον Dioscoridi, lib. 3. cap. 80. & Plinio, lib. 6. cap. 22. id est, pabulum cervi, hoc enim pabulo cervos serpentibus resistere fama est, Diosc. & Plinio auctoribus.

I. Pastinaca sativa latifolia.

Pastin. sativa, Trag. Lac. ico. Lug. Gef. hor. Cam. | Pastinaca, Brunf. sylv. Trag. Ang. Cord. Gefn. hort. Thal. Cam. sponte nata, Cæf.

Pastinaca vulgaris, Dod. gal. Cæf.

Pastinaca domestica, Matth. Ang. Cast. Ad. Lob.

Pastinaca latifolia sativa Dod. latifolia sylv. Ger.

Sisarum sativum magnum, Fuch. Tur.

Sifer Dioscoridis, Col.

Elaphobosum sativum, Tab.

II. Pastinaca sylv. latifolia.

Pastinaca, Brunf. sylv. Trag. Ang. Cord. Gefn.

Sifer sylv. Fuch. Tur.

Elaphobosum, Matth. Dod. gal. Cast. sylv. Lac.

Baucia, Pastinaca sylv. Arabum, an Elaphob. Ad.

Elaphosum erraticum, Tab.

Pastinaca sylv. gallica, Cord. in Diosc.

Pastinaca latifolia sylv. Dod.

Spondylium, Ger.

SISARUM.

Sisarum Diosc. l. 2. c. 139. vulgo cognitum, cujus radix elixa, ori grata est. Sifer Plinio, l. 19. c. 5. quod olim in Germania cibi causa ferebatur, quare eam quotannis à Germanis Tib. Cesar, Plinio scribente, flagitavit.

I. Sisarum Germanorum.

Sifer, Brunf. Matth. Cord. in Diosc. Gef. hor. Lon.

Sifer alterum, Lac.

Sifer sativum, Fuch. minus, Tur.

Sisarum, Trag. (& Rapunculus hortensis) Dod.

Ang. Ad. Lob. Tab. Ger. majus, Lugd.

Sifer Germanicum, Cæfalp. cui Elaphobosum

Diosc. & Plinij.

Elaphobosum Dioscoridis, Col.

II. Sisarum Syriacum.

Secacul Arabum & Maurorum sive Pastinaca

Syriaca, Rauvv. Lugd. ap.

ANGELICA.

Angelica, quam aliqui ad Smyrnium, alij ad Laserp. sive Silphium Cyrenaicum referunt: etiam S. Spiritus radix dicitur, vel à radicis suavissimo odore, vel à facultate singulari, qua contra venena valet.

I. Angelica sativa.

Angelica, Brunf. Ang. Gefn. hort. Lac. Ad. Lob.

Cast. Tab.

Angelica major, Dod.

Angelica sativa, Trag. Matth. Fuch. Dod. gal.

Lon. Lugd. Cæf. Ger.

Angelica odorata, Gefn. col. Cam.

Smyrnium, Cord. in Diosc. & hist.

Laserpitium, Lac.

Variat radice; nostra enim crassior, Bohemica minor & nigricans: illa citius, hæc tardius

corrumpitur.

Huc referenda est Angelica Scandiacæ, sive

Archangelica Tabernæmontani, quæ umbella

est flava, semine rotundiore, & ex Norvegia ac

Pomerania adfertur.

II. Angelica sylvestris major.

Angelica sylv. Trag. Matth. Fuch. Dod. Lon.

Ad. Lob. Lugd. Thal. Cam. Tab. Ger.

In locis humidioribus, folijs est tenuioribus.

III. Angelica sylv. minor sive erratica.

Pycnocomos, Brunf.

Angelica vitium (& Osteritium sylv.) Trag.

Lon. Herba Gerardi, Dod. Ger.

Elaphobosco similis, Cord. in Dios.
 Corchorus quibusdam, Gesn. hort.
 Podagraria, Ad. Lob. Cast.
 Angelica erratica, Thal. sylv. communis, Cam.
 Ægopodium, Tab.
 Foliorum incisuris mirè variat.
 IV. Angelica sylvest. hirsuta inodora : in
 Prodr. descripta.
 Herba Podagrariæ cognata, Franco.

V. Angelica sylv. montana.
 Archangelica, Clus. pan.
 Angelica, Cæs. Hucetiam referenda
 Angelica minor montana, Tab.
 VI. Angelica aquatica.
 Archangelica, Lob. Dod. Clus. pan. & hist. Cæs.
 Lugd. Cam.
 Angelica aquatica, Gesn. hort. & col.
 Angelica altera, Cæs.

IMPERATORIA.

Imperatoria, quæ ob raras & præstantes facultates, sic nominata fuit, inter Laserpitium & Panacem media videtur.

I. Imperatoria major.
 Astrantia, Brunf. Gesn. hor. & col. Dod. Clus. hist.
 Smyrnion hortense, Trag. Gesn. hort.
 Laserpitium Germanicum, Fuch.
 Laser five Laserpitium, Tur.
 Struchion, Cord. hist.
 Ostrutium, Dod. gal. Lon.

Imperatoria, Matth. Gesn. hort. & fra. Lac. Ad.
 Lob. Cast. Lugd. Tab. Ger.
 Ligusticum, Ang.
 Herba rena vulgi, Cæs.
 Magistrantia, Cam.
 II. Imperatoria minor.
 Imperatoria vel Astrantia alpina, Cam. ep.

LASERPITIVM.

Laserpitium, Σίλφιον Dioscoridi, lib. 3. cap. 94. cujus caulis ferulaceus καλαμών appellatur, folia sunt apio
 similia, semen verò latum : ex cujus caulibus & radice incis, καλῶν, i. e. succus colligitur : quibusdam
 caulis σίλφιον : radix, καρύδαγος, & folium καλαμῶν dicuntur : sic Theoph. 6. hist. 3. Silphium cujus folium
 maspetum vocant : Et Plin. lib. 19. cap. 3. Laserpotium, quod Græci Silphion vocant, in Cyneraica provincia
 repertum, cujus succum Laser vocant : Avicenna planta Laserifera Altiht dicitur, interpretum aliqui Asam
 reddunt, forte voce ex Laser corrupta.

I. Laserpitium veterum.
 Silphion, Dioscoridis & Theophrasti.
 Laserpitium, Plinio.
 Altiht Avic. Asa quibusdam.

II. Laserpitium Gallicum.
 Laserpitium, Ad. Lob. (five Silphium) Lugd.
 Laserpitium Massilioticum, Tab.

PANAX.

Panax, quasi παναν, omnibus remedium adferens, cujus Theoph. 9. hist. 10. genera quatuor : 1. Syria-
 cum : 2. Chironium : 3. Aesculapicum : 4. Herculanum : Chironium, folio rumici simili : Aesculapium,
 folio Thapsia : Herculanum, folio magno & amplo, ut quoque versus tres palmos perficiat. Dioscoridi, lib. 3.
 cap. 55. 56. 57. tria genera sunt : παναν ἡγοῦντες, ex quo Opopanax colligitur, folijs ficulneis, quinquepar-
 titis : παναν δένδρον, folijs faniculi : παναν καρύδαγος, folio amaraci.

I. Panax Pastinacæ folio, an Syriac Theoph.
 Sagapenum existimatum, Gesn. hort.
 Panaces peregrinum, Dod.
 Panax altera recentiorum Olusatris aut Pasi-
 nacæ folio, Ad. Lob.
 Panax Chironium, Lugd. Herculeum 2. Tab.
 Panax herculeum majus, Ger.
 an Panacis heraclei alterum genus, Cæs.

Σαγαπένιον Sagapenum & Serapinum in Offi-
 cinis, an hujus forte lachryma, cum sit plantæ

ferulaceæ in Media provenientis, medio inter
 succum Silphij & Galbanum colore, Dioscor.
 lib. 3. cap. 95.

II. Panax costinum.
 Costus, Matth. Lon. vulgaris, Cam ep.
 Costus spurius, Matthioli, Lob. ob. Cam.
 Pseudocostus, Matth. Lugd.
 Herba costa, Cæs. alp.

Panax Chironium Theoph. Cam.
 Panaces costinum & Costus Illyricus, Tab.

III. Pa-

III. Panax sphondylii folio sive Hera-
cleum.

Panaces Heracleum, Matth. Ang. Gesn. hort.
Lac. Cast. Lugd.

Panax Heracleum Herculeum, sive Heraclia
fronde pastinacæ, Ad.

Panax Heracleum, Lob. Dod. Ger.

Panax Heracleum, Cæs. primum, Tab.

Sphondylium alterum, Dod. 8.

Floribus est albis, luteis dicit Diof. tales se
vidisse, Lobelius testatur.

IV. Panaci Heracleo similis Ungarica.

Tataria Ungarica, Clus. hist.

(bari.

an Baltracan in Tartaria nascens, Josephi Bar-

Hujus radice, Ungari Agriæ vicini, alterius

panis penuria vescuntur: & Tartari, folio-

rum in aqua decoctum refrigeratum, Vini in-

star bibunt.

SPHONDYLIIUM.

Sphondylium folia habet platano similia ad Panacis foliorum effigiem accedentia, Dioscoridi lib. 3. cap. 90.
Sphondylium Plinio, lib. 12. cap. 26 & l. 24. c. 6. sic dictum fortasse ob odoris gravitatem, à Spondyle insecti
genere, odoris gravis, ut Pena tradidit.

I. Sphondylium vulgare hirsutum.

Branca urfina, Brunf. Trag. Cord. in Diof.

(cui & Bupleuron Nicandri) Germanica,

Dod. gal.

Acanthus vulgaris sive Germanica, Fuch.

Sphondylium, Matth. Lac. Gesn. hort. Lon.

Cast. Cæs. Tab. vulgare, Dod. 2.

Sphondylium, Ad. Lob. Dod.

Variat ratione loci, prout in montosis &
planis provenit, hinc duæ apud Tabern. ico-

nes: aliquando ita ludit, ut in caulis summo,

folia sint breviora quidem, attamen in ternas
& quaternas lacinias divisa. Floribus est com-
muniter albis: Sed & purpureis, licet rarius,
reperitur.

II. Sphondylium hirsutum folijs angustio-
ribus: hoc in Prod. primo loco descriptum est.

III. Sphondylium alpinum parvum: quod
2. loco in Prodr. describitur.

IV. Sphondylium alpinum glabrum: quod
in Phytopinace sub. 2. in Prodr. sub. 3. propo-

LIBANOTIS.

Libanotis, quod radix *ἑστὴ λιβάνης*, thus redoleat, duplex est, latifolia & serula folio: latifolia Theoph. l. 9.
c. 12. genera duo fecit, alterum sterile, alterum fertile, & alterum tam fructu, quam folio utile, alterum
tantum radice: fructiferum, folium palustri apio simile, sed majus, habet: sterile, folio lactuca amara con-
stat. Plin. l. 19. c. 12. de Libanotide confuse egit, sicut & l. 20. c. 16. cum Conycis miscuit.

I. Libanotis latifolia major.

Rosmarinus Theoph. Ang.

an Ligusticum alterum, Matth. Cast.

Libanotis Theoph. major, Lob. Lugd. Ger.

Libanotis alba major, Tab.

Elaphoboscum album, Lon.

Seseli æthiopicum 2. Clus. pan. & hist.

II. Libanotis latifolia altera sive vulgarior.

Seseli primum, Trag. æthiopicum, Matth. ico.

Fuch. ico. Tur. Lac. Gesn. hor. Lon. Lugd. Clus.

pan. & hist.

Dauci alterum genus, Fuch. Tur. Lugd.

Libanotis alba, Gesn. hort. Tab.

Libanotis tertia Dodonæi, Lugd.

Libanotis Theoph. Dodonæo gal. Ad. Lobel.

altera, Thal.

Libanotis minor, Ger.

Seseli æthiopicum herba, Dod.

III. Libanotis latifolia minor semine cri-
spo: hæc 2. in Prodr. mo.

IV. Libanotis minor apij folio.

Daucus anguloso caule, Cord. hist.

Libanotis Theoph. minor, Lob.

Libanotis alba minor, Thal.

Libanotis panacea, Tab.

V. Libanotis apij folio semine aspero.

Rosmarinus folijs Selino similibus, quæ Liba-

notis legitima Theoph. perperam Siler Creti-

cum, Hon. Belli ep. 1 ad Clus.

VI. Libanotis latifolia aquilegiæ folio,

quæ 1. est in Prodr. mo.

Seseli æthiopicum alterum, Cam.

VII. Ligusticum vulgare: an Libanotis

fertilis Theophrasti?

Levisticum, Brunf. Lob. & Lasepitiu Ger-

manicum, vulgare, Matth. Dod. Ad. Cæs.

V 3

Ligusti-

Ligusticum, Brunf. Cord. in Diof. Gefn. hort. Laferpitium, Ang. Ger.
 Lon. Tab. fativum, Trag. Cord. hist. vulgare, Smyrnum, Lac. Fuch.
 Dod. gal. Cam. Hippofelinum, Lugd.
 Libyiticum vulgare, Fuch. ico.

LIBANOTIS FERULÆ FOLIO & Panax Asclepias.

Libanotis Diofcoridi, l. 3. c. 87. duum est generum: unum facundum, cujus semen rotundum, angulosum, acre, linguam exurens, & naxus vocatur, folijs feniculis cui alterum confimile, semine lato, minime exurente. Sterile illorum similitudinem refert, sed neque caulem, neque florem, neque semen promit.

- | | |
|---|--|
| I. Libanotis ferulæ folio semine anguloso.
Libanotis seu Rosmarinum, Matth. Lac. Lugd.
Rosmarinum i. Ang. Cast.
Libanotis i. Dod. vel cachryfera, Cam.
Rosmarinum ferulaceum, fertile, Diof. cujus semen Cachris dicitur, Ad.
Cachrys verior Libanotis Galeno, Lob.
Libanotis candida, Cæf. | Libanotis 2. Dod. Tab.
Libanotis nigra, Cæf.
IV. Libanotidi secundæ similis seu Panax Asclepium primum.
Panaces Asclepium, Matth. Lac. Cast. Lugd.
V. Panax Asclepium umbella lutea.
Panax Asclepium alterum, Lugd.
VI. Panax Asclepium semine foliofo.
Panax Asclepium Apulum, Col.
VII. Libanotis minor umbella candida.
Libanotis Septentrionalium herbariorum, Ad.
Libanotis minima, Lugd. (minor.
VIII. Libanotis tenuif. German. major &
Libanotis <i>oxyphloides</i> major & minor, Thal. |
|---|--|

CARUI

Karus Diofcoridi, lib. 3. cap. 66. *καριον*, Actio, *καριον* Simeoni Serbi, lib. de alim. Careum Plin. lib. 19. cap. 8. à Caria regione in qua laudatissimum nascitur.

- | | |
|---|---|
| I. Cuminum pratense, Carui Officinarum.
Caros, Brunf. Trag. Dod. gal. Gef. hor.
Careum, Fuch.
Carum, Tur. Cord. in Diof. Matth. Lac. Ang.
Lob. Dod. Cast. Lugd. Tab. Ger.
Carui, Lon. Ad. Cæf. Thal. | Cuminum equinum & syl. Trag.
Feniculum erraticum alterum, Lon.
Peucedanum, Eid. ico.
Hippomarathrum, Bot. Franc.
Feniculum sylv. Loniceri, Lugd.
Alia latioribus, alia angustioribus folijs est.
IV. Podi farina seu Rosculus quo flacus ventris exigunt: par. 4. Ind. Orient. 7. |
|---|---|

CORIANDRUM

Korion *ή κοριανδρον* Diof. lib. 3. cap. 71. dictum putant, quod folia & caules cimices redoleant. *Κοριανδρον*, Theoph. 7. hist. 1. & 4. caus. 3. cujus genera plura esse 4. hist. 7. dicit. Coriandrum Plinio, lib. 6. cap. 20. quod inter sylvestria non invenitur.

- | | |
|--|---|
| I. Coriandrum majus.
Coriandrum, Brunf. Trag. Fuch. Matth. Ang.
Cord. hist. Gefn. hort. Lac. Lon. Ad. Lob. Cast.
Cæf. Cam. Tab. Ger.
Coriandrum, quod recens frigidum, exsiccatum verò calefacit, Guil.
Coriander, Tur. | Semina in calidiorib. regionib. majora sunt.
II. Coriandrum minus testiculatum.
Coriandrum alt. minus odorum, Lob. Lug. sub
Coriandri alterius icone, Dod.
Coriandrum 2. inodorum, Tab.
III. Coriandrum sylvestre foetidissimum.
Coriandrum sylv. Myconi, Lugd. |
|--|---|

ANL-

A N I S U M.

Anisum Diosc. lib. 3. cap. 65. Anisum, quidam auctore Plinio, lib. 20. cap. 17. quasi abhætor vocare, quia appetentiam cibi præsaret, & forsan sic dictum, & in vino raris iunctura præstaret, quod tensiones flatulentas internas & externas remutat & laxet.

I. Anisum herbarijs.

Abfinthium dulce, Roës.

Majore est femine & minore, hocque apud Bohemos habetur.

II. Anisum peregrinum.

Anisum Philippinarum Insularum, Clus. hist.

A M M I.

Ammi Dioscorid. lib. 3. cap. 70. quod vulgum dicitur ugi sagidmèr vocitant. Plinio lib. 20. cap. 15. Ammi quod Græci vocant, Cumino est simillimum: quidam Cuminum Aethiopicum esse existimant: Hippocrates regium appellat.

I. Ammi majus.

Ammi, Brunf. Trag. Tur. Cord. in Diosc. & hist.

Gef. hort. Lon. Lugd.

Ammi commune sive vulgare, Dod. Cam. Ger.

Ammi vulgatus, Lob.

Ammioselinum, Tab.

Quibusd. Bubon. Hipp. alijs Bupleuron Plin.

Variat fol. plurim. incisus & nonnihil crispis.

II. Ammi alterum femine apij.

Ammi majoribus & ferratis folijs femine apij,

Gefn. hort.

Ammi Creticum aromaticum, Ad. Lof.

Ammi tertium Creticum, Tab.

III. Ammi parvum folijs fœniculi.

Ammi, Matth. Ang. Lac. Cast. Cæs. Lugd. Cam.

Ammi verum, Gef. hort.

Ammi parvum, Dodon. gal. alterum parvum,

Eidem f.

Ammi perpusillum, Lob.

Ammium primum Alexandriacum, Tab.

IV. Ammoides.

Ammi pusillum, Cæs.

P I M P I N E L L A.

Pimpinella & Bipinnella à recentioribus, à foliorum binis ordinibus, pennatim sive plumatim digestis, nominata, veterib. indita existimantur: quæ etiam Bipennula & Pimpinella vocantur. Hæc duplex est, Pimpinella saxifraga, seu saxifragia, à facultate calculorum à renib. expellendorum: altera Pimpinella Sanguisorba, vel Sordastrella, quod sanguineos fluxus sistat: quæ nuncupatur Myrpesio, & quibusd. Sideritis 2. Diosc. censetur.

I. Pimpinella saxifraga maj. umbellâ candidâ.

Pimpinella, Brunf. Cord. in Diosc. Lon. Trag.

Fuch. Tur. Gef. hor. Lob. Cast.

Pimpinella nostras communis major, Thal.

Bipinnella, Saxifraga major, Ad.

Pimpinella saxifraga, Matth. Ger. major, Cam.

Bipennula, Lac.

Saxifraga major, Dod. gal. Saxifraga 1. Cæs.

Saxifraga, Cord. hist. magna, Dod. hircina major,

Gef. hor. vulgaris major, Clus. pan.

Tragoselinum majus, Tab.

Folia in una atroviuentia, splendentia: in altera minime: invenitur & in lacinias divisa. Ad

hujus radicem quibusdâ in locis, grana reperiuntur,

quorum medulla in colorem rubeum mutatur, cujus ad tincturam carmesini usus est,

monentibus Lacuna & Anguillara, & Coecus

radicum quibusdâ dicitur.

Fragosus l. j. c. 17. videtur Cocchenilla exist.

masse: Cocchinilla, inquit, quædam grani species adfertur ex Peru, quod nascitur in certis

plantis parvis Pimpinellæ vulgari similibus, cujus radicibus adhæret, similitudine uvarum

syvestrium: quidam putarunt falsò, esse Cognidium verum: alij esse Chermes Arabum,

à Cocco Baphico Græcorum differens, quod manifestè falsum est, hæc ille. At Oviedus, ex arbore colligi vult, ut suo loco dicitur.

II. Pimpinella saxifraga major altera.

Pimpinella secunda species, Trag.

Tragoselinum minus, Tab.

Bipinnella sive saxifraga minor, Ger.

Cauliculi & foliorum venæ, interdum purpurascent: hæc fervore & acrimonia primum

genus superat.

III. Pimpin. saxifraga major umbellâ rubente.

Saxifraga major in alpi. flore rubente, Gef. h.

Pimpinella major umbellis purpureis, Gef. fra.

IV. Pim.

IV. Pimpinella saxifraga minor.
Pimpinellæ 3. species, Trag.
Pimpinella minor, Fuch. Tur. Cam. ep.
Pimpinella saxifraga minor, Lugd. Cam.
Pimpinella nostras communis minor, Thal.
Bipinella, Saxifraga hircina, Ad.
Pimpinella, Saxifraga hircina minor, Lob.
Saxifraga minor alt. Dod. gal. Saxifrag. 2. Cæf.
Saxifraga hircina minor, Gef. hort. Cam.
Saxifraga parva, Dod.
Saxifraga vulgaris minor, Cluf. pan.
Saxifraga pimpinella Germanica minor, Cluf.
hiflor.
Daucus Selinoides, Cord. hift.
Dauci 3. genus, Lugd.
Tragofelinum petræum, Tab.
Tragium Diofcoridis, Col.

Folia interdum laciniata, interdum incifuris angustioribus & oblongis divifa: aliquando folijs petrofelinis.

V. Pimpinella saxifraga tenuifolia: in Prodromo defcripta.

VI. Pimpinella Sanguiforba major.
Pimpinellæ Italicae 2. genus, Trag.
Pimpinella seu Sanguiforba major, Matt. Caft. Lugd. Cam.

Pimpinella major, Dod. gal. fylv. Dod.
Pimpinella Italica major, Cluf. hift. Thal.
Sanguiforba major, Fuch. Cord. hift. Tab.
Sanguiforba altera major, Ad. (five Pimpinella) Lob.
Pimpinella fylv. Ger.

Sideritis fecunda Diofc. major, Col.

VII. Pimpinella Sanguiforba minor hirsuta.

Pimpinella Italica, Trag. Lon. minor, Thal.

Pimpinella, Ad. Lob. Cæf. minor. Dod. gal. Lug.

Pimpinella fylv. hirsuta, Gef. hor.

Pimpinella sanguiforba, Dod. minor, Matth.

Caft. Cam.

Pimpinella hortenſis, Ger.

Sanguiforba minor, Fuch. Cord. hift. Tab.

Sideritis 2. Ang. Guil. quæ Pimpinella Italica.

Sideritis 2. Diofc. minor, Col.

an Sideritis altera Diofc. l. 4. c. 34. & Sifitictet-

ris Plinij l. 4. c. 17.

Hæc apud Monſpelienſes minor & valde pi-

loſa reperitur.

VIII. Pimpinella sanguiforba minor levis.

Pimpinella fativa lævis, Gef. hor.

Culturâ ſolùm à priore diſſerre videtur, cùm

in uſum acetariorum ab Italis in hortos ſeratur.

IX. Pimpinella sanguiforba inodora: in

Prod. deſcripta.

M Y R R H I S.

Myr̃rus, ſive uſippu Dioſcoridi lib. 4. cap. 116. Myrrhū, quæ alijs Smyrrhiza, alijs Myrrha dicitur, Plinio lib. 24. cap. 16.

I. Myrrhis major, vel Cicutaria odorata.

Myrrhis, Matth. Cord. in Diof. Gef. hor. Lac. Ad.

Lob. Dod. Caft. Lugd. fativa, Cam.

Sefeli Peloponenſe, Ang.

Cicutaria tertia, Cæf.

Cerefolium Hiſpanicum, Tab.

Cerefolium magnum & Cicutaria tenuif. Ger.

II. Myrrhis minor.

Myrrhis altera, Ad. parva, Lob. Lugd.

Cicutaria ſecunda, Cæf.

Myrrhis fativa minor, Cam.

Myrrhis montana, Tab.

III. Myrrhis fylv. feminibus lævibus.

Myrrhis, Fuch. Dod. gal. Tur. Lugd. fylv. Cam.

Cicutaria, Gef. hor. Lon.

IV. Myrrhis fylv. feminibus aſperis.

Myrrhis fylv. nova Æquicolum, Col.

V. Myrrhis Broccenbergens, Thal. quid?

CICUTA ET CICUTARIA.

Kα' νεον Theoph. l. 1. hift. 8. & 6. ejusd. 2. Diofc. l. 4. c. 79. Etymologicus ita nominatum tradit, αὐτὰ τὸν γόνιον μόνον εἰδὲν μὲν, ὃν ὁνότων τοῖς νέστοι. Quare Gal. lib. quod animi mores 3. quod cicuta epora ſtultitiam pari-
riat, νεον dicta, deſumpto nomine ab eo affectu, quia corpus ipſum torquetur. Plin. l. 25. c. 13. Cicuta, cujus cul-
lem viridem à peris, edi ſcribit: verum qui ſapiunt, ab huius eſu, Socrateo exemplo moniti, abſtineant.

I. Cicuta major.

Cicuta, Trag. Matth. Ang. Fuch. Dod. Tur. Lac.

Ad. Lob. Lon. Caft. Lugd. Cæf. Tab. Ger.

Cicuta major, Cord. hift. Cam. vera, Gef. h. Thal.

Cicutaria vulgaris, Cluf. hift.

Variat folijs aliquando latioribus, aliquan-

do tenuioribus.

II. Cicuta minor petroſelino ſimilis.

Petro-

Petroselini vitium, Trag.
 Cicuta minor, Cord. hist. Cam.
 Apij comes vitium, Gef. hort.
 Dauci inutilis genus, Gef. col.
 Sison, Lon.
 Apium cicutarium, Thal.
 Cicutaria fatua, Ad. (quæ minus fœtida) Lob.
 Petroselinum caninum, Tab.
 III. Cicutaria latifolia fœtida.
 Sefeli Peloponense, Matth. Gef. hor. Lac. Cast.
 Lon. Lugd.
 Cicutaria latifolia fœtidissima, Lob. Lugd.
 Cicutaria, sive Cicutaria Myrrhis, Thal.
 Cicutaria, Cast. ico. fœtida, Tab.
 Cicuta latifolia fœtidissima, Ger.
 IV. Cicutaria latifolia tertia.
 Cicutaria maxima Brancionis, Lob.
 V. Cicutaria palustris latifolia alba.
 Cicutaria alba, Lugd.

Cicutaria palustris fl. candido, Cam.
 an Meum Silesianum, Ejusd.
 VI. Cicutaria palustris latifolia rubra.
 Cicutaria rubra, Lugd.
 Cicutaria palustris fl. purpureo, Cam.
 VII. Cicutaria palustris tenuifolia.
 Ligisticum sylv. Trag.
 Fœniculum sylv. Eid.
 Cicuta palustris, Cord. in Dioscorid. aquatic.,
 Gef. hort. Thal.
 Cicutaria palustris, Lob. Tab. Ger.
 Cicutaria palustris alia, Cam.
 Phellandrium, Dod. Lugd.
 Silaus Plinij, Cæs.
 Phellandrium est Plin. l. 28. c. 12. alijs Silaum l. 27.
 VIII. Cicutaria bulbosa. (c. 8.)
 Cicutaria pannonica, Clus. pan. & hist.
 Bulbocastanum coniophyllum, Cam.
 Myrrhis cicutaria, Tab.

S E S E L I

Σ *Seseli* Dioscor. l. 3. c. 60. quatuor generum, *μαροσαλίστιον*, folijs fœniculi: *αἰθιονίδιον*, folijs hedera: *πελοποννησιακόν*, folijs cicutæ latioribus: *νεφελίων* sive *τοπόδιον*: Plin. l. 8. c. 32. ex Aristotelis l. 9. hist. *Cervæ* ante partum, purgari herba quadam quæ *Seseli* dicatur, scribit: & l. 25. c. 8. *Seseli cervæ* enixæ à partu monstrare: & l. 20. c. 22. *Tordylium*, est semen ex *Seseli*.

I. *Seseli montanum* Cicutæ folio glabrum:
 an Peloponnesiacum Diosc.
 Ligusticum alterum Belgarum, Lob. Lugd.
 Ligusticum 2. herbariorum, Tab.
Seseli mont. i. vel alpinum, Clus. pan. & hist.
 Latioribus folijs ex horto Cl. Contareni
 habemus.
 II. *Seseli mont.* Cicutæ folio subhirsutum:
 quod in Prodromo descriptum est.
 III. *Seseli Creticum majus*.
 Tordilium sive *Seseli Cretic.* majus, Lob. Lugd.
 Pimpinellæ Romanæ alterum genus syl. Cæs.
Seseli Creticum majus, Cam. 2. Tab.
 IV. *Seseli Creticum minus*.
 Ordilium Nicandri & Tordylium Diosc. Ang.
Seseli Cretici species, Eid.
 Caulis, Bellonio, Gef. hor. Belli ep. 1. ad Clus.
 Tordylium & Gordilium, Dod. gal. Gefn. hort.
 Lugdun.
Seseli Creticum, Lac. Ad. Lob. Dod. Cast. Ta-
 bern. Ger.
Seseli Creticum minus, Cam.
 Pimpinella Romana vulgo, Cæs.
 Tordilium Creticum, Eyst.
 V. *Seseli Creticum fructu majore*.

Tordylium majus alt. luteum *λεόναρπ*, Col.
 VI. *Seseli Creticum minimum*.
 Tordylium minimum Apulum, Col.
 VII. *Seseli Æthiopicum fœlicis folio*.
Seseli Æthiopicum alterum, Matth. Gef. hort.
Seseli Æthiopicum, Ang. Ad. Lob. Cast. Tab. ve-
 rum, Lugd. Cam.
Seseli Æthiopicum frutex, Dod. Ger.
 Herba quæ pro *Seseli Æthiopico* ostenditur,
 Cæs. alp.
 VIII. *Seseli Mafsiliense ferulæ folio*.
Seseli Mafsiliense ferulæ aut Dauci Cretici fa-
 cie, Lob. ob.
Seseli Mafsiliense, Matth. Lac. Gefn. hort. Lon.
 Cast. Lugd. Tab. nuperorum, Lob. ico.
 Siler montanum Officin. Ger.
 IX. *Seseli Mafsiliense fœniculi folio*, quod
 Dioscoridis censetur.
Seseli Mafsil. Ang. Dod. Lugd. Cæs. *Seseli Maf-*
 siliense fortè, Clus. hisp. nonnullorum, Cam.
Seseli Mafsiliense folio fœniculi crassiore, Ad.
 Lobel.
Seseli Mafsiliense Dioscoridis, Clus. hist.
 Fœniculum tortuosum, Lugd.
 Fœniculum petræum, Tab.

X

Variat

Variar in foliorum crassitie, tenuitate, longitudine, breuitate & diuisione: in omnib. tamen glauca sunt. Alias nomine Seseleos Mass. habemus, de quib. cum adhuc dubitemus, ut & alijs umbelliferis, de ijs in Theatro, si Deus voler.

X. Sefeli montanum fœniculi folio. Sefeli mont. 3. vel mont. angustifol. Clus. pan. & hist. qui vult à Libanotide Diofc. altera fructifera, non multum differre.

XI. Sefeli palustre lactescens. Sefeli palustre, Cam.

XII. Sefeli pratense, Silaus fortè Plinio lib. 26. cap. 8.

Ligusticum Matthioli censet, Ges. hor. Pastinaca pratensis Theoph. Cord. in Diofc. Pastinaca nigra sylv. Cord. hist. Sefeli prat. Monspeliens. Ad. Lob. Lugd. Cam. Siler alterum pratense, Dod. Hippomarathrum primum Tab. sub Fœniculo dulci, Ger. ico.

XIII. Sefeli prat. tenuif. sive Daucus pratensis tenuifolius: pro 2. in Prodr. descriptus.

LIGUSTICUM.

Lιγυστινόν (Galeno λιβυστινόν) ut plurimum in Liguria nascitur, quare à λιβυγία nomen traxit, in monte scil. Apenino dicto: incolis πανεύς dicitur. Diofc. l. 3. c. 85. Ligusticum sylvestre est, in Liguria sua montibus: panacem aliqui vocant. Plin. l. 19. c. 8. & l. 20. c. 15. Siler nunc appellant nomine à Sile deducto, quia pro Sefeli semine utuntur, at Veteres ipsum Sefeli, etiam Sili & Seli vocabant.

I. Ligusticum quod Sefeli Officinarum. Siler montan. Trag. Guil. Ad. Lob. Dod. Clus. h. Ligustic. Marr. Lac. Cast. Lugd. verum, Dod. gal. Ges. hor. Tab. sub Levisticum vulgari, Ger. ico. Sefeli Malsilioticum, Cord. in Diofc. Sefeli, vulgò Siler montanum, cum nullo Sefeli conueniens, Ges. hort.

Sefeli Italicum, Cast. Ser montanum, Sefeli peloponense, Cæs. Semine latiore & breuiore variat.

II. Ligusticum folijs cicutæ. Siler Creticum, Cam.

III. Ligusticum sive Siler montanum angustifolium: in Prodr. descriptum.

BULBOCASTANUM.

Bολβοκαστάνιον, cuius Trallianus l. 7. c. 2. meminit, à radicis figura bulbofa, & sapore castaneas exprimentem, nomen habet. Bónior Diofc. l. 4. c. 124. aliqui censent, cui & αὐτοβόνιον, seq. cap. subiungit.

I. Bulbocastanum majus folio apij. Oenanthe prima, Matth. Cast. Lugd. Bunium, Dod. gal. Lac. Ges. hor. Apios, Tur. Bulbocastanum, Ges. hor. Dod. Cast. Tab. Ger. Bulbocastanum grandius, Lugd. Bulbocastanum mas Tralliani, Lugd.

Nucula terrestris Septentrionalium, Ad. Lob. Pancafeolus vulgo, Cæs.

II. Bulbocastanum minus. Ornithogali species, Lon.

Bulbocastanum alterum, Cam. Hoc ratione loci, folior. incisuris variat: quod ex Angl. ex Pyren. & monte Calcaris habemus.

OENANTHE ET FILIPENDULA.

Oenanthe Diofc. l. 3. c. 135. quasi flos vinosus, quod odore & quadantenus colore, non sint viri dissimiles: vel potius, quod cum vite floreant: & αὐτοανθεῖον, a florum candore, quos producit: cuius radix magna, in multa rotunda capitula extuberans. Plinio l. 21. c. 23. Oenanthe radice magna numerosa, &c. Recentiorum Oenantes subjungamus, ut & Filipendulas, quæ cum Oenante viribus aliquantum conueniunt: Filipendula à numerosis illis & rotundis in radice capitibus, quæ velut ex filo quodam pendere videntur, nomen habet.

I. Oenanthe apij folio.

Oenanthe secunda, Matth. Lugd.

Oenanthe angustifolia, Lob. species, Lugd.

Filipendula, Cast. ico. 2. vel tenuifolia, Tab.

Filipendula angustifolia, Ger.

Cyminum bulbosum Plinij, Col.

II. Oenanthe pastinacæ fyl. fol. semine atri-

Oenanthe species altera, Lugd.

III. Oenanthe chærephylli folijs.

Oenanthe tertia, Matth. Lugd.

Oenanthe cicutæ facie, Ad. Lob. Lugd.

Filipendula altera species, Ges. hor.

Filipendula 3. Oenanthe selinophyllos, Tab.

IV. Oenanthe aquatica.

Oenan-

Oenanthe 4. Matth. Lugd.
 Oenanthe aquatica, Lob. aquat. repens, Cam.
 Laver minus, Lon.
 Bulbocastanum foemina, Lugd.
 Sifer palustre, Lugd.
 Petroselinum sylv. vulgo, Cæs.
 Filipendula aquatica vel palustris, Tab. Ger.
 Juncus odoratus aquatilis, Dod.
 Differentiæ ratione magnitudinis & parvitas, multæ reperiuntur: sic aliquando bulbis carens, quemadmodum Dod. pingit, & Lobel. duas alias icones subjungit: sic apud Montpellierenses, capitulo est majore, per omnia hispidiore: apud nos minore, nec hispido.
 V. Oenanthe hederæ folijs.
 Oenanthe Myconi, Lugd.
 VI. Oenanthe prolifera Apula.
 Oenanthe Cretica, Ponæ in Bal. ital.

VII. Filipendula vulgaris, an Molon Plin. lib. 26. cap. 7.
 Filipendula, Trag. Dod. Matth. Cord. hist. Ang. Gefn. hort. Lon. Thal. Cast. Lugd. Tab. (cui & Saxifraga rubra) Ger.
 Oenanthe, Fuch. Lac. Cord. in Diosc. Lob.
 Oenanthe vulgaris, Ad.
 Filipendula vulgaris, Eyst.
 VIII. Filipendula minor: in Prod. descripta.
 IX. Filipendula montana fl. pediculariæ.
 Filipendula mont. Dod. Tab. Ger.
 Oenanthe sive Filip. alt. mont. Ad. Lob. Lugd.
 Alektorolophos 1. vel alp. major, Clus. pan. & h.
 Oenanthe alia Myconi, Lugd.
 Crista quædam in alpinis, Cæs.
 X. Filipendula montana altera.
 Alektorolophos alpinus 2. Clus. pan. & hist.
 Floribus est modò pallidis, modò purpureis.

PEDICULARIS SEU FISTULARIA.

Pedicularis, ab effectu nomen habet: si enim a pecoribus inter cetera pabula devorata fuerit, pediculorum ingentem copiam procreat. Α'λεκτοροφος seu Crista apud Plin. l. 27. c. 5. censetur, cui folia similia gallinæ cristæ tribuit. Imò ob florum congeriem, multiplicis & densæ Gallinæ cristæ modo fastigiatam, sic posteriores dici putant: aliqui Fistulariam nominant, quod ad fistulas & sinuosa ulcera utilis esse credatur.

I. Pedicularis alpina lutea.
 Filipendula alpina, Lugd.
 an Oenanthe, Cæs.
 II. Pedicularis alpina filicis folio major.
 Pedicularis major alpina, Lugd.
 In hac varietas occurrit.
 III. Pedicularis alpina filicis folio minor.
 Alektorolophos alpin. minor, Clus. pan. & hist.
 IV. Pedicularis alpina folio ceterach.
 Herba folijs aspleno perfimilis, Gefn. fra.
 V. Pedicularis pratensis purpurea.
 Pedicularia campestris prior, Trag.
 Alektorolophos, Dod. gal. Thal.
 Pedicularis, Lob. Cast. Tab. altera, Lon.
 Fistularia, Dod.
 Alektorolophi 3. genus, Clus. pan. & hist.
 Crista galli altera, sive Phthirion, Lugd.

Ruta pedicularis, Tab.
 Floris color vel purpur. vel carn. vel candid.
 VI. Pedicularis prat. lutea, vel Crista galli.
 Pedicularis campestris 2. Trag.
 Alektorolophos, Ang.
 Crista gallinacea, Dod. gal. Lugd. Clus. hist.
 Crista galli, Lob. Dod. Thal. simplici caule, Cæs.
 Pedicularia lutea, Tab.
 Mimulus Plinij quibusdam: mimuli herba in prato pelsima l. 18. c. 28. quamvis alij Nummulum legant, Nummulariam dictam censentes.
 Variat magnitudine & foliorum latitudine, caulium numero: floribus luteis, rarius candidis: semine nigro, aut subluteo.
 VII. Crista galli umbellata.
 VIII. Crista galli angustifolia montana: illa pro 1. hæc pro 2. in Prodromo descripta.

BARBA CAPRÆ.

Barba capræ, à florum figura, quæ barbam caprinam aliquo modo refert, nomen obtinuit: & prima Melandryon Plinij, l. 26. c. 7. censetur, cujus descriptio talis: Melandryon nascent in segete ac pratibus flore albo, odorato. Altera ejusdem, l. 24. c. 19. Rhodora: herba, inquit, quam Galli Rhodoram vocant, caulibus habet virga siculnea modo geniculatum, folia urtica, in medio exalbida, eadem procedente tempore tota rubentia, florem argenteum.

I. Barba capræ floribus oblongis.
 Barbula capræ & barba caprina sylv. Trag.
 Barba capri, Fuch. Dodon. gal. ico. capræ,

Lugdun. Eystett.
 Barba caprina, Gefn. hort. altera, Lon.
 Potentilla 2. Ang.

X 2

Drymo-

Drymopogon 1. Tab.

II. Barba capræ floribus compactis.

Barbula caprina prior, Trag.

Barba capri, Dod. gal. desc.

Potencilla 1. Ang.

Medefusium (à Ger. Medisif) Cord. hist.

Barba caprina 1. Lon.

Barbi capra, Ad. Lob.

Regina prati, Dod. Ger.

Ulmaria (à foliorum forma) Gefn. cat. Clus.

pan. & hist. Lugd. Cam. Tab.

Argentilla major, Thal.

SECTIO SEXTA. VALERIANA; NARDVS.

Valeriana Dioscoridi, l. 1. c. 10. φῶς ἢ ραχὶς & κϋπερ eo quod radices cum quadam odoris gravitate Nardum emulenter: imò & viribus Nardo similes, Galeno & Aegineta auctoribus. Plinio, l. 12. c. 12. Nardum Creticum, aliqui agriam vocant, alij phu folio olusatri, &c. & l. 21. c. 20. Nardus quod Phu appellavimus. Officinis & herbarijs Valeriana, à multis quibus valet facultatibus: quare & Theriacaria dicitur. Genera duo, una descriptione Dioscorides proposuisse videtur: folia namque olusatri, majori Valeriana: folia Elaphobosci, media: radices priori, floris color, media convenit.

I. Valeriana hortensis: Phu folio Olusatri Dioscorid.

Valeriana vera, seu Nardus agrestis, Trag.

Phu magnum, Fuch. Matth. Tur. Lac. Lon. Lug.

Phu majus, Matth. Cord. hist.

Phu verum, Cord. in Diosc. Fuch. hortense. Gefn. hort.

Phu ponticum, Tab.

Valeriana major, Ang. Ad. Lob. Cam. Eyf.

Valeriana optima, Cæf. hortensis, Dod. Ger.

Carpesium, Cast.

II. Valeriana folijs Calcitrapæ.

Valeriana annua seu æstiva, Clus. hist.

III. Valeriana peregrina purpurea albæ.

Valeriana Indica, Clus. hist.

Valeriana peregrina ocimi folio, Col.

In Phytopinace, sub 4. in Prod. sub 6. & in Matth. figurâ additâ, descripsimus.

IV. Valeriana sylv. major.

Phu similitudine Elaphobosci, Dioscoridi.

Valeriana, Brunf. Gefn. hort. altera, Cæf.

Valeriana vulgaris, Trag. Cord. in Diosc. Lac.

Valeriana sylv. Ad. Lob. Dod. Cam. Eyf. prima, Clus. hist.

Valeriana major, Dod. gal. Lugd. Thal.

Phu Dioscoridis, Brunf. Colum. vulgare, Fuch. Tur. Tab.

Phu Germanicum, Fuch.

Phu majus commune, Gefn. hort.

Phu parvum, Matth. Lac. Cast.

Valeriana major, Tab. major sylv. Ger.

V. Valeriana sylv. major montana.

Valeriana 3. Trag.

Valeriana montana & 3. Tab.

VI. Valeriana palustris major: quæ 1. in Prod.

VII. Valeriana cærulea.

Phu græcum, Dod. gal. Lugdun. peregrinum, Gefn. hort.

Valeriana peregrina, Ad. Lob. Cam.

Valeriana græca, Dod. Tab. Ger.

Pseudovaleriana dici potest, nam præter foliorum similitudinem, nil cum Valeriana commune habet: flore est communiter cæruleo, aliquando albo.

Valeriana Græca fl. cæruleo &

Valeriana Græca fl. albo, Eyf.

VIII. Valeriana palustris minor.

Valeriana exigua vel 4. Trag.

Valeriana min. five pal. Thal. Ger. minor, Ad.

Valeriana minor syl. Lob. Lugd. minima, Dod.

sylv. five palustris min. Cam.

Phu parvum, Dod. gal. minus, Gefn. hort. Lon.

Tab. minimum, Matth. Cast. Lugd. Cam. ep.

IX. Valeriana palust. media parum lacinia-

ta: quæ 2. in Prod.

X. Valeriana alpina prima: quæ pro 4. in

Phytop. pro 3. in Prodr. describitur.

XI. Valeriana alpina altera.

Phu saxatile seu petræum, Gefn. hort.

Valeriana sylv. alpina 1. latifolia, Clus. hist.

XII. Valeriana alpina scrophulariæ folio:

quæ 6. in Phytop. 4. in Prodr.

an Vale-

an Valeriana inodora 1. Cæf.

XIII. Valeriana montana subrotundo folio.

Valeriana montana, Lugd.

XIV. Valeriana montana inodora.

Valeriana inodora altera, Cæf.

Valeriana annua ex Ilva, Cam.

XV. Valeriana alpina Nardo celticæ similis.

Valeriana fylv. alpina 2. saxatilis, Cluf. hift.

XVI. Valeriana alpina minor: quæ 5. in Prodr.

XVII. Valeriana rubra.

Polemonij altera species, Dod. gal. Gefn. hort.

Limonium Monspeliensium, Gefn. hort.

Ocymastrum Valerianthos, Ad. Lob.

Valeriana rubra, Dod. Tab. Cam. Ger. Eyft.

Valeriana inodora 3. Cæf.

Phu peregrinum, Cam. ep.

Sunt qui Narcissum Virgilij & Columellæ

in hortis: alij Behen rubrum: alij Struthium:

alij Conardum Plinij, l. 26. c. 5. velint.

XVIII. Valeriana rubra angustifolia: quæ

7. in Prodr.

XIX. Valeriana campestris inodora major.

Bupleuron Hipp. apud Plin. l. & c. 22. videtur.

Locusta quibusdam, Gefn. hort.

Phu minimum alterum, Lob. Lugd.

Album olus, Død.

Polypremum Cassiani: Chalceum Plinij, l. 26.

c. 7. a foliorum colore, Lugd.

Valeriana campestris, Cam.

Lactuca agnina, Tab. Ger.

Bupleuron, Cæf.

an Valerianella altera nudo umbilicato & bre-

vi femine, Col.

Variat magnitudine, folijs angustioribus,

latis & integris: quare figuræ duæ apud

Tab. & Ger. reperiuntur, & abortiva, floris ex-

plicatione ab insectis prohibita.

XX. Valerianella echinata.

Valerianella cornucopoides echinata, Col.

XXI. Valerianella femine stellato.

Phu minus petræum, Tab.

Valeriana petræa, Ger.

Valerianella altera tenuifolia se nunc Scabiosæ

stellato, Col.

XXII. Valeriana fylv. folijs tenuiss. divis.

Phu minimum, Ad. Lob. Lugd.

NARDUS MONTANA ET CELTICA.

Nardus montana, vocatur & ὄρεον & ὄρεανίζων, Diosc. l. 1. c. 7. at Celtica, qua Spica Celtica, vel Romana Officinis, Eid. cap. 8. vocatur & ὄρεανίζων sive Saliunca, & l. 6. c. 19. ὄρεον dicitur. Saliunca Plinio l. 21. c. 7. & 20. & Nardus Gallica, l. 1. c. 12. & l. 21. c. 20.

I. Nardus montana radice olivari.

Nardus montana, Matth. Ang. Ad. Lob. Lugd.

Cluf. hift. Cæf. Cam. Tab.

Radices binas, ternas & quaternas asphode-

limodo, habet.

II. Nardus montana radice oblonga.

Nardus mont. longius radicata, Cam. ep.

III. Nardus Cretica filipendulæ radice.

Nardus Cretica Valerianæ simillima, Hon.

Belli ep. 4.

Nardus Cretica Belli, Pon.

IV. Nardus Celtica Dioscoridis.

Nardus Celtica, Matth. Cord. hift. Gefn. hort.

Tur. Guil. (cui & Saliunca) Ad. Lac. Lob. Cast.

Cam. Tab. Ger.

Nardus alpina seu celtica, Cluf. pan. & hift.

Nardum gallicum, Cæf.

Spica Celtica, Lugd.

V. Nardus Celtica altera.

Spica celtica, fastigiato flosculorum ordine,

Cam. ep.

Spica celtica, Tab.

Nardus celtica repens, Ger.

VI. Nardus ex Apulia.

Saliunca Neapolitana, Lugd.

Phu minus Apulum, Tab.

VII. Nardo celticæ similis inodora: in

Prodr. descripta.

VIII. Nardo Celticæ similis hirculus.

Hirculus, Ad. Lob. Cam. ep. Cæf. Tab. Ger.

Hirculus veterum, Cluf. in Gar. Lugd.

Hirculus & Nardus Samphoritica, Ang.

CASPARI BAVHINI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER QVINTVS.

SECTIO PRIMA SOLANVM; MANDRAGORA; HYOSCYAMVS; NI- COTIANA; PAPAVER; HYPECOON; ARGEMONE.

S O L A N U M.

Solanum, ὄφιον *Græci* vocant, quod vitem, vel acinum, aut tale quid signat. Theoph. 19. hist. 12. 14. & 21. duo genera habet, ubi Gal. a Vescarium reddidit: ad Diosc. l. 4. c. 71. genera 4. recensuit: 1. ὄφιον ὑπναιον, *Solanum hortense*: 2. ἡλιμακρον ἢ φουκαλιδά, *halicacabum*, aut *Vescarium*: 3. ὄφιον ὑπναιον, *somniferum*: 4. μανικόν, *manicum*. Plin. l. 27. c. 13. *Solanum*, inquit. *Græci* *Strychnon* vocant: & l. 21. c. 31. *Strychni* genera 4. enumerat.

Solanum bacciferum.

I. *Solanum Officinarium.*

Solanum, Brunf. vulgare, Trag. minus, Cæs.
So'anum, Lon. hort. Matth. Fuch. Ang. Dod.
Gefn. hort. Lob. Lugd. Cam. Ger. fativum, Tab.
Solanum nigrum, Cord. in Diosc. & hist. quod
edendo est.

Cuculus & *Cacubalum* Plinij, Ang.

Solanum hort. Circeæ aut Phaeoli folio, Ad.

Variat folijs magis laciniatis, ut Fuch. figura:
alia *halicacabi*, ut Lob. exprimit: acinis nigri-
cantibus & fuscis: puniceis, quod *Solanum*
puniceum Cord. hist. rubris, luteis, quod *Sola-*
num luteum Gefn. hort. Sic in arenosis Michel-
feldæ vix palmam excedens, reperitur.

II. *Solanum vescarium*, quod folliculi ve-
sicæ inflatæ similes: vel ut Plin. l. 21. c. 31. quo-
niam vescicæ & calculis proferit.

Saxifraga rubra & 4. Brunf.

Solan. halicac. Trag. Matth. Lac. Ad. Lob. Lugd.

Halicacabum, Ang. Cast. vulg. Fuch. Tur. Eyst.

Halicacabum, vescarium, Cam.

Vescaria, Cord. in Diosc. Gefn. hort. Cæs.

Vescaria vulgaris, Dod. gal. prima, Cast.

Solanum vescarium, Gefn. hort. Dod.

Halicacab. sive vescaria, Cord. hist. Gefn. hort.

Alkekengi, Lon.

III. *Solanum vescarium Indicum.*

Halicacabum sive Solanum Indic. Cam. Eyst.

IV. *Solanum μελανόκρονον.*

Solanum hortense nigrum, Trag.

Mandragora, Theoph. Dod. gal. Ang. Guil. mo-
rion, Fuch. ico. Lon. tertia species, Cord. in Diosc.

Solanum majus, Matth. Cast. Cæs. Cam.

Solanum somniferum, Fuch. Tur. Ad. Lob. Lugd.

Solanum lethale, Dod. Clus. hist.

Solanum sylvat. Gefn. hor. syl. sive lethale, Thal.

Belladonna, Clus. pan.

Duum est generum: 1. folijs amplioribus &
flore majore: 2. folijs & floribus minoribus.

V. *Solanum somniferum bacciferum.*

Solan. somnifer. alt. Matth. Gefn. hor. Lug. Cam.

Solani lethalis aliud genus, Dod.

Solanum somniferum, Lon.

Solanum de Hiericho, Cast.

VI. an *Solanum manicum* ex Guinea.

Fructus minor & Paludani, Clus. ex l. 2. c. 20.

VII. *Solanum somniferum verticillatum.*

Solan. somnifer. Matth. Guil. Gefn. hor. Lac. Cl.

hisp. & hist. Dod. Ad. Lob. Cast. Lugd. Cæs. Cam.

Acini in folliculis hirsutis, per maturitatem

nunc rubri, nunc ex rubro crocei sunt.

VIII. Herba à militib. ad civitatem Philippi

evulsa & gustata, eos prope ad furorem & infla-

niam redegit, qui tamen affectus paulo post mi-

tior redditus: par 9. Ind. occid. addit. quid est?

IX. *Solanum fruticosum bacciferum.*

Strychnodendron, Gefn. hort. Ad. Lob. ob. Eyst.

Amonum, Gefn. hort. Lob. ico. Plinij, Ger.

Solanum arborecens, Cast. Cæs. Cam.

Solanum fruticosum, Gefn. hort. Tab.

Solanum Americanum, Lugd.

Pseudo-

Pseudocapsicum, Dod.

X. Solanum quadrifolium bacciferum.

After sed non Articus, Trag.

Herba paris, Matth. Ang. Dod. Cast. Cæs. Lugd.

Thal. Ger.

Paris herba, Lon. Cam.

Aconitum Pardalianches, Fuch. Tur.

Aconitum sive Pardalianches monococcon,

Cord. in Diosc. & hist.

Solanum tetraphyllum, Gef. hor. Ad. Lob.

Aconitum salutiferum, Tab.

Folia habet communiter quatuor, aliquando tria, quinque, & sex.

XI. Solanum triphyllum Brasilianum: 3. loco in Prodomo describitur.

XII. Solanum scandens seu Dulcamara.

Dulcis amara, Trag. Dulcamara, Dod. Lugd.

Amarum dulce, Cord. in Diosc.

Amara dulcis, Gef. hor. Ang. Lob. ic. Lon. Tab.

Vitis sylv. Matth. Lac. Cast. Cam.

Solanum γλονόκινος, Thal.

Salicatum Plinij, Guil. the. Cæs.

Circea Monspeliensis, Ad. Lob. ob. Cam.

Videtur quibusdam αμεινός & γία Diosc. l. 4. c. 183.

sed mucosum florem suae Viti tribuit. Salica-

strum Plinij lib. 22. c. 1. Alijs Cyclaminus altera

Diosc. & Melotron Theophrasti.

Floris color communiter cæruleus, rarius

albus est.

Dulcis amara flore pleno, &

Dulcis amara flore cæruleo vulgatiore, Eyf.

XIII. Solanum tuberosum esculentum, sub 19

in Phitop. sub 1. in Prod. & Matth. descriptum.

Picnocomus Dioscoridis, Cortuso.

Papas radix ex qua edulium Chunno dictum

conficitur: Joseph. Acosta l. 4. c. 17. imò panis lo-

co utuntur, quem Chunno vocant: Eid. l. 3. c. 20.

an Pape radices genus tuberum specie, sed exi-

gui saporis: part. 6. Ind. Occid. c. 20.

Arachidna Theoph. Papas Peruvian. Clus. hist.

Papas Peruanorum, Eyf.

Hujus aliud genus in calidioribus fundis, ex

quo fercula Locro appellata parant: Joseph.

Acosta l. 4. c. 17.

XIV. Solanum racemosum cerasorum for-

ma: pro 2. in Prod. descriptum.

Solanum pomiferum.

I. Solanum pomiferum fructu rotundo stria-

to molli.

Lycopersicon Galeni, Ang.

Poma amoris, Dodon. gal. Ad. Lobel. Cam. ep.

Tab. Ger.

Pomum amoris, Lugd. Cam.

Malum & pomum aureum, Gef. hor.

Aurea mala, Dod. Cast.

Solani pomiferi genus aliud, Gef. hor.

Tumulte Americanorum, Guil. pap.

Mala insana, Cæs.

Aliqui ad Solan. furiosum referunt: alijs Glau-

cium Dioscorid. est. Vide de Lycopersico, Dod.

Fructus communiter lutei, auricolores, ali-

quando pulchre rubentes: rarius albi: est &

surrectis cubitalib. cauliculis, quod per omnia

minus est.

Poma amoris fructu luteo, &

Poma amoris fructu rubro, & Mala Peruv. Eyf.

II. Solanum pomiferum fructu rotundo stria-

to duro.

Solanum pomiferum, Lob. Lug. Tab. Ger. Eyf.

Mala Æthiopica, Dod. Lugd. Ger.

Capficum rotundum Dalechampi, Lugd.

Folia magis minuscule sinuosa: in caule ali-

quando ut & in folijs, modo inferne, modo su-

perne, parvi aculei.

III. Solanum peregrinum fructu rutundo.

Hyoscyamus peregrinus Dalechampi, Lugd.

I. Solanum pomiferum fructu oblongo.

Mala insana, Trag. Fuc. Dod. Lac. Lon. Tab. Ger.

Malum insanum, Gef. hor.

Melongena, Matth. Cord. hist. Ad. Lobel. Cast.

Lugd. Cam. & Verengeria Toletanorum.

Solanum hortense & Pyra insana, Cæs.

Melanzana fructu pallido, Eyf.

Videtur Strychnon hort. Dioscoridis, urba-

num Theophr. Esculentum Galeni, & tertium

genus Plinij.

Variat flore purpureo, albo: fructu, albo, pur-

pureo, luteo: figura quandoque oblonga, ali-

quando instar mali rotunda.

V. Solanum pomiferum fructu incurvo.

Melanzana, Arabum Melongena & Bedengi-

an, Rauv. Lugd.

Variat colore fructus, qui flavus, cinereus, &

purpureus.

Solanum pomiferum fructu spinoso.

I. Solanum pomiferum fructu nigro spinoso

Melanzana nigra, Bathschain, Æthiopica,

Rauv. Lugd.

Fructu est longo, rotundo: atro, subnigro.

II. Solanum spinosum fructu rotundo.

Pomum

Pomum Hiericoniticum, Imper.

III. Solanum pomiferum folio rotundo tenui.
Cachos Indorum Monardi, Lugd.

IV. Solanum pomo spinoso rotundo, longo flore.

Stramonium sive pomum spinosum, Trag.

Nux metella, Matth. Cast. Acoft. Cam.

Nux methel Avicennæ, Ang. Fuch. Gef. hor.

Hyoscyamus Peruvianus, Cord. hist.

Tatula Turcarum, Guiland. pap.

Paracoccalon sive barycoccalon, Græcis recentior.

Melospinus Venetis: Malus Peruviana

Callis: corona regia quibusdam: Solanum Romanum Monspel. Guiland. l. c.

Stramonium, Fuch. Dod. Gef. hor. Lac. Lugd. Dodon. Cam. Eyft.

Stramonium peregrinum, Ad. (an Solanum manicum) Lob. Ger.

Hippomanes Cratevæ, Ang. Gef. hort.

Solani pomiferi genus 3. Gef. hor.

Solanum spinosum, Tab.

Solani pomiferi genus 3. Cæf.

Malum spinosum, Cæf.

V. Solanum foetidum pomo spinoso oblongo.

an Manicum Diosc. ex hoc Muslac fieri ajunt.

Tatoula, quæ Nux methel Arabum: Græcis,

Solanum somniferum, Bellon.

Datura, Garziæ, Acoft. Cast. Lugd. prima, Cast.

Nuci metellæ congener, Cam. ep. Tatula, Ei. hor.

Solanum manicum, Col.

Stramonium spinosum, Ger.

Datura Turcarum, Eyft.

Dutroa, Linsc. part. 2. Ind. Or. c. 33. part. 3. c. 1. & part. 4. c. 17.

Dutroa, Hispanis, Burlatoria: Arabibus: Marana: Persis & Turcis, Datula, Palud. in Linsc.

Variat floris colore: est vulgari flos albus

magnus: alterius flavus: tertij, Hyoscyami floribus accedit: quare tres Daturæ, Costæo: nunc

& purpureo habetur.

IV. Solanum foetidum pomo spinoso rotundo semine pallido.

Datura Ægyptiaca flore pleno, Pon. Ital.

Stramonium Ægyptiaca flore gemino altero alteri innato, C Bauhini, du Bry.

Communiter duo flores alteri innascuntur.

VII. Solanum Ægyptiacum flore pleno.

Stramonium Ægyptiaca flore pleno extrinsecus

purpurascens, intrinsecus albicante C. Bauhini, du Bry.

Solanifolia.

I. Solanifolia Circæa dicta major.

Lappa sylv. Trag.

Ocimum verrucarium, Gef. hort.

Circæa Luteriana, Lob. Dalech. Lugd. Ger.

Helxine fylvestris, sive fluvialis, Thal.

Herba D. Stephani, Tab.

Circæa, Eyft.

II. Solanifolia Circæa alpina.

Circæa minima, Col.

III. Solanum Mexiocanum flore magno.

Magnæ admirationis herba Peruviana, Lobel.

Castor.

Marabillas, del Peru & Hachal Indi, Clus. pan.

Admirabilis Peruviana, Eid. hist.

Gelsemium rubrum & Mandragora Theophr.

Cæfalp.

Gelsemium sive Jasminum Indicum, Cam.

Jasminum rubrum Dalechampij, Lugd.

Viola Peruviana, Tab.

Mirabilia Peruviana, Ger.

Jasminum Indicum seu flos mirabilis Peruanus, Eyft.

Jasminum Indicum flore rubro & variegato, Eidem.

Flores purpurei seu Kermesini coloris, laterici, flavi aut pallentes, obsoletè rubentes, exalbidi, binis coloribus ex purpureo & luteo mixtis: sic ex rubro, luteo, albo, in uno flore magna

varietas: nonnunquam albo & purpureo simul

dimidiatim in eodem flore tingitur: sive inæ-

qualibus vel latis, vel minutis maculis purpureis tam punctatim, quàm virgatim album colorem intercurrentibus, quandoq; radijs flavis

per longitudinem flores distinguuntibus.

IV. Solanum Mexiocanum flore parvo: sub

Solano 4. in Prodomo describitur.

V. Solanum Indicum hirsutum corymbiferum.

Solani Indici genus, Clus. exot. l. 4.

M A N D R A G O R A.

Mανδραγόρας, ἡ ἀντίμυλον, ἡ μανδρά Dioscor. l. 4. c. 76. Mandragora, quod ad mandras pecorum, aliis speluncas proveniat. Circæa, nomine à Circe deducto, quoniam radiæ ad amatoria conducere videantur.

Genera

Genera Diosc. nigra semina, quæ æpidaxias, & candida mas, vicior vocitata: tertium vicior, quod mari quidem simile, sed omnibus partibus minus est. Plinio l. 29. c. 13. Mandragora alia candida mas, alia nigra semina. At Theophr. 6. hist. 2: 9. hist. 9. & 6. caus. 4. Mandragora, a prædictis diversa est.

I. Mandragora fructu rotundo.

Mandragora mas, Trag. Fuch. Matth. Dod. gal. Lac. Cord. in Diosc. Ad. Lob. Lugd. Cam. masculus, Tur.

Mandragora, Ang. Mandragoras, Gef. hor. Cæf.

Mandragoras albus seu masculus, Cord. hist.

Mandragora mas vel alba, Cam.

II. Mandragora fructu pyri.

Mandragoras femina, Trag. Matth. Cordo in Diosc. Lac. Ad. Lob. Dod. Lugd. Cæf. Cam.

Mandragor. niger seu femina, Cord. hist. Cam.

III. Mandrag. flore subcæruleo purpurascete.

Mandragora femina, Clu. hisp. & hist. Cast. Eyst.

Mandragora, Lon. altera, Cæf.

HYOSCYAMUS.

Yconclauit Dioscorid. lib. 4. cap. 69. id est, saba suilla, vel porcina, quod apri ejus pastu resolvantur & convellantur, presenti mortis periculo, nisi aqua copiosa, statim se foris & intus polluerent, ut Aelianus prodidit. Dioscorides differentias tres proposuit: unam semine nigro, floribus penè purpureis: alteram semine subflavo, floribus luteis: tertiam mitissimam, candidi floris & seminis. At Plin. lib. 25. c. 2. Apollinaris genera plura sunt: unum semine nigro: alterum candidius: tertium Irionis semini simile: quartum candidi seminis ut maritimi: item rufi seminis.

I. Hyoscyamus vulgaris vel niger.

Hyoscyamus, Brunf. Tur. Matth. Lac. Lug. Cæf.

Hyoscyamus vulgaris, Gef. hort. Thal. Eyst.

Hyoscyam. 1. Ang. Tab. secundus Galeni, Trag.

Hyoscyam. niger, Dod. Lon. Ad. Lob. Cast. Ger.

Hyoscyamus flavus, Fuch. niger vulg. Clu. hist.

Apollinaris, Cord. in Diosc.

Folia integra, dissecta, in lacinias acutas divisa.

II. Hyoscyamus albus major, vel 3. Dioscor.

& 4. Plinij.

Hyoscyamus candidus, Trag.

Hyoscyamus albus, Matth. Dod. Gef. hort. Tur.

Lac. Ad. Lob. Lon. Cast. Lugd. Cam. Ger. Eyst.

secundus, Tab.

Hyoscyami alterum genus in maritimis, Cæf.

Apollinaris 3. Cord. in Diosc.

III. Hyoscyamus albus minor.

Hyoscyamus alter, Ang.

Hyoscyamus albus minor, Lob. ico. alb. vulgaris, Clu. hist.

IV. Hyoscyamus Creticus luteus minor.

Hyoscyamus 4. vel albus Creticus, Clu. hist.

V. Hyoscyamus Cretic. lut. major: hic sub

5. in Phytopinace, in Prod. etiam & Matthiolo

descriptus & pictus.

Hyoscyamus Creticus alter, Clu. hist.

VI. Hyoscamus rubello flore.

Hyoscyamus peregrin. rubello flore, Clu. pan.

Hyoscyamus Syriacus, Cam.

Alterum Camerarius addit, Hyoscyami pe-

culiaris nomine, qui sola foliorum latitudine à

prædicto differt.

VII. Hyoscyamus cauliculis spinosissimis.

Ægyptiacus.

Hyoscyamus Ægyptiacus, Clu. hist.

NICOTIANA.

Nicotiana à Jo. Nicotio Regis Gallia consiliario dicta, cujus opera, Anno 1560. Gallijs innotuit, quam Ulyssipone, dum legati munere fungeretur, à Belga è Florida Insula allatam, accepit.

I. Nicotiana major latifolia.

Hyoscyami tertia species, Gef. hor.

Sana Sancta Indorum, Ad. Lob. Ger.

Tabacum (ab ejus nominis Insula) Monar. Fra.

Tabacum latifolium, Cam. Eyst.

Petum, Theu. latifolium, Clu. ad Monar.

Hyoscyamus Peruvianus, Dod. Cam. ep.

Nicotiana, Lon. Lugd. major, Tab.

Perebecenuc, Oviedo, Lugd.

Tornabona, qui à Tornabonio missa, Cæf.

Herba S. Crucis femina, Cast.

Tubac & Tubacka: par. 5. Ind. Or. & par. 6. & 8.

Tabacum, Tabaco & Tabacca: par. 8. & 9. Ind.

Occid.

Y

Uppó-

Uppónvoc, Virgineæ indigenis: desc. Virgin.
Petum Brasiliensis, Stadio, l. 2. c. 13.

Arbustum cujus folia exsiccant & accensorum
fumo inebriantur, Benzon. l. 1. c. 26.

Lerius asserit Nicotianum licet apud nos Pe-
tum nominetur, attamen verum Petum Bra-
siliensium non esse, seque ne quidem in hortis
Galliæ vidisse, & apud nos ob cœli inclemen-
tiam ægrè adolescere posse credat.

Ex hujus herbæ fumo, octo aut novem die-
rum famem tollerare posse, in par. 3. Amer. ep. 1.
scribitur: at Lerio per triduum aut quadriduum.

II. Nicotiana major angustifolia: & Eyst.
Herba Sancta sive Tabacum minus, Lob. ob.
Tabacum sive herba Sancta minor, Lob. ico.
Petum angustifolium, Clus. ad Monar.

Hyoscyamus Peruvianus alter, Dod.
Herba Sanctæ Crucis mas, Cast.

Tabacum angustif. Cam. alterum minus, Lugd.
III. Nicotiana minor: & Eyst.

Hyoscyamus niger vel 3. Matth. Cast. Lugd.

Hyoscyamus luteus, Dod. Ges. hort. Lon. Cam.
Ger. multum cum 2. Diosc. convenit, Ang.

Hyoscyamus dubius luteolus Solanifolius, Ad.
Lobel.

Hyoscyamus Peruvianus, Tab.
Priapeja, à forma fructus, Ges. hor.

Petum quartum, Clus. ad Monar.
Tornabonæ congener, Cæf.

Nicotiana minor seu Hyoscyamus luteus, Eyst.
IV. Nicotiana minima.

Tabacum sive sana Sancta minima, Lob. Lugd.
Tabacum minimum, Cam.

Petum tertium, Clus. ad Monar.

V. An Nicotianæ species in Insula Mambo-
nit, pyratæ herbam quandam comedunt, quæ
inebriati & dementati, omnia pericula post-
ponunt: par. 7. Ind. Or. 20.

VI. Calsina herba è cujus succo potionem
conficiunt in Florida, quam bibunt ubi in lo-
cum periculosum se conferunt, quo famem & si-
tim per horas 24. tollunt: part. 2. Amer. navig. 4.

P A P A V E R.

MANUS à manu, non ministrando, quod videntes suis munis fungi non possint. Latinis Papaver,
Dioscorid. lib. 4. cap. 64. 65. & 66. quinque genera proposuit: I. Mῆνον ποῖον, papaver erraticum, à
flore protinus deciduo, qui puniceus, interdum albus. II. Mῆνον ἴσιον & papaver sativum, quod semine can-
dido, quod δοκονίτιον. III. Sylvestre duplex, unum nigro semine, quod πικρίτις & quibusdam ποῖον, quod è
scapo succus lacteus emanet: alterum majus sylvestre & ad medicinas valentius. IV. Mῆνον νεπαρίτις, ei est
nagῶν papaver corniculatum, à calyculo in corniculorum modum inflexo, aut marinum. V. Mῆνον ἀγρίον
aut papaver spumeum, quia herbula tota est spumea, quibusdam ἡγάνδρα Heracleum. Theophrastus sativi
i. hist. 15. & 9. hist. 8. meminit: Sylvestrū verò genera 9. hist. 13. plura notavit: ut corniculatum: nigrum: er-
raticum flore rubro: Herculanum folio Struthij. Plinius l. 20. c. 18. sativum album & nigrum proposuit, & ex
huius scapo inciso, opium colligi monet: at cap. 19. inter sativa & sylvestria medium genus, Rheas sive erraticum
constituit. Sylvestrium unum genus Ceratitidis, quod aliqui glaucion, alij paralion vocant: alterum est
heracleon, ab alijs aphron: tertium genus est tithymalon, mecona vocant, alij paralion.

I. Papaver hortense semine albo: sativum
Diosc. album, Plinio.

Papaver, Brunf. Ang. Lon.

Papaver sativum, Matth. Dod. gal. Lugd. Tab.

Papaver sativum purpureum, Tur.

Papaver album, Trag. Dod. candidum, Ad. Cæf.

Papaver album sativum, Ges. hort. Lob. Cast.
Gerard.

Papaver sativum semine candido, Fuch.

Flos candidus, vel leviter purpureus: ali-
quando flore est cinereo, ungue purpureo: vel
candido, rubris maculis infecto & semine fla-
vo; & hoc

Papaver tertium & luteum est, Trago.

II. Papaver hort. nigro semine: sylv. Dio-
scoridi: nigrum, Plinio.

Papaver nigrum, Brunf. Cast. minus, Ges. hort.

Papaver sativum alterum vulgo nigrum, Cord.
in Dioscor.

Papaver sativum semine atro, Fuch.

Papaver nigrum sativ. Dod. flore malvæ hor-
tensis aut Pœoniæ, Ad. Lob. Lugd.

III. Papaver vulgare cujus capitula forami-
nibus hiant, semine incano, ἀργυρίον, Dio-
scoridi.

Papaver vulgare & 1. Trag.

Papaver tertium, Dod. descr.

Papaver patulum, Ad.

Papa-

Papaver spontaneum sylv. Lob.

IV. Papaver flore rubro semine fusco.

Papaver rubrum, Trag. Gesn. hort.

Papaver sylv. Dod. gal. Lugd.

Papaver nigrum, vel 2. Dod.

V. Papaver cristatum floribus & semine

album.

Papaver candidum alterum, vel 6. Trag.

Papaveris sat. species folijs dissectis, Dod. gal.

Papaveris albi altera species florum folijs crenatis, Gesn. hort.

Papaver Memphiticum, floribus multifidis, Gesn. ap.

Papaver sativum 4. Dod.

Papaver fimbriatum aut cristatum album, Ad. Lob. Lugd.

Papaver flore fimbriato, Cæs. flore niveo, Tab.

Papaver sativum nigrum, Ger.

VI. Papaver cristatum floribus rubris, semine nigro.

Papaver rubrum alterum, vel 7. Trag.

Papaveris rubri species folijs florum crenatis, Gesn. hort.

Papaver sativum nigrum cristatum, Ad.

Papaver fimbriatum aut cristatum nigrum, Lob.

Papaver 2. folijs dissectis, Dod.

Papaver sativum rubrum fimbriatum, Lugd.

Hæ duæ species floris colore variant, subinde albus, frequenter rubeus, quandoque ex utroque mistus: & qui rubet, aliquando colore

purpureo, aliquando dilutius rubet: hinc

Papaver flore pleno rubeum.

Papaver flore multiplici incarnato.

Papaver flore multiplici purpurascete.

Papaver flore miniato pleno.

Papaver flore pleno argentei coloris.

Papaver multiplex album oris rubicundis, ex hort. Eyft.

VII. Papaver pleno flore album.

Papaver flore multiplici, Gesn. hort. Cam. ep.

Papaver polyanthos, Tab.

Papaver alb. polyanthon seu multifl. Lob. Ger.

Papaver flore multiplici numero denso, Cæs.

Est majus & minus: floris colore purpureo, rubro, rubeo saturato, albo, violaceo & mixto:

hinc septem figuræ apud Tabernæmontanum & Gerardum habentur.

VIII. Papaver pleno flore nigrum.

Papaver nigrum polyanthon, Lob. Ger.

IX. Papaver laciniatis floribus.

Papaver laciniatum rubrum, aliud unguibus purpureis, aliud unguibus albis, Eyft.

X. Papaver errat. majus: *poleas* Dioscoridi, Theoph. Plinio.

Papaver rubrum, Brunf. erraticum, Eid.

Papaver erraticum, Matth. Cord. in Dioscorid.

Gesn. hort. Lac. Lon. Dod. Cast. Cæs. Thal. Tab.

rubrum, Eyft.

Papaver erraticum primum, Fuch.

Papaver Rhœas, Lob. Ger. prius, Lugd. alterum, Dod. gal.

Papaver rhœas five caduco flore puniceo, Ad. Lob. ico.

Flore est puniceo, rarissimè albo.

XI. Papaver erraticum pleno flore.

Argemone multiplex, Trag.

Papaver rhœas flore pleno, Cam.

XII. Papaver errat. Pyrenaicum flore flavo: quod pro primo in Prodromo describitur.

XIII. Papaver erraticum minus.

Argemone exigua, & 2. Trag. Lugd.

Argemone, Lac. Lon.

Papaver rhœas, Dod. gal. rhœas minus, Lugd.

Papaver erraticum alterum, Fuch. Dod.

Papaver erraticum minus, Tab.

XIV. Papaver corniculatum luteum: *ma-*
gallens Diosc. Theoph. sylv. ceratidis, Plinio.

Papaver sylv. corniculatum, Trag.

Papaver corniculatum, Matth. Lac. Ad. Lobel. Cast. Cæs.

Papaver corniculatum primum, Tab. majus, Dodon.

Papaver corniculatum luteum, Fuch. Tur. Eyft.

Papaver corniculat. flavo flore, Clus. hist. Eyft.

Papaver cornutum, Dod. gal. Cord. in Diosc. & hist. Gesn. hort. Lon. Lugd. Cam.

XV. Papaver cornic. phœniceum hirsutum.

Papaver cornutum rubro flore, Gesn. hort. Ger. flore phœniceo, Ad. Lob. Clus. hist.

Papaver cornutum alterum floribus rubris, Cam.

Papaver corniculatum, rubrum, Dod.

Papaver corniculatum alterum, Lugd. Tab.

Flos interdum intensè rubens, interdum languidus, aliquando pallidus.

XVI. Papaver corniculatum phœniceum glabrum.

Papaver corniculat. phœniceum alterum, Lob. ico. phœniceo pallescente flore, Clus. hist.

XVII. Papaver spinosum: quod sub 15. in Phytopinace, sub 2. in Prodr. & in Matthiolo

descriptum & pictum : quo etiam nomine postea Clus. in sua hist. & Eyst. proposuere.

Ficus infernalis Italarum.

an Glaucium Dioscoridis : γλαυκίον succus est herbæ folijs ferè papaveris corniculati, quæ crocei coloris succo copioso prædita sunt Dioscorid. lib. 3. cap. 100. Et hujus papaveris folia, succo flavescente, instar Chelidoni majoris, abundant.

XVIII. Papaver corniculatum violaceum. Papaver cornutum flore violaceo, Gesn. hort. Ger.

Papaver corniculatum violaceum, Lob. Dod. Lugd. Cast. violaceo flore, Clus. hist.

Anemone Narbonensis major corniculata, Advers.

Anemone major corniculata Penæ, Lugd. Flores cærulei, & nigræ violæ æmuli.

HYPECOON.

Υψέκοον οὐ δὲ ὑπέκοον, papaveri Dioscorides, lib. 4. cap. 68. subijcit, cum eadem ei sit natura, quæ succo papaveris. Et Plin. lib. 27. cap. 11.

I. Hypocoum.

Cuminum sylv. alterum, Matth. Cast. Lugd. Tab. Cam.

Hypocoum, Gesn. hort. Dod. Clus. hisp.

Hypocoum legitimum, Eid. hist.

Cumino filiquoso persimilis, Ad.

Cuminum sylv. alterum Dioscorid. Italarum, Lob. ob.

Cuminum sylv. alterum filiquosum, Eidem icon.

Cuminum corniculatum, Ger.

II. Hypocoi altera species.

Cuminum alterum Diosc. filiquosum, Ad.

Cuminum alterum Dioscor. sylv. filiquosum, Lob. icon.

Cuminum sylv. filiquosum Penæ, Lugd.

Cyminum sylv. 3. & filiquosum minus, Tab.

Cuminum filiquosum, Ger.

A priore differt folijs angustioribus, longioribus, glaucis, filiquis deorsum recurvis.

ARGEMONE.

Αργέμον in totum papaveri sylv. simile Dioscorid. lib. 2. cap. 208. radicem rotundam tribuendo, quod nostræ non convenit. Sic dicta, quod ἄγρυα oculorum & nubeculas expurget, Plinio, lib. 25. cap. 9. Argemonia : nostri tria genera faciunt : & id demum probant, cujus radix thus redoleat. Sed videtur Plinius quatuor genera agnoscere, ut lib. 21. cap. 23. Anemonem, quam Argemonem vocari dixit : 2. genus hoc est : 3. genus, lib. 24. cap. 19. lappam Canariam, cujus radix jucundum odorem, thuri similem spirat. Argemonem nuncupari tradit : 4. genus statui potest, Inguinaria, quam lib. 26. cap. 9. etiam Argemonem appellari testatur.

I. Argemone capitulo breviori.

Anemone minor, Coriandri folio, flore Pulsatillæ, capitulis hirsutis, Ad.

Argemone capitulo torulis canulato, Lob. Ger.

Argemone minor capitulis brevioribus, Lugd.

Argemone, Cast. prima, Tab.

Anemone minor Penæ, Lugd.

II. Argemone capitulo longiore.

an Argemone, Cord. hist.

Anemone Narbonensis major corniculata, Ad.

Argemone capitulo longiore, Lob. Lugd. Ger.

Papaver erraticum alterum, Cæs.

Argemone 2. Tab.

III. Argemone alpina folijs Scandicis lutea : in Prodr. descripta.

IV. Argemone alpina Coriandri folio.

Argemone lutea, Ponæ Ital. qui in Baldo collatam transmisit.

SECTIO

SECTIO SECUNDA.

ANEMONE; PULSATILLA; ADONIS.

ANEMONE.

A ^{Nequora Dioscoridi, lib. 2. cap. 207. Anemone, Plinio, l. 21. c. 23. ἀνὸν τὸ ἀνέμω, à vento, quod flos tantum vento flante aperitur, unde & Herba venti quibusdam.}

Genera duo Diosc. & Plinio, sylvestre & sativum: hujus, inquit, multa species, phaniceo flore, altera candidante, aut lacteo, aut purpureo.

Anemone latifolia simplicis flore.

I. Anem. Cyclamini seu malvæ folio lutea.

Anemone latif. Clus. hisp. Lob. Lugd. Tab. Ger.

Anem. hort. latifol. i. simpl. flavo flore, Clus. hisp.

Flos 10. aut pluribus folijs constans, externè flavus, internè aureus.

II. Anem. Geranei rotundo fol. purpurascens.

Anemone latifol. altera, Clus. hisp.

Anemone hort. latifol. simpl. flore 3. Eid. hisp.

Anemone i. Dod. Cæs.

Anem. rubrosa bulbocastani radice, Lob. Ger.

Anemone papaveracea, Tab. Ger.

Anemone stellata purpurea & alba, Eid.

Geranium i. quorundam Dalech. Lugd.

Flos ex 12. aut 15. folijs, foris cineraceis hir-

sutis, interius rubedine purpurea nitentibus

componitur: quare in dilutiore purpura rubet:

alias interius inflores, exterius remissiore:

tarius totus albet.

III. Anemone Geranei rotundo folio dilu-

tè purpurascens.

Anemone hort. latifolia 4. simpl. flore, Clus. hisp.

Flos externè exalbidi obsoleti coloris, in-

ternè ex purpura dilutiore albicat.

IV. Anem. Geranei rot. folio dilutè rubens.

Anemone hort. latifol. 5. simpl. flore, Clus. hisp.

Floris folia octona foris obsoletè rubent, lan-

guine pubescunt: interius dilutiore rubore &

ad carneum tendente nirent, unguib. albicant.

V. Anemone latifol. simplici carneo flore.

Anemone hort. latifol. 6. simpl. flore, Clus. hisp.

Flos 10. aut 12. foliorum purpurei ferè colo-

ris, unguibus albicantibus.

VI. Anemone latifolia flore purpureo saturo.

Anemone hort. latifol. 8. simpl. flore, Clus. hisp.

Flos 8. foliorum, coloris purpureo saturi, ex-

terius splendentis unguibus magnis & ad pe-

diculum purpureis.

VII. Anemone latif. purpureo violaceo flore.

Anemone hort. latif. 12. simpl. flore, Clus. hisp.

Flos octo folijs constans, externè dilutè pur-

purascens splendet; internè violaceus, ungui-

bis magnis & argentei coloris.

VIII. Anemone latifolia flore purpuro-

violaceo altera.

Anemone hort. latifol. 13. simpl. flore, Clus. hisp.

Flos qui ex 12. folijs constat: foris ex purpu-

reo albescit & splendet: interius ex violaceo

purpureo splendet, unguibus albis.

IX. Anemone latifolia violaceo flore.

Anemone hort. latif. 9. simpl. flore, Clus. hisp.

Flos octo vel plurium foliorum, externè sub-

purpureus & splendens, internè ex purpura

violaceus, unguibus rubescentibus, orbe albi-

cante cinctis.

X. Anemone latif. fl. violaceo saturo colore.

Anemone hort. latifol. 11. simpl. flore, Clus. hisp.

Flos sex folijs præditus, violacei saturatioris

coloris, unguibus majorib. magisq. candidis.

XI. Anemone latifolia flore variegato.

Anemone hort. latifolia 7. simpl. flore, Clus. hisp.

Flos qui octifolius, foris ex purpureo saturo

tus rubet, interius ad unguis usque albus satu-

ra purpura & quasi Kermesina niter: oris coc-

cineis, in quæ radij purpurascens spargun-

tur: unguis magnos & albos habet.

XII. Anemone latifolia punctato flore.

Anemone hort. latifol. 10. simpl. flore, Clus. hisp.

Flos octifolius violaceus, interna parte ma-

culis albis aspersis.

XIII. Anemone latifolia flore carneo.

Anemone hort. latifol. 14. simpl. flore, Clus. hisp.

Floris modò majoris, modò minoris, octo

folia extrinsecus nonnihil purpurascunt, in-

trinsecus ferè carnei, vel saturatioris, vel dilu-

tioris, unguibus albis.

XIV. Anemone latifolia Saniculæ folio.

Anem. simplex latif. dilutè purpurascens, Eyst.

Y 3

XV. Anem.

XV. Anemone latif. flore orangei coloris.
Anemone hort. latif. 15. simpl. flore, Clus. hist.

Floris octo vel novem folia, externè carnei coloris, unguibus saturatè purpurascens, internè carnei diluti: Habetur major & minor.

XVI. Anemone latifolia flore coccineo.

Anemone hort. latif. 16. simpl. flore, Clus. hist.

Floris octo folia, internè elegantissimo coccineo nitent, unguibus orbis pallescens ambit, externè quadam lanugine pubescunt: huc pertinet Anemone latifolia fl. coccineo simplici, Eysf.

Flos coccinei coloris, medium è fusco nigricans & capitulum multis folijs staminulis pallidè virentibus septum.

XVII. Anemone latif. flore magno coccineo.

Anemone hort. latif. 17. simpl. flore, Clus. hist.

Floris octo folia internè elegantissimo coccineo colore fulgent, nullis unguibus apparentibus, externè color dilutior; & lanuginosa.

XVIII. Anemone latifolia flore coccineo phoeniceo.

Anem. latif. Byzantina coccin. colore, Clus. pan.

Anemone hort. latif. 18. simpl. flore, Eid. hist.

Flos amplius octifolius, coloris ex coccineo phoeniceo, ut in Rheade, unguibus parvis subpallidis.

Anemone tenuifolia simplici flore.

I. Anemone Geranei Ropertiani folio cærulea: an Dioscoridis?

Anemone tenuifolia tertia, Clus. hisp.

Anemone hortensis tenuifolia simplici flore 1. Eid. hist.

Anemone 2. Dod. Lugd.

Anemone tuberosa Geranifolia, Lob.

Anemone montana, Cæs.

Anemone Ropertiana, Tab. geranij folia, Ger.

Flos ex 14. aut 15. foliolis mucronatis compositus, coloris est cærulei, vel rubri, vel ex utroque mixti: est externa parte subcærulei, interna albi: sic flore nunc cæruleo, nunc rubro, nunc albo reperitur: quare Tabern. tres species, alba, cærulea & rubra.

II. Anemone tenuifolia flore multifido dilutè purpurascens.

Anemone hort. tenuif. 9. simpl. flore, Clus. hist.

Flos ex 14. & plurib. foliolis dilutè purpureis, & quasi carneis, nullis unguibus vestigijs constar.

III. Anemone cœnanthes folijs flore violaceo hexaphyllo.

Anemone tenuifolia altera, Clus. hisp.

Anemone hort. tenuif. simpl. flore 2. Eid. hist.

Anemone tertia, Dod. Lugd.

Anemone bulbosa radice, Ad.

Anemone tuberosa radice, Lob. ob. Ger.

Anemone, Cast. angustifolia, Tabern. tenuifol.

Cam. at. i. in epist.

an Anemone altera, Cæs.

Anemone tenuifol. fl. purpureo violaceo, Eysf.

Flos, qui ex 6. interdum 7. & 8. folijs compositus est, communiter est purpureus seu violaceus, externa parte lanuginosus: est ruber seu phoeniceus, vel ex purpura rubens: est & albus: quare apud Tabernæmontanum.

Anemone corallina violacea & alba: &

Anemone angustifolia, & 4. & apud Gerard. figuræ tres.

IV. Anemone tenuifol. fl. pallidè coccineo.

Anemone hort. tenuif. 16. simpl. flore, Clus. hist.

Flos hexaphyllus, foris tenui lanugine pubescens, coloris dilutè rubescens, internè coccinei valdè diluti, unguibus amplis albis.

V. Anemone tenuif. coccineo fl. hexaphyllo.

Anemone hort. tenuif. 3. simpl. flore, Clus. hist.

an Anemone alterum genus, Cæs.

Flos floridi coccinei coloris, unguibus magnis, ex pallido, fusco & albo mixtis.

VI. Anem. tenuif. coccineo flore octophyllo.

Anemone hort. tenuif. 4. simpl. flore, Clus. hist.

Flos internè coccineus, unguibus albis, & externè coccineus, tenui lanugine pubescens & splendens.

VII. Anemone tenuifolia flore magno coccineo hexaphyllo.

Anemone tenuif. coccineo flore simp. Clus. pan.

Anemone hort. tenuif. 5. simpl. flore, Eid. hist.

Flos intus elegantissimus coccineo colore nitet, foris lanugine pubescit: unguibus albi sunt.

VIII. Anem. tenuif. flore coccineo sanguineo.

Anemone hort. tenuif. 7. simpl. flore, Clus. hist.

Flos 5.6. interdum 7. foliorum, coloris coccinei, ad sanguineum vergentis, unguibus magnis exalbidis, purpureis venis distinctis: aliquando flos ad costæ lateris colorem accedit, nec splendet.

IX. Anem. tenuif. flore sanguineo coccineo.

Anemone hort. tenuif. 8. simplici flore, Clus. hist.

Floris sex folia, externè lanugine obducta, coloris sunt sanguinei saturatoris & splendentis, internè sanguinei coccinei permixti.

X. Anem.

X. *Anemone tenuifolia* flore sanguineo coccineo altera.

Anemone hort. tenuifol. 20. simp. flore, Clus. hist.

Flos major hexaphyllus, sanguineo colore, vel inter coccineum & cochinelium medio, unguibus minoribus, & albicantibus.

XI. *Anemone tenuifolia* flore ex sanguineo & coccineo medio.

Anemone hort. tenuifol. 19. simp. flore, Clus. hist.

Flos hexaphyllus, coloris ex sanguineo & coccineo medij, diluti, ei prorsus similis quem vulgus cochinelium appellat: unguis magni, albi & quasi argentei.

XII. *Anemone tenuifolia* flore amplo sanguineo hexaphyllo.

Anemone hort. tenuifol. simp. flore 6. Clus. hist.

Flos coloris sanguinei elegantissimi, unguibus magnis albis.

XIII. *Anemone tenuifolia* flore amplo atroturbente.

Anemone hortensis tenuifolia 17. simplici flore, Clus. hist.

Flos hexaphyllus, coloris sanguinei ex atroturbentis & quasi sericei panni villosi Kermesino colore præditi, cærulei.

XIV. *Anemone tenuifolia* fl. rubro saturo.

Anemone hort. tenuifol. 16. simp. flore, Clus. hist.

Flos hexaphyllus, ruber, seu potius sanguineus, unguibus magis saturis, venis albicantibus distinctis.

XV. *Anemone tenuifolia* flore niveo.

Anemone hort. tenuifol. 13. simp. flore, Clus. hist.

Flos hexaphyllus niveus, cujus unguibus carnei quid aspersum: apicibus ex obscura purpurea nigricantibus.

XVI. *Anemone tenuifolia* flore amplo candido.

Anemone hort. tenuifol. 12. simp. flore, Clus. hist.

Flos hexaphyllus, prorsus candidus, unguibus externè virescentibus, apicibus nigris.

XVII. *Anemone tenuifolia* Cretica flore magno albo: quæ in Prodr. sub 1. descripta est.

XVIII. *Anemone tenuifolia* fl. albicante.

Anemone hort. tenuifol. 15. simp. flore, Clus. hist.

Flore est hexaphyllo candicante, staminibus albis, apicibus subcæruleis.

XIX. *Anemone tenuifolia* flore exalbido majore.

Anemone hort. tenuifol. 10. flore simp. Clus. hist.

Anemone tenuifolia carneo flore, Clus. pan.

Flos magnus, hexaphyllus, coloris primum

exalbidi virescentis, dein ad carneum tendentis, unguibus externè virescentibus, internè albis, staminibus carnei coloris.

XX. *Anemone tenuifolia* fl. exalbido minore.

Anemone hort. tenuifol. 11. simp. flore, Clus. hist.

Flos minor ex 6. 8. & pluribus foliolis compositus, coloris extrinsecus carnei albo mixti: intrinsecus verò prorsus ferè albi: unguibus & venis ex albo paululum virescentibus.

XXI. *Anemone tenuifolia* flore furvo albicante.

Anemone hortensis tenuifolia 21. simplici flore, Clus. cur. post.

Flos ex cineraceo sive furvo, albicans, & tenui velut rubedine perfusus, ut ferè est Capucinatorum pannus.

XXII. *Anemone tenuifolia* flore carneo striato.

Anemone hort. tenuifol. 14. simp. flore, Clus. hist.

Flos hexaphyllus externè carneus, oris albicantibus: internè exalbidus, venis carneis ad medium folium sparsis, staminibus purpureiscentibus, apicibus nigricantibus.

XXIII. *Anemone tenuifolia* flore magno suaverubente, unguibus albis.

Anemone tenuifolia flore suaverubente Caccini: ad Clus. cur. post.

Has varietates, ratione fieri credibile est, cum

in alijs quibusdam plantis etiam contingere observatum sit. Nam natura, in florum Anemonum coloribus, non minus quàm in Tulipis & Iridibus ludit: ita ut plusquàm triginta discrimina in colore, aut unguum varietate, aut foliorum numero observata fuerint.

Anemone Matthioli.

Omnes Anemones singulares caules, interdum duos aut tres, vel pures, nullis ramis præditos proferre observatum fuit, nisi fortè id naturæ lusu contingat, uno alterove ramulo inter superna folia summum caulem amplectentia, enato. Quare, quid Matthiolus suis Anemonibus quatuor propositis velit, non assequimur: omittere tamen nolimus.

I. *Anemone prima*, Matth. Lugd.

II. *Anemone secunda*, Matth. Lugd.

an *Ranunculus* flore globoso.

III. *Anemone quarta*, Matth. (at in edit. secunda, 1.) Cast. Lugd.

Anemone, Lac. *Anemon. ramosa* purpurea, Tab.

IV. *Anemone quinta*, Matth. (at in edit. secunda *Anemone altera*) Cast. Lugd.

Anemone altera, Lac.

Anemo-

Anemone ramosa lutea, Tab.

V. Anemonia varia radice fibrosa peregrina.
Anemones genera varia, floris rosei, lutei, purpurei varietate distincta, aspectu pulchra: vario floris colore, aliàs rubro, aliàs purpureo, nonnunquam luteo, observavit Rauvolfius in suo Itinere Hierosolymam versus, & obiter Lugd. herb. attrigit.

Anemone flore pleno.

I. Anemone latifolia maxima versicolor.
Anemone latifolia flore multiplici, Clus. hisp. & pan. Lugd.
Anemone hort. latifol. pleno flore 1. Eid. hist.
Anem. max. polyanthos Chalcedon. Lob. Ger.
Anemone Chalcedonica major, Tab.

Folia florum externa & majora dena aut duodena, viridia sunt, eorum mucronibus coccineo colore leviter & virgatim infectis: interna minora & angustiora, dilutior purpura ex rubro nitent.

Aliquando, ex prædicto flore uncialis pediculus, minorem florem ex octo latiorum foliorum partim viridium, partim coccineorum compositum, sustinet, quam pro quarta posuimus.

II. Anemone latifolia flore coccineo.
Anemone hort. latifol. pleno flore 2. Clus. hist. Differt à priore, quod in hac floris umbellum glomerata & reflexa folia non occupant.

III. Anemone latifolia coccineo flore duplo veletiam triplo densiore & pleno, quam prior sit, Clus. cur. post.

IV. Anemone latifolia Pavo dicta major 1.
Anemone hort. latifol. Pavo major 1. Clus. hist.

Flos unicus 20. 30. aut pluribus folijs constans, eleganti, saturato splendidoque coccineo colore præditis, unguibus sanguineis, orbe pallido cinctis.

V. Anemone latifolia Pavo dicta major prolifera.
Anemone pavota latifolia multiplex flore miniat, Bry.

VI. Anemone latif. Pavo minus polyphylla.
Anemone hort. latifol. Pavo major 2. Clus. hist.
Anemone hort. fl. pleno coccineo variegata latifolia, Eyst.

Hæc flores minus plenos profert, interdum simplici, octo, novem, aut decem foliorum serie constantem.

VII. Anemone latifolia flava.
Anem. hor. latif. duplo flore flavo, Clus. hist. Eyst.

an Anemone multifido & lanuginoso folio, quod in Apulia luteo flore reperitur, Ang.

VIII. Anemone tenuifolia multiplex rubra.
Anemone multiplex rubra, Clus. hisp.

Anem. flore polyphylo tenuifolia, Eid. pan.
Anem. hort. tenuifolia pleno flore, Eid. hist.

Anemone 4. Dod.
Anemone flore multiplicato coccineo, Lob. colore tenuifolia, Eyst.

Anemone coccinea multiplex, Ger.
Flore est rubro, cæruleo, albo.

IX. Anemone tenuifol. multiplex purpurea.
Anemone tenuifolia pleno purpureo flore Caccini, Clus. cur. post.

Est etiam quæ purpureo cæruleum florem, alia quæ suaverubentem & nigrum profert.

X. Anem. tenuif. multip. atropurpurea.
Anemone tenuifolia pleno flore ex atropurpurea, Clus. cur. post.

XI. Anemone Geranei rotundi folio plena.
Anem. latif. purpurorubescens plena, Eyst. descripta ab Anemone hort. latifolia 3. Clusij sola multiplici foliorum serie differt.

Anemone sylvestris.

I. Anemone sylvestris alba major.
Anemone 3. Matth. Cast. Lugd. flore albo, Lob.

Anemone alpina, Gef. fra.
Anemone pannonica, Dod.

Anem. sylv. 1. Clus. pan. & hist. Lob. ad. par. 2.
Anem. syl. flore candido, Thal. syl. fl. albo, Eyst.

Anemone major alba, Tab.
Ranunculi 11. species, Cord. hist.

Aconito cognata videtur, Gef. hor.

II. Anem. syl. alba minor: pro 1. in Prod. descripta
III. Anem. alpina alba major: quæ 2. in Prod.

IV. Anem. alpina alba minor: quæ 3. in Prod.
V. Anemone nemorosa flore majore.

an Anemone λευκώρια, Theoph.
Sanicula minor quibusdam, Brunf.

Ranunculus candidus, Trag.
Ranunculi 4. species, Fuch. Cord. hist. Lugd.

Ranunculus 6. Tur. 8. Lon.
Ranunculus parvus, Dod. gal.

Ranunculus phragmitis, Gef. hor.
Ranunculus nemorosus, Ad. Lob. Tab.

Eneaphyllon, Ang.
Ranunculus sylvarum, Clus. hist.

Anemone 5. Dod. sylv. vulgaris, Clus. pan. montana, Cæs.

Anem. nemorum alba, purpurea, coccinea: Gef. Ranunc.

Ranunculi 3. tertium & quartum genus, Thal.

Flore est candido, aut ex purpura rubente, modo dilutior, modo intensiore colore, subcæruleo, carneo, roseo: hinc Taber. tres figuras habet, Ranunculi albi, purpurei, & ex rubro purpurei nomine, & Thalius tertio generi quod flore est candido, species tres tribuit, folijs & floribus majoribus, minoribus & medio modo donatis: quartum è candido rubet, & ratione foliorum majus & minus est.

VI. Anemone nemorosa flore minore: hæc in Prodomo 1. est.

Ranunculi tertij generis species min. Thal.

VII. Anemone nemorosa sterilis folijs punctatis.

Ranunculi tertij quintum genus, Thal.

Ranunculi nemorosi vitium *γῆγορρα*, Cat. Altorff.

VIII. Anemone nemorosa flore pleno albo.

Anemone limonia pleno albo flore, vel

Ranunc. sylvar. pleno albo flore, Clus. hist. Eyff.

IV. Anemone nemorosa flore pleno purpur.

Anemone limonia pleno purpureo flore, vel

Ranunculus sylvar. pleno flore purpurascens, Clus. hist.

Ranunculus nemorosus flore pleno, Eyff.

X. Anemone nemorosa affinis peregrina 1. candido aut purpurascens flore.

Anemone *λεμόνια* peregrina 1. Clus. hist.

XI. Anemone nemorosa affinis peregrina 2. flore herbacei coloris.

Anemone *λεμόνια* peregrina 2. Clus. hist.

PULSATILLA.

A Nemones alterum genus quæ Limonia vocatur, Plin. l. 21. c. 11. ex Theophr. 6. hist. 7. Anemone genus (Ga-
za Fremium vertit: Plin. l. 21. c. 23. Phenion habet) quod Leimonion vocant: hanc sunt qui Pulsatillam
esse velint. Pulsatilla nominatur, quod seminum tremuli pappi levissimo statu, huc atq. illuc agitentur, unde
Herba venti dicitur, quare *ὄψυγον* dici potest.

I. Pulsatilla folio crassiore & majore flore.

Rüchschell/Brunt.

Herba venti, Trag. Lon.

Pulsatilla Matthiol. Gesn. hort. Cast. Dod. Ad.

Lugd. Tab.

Pulsatilla vulgaris, Lob. Ger. recentiorum, Cæ-

salp. communis, Cam.

Pulsatilla vulgaris dilutior, Clus. pan. & hist.

Herba Sardoæ, Dod. gal.

Anemone sylv. Fuch. communis, Tur. monta-

na, Gesn. hort.

Anemone species, Gesn. hor. Thal.

Anemone 10. vel leptophyllon, Cord. hist.

Anemone limonia & Samolus Plinij, Dalech.

in Plin.

Ranunculus 2. Lac. Diosc. 2. species, Gesn. hor.

Colore ut plurimum violæ nigræ purpureo,

& obsoletiore intensiore & remissiore pro loci

ratione: in umbrosis dilutior, in apricis colo-

ratione: pleno etiam flore reperiri significatum.

II. Pulsatilla folio tenuius inciso & flore mi-

nore, sive palustris: hæc in Prodomo primo

loco describitur.

III. Pulsatilla flore minore nigricante.

Pulsatilla altera, Dod. Lugd.

Pulsatilla flore clauso, Lob. ico.

Pulsat. vulg. saturatior flore, Clus. pan. & hist.

IV. Pulsatilla apij folio vernalis flore majore: quæ 2. in Prodomo.

V. Pulsatilla apij folio vernalis flore minore: quæ 3. in Prodr.

VI. Pulsatilla apij folio autumnalis: quæ 4. in Prodr.

VII. Pulsatilla folio Anemones secundæ, sive subrotundo: quæ 5. in Prodomo.

VIII. Pulsatilla flore rubro obtuso.

Pulsatilla rubra, Dod. Ad. Lob. Lugd. Tab. Ger. an Anemone 4. Cam. ep.

IX. Pulsatilla flore albo.

Anemone alpina, Gesn. fra.

Anem. syl. 2. Clus. pan. & hist. Lob. ad. part. 2.

Pulsatilla alba, Lob. Lugd. Tab. Ger. flore candido, Dod.

Flos intus lacteus, exterius nonnihil purpurascens.

X. Pulsatilla lutea apij hortensis folio.

Pulsatilla secunda alpina, Lugd.

XI. Pulsatilla lutea pastinacæ sylv. folio.

Pulsatilla lutea, Gesn. hor. Ad. Cam. ep.

Pulsatilla tertia alpina, Lugd.

Anemone sylv. tertia, Clus. hist.

XII. Pulsatilla lutea alpina hispidior.

Pulsatilla prima alpina Lugd.

an Anemone lutea, Ang.

ADO-

A D O N I S

Adonidis floris meminit Ovidius 10. Metamorph. qui Anemone esse à multis creditur: alij huic sequenti tribuunt. Verum quia ratione capituli cum Ranunculis conveniat, inter Anemones & Ranunculos repositimus: Quibus dum & Theoph. à floris flammæo igneoq; colore: & 6. hist. 6. inter vernos flores recenset.

I. Adonis hortensis.
Anemone hort. Trag. Lugd. Anemone, Lon.
Anemone tertia, Tab.

II. Adonis flore majore.
Anthemis eranthemos Dalechampi, Lugd.

III. Adonis hort. flore minore atrorubente.
Adonis recentiorum, aut Adonium Poetarum, species Anemone, Ad.

Adonis recentiorum, Lob. ob. flos Adonis, Eid. ico. Cam. Ger.

Flos Adonis vulgo, Clus. hist.
Eranthemum, Dod.

Adonium, Tab.

Flos habetur miniati, lutei coloris: hinc
Adonium & Adonium luteum, Tab. (rib.)

IV. Adonis syl. fl. phæniceo ejusq; fol. longio-

Anemone agrestis, Trag.

Anemone tenuifolia, Cord. in Diosc. Gesl. hist.

Anemone tenuifolia, Cord. hist.

Adonis, Matth. Lugd.

Chamæmelum eranthemum vel purpureum,

Dod. gal. rubrum, Gesl. hort.

Aculeata, Lon.

Ranunculus arvensis flore rubicundo, Cæs.

Chamæmelum purpureum, Tab.

Variat floris colore phæniceo, luteo, pallido

& albo; hinc

Anemone tenuifol. alt. flore pallido, Cord. hist.

Adonis flore pallido, Cam. ep. Lugd. Tab.

Adonis 2. & 3. inter fegetes, Tab.

Eranthemum flore flammæo, &

Eranthemum folio rubro, Eyst.

SECTIO TERTIA.

RANUNCULUS EJUSQUE SPECIES.

Ranunculus & Apium agreste. Ranunculus, quod Ranarum more humidis limitibus & opacis marginibus læretur: aut quod rana; inter ejus frutices frequenter inventantur. Apium, quod folijs apium æmuletur.

Genera complura Dioscoridi: 1. Coriandri folijs (& ad malva latitudinem accedentibus, Plinio) flore luteo: interdum purpureo: 2. lanuginosus (foliosus Plinius) quod syl. apium appellant: 3. minimus flore aureo: 4. huic simile flore lacteo. Idem habet Plin. l. 25. c. ultimo.

Ranunculus nemorosus.

I. Ranunculus nemorosus luteus.

Ranunculi sylv. alterum genus, Trag.

Ranunc. 3. species, Cord. hist. tertij genus 2. Thal.

Ranunc. 4. species lutea, Fuch. Dod. gal. Lugd.

Ranunculus phragmites luteo flore, Gesl. hort.

Ranunculus luteus, Lob. ico. Tab.

Ranunculus 7. Tur. 9. Lon.

Ranunculus nemorosus flore luteo, Ad. Eyst.

Anemone 6. Dod. Lug. mont. colore luteo, Cæs.

Anemone nemorum lutea, Ger.

Major est & minor, Thal. Flore communiter

un ico, aliquando duobus & tribus.

II. Ran. nemorosus vel sylv. folio rotundo.

Ranunculus dulcis, sub sylv. deserip. Trag.

Ranunculus 1. species, Fuch. Tur. Lon. Lugd.

Ranunc. auricomus, Dod. gal. Lob. ico. Thal.

Ranunc. nemorosus, Ger. dulcis nemor. Tab.

Polyanthemum, Ang.

III. Ranunculus nemorosus Thaliatri folio.

Ranunculus Thaliatri folio, Clus. pan. Cam.

Ranunculus præcox 2. Thaliatri folio, Eid. hist.

Aquilegia minor Dalechampi, Lugd.

IV. Ranunc. nemorosus Muscatellina dictus.

Aristol. rotundæ concavæ similis herbula, Trag.

Aristol. vulg. alt. radice oblonga, Gesl. hort.

Capnos Plinij, Tur.

Moschatella, Cord. hist. Thal. Cam.

Ranunculus minimus Septentrionalium herbi-

do muscoso flore, Ad. Lob. ico.

Denticulata, à radice forma, Lugd.

Pumaria bulbosa tuberosa minima, Tab. II

Radix cava minima, Ger. ico.

Ranunculus pratensis & arvensis ob ocol

I. Ranunculus pratensis erectus acris. II

Ranunculus luteus, Trag.

Ranunculus pratensis surrectis cauliculis, Lob.

Ranunculus hortensis 2. Dod. Lugd.

Ranun-

Ranunculus sylvestris, & 2. Tab.

Ranunculus lævis, Cæf.

Ranunculus batrachoides, Ger.

Ranunculus polyanthemus maculatus, Thal.

In folij medio sæpè macula reperitur, & hic Ranunculi alter. species maculis notata, Trag. quâ communiter destituitur. Hic magis minusve hirsutus occurrit.

II. Ranunculus pratensis erectus dulcis.

Ranunculus pratensis, vel 1. Trag.

Chrysanthemum simplex, Fuch.

Polyanthemum simplex, Dod. gal. Lugd.

Ranunculus 7. Lon. dulcis, Tab.

Ranunculus surrectis cauliculis, Ger.

Ranunculus hortensis erectus flore simplici luteo, Eyst.

Hic cum latioribus quoque folijs reperitur, idcirco apud Tab. & altera figura

Ranunculi holeracei majoris nomine : & apud

Ger. sub titulo Ranunculi auricomi.

III. Ranunculus pratensis repens hirsutus.

Ranunculi 8. species, Cord. hist.

Ranunculus pratensis reptante cauliculo, Lob.

Ranunculus polyanthemus 1. Dod. Thal.

Ranunculus hortensis 1. Dod. Lugd.

Ranunculus vinealis, Tab.

Ranunculus pratensis etiamque hortensis, Ger.

Variat magnitudine, nam in hortis, quibus

præ cæteris spontè tamen proveniens, familia-

rior, latioribus multo quam in pratis folijs re-

peritur : & nonnunquam veluti quædam ma-

culæ inalbicant.

IV. Ranunculus pratensis radice verticilli

modo rotunda.

Crus galli, Brunf. Coronopus parvus, Eid. 4.

Ranunculus exiguus, & 1. Trag.

Ranunculus 5. Matth. Tur. Lac. Lon. Lugd.

Batrachion Apuleij, Dod. gal.

Ranunculus minor vel 3. Fuch. vel 9. Cord. hist.

minor, Tab.

Ranunculus flammula dictus, Gesn. hort.

Ranunc. bulbosus, Ad. Lob. Cam. Thal. Ger.

Ranunculus tuberosus, Dod. Lugd.

Ranunculus lanuginosus 1. Cæf.

Magnitudine variat, nam in saxosis, vix

duarum triumve unciarum reperitur: contra in

hortorum areolis spontè nascens, cubitum ex-

cedit: in pratis mediæ altitudinis reperitur.

V. Ranunculus arvensis parvus folio trifido.

Ranunculus minimus Apulus, Col.

Ranunculus hortensis flore pleno.

I. Ranunculus hortensis erectus flore pleno.

Ranunculus luteus, vel 3. flore multiplici, Trag.

Ranunc. multiplex, Fuch. tertius, Tur. quart-

tus, Lon.

Ranunculi 7. species coronaria, Cord. hist.

Ranunculus sylv. 2. Dod. Lugd.

Ranunc. polyanthemus, Ad. Lob. polyanth. 3.

erectus, Cam. at. 2. epit.

Ranunc. erectus hortensis fl. pleno luteo, Eyst.

Major & minor habetur : & ille dicitur

Ranunculus multiflorus maximus, Tab.

Ranunculus maximus multiplex, Ger.

Flores, Bellidum plenarum orbiculos imi-

tantur, sæpius geminatim combinantur, ac

quandoque sobolem aliam ex se emittunt.

II. Ranunculus hortensis inclinans.

Ranunculus hort. reptante cauliculo, Lob.

Ranunc. repens flore multiplici luteo, Gesn. hort.

Ranunculus polyanthos luteus repens, Cam.

Ranunculus hort. flore pleno, Eyst. cui major

& minor est.

III. Ranunculus dulcis flore pleno.

Ranunculus pratensis cultura multiplex, Trag.

Polyanthemum multiplex, Dod. gal. Lugd.

Ranunculus dulcis multiflorus, Tab.

Ranunculus maximus multiplex, Ger.

IV. Ranunculus bulbosus flore pleno.

Pes corvi flore pleno, Brunf. Coronopus, Eid.

Coronopus quorundam multiplici luteo flore,

Gesn. hort.

Ranunculus radice bulbosa flore pleno, Cam.

Ranunculus bulbosus major, Eyst.

V. Ran. radice tuberosa fl. pleno & prolifero.

Ranunculus tuberosus flore multiplici, Dod.

Ran. magnus Anglicus polyanthos, Lob. ico.

Ranunculus 3. Cam. ep.

Ranunculus tuberosus Anglicus, vel 25. Tab.

Sæpius ex uno flore, unus & alter prodit.

VI. Ran. folio aconiti flore albo multiplici.

Ran. mont. magnus flore multiplici, Gesn. hort.

Ranunculus niveus polyanthos, Lob. Lugd.

Ranunculus pleno flore albo, Clus. hist. Eyst.

Ranunculus albus multiflorus, Tab. Ger.

Ranunculus leucanthemos flore pleno, Cam.

Ranunculus echinatus.

I. Ranunculus arvensis echinatus.

Ranunculus albus five echinatus, Dod. gal.

Ranunc. sativus, Tur. arvensis, Gesn. hort. Tab.

Ranunculus arvorum, Lob. ico. Ger.

Ranunculus hortenſis ſimpl. r. ſpecies, Fuch. Ran. in aquis naſcens folio parum ſciſſo, Cæſ. Lugd. altera ſpecies, Fuch. ico. quinta ſpecies Ranunculus fluviatilis, Tab.

vel ſegetalis, Cord. hiſt.

Ranunculus ſylv. tertius, Dod. Lob. ob.

Folio eſt aliquando latiore, aliquando anguſtiore, pro ratione folij pinguioris: hinc Ranunculus arvenſis latifol. & anguſtif. Tab.

II. Ranunculus ſtellatus echinatus Creticus, Ranunculus echinatus Creticus, Pon. Ital.

III. Ranunc. rotundifol. repens echinatus.

IV. Ranunculus paluſtris echinatus: ille ſub 2. hic ſub 3. in Prod. deſcriptus.

Ranunculus Apuleij quibuſdam, Cluſ. hiſt.

Ranunculus paluſtris & aquaticus.

I. Ranunculus paluſtris apij folio lævis.

Ranunculus & Sardonias, Dioſc.

Ranunculus, ſtrumea & apiaſtrum, Plin.

Scelerata, Apuleio.

Apium aquaticum, Trag.

Apiaſtrum, Cord. in Dioſc.

Ranunculus 1. Matth. Geſn. hort. Lac. Caſt.

Lugd. 4. Tur. 3. Lon.

Ranunc. aquaticus, Fuch. ico. paluſtris, Cord.

hiſt. Dod. f. Lugd. Thal. Cam. Tab. Ger.

Herba Sardoia, Guiland.

Ranuncul. paluſtris rotundiore folio, Ad. Lob.

Ranunc. alter hiſtuto ſemine folijs apij, Cæſ.

Folijs & caulibus eſt alibi majoribus, alibi minoribus, floribus luteopallidis; at Cordus, & purpureis obſervavit.

II. Ranunc. paluſtris apij folio lanuginofus.

Ranunculi 2. ſpecies, vel Sardous Ranunculus, Cord. hiſt.

Ranunculus Sardonius, Ang.

Ranunculus 2. Matth. Lugd.

Differt à priore, quod lanuginofus, pluribus foliorum incifuris ſpectetur.

III. Ranunc. aquaticus hederaceus luteus.

Ranunculus hederaceus Dalechampij, Lugd.

IV. Ranunc. aquaticus coryledonis folio.

Coryledon aquatica, Dod. gal. paluſtris, Eid. f.

Herba rotundo folio, aliquibus Acetabulum, Cord. in Dioſc.

Coryledon aquat. acris Septentrionalium, Lob.

Ranunculus aquaticus umbilicato folio, Col.

V. Ranunculus aquaticus, folio rotundo & capillaceo.

Polyanthenum paluſtre aut aquatic. Dod. gal.

Ranunculus 3. Geſn. hort.

Ran. aquatilis, Dod. Ger. aquat. hepaticæ facie,

Hepatica aquatica, Lugd. paluſtris, Thal.

In noſtro duplicia folia obſervantur, quæ ſub aqua multifida, capillacea; quæ extra aquam rotunda & crenata: quare Cæſ. folia alteri parum ſciſſa, alteri in capillaceam tenuitatem ſiſſa tribuit: addens, ſe vidiffe quoddam utrumque genus foliorum habens, initio intergrum, procedente tempore capillaceum: at in noſtro foliorum diverſitas ſimul conſpicitur.

VI. Ranunculus aquaticus capillaceus.

Ranunculus in aquis folijs in capillaceam tenuitatem ſciſſis, Cæſ.

Ran. trichophyllon aquaticus mediol. Col.

Ranunculus folio longo tam paluſtris quam montanus.

I. Ranunculus longifolius paluſtris major.

Ranunculus inſectus 1. Cæſ.

Lingua Plinij, Lugd.

Ranunculus πλατύφυλλον, Thal.

Ranunculus lanceolatus major, Tab. flammeus major, Ger.

Folia prima aliquando ſubrotunda ſunt, ad Chelidonia minoris, aut Cochleariæ formam accedentia: quemadmodum Ranunculi latifolij nomine, hiſt. Lugd. exprimere videtur.

II. Ranunculus longifolius paluſtris minor.

Ranunculus 1. Ang. 12. Cord. hiſt.

Ran. flammeus aquatilis anguſt. Ad. Lob. Lug.

Flammula ranunculus, Dod.

Ranunc. aquaticus ἀνρύλας ὀφρύν, Thal.

Ranunculus lanceatus minor, Tab. flammeus minor, Ger.

Agolethron Plinij, l. 21. c. 13. quibuſdam: alijs Enneaphyllon, Ejuſdem, l. 27. c. 9.

III. Ranunculus paluſtris ferratus.

Flammula, Dod. gal. aquatica, Lugd.

Flammula ranunculus folio ferrato, Dod.

Ranunculus alter, Geſn. hort.

Ranunc. aquatilis anguſtifolius ferratus, Lob.

Ran. lanceatus ferratus; Tab. flam. ferrat. Ger.

IV. Ranunculus mont. folijs plantaginis.

Ranunculus Pyrenæus albo fl. Cluſ. hiſp. ap. 2. an Ranunculus phœnicens Myconi, ob ſimilitudinem cum palmæ folijs, Lugd.

V. Ranunculus montanus folio gramineo.

Ranunc. pumilus gramineis folijs, Ad. Lob. ico.

Ranunculus gramineus, Tab. Ger.

Hydropiper lanceolatum, Lugd.

VI. Ra-

- VI. Ran. mont. folio gramineo multiplex. Ranunculus folio graminis, Dod.
 Ranunculus gramineus z. multiplex, Tab.
 VII. Ranunculus gramineo folio bulbosus. Ranunculus leptomacrophyllon bulbosus, vel Ranunculus bulbosus gramineus mont. Col.
Ranunculus grumosa vel etiam Asphodeli radice.
 I. Ranunculus lanuginosus angustifolius grumosa radice major. Ranunculus Illyricus major, Clus. hift.
 II. Ranun. lanug. angustif. grum. rad. minor. Ranunculus Pannonicus, Clus. hisp.
 Ranunculus grumosa radice 4. Eid. hift.
 Ran. Illyricus, Dod. Lob. Tab. Cam. Ger. Eyf.
 Ranunculus peregrinus alter, Cæs.
 III. Ranunculus lanugin. apij folio asphodeli radice. Ran. alter faxatilis mont. asphodeli radice, Col.
 IV. Ranunculus grumosa radice folio ranunculi bulbosi: hic 4. est in Prodomo.
 V. Ranunculus grumosa radice flore phœniceo minimo simplici. Ranunc. Tripolitanus phœniceo fl. Clus. pan.
 Ranunc. Asiaticus grumosa radice 1. Eid. hift.
 Floris foliola 3. aut 6. rarius 3. aut 4. foris phœnicei, internè miniati coloris staminib. rubris.
 VI. Ranunculus grumosa radice ramosus. Ranunculus Asiaticus *πολύκλωνος* sive grumosa radice 2. Clus. hift.
 Ranunculus Asiaticus grumosa radice flore phœniceo ruberrimo, Eyf.
 VII. Ranunc. grumosa radice fl. flavo vario. Ranunculus Asiaticus grumosa radice flore flavo rubris venis distincto, Clus. cur. post. Eyf.
 VIII. Ranunculus grumosa radice fl. albo. Ranunc. peregrinus grumosa radice 1. Clus. hift.
 Flos quinquefolius albus suaviter rubente colore per oras mixto.
 IX. Ranunculus grumosa radice flore albo, leviter crenato. Ranunculus peregr. grumosa radice 2. Clus. hift.
 X. Ranunculus grumosa radice flore niveo. Ranunculus peregr. grumosa radice 3. Clus. hift.
 Ranunculus Creticus grumosa radice flore niveo, Eid. hift. ap. alt. & Eyf.
 XI. Ranunculus asphodeli radice Creticus. Ranunculus Creticus latifolius, Clus. hift.
 XII. Ranunculus latifolius bullatus asphodeli radice. Clusius in hift. duas habet figuras, magno & parvo flore, nulla in descriptione facta mentione: ille vocatur Ranunculus grumosa radice 1. Clus. hift.
 Ranunculus Lusitanicus Clusij, Lob. ico, Ger. Ranunculus Lusitanicus 2. Tab. hic verò Ranunculus autumnalis, Clus. hisp. Ger.
 Ranunc. grumosa radice 1. species 2. Clus. hift.
 Ranunc. Lusitanicus autumnalis, Lob. ob.
 Ranunc. Lusitanicus, Dod. Lugd. primus, Tab.
 XIII. Ranunculus cherophyllos asphodeli radice. Ranunculus montanus leptophyllos Asphod. radice, Colum.
Ranunculus grumosa radice flore pleno.
 I. Ranun. asphodeli radice flore sanguineo. Ranunculus Constantinopolitanus, Clus. hisp. Dod. Lugd. Cam.
 Ranunc. polyphyllus flore coccineo, Clus. pan.
 Ranunculus Asiaticus grumosa radice pleno flore, Eid. hift.
 Ranunculus sanguineus multiplex, Lob. Ger.
 Ranunculus Turcicus sive sanguineus, Tab.
 an Ranunculus primi generis purpurei floris apud Dioscor. quem simplici flore etiam nasci verisimile est.
 II. Ranunculus asphodeli radice flore subphœniceo rubente. Ranunculus Asiaticus grumosa radice pleno flore 2. Clus. hift.
 Ranunculus pleno flore ruberrimo, Eyf.
 Flos ex centum & triginta folijs, foris subphœnicei, dein miniati, interius elegantis rubri miniati ad coccineum tendentis.
 III. Ranunculus asphodeli radice prolifer miniatus. Ranunculus Asiaticus grumosa radice pleno flore 3. Clus. hift.
 Ranunculus Asiaticus grumosa radice flore pleno sanguineo prolifero, Eyf.
Ranunculus montanus.
 I. Ranunc. rutaceo folio flore suaverubente. Ranunculus præcox 1. rutæ folio, Clus. hift.
 Ranunculus alpinus Coriandri folio, Pon.
 II. Ranunculus alpinus humilis rotundifolius flore minore. Ranunculi montani primi species 1. Clus. pan. & hiftor.
 III. Ran. alp. humilis rotundif. flore majore. Ranunculus montanus minimus, Gefn. hort.
 Ranunculi mont. primi species 2. Cl. pan. & h. Ranun-

Ranunculus montanus, Dod. ed. belg.

Flos interdum duplici foliorum serie constat.

IV. Ranunculus mont. hirsutus albus altior.

Ranunculus alpinus albo flore, Clus. pan.

Ranunc. mont. 2. vel secundi species 1. Eid. hist.

V. Ranunculus montanus hirsutus humilior Narcissi flore.

Ranunculi 2. alterum genus, Clus. pan.

Ran. montani secundi species altera, Eid. hist.

VI. Ranunculus montanus hirsutus purpurascens flore.

Ranunculus montanus 3. Clus. pan. & hist.

Aconitum candidum *ἄκονιτον* Dalech. Lugd.

Multum convenit cum Caryophyllata alpina quinquefolia majore: verum Caryophyllata radice est odora, flore pallidè luteo in papum abeunte.

VII. Ranunculus montanus Aconiti folio albus flore majore.

Ranunculus 4. Matth. Lac. Ges. hor. (dentur.

Aconiti 5. nomine Matth. & Lug. exprimere vi-

Ran. albus major, Ges. fr. syl. simp. fl. Ges. hor. ap.

Ranunculus maximus leucanthemon Thal.

leucanth. folio aconiti, Cam.

Ranunc. montanus 3. Cæs. 4. Clus. pan. & hist.

VIII. Ranunculus montanus Aconiti folio albo flore majore.

Ranunc. flore albo, vel Ranun. 4. externus, Dod.

Ranunc. albus flore simplici, Lob. albus, Tab.

Ranunc. mont. albus, Lugd. alpinus albus, Ger.

Ran. montani quarti species alt. Cl. pan. & hist.

Aconitum batrachoides, Ad. Lob. ico.

Ranunculus 4. Diosc. esset, nisi magnitudo obstaret, Dod.

IX. Ran. mont. Aconiti folio flore globoso.

Ranunculus sextus, Matth. Lugd.

Aconitum 3. Matth. Lac. Thal. Tab. cui & y.

Aconitum lycoctonum 3. Lugd.

Anemone montana quædam, Ges. hort.

Trollius flos, Ges. fr. Clus. pan.

Ran. flore globoso, Dod. fr. Lug. Eyst. glomerato

flore, Cl. hist. globosus, Ger. five montan. Cam.

Ranun. mont. alp. glomeratus, Lob. mont. alter,

Ranunculus alpinus luteus, Tab. (Cæs.

Major ampliore fl. & quasi aureo: alter hu-

miliior, fl. minore, colore ex viridi pallecente

albo reperiri scribit Tab.

Ranunculum alpinum album nominans.

X. Ranunc. mont. fol. Aconiti magno flore.

Ranunculus mont. major flore luteo, Eyst.

XI. Ran. geranij tuberosi fol. qui 5. in Prod.

XII. Ranun. mont. latissimo folio hirsutus.

Ranunc. platyphyllos flore luteo, Clus. pan.

Ranunculus montanus 5. Eid. hist.

XIII. Ran. mont. subhirsutus geranij folio.

XIV. Ran. mont. lanug. folijs ranunc. prat. re-

pentis: ille pro 6. hic pro 7. in Prod. describitur.

Ranunculus saxatilis.

I. Ranunculus saxatilis magno flore.

II. Ranunculus saxatilis folijs subrotundis:

ille pro 8. hic pro 9. in Prodrōmo describitur.

III. Ranunc. saxatilis minimus hirsutus.

IV. Ranunc. villosissimus Monpeliciacus:

ille pro 10. hic pro 11. in Prodrōmo describitur.

SECTIO QUARTA

ACONITUM; DORONICUM; HELLEBORUS NIGER;
HELLEBORUS ALBUS, ET HELLEBORINE.

ACONITUM.

Aκόνιτον Diosc. l. 4. c. 77. & 78. Aconitum Plinio, l. 27. c. 3. dictum, quoniam in nudis caulis, quas aconis
nominant, nascatur. Alij hanc nominis rationem attulere, quoniam vis eadem in morte esset, que con-
ibus ad ferri aciem deterendam statimq; ad mortem velocitas sentiretur. At Theophr. 9. hist. 16. *ἀκόνιτον* appellatum
ab Aconis, pago quodam Mariandynorum, quoniam ibi præcipuè proveniat.

Genera duo Dioscoridi: alterum folijs Cyclamini, aut Cucumeris, quod *ποσάδων*, *οἱ δὲ νάμωγοι*, *οἱ δὲ δολυπόνοι*, *οἱ δὲ μωρεῖνοι*, *οἱ δὲ θυγοπόνοι* vocent. Alterū folijs effigie Platani, crebris divisuris, quod *μωρεῖνοι*, *οἱ δὲ θυγοπόνοι*, *οἱ δὲ μωρεῖνοι*, *οἱ δὲ θυγοπόνοι* vocent. Alij *δονοῦν* *όνον* appellant: cujus tria genera: unum quo venatores utuntur: alia duo, qua Medici in suum usum
vertere, è quibus tertium Ponticum nominatur. Theophr. l. c. Aconiti anius folio intubaceo, (forsan pro *ναμωγοῖς*, *οἱ δὲ νάμωγοι*, *οἱ δὲ δολυπόνοι*, *οἱ δὲ μωρεῖνοι*) meminit. Plin. l. 27. c. 2. & 3. de Aconito egit: describit folijs cyclamini aut cu-
cumeris: *carumaron* dicit, propter radicem cammaro marino similem (forte rectius *ναμωγοῖς*, quasi *ναμωγοῖς*
perniciōsum, ut est apud Homerum) alijs *thelyphono*: aliquibus *scorpion*, quia radix scorpionum modo incut-
vetur: quibusdam *myocitonon*, quoniam mures odore necet.

I. Aconi-

XVII. Aco-

XVII. Aconitum saluterum, seu Anthora.

Anthora dicta quasi *anthe* & *hora*, quod Thora Alexipharmacum sit. Avicen. Napellus Moysis & herba Napello similis, ejusq; veneno repugnans. Antora, Matth. Gef. hor. Lon. Cæs. Cast. Cam. Anthora, Ad. Lob. Dod. Taber. Ger. vulgaris, Clus. hist.

Aconitum saluterum, Gef. hor.

Flore est luteo: Tab. secundæ meminit, quæ solo floris colore cæruleo à priore differt: habet & tertiam ex Pandectario, folijs a fari crenatis, radice rotunda amara: sed quid est?

ACONITUM PARDALIANCHES.

I. Aconitum pardalianch. i. seu Thora major.

Pseudoaconitum pardalianches, Matth.

Aconitum i. seu pardalianches majus, Gef. hor.

Aconitum Ghini, Ang.

Limeum Plinij, Ang. Lugd.

Herba thora, limeū vocari falso creditur, Guil.

Tora venenata, Gef. lun. (pap.)

Pthora Valdensium, Ad. Lob. ico. Clus. hist.

Thora Valdensis, Clus. pan. Cast. Lugd. Cam.

mas & femina. Tab. Ger.

Tora major, Cam. ep.

Foliorum exortu, situ & numero variat: enascitur enim uno folio, duobus, idq; vel statim à radice, vel nullo à radice, sed in caule duobus majusculis, vel tribus, vel quatuor, vel quinque ad summum: hinc Taber. feminam quatuor, marem duobus folijs magnis pingit.

II. Acon. pardalianches alter. five Thora min.

Aconitum primum minus, Gef. hor.

Thora minor, Gef. de acon. Cam. ep.

Thora Valdensis, Dod.

Thora Sabaudica & Thora montis Baldi, Tab.

Limeum pardal. genus uno folio, Lugd.

Ranunculus grumosa radice 3. Clus. hist.

Hujus folia breviora supernè latiora & magis incisa, quàm Thora Valdensis, vel è monte Baldo: hujus flos, Clusio quinis folijs, illorum, quaternis dundaxat folijs exprimitur.

III. Aconitum pardalianches Dioscoridis creditum Matthiolo.

Aconitum pardalianches, Matth. Lac. Dod. gal.

Cast. Lugd. Tab.

Aconitum Matthioli, an in rerum natura sic dubitat, Gef. hor. & lun.

In Lugd. hist. primum Matthioli figura exhibetur: dein in append. iconi prius propositæ, ramulus floribus onustus adpingitur. Quod aliqui commentitium existimant: Lug. historiæ author, plantam in Allobrogibus nasci scribit: quid sit ignoramus.

Herba venenata & earum antidota.

I. Ourari.

I. Turara.

II. Aparaeo.

II. Wape.

III. Corafsi.

III. Cuturapama.

IV. Parapara.

IV. Macatro.

Hæ solo nomine, part. 8. Ind. Occid. proponuntur, sed quid?

DORONICUM.

Doronici vox ab Arabibus petita, qui Doronigi sive Durungi dicunt: hoc aliqui inter Aconita referunt, sed quod illo canes interficiantur: aliqui ab Aconito separant, siquidem sine noxa usi sint: & licet canes interficiant, dantur & alia quæ brutis, non tamen hominibus obsunt; ut vulpes, aloë saluberrima & Amygdali amaris necari, Plutarchus auctor est.

I. Doronicum radice dulci.

Acon. pardalianches Theophr. Matt. Lug. Tab.

Doronicum Austriac. alterum, Clus. pan. Cam.

Doronicum 3. Austriacum 2. Clus. hist.

Doronicum 2. longifolium, Tab. minus, Ger.

Doronicum radice repente, Eid.

II. Doronicum radice scorpij brachiata.

Aconitum pardalianches Plinij, Matt. Dod. gal.

Lugd. Tab. alterum, Dod.

Doronicum brachiata radice, Lob. Lugd. Ger.

an Doronicum radice nigra, Col.

III. Doronicum radice scorpij.

Aconitum pardalianches minus, Matth. Lugd.

Cast. primum, Dod.

Doronic. Ang. Cord. hist. Gef. hor. Lon. Cæs. Eyst.

Doronicum Romanum, Gef. hor. Lugd.

Doronicum alterum, Ad.

Doronicum primum, Tab. minus, Cam.

Doronicum majus, Ger.

Doronicum latifolium, Clus. pan. & hist.

Doronici tertij varietas, Ad. Lob.

Ob triplicem hanc Aconiti pardalianchis differentiam, triplicem esse Doronici varietatem, non sine causa suspicari licet.

IV. Doronicum plantaginis folio.

Doronicum primum, Ad.

Doronicum minus officinarum, Lob. Lugd.

Doronicum angustifolium, Clus. hist.

V. Do-

- V. *Doronicum plantaginis folio alterum.*
Alisma, Matth. Cast. Cam. Eyf. alpinum, Gefn. hort. Thal.
Caltha alpina, Gefn. hort. Tab.
Calendula alpina, Ger.
Nardus Celtica altera, Ad. Lob. Lugd.
Chrysanthemum latifolium, Dod. Lugd. Ger.
*Doronicum quintum Germanicum & 6. Pan-
 nonicum, Clus. hist.*
Damasonium sive Alisma, Lugd.
Parmica montana, Lugd.
Damasonium primum Diosc. Tab.
*Alij glabris, alij hirsutis folijs pingunt: ha-
 denus magis minusve hirsutis, licet diversis lo-
 cis natum observavimus: sic floris color albus
 est Matthiolo, ex pallido albicans, Cast. alijs lu-*
- teus, & rectè: in Styriae pratis floribus caeruleis
 reperitur.
- VI. *Doronic. longifolium hirsutiae asperum.*
Doronicum primum vel minus, Clus. pan.
Doronic. 2. Austriacum minus sive 1. Eid. hist.
 VII. *Doronicum latifolium flore magno.*
Doronicum Austriacum 3. Clus. pan.
Doronicum 4. Stiriacum, Eid. hist.
 VIII. *Doronicum maximum folijs caulem
 amplexantibus.*
Doron. Austriacum 5. sive maximum, Clus. pan.
Doronicum 7. sive Austriacum 3. Eid. hist.
 IX. *Doronicum Helveticum incanum.*
 X. *Doronicum Helveticum humile, crassis
 folijs: illud pro 1. hoc pro 2. in Prodromo de-
 scribitur.*

HELLEBORUS.

EΛέβορος secundum Erymologicum dicitur, ἀπα τὸ ἐλεῖν τὴ βοῶν quod esu perimat.
 Genera duo sunt Dioscoridi l. 4. c. 150. & 151. albus, folijs plantaginis, aut beta sylvestris: niger qui &
 μαλακὸς (quoniam Melampus caprarum pastor, furentes in se prati filias, hoc primum purgasse & sanasse
 fertur) folijs platani, Theophr. 9. h. 11. Elleborus niger & candidus aequivoce dicitur, cum alijs facie similes, sed
 radicis colore candido & nigro inter se differre censeant. Alijs folium nigri laureum: candidi, porraceum red-
 diderunt, radices autem similes, colore excepto. Niger ubiq; nascitur, sed optimus Helicone: at candidus locis
 paucissimis exit: optimi vero & usitatissimi quatuor sunt, Oetum, Ponticum, Eleaticum, Massalioticum. Et
 quavis forma conveniant, vires tamen proprias sortiuntur: nigrum, ab eo qui comperit & primo succidit,
 Melampodium quidam appellant: hac Theophrastus. Plinio l. 25. c. 5. Genera prima duo sunt, candidum & ni-
 grum: hoc de radicibus tantum intelligi tradunt pleriq;: alijs folia nigri, platano similia, sed minora nigro-
 ra, & pluribus divisuris scissa: albi, beta incipientis, &c. Latinis Veratrum quod mentem vertat.

HELLEBORUS NIGER.

- I. *Helleborus niger foetidus.*
*Enneaphyllon Plinij l. 27. c. 9. quod longa folia
 novena habere videtur.*
Pedicularia foetida 3. Trag.
Elleborus niger sylv. adulterinus, Trag. Fuch.
Lugdun.
Lycostonum primum, Dod. gal.
Consiligo, Ruel. Gef. hor. Lon. Ger.
Consiligo sylvestris, Tur.
Pulmonaria Vegetij, Gef. hort.
*Helleborus niger alter, vel Helleborine major,
 Cord. hist.*
Veratrum nigrum tertium, Dod. Clus. hist.
Sesamoides magnum Cordi, Lob.
Helleboraster, Ad. maximus, Lob. Ger.
Helleborastrum magnum, Tab.
Enneaphyllon Plinij, Cæf.
 Magnitudine variat: hinc Helleborastrum
 magnum & minus, Tab. at Ger. sub Consilagine
- Ruellij & Helleboro maximo proponit.
 II. *Helleborus niger hort. flore viridi.*
Consiligo Plinij l. 26. c. 7. videtur.
Helleborus niger, Brunf.
Elleborus niger adulterinus domesticus, Trag.
Elleborus niger adulterinus hortensis, Fuch.
Elleborus niger alter, Matth.
Elleborus niger vulgaris, Gef. hor. Cæf.
Pseudohelleborus niger, Dod. gal.
Consiligo, Tur. minor, Lugd.
Helleborus niger nostras, Cord. hist.
*Veratrum nigrum, Cord. in Diosc. secundum,
 Lac. Dod. Clus. pan. & hist. Tab.*
*Elleborus niger tertius Dodonæi & Matthio-
 li, Lugdun.*
Helleboraster alter, Ad.
Helleborastrum, Lob. Ger.
 Hujus radice multi in Medicina utuntur.
 III. *Helleborus niger hortensis alter.*
Veratrum nigrum 4. peregrinum, Clus. hist.

A a

Hujus

Hujus folia attrita, florum oræ ex purpura nigricant.

IV. *Helieborus niger* flore roseo.

Elleborum nigrum, Matth. Cast. Lugd. Cam.

Planta leonis, Dod. gal.

Elleborus niger fl. magno purpureo, Gef. hor.

Helleborus niger, Ad. Lob. *niger* 2. *Dodonæi*, Lugdun.

Veratrum nigrum, Dod. legitimum, Clus. pan. *Stiriacum*, Tab.

Ellebori nigri alterum genus, Cæs.

Elleborus niger annuus, Ang. *niger* legitimus, Clus. hist. *niger* verus, Ger.

Flore est purpureo, candido: sic flos initio albidus, dein purpurascens, postremo virens; & qui albo flore marcescens purpurascit: flos albescit cum aliqua diluta rubedine.

V. *Helieborus niger* *Saniculæ* folio major.

Osteritium montanum, Trag.

Sanicula foemina adulterina, Eid.

Sanicula foem. Fuch. Gef. hor. Lugd. Clus. hist.

Veratrum nigrum *Dioscoridis*, Dod. Lac. Eyst. *nigrum* 2. Clus. pan.

Altrantia nigra, Gef. hor. Ad. Lob. Ger.

Imperatoria nigra, Tab.

Elleborus niger *Dodonæi*, Lug. verus *Dioscoridis* *Dodonæo*, sed fallitur, Gef. hor.

VI. *Helieborine* *Saniculæ* folio minor, in Prodomo describitur.

VII. *Helieborine* *Saniculæ* facie.

Epipactis, Matth. Lac.

Elleborine, Matth. Lugd. Tab.

Helieborine *Matthioli* commentitia, Ad.

Elleborine alpina *Saniculæ* & *Ellebori nigri* facie, Lob.

VIII. an *Elleborine* nigra species.

Polyrrhizos *Plinij* *Dalechampi*, Lugd.

IX. *Helieborus niger* tenuifolius *Buphthalmi* flore.

Elleborus niger verus, Trag. Lon.

Pseudoelleborum, Matth. Lugd.

Buphthalmum, Ang. *Dodon.* Clus. pan. & hist. Lugd. Cam.

Helieborine tenuifolia, Cord. hist.

Elleborastrum nigrum, Gef. hor. Cam.

Helleborus ferulaceus, Ad.

Helleborus niger ferulaceus *Theoph.* Ad. Lob.

Elleborum alterum, Cast.

Helleborus Hippocratis, Tab.

Sesamoides minus, Cord. in *Diosc.* Gef. hor.

Ellebori nigri species quibusdam, Gef. hor.

HELLEBORUS ALBUS.

I. *Helleborus albus* flore subviridi.

Elleborus albus, Brunf. Trag. Fuch. Cord. hist. Gef. hort. Ang. Lon. Lugd. Cam. Clus. hist. fl. herbaceo, Eyst.

Helleborum album, Matth. Ad. Lobel. Cæs. alp. Castor.

Veratrum album, Dod. gal. Tur. Lac. Cord. in *Dioscorid.*

Helleborus candidus *Græcorum*, est *Consiligo* *Vegetij*, *Abfyrri*, *Columel.* & *Plinij*, Guil.

Flore est in viridi albescente *Taber.* qui iconem sequentis habet: dein flore pallide flavescente, & alterum eodem colore, nisi quod flos racemi instar coactus sit, quem

Elleborum album foeminam.

Helleborum album præcoccem Ger. nominat. Mas durior, foemina mollior.

II. *Helleborus albus* flore atrorubente.

Helleborum album floribus atrorubentibus præcox, Lob.

Helleborus albus alter fl. nigricantibus, Dod. flore ex purpura nigricante, Clus. hist.

Ellebori albi alterum genus, Cæs.

Hellebor. albus, Ger. flore atrorubescens, Eyst. mas, Tab. ico.

Ex radicibus *Ellebori albi*, *Hispani* venenum conficiunt, de *Balestera* & de *Jerva* vocatum, quod idem quod *Pharicum* dictum, aut parum omnino ab eo differens. Et *Limeum* herbam à *Gallis* appellatam, ab *Elleboro* non discrepare, suspicari possumus. Guil. pap.

HELLEBORINE.

I. *Helleborine* latifolia montana.

Satyrium octavum, Trag.

Helleborine, Dod. Ad. Lob. Lugd. Ger. 1. Tab. recentiorum 2. Clus. hist.

Damaconium Calliphylion, Cord. hist.

Epipactis sive *Elleborine*, Cam. ep.

Sigillum Salomonis, Cæs.

Epipactis latifolia, Eyst.

Foliorum amplitudine (& quod altera folijs oblongis acutis, altera verò subrotundis est) & floris colore variat.

II. *Helleborine* altera atrorubente flore.

Alisma botryodes seu racemosum, Thal.

Variat foliorum amplitudine: florum colore atrorubente, rarius candido.

III. *Helle-*

- III. Helleborine angustifolia palustris five pratenfis.
 Elleborine 2. Cluf. pan. recentiorum 3. Eid. hift.
 IV. Helleborine flore carneo.
 Elleborine 3. Cluf. pan. 4. Eid. hift.
 Sigillum S. Mariæ alterum, Cæf.
 V. Helleborine flore albo, vel Damafonium montanum latifolium.
 Alisma quorundam, Cord. hift.
 Alisma cymbalanthemon, Thal.
 Helleborine albo flore, Tab. Ger.
 Epipactis angustis folijs, Eyst.
 VI. Helleborine montana angustifolia spi-
 Elleborine 4. Cluf. pan. 5. Eid. hift. (cata.
 VII. Helleborine montana angustifolia purpurascens.
 Damafonium tenuifolium, Cord. hift.
 Elleborine 5. Cluf. pan. 6. Eid. hift.
 Alisma tenuifolium, Thal.
 Damafonium alpinum, Lugd.
- Sigillum S. Mariæ 3. Cæf.
 Helleborine angustifolia, Tab. Ger.
 Flore luteo reperiri Lugd. auctore est.
 VIII. Elleborine 7. Cluf. hift.
 IX. Helleborine fl. rotundo, five Calceolus.
 Alismatis species flore ferrugineo, Gefn. hort.
 Lonchitis prior, Dalech. in Diosc. Ama.
 Damafonium nothum, Dod. gal.
 Calceolus Marianus, Dod.
 Pseudodamafonium, Cluf. pan.
 Calceolus Mariæ, Ad. Lob. Eyst.
 Elleborine recentiorum 1. Cluf. hift.
 Elleborine ferruginea Dalechampi, Lugd.
 Alisma *ἀνθεμον* aut *νοκάνθεμον*, Thal.
 Flore est luteo, sed folia adjuncta ferruginea:
 reperitur & albo & utriculo purpureo: apud
 Helvetios flore est duplo majore, quam apud
 Noricos.
 X. Helleborine Indica floribus candidis.
 Elleborines fortè genus, Cluf. exot. l. 4. c. 20.

 S E C T I O Q U I N T A
 G E N T I A N A ; P L A N T A G O ; H O L O S T I U M ;
 C O R O N O P U S ; P S Y L L I U M .

G E N T I A N A .

Gentiana Dioscoridi, l. 3. c. 3. quæ ab inventore Gentio Illyriorum rege, qui primus in bello ejus vires reperit, denominata. Diosc. est folijs juglandi, plantaginive similibus: at Plinio, l. 25. c. 7. folijs fraxini.
 Verum *Gentiana* aliæ sunt radice perenni, aliæ fugaci: illa flore & semine prolato, interire non solent, sed singulis annis ex eadem radice, nova germina producant: hæ vero, flore emarcido, & semine disperso, hyeme intereunt, & ex semine renascuntur.

Gentiana alpina major.

- I. *Gentiana* major lutea.
 Gent. Brunf. Matth. Fuch. Ang. Tur. Lac. Dod.
 Cord. in Diosc. & hift. Gef. h. Lon. Cæf. Cast. Lug.
 Gentiana major, Matth. Gefn. hort. ap. Ad. Lob.
 flore luteo, Cam.
 Gentiana veterum, Cluf. hift.
 Gentianæ 1. species, Trag.
 Reperitur quoque florib. flavis, imò & albis.
 punctis carentibus campanulæ forma, in Pyre-
 næis. (næis.
 II. *Gentiana* major purpurea.
 Gentianæ 2. species, Trag. Dod. gal.
 Gent. punicea, Gefn. fr. purpureis floribus, Lob.
 Gentiana major alia, Cam. ep. (ob.
 Gent. major fl. purpureo, & 1. Cluf. pan. & hift.
 III. *Gentiana* major flore punctato.
 Gent. major pallida punctis distincta, Cluf.
 pan. & hift.
- Variat floris colore pallido: reperitur & cæruleo, quæ
Gentiana major cæruleo flore, Cluf. hift.
 IV. *Gentiana* asclepiadis folio.
 Gentiana 3. Trag. Dod. gal.
 Gentiana folijs hirundinariæ, Gefn. hort. five
 Asclepiadis, Cluf. pan.
 Gentiana 2. cæruleo flore, Cluf. hift. Tab.
 Gentiana minor altera, Dod.
 Vincetoxicum 1. Cæf.
 Flore est cæruleo saturato, nunc purpureo,
 nunc delicatiore & velut cinerei coloris.
Gentiana alpina minor five *Gentianella*.
 I. *Gentianella* alpina latifolia magno flore,
 quæ in Prodromo descripta est.
 II *Gentianella* alpina angustif. magno flore,
 Gentiana 4. Trag.
Gentianella alpina, Gef. hort. pumila, Gef. cat.

Aa 2

Gentia-

Gentianella campanulæ flore purpureo, Ad.
Gentiana 7. & Gentianella verna major, Clus.
pan. & hist.

Gentianella Helvetica, Lob. ico.

Gentianella minima latifolia, Lugd.

Helleborine Dalechampia ad Diosc.

III. Gentianella alpina verna major.

Hippion, id est, Viola equina, Cord. ob. Gesn.

Calathiana verna, Gesn. hort. (hort.

Gentianella verna minor, Clus. hisp. & hist.

Gentiana 6. Clus. pan.

Gentianella alpina, Lob. Bavarica, Cam. hort.

Gentianella angustifolia, Lugd.

Gentianella minima verna fl. cæruleo, Eyst.

Vincetoxici species pusilla, Cæs.

Flos plerisque cæruleus, quibusdam can-
dicans.

IV. Gentianella alpina verna minor.

Gentianella minor, Cam. hort.

an Gentianella purpurea minima, Col.

V. Gentianella alpina æstiva centaureæ
minoris folijs.

Gentiana fugax 5. seu Gentiana 11. Clus. pan.
& hist.

Gentiana minor, Tab.

Calathiana verna Dalechampij, Lugd.

VI. Gentianella brevi folio.

Gentiana minima, Ad. Lob. Cast.

Gentiana fugax 4. vel Gent. 10. Clus. pan. & hist.

Vulneraria herba, Cast. ico.

VII. Gentianella cærulea oris pilosis.

Gentianella cærulea fimbriata angustifolia au-
tumnalis, Col.

VIII. Gentianella omnium minima : in
Prodromo descripta.

Gentiana pratensis.

I. Gentiana cruciata.

Herba fullonum, Brunf.

Cruciata, Trag. Fuch. (cui & Gentianæ spe-
cies) Dod. Ang. Gesn. hort. Lac. Lon. Lugd. Eyst.

Gentiana cruciata, Gesn. hort.

Gentiana minor, Matth. Ad. Lobel. Cast. Tab.
media, Cam.

Gentiana 3. quæ duplex, Clus. pan. & hist.

Cruciata gentianella, Thal.

Vincetoxicum alterum, Cæs.

Altera est procumbens & minor : altera ere-
cta & major : alterius flores intensè cærulei est
& tertia radice non pertusa.

II. Gentiana autumnalis ramosa.

Gentiana fugax five annua 1. vel Gentiana 7.
Clus. pan. & hist.

Gentiana 7. Tab.

Viola calathiana altera, sive polyanthemus,
Thal.

Gentianella multiflora autumnalis è cæruleo
purpurascens, Eyst.

Flore est cæruleo purpurascens, rarius can-
dido.

III. Gentiana pratensis flore lanuginoso.

Gentiana fugax altera sive Gentiana 8. Clus.
pan. & hist.

IV. Gent. pratensis flore brevior & majore.

Gentiana fugax 3. sive Gentiana 9. Clus. pan.
& hist.

V. Gentiana utriculis ventricosus.

Gentianella cærulea cordata, Col.

VI. Gent. angustifolia autumnalis major.
Pneumonanthe, Lob.

Calathiana viola autumnalis minor, Gesn. hort.

Calathiana autumnalis, Gesn. cat.

Campanula autumnalis, Dod. Eyst.

Gentiana 4. sive angustifol. 2. Clus. pan. & hist.

Flore est cæruleo dilutiore : est nigro : rarius
albo.

VII. Gentiana angustifolia autumnalis mi-
nor, floribus ad latera pilosis.

Pneumonanthe, Cord. hist. desc. Ad.

Viola calathiana autumnalis prima, Thal.

Gentianella autumnalis folijs centaureæ mi-
noris flore cæruleo, Eyst.

Gentiana palustris.

I. Gentiana palustris angustifolia.

Gentiana minima, Matth. Cast. desc.

Calathiana viola in pratis udis, Dod. gal. Lugd.

Calathiana viola autumnalis, Gesn. hort.

Pneumonanthe (in humentib. ericetis) Lob.
ob. Tab. Ger.

Gentiana angustifolia, vel 4. Clus. pan. & hist.

Cruciata sive Gentiana minima, Lugd.

Campanula pratensis, Lugd.

Floris color cæruleus, violaceus, purpureus.

II. Gentiana palustris latifolia flore pun-
ctato.

Gentiana 12. & punctata, Clus. pan. & hist.

Alisma folio glabro, in Phytopinace.

Floribus est subcæruleis, purpureis, viola-
ceis, punctis aspersis.

PLAN-

PLANTAGO.

Plantago ἀνθύλακος Diof. lib. 2. cap. 153. à forma, id est, lingua agnina dicitur: alijs πολὺννε & multinervia & ἐπὶ πλινθεῖ & septinervia. Latini, plantago, à planta ducto nomine.

Plantago latifolia.

I. Plantago latifolia glabra: quæ 1. in Prod.

II. Plantago latifolia sinuata.

Plant. rubra, Brunf. Trag. (vel major & 1.) Lon.

Plantago major, Matth. Fuch. Tur. Gesn. hort.

Dod. Cast. Tab. Cam. major latifolia, Ang.

Plantago latifolia, Cord. in Diof. Ger. latif. lævis, Ad. Lob. ico. vulgaris latifol. Eid. obf. Lugd.

Plantago & Centinervia, Cæs.

Plantago πολὺννε & major five rubra, Thal.

III. Plantago latifolia incana.

Plantago major, Brunf. Matth. Lon. Lug. Cam.

Plantago latifolia, vel media & 2. Trag.

Plantago media, Fuch. Dod. Gesn. hort. Thal.

Plantago major incana, Ad. Lob. Cluf. hist.

Plantago minor, Tur. minor Dioscoridis, Tab.

Plantago incana, Ger.

Cynoglossa quorundam, Lugd.

IV. Plantago latifolia rosea, flore expanso.

Plantago rosea, Cam. Ad. Lob. ico. Eyf.

Plantagini majori florem addidit, Camer. in

Plantago rosea exorica, Ger. (Matth.

V. Plantago latifolia rosea, floribus quasi

in spica dispositis.

Plantago rosea, Ad. Lugd.

Plantago multiplex, Tab.

Plantago rosea spicata, Ger. Eyf.

Hujus spicam, Cam. in Matth. Plantagini

majori, & Lob. in icon. Plantagini roseæ ad-

jectit. Unam esse, & differentiam in flore di-

solum tempore consistere, censemus.

VI. Plant. latifolia spica multiplici sparsa.

Plantago major altera, Dod. gal.

Plantago major spica multiplici, Dod.

Plantago paniculâ sparsâ Sarothrodes & Co-

rematophora, sive Scoparia, Gemmæ, Lob.

Plantago rosea Lobelij, Lugd.

VII. Plantago Indica.

Payco, herba ex Peru, Monar. Lugd.

VIII. Plantago peregrina sinuosa.

Plantago umbilicata, latifolia & convoluta,

Lob. ad. par. 2.

IX. Plantago latifolia incana spicis varijs.

Plantago peregrina latifolia Gareti, Cluf. hist.

Capitula varia: quædam rosam æmulantur,

quædam spicam: quædam ex media rosa bre-
vem spicam producant: in alijs ex spicæ parte
infima, alia capitula dependent.

X. Plantago villosa, seu incana lanuginosa.
Plantago Salmaticensis, Cynoglossum fortè
Diof. Cluf. hisp. & hist.

XI. Plantagini Hispanicæ similis.

Planta quæ Alexipharmacum est: in Epist. ad
Monard.

XII. Plantago latifolia glabra minor.

Plantago latifolia minor, Tab. Ger.

XIII. Plantago latifolia hirsuta minor.

Plantagini mediæ genus minimum, Thal.

Plantago angustifolia.

I. Plantago angustifolia major.

Plantago minor, Brunf. Fuch. Dod. Gesn. hort.

Lac. Lon. Lugd. media, Cast.

Plantago lanceolata, Trag. Ang. Tab.

Plantago longa, Matth. Lugd.

Plantago quinquenervia, Ad. Lob. Ger. πολὺννε-
& Thal.

Lanceola major, Cæs.

Variat: spicis aliquando bifidis: aliquando

loco spicarum sunt capitula, mirè variantia.

II. Plantago angustifolia major, caulium

summitate foliosâ.

Plantago quinquenervia rosea, Ger.

III. Plantago angustifolia prolifera.

Plant. angustifol. Gazetti, vel exotica, Cluf. hist.

IV. Plant. angustifolia serrata Hispalensis.

Plantago angustifolia altera, Cluf. cur. post.

V. Plant. angustif. fruticans, Cluf. cur. post.

VI. Plantago angustifolia minor, Tab. Ger.

Plantago pentaneuros minor, Thal.

Lanceola minor, Cæs.

VII. Plantago pilosa bulbosa.

Plantago Apula laciniata bulbosa, Col.

VIII. Plantago angustifolia paniculis la-

gopi, quæ 4. in Prod.

an Planta peregrina plantagini acutæ similis,

quæ Græcis *ναῖανόν*, *nu* dicitur, Rauv. Lugd.

Variat, modo paniculis lagopi est: modo ca-

pitulis rotundis, hirsutis, albis.

IX. Plantago trinervia fol. angustissimo:

3. in Prod.

Aa 3

X. Plan-

X. *Plantago trinervia montana.*

Plantago altera minima trinervia montana incana, Col.

*Plantago aquatica.*I. *Plantago aquatica latifolia.*

Plantago aquatica, Brunf. Trag. Matth. Fuch.

Dod. Tur. Gesn. hort. Lon. Ad. Lob. Cast. Thal.

Cæs. Lugd. Tab. Ger.

Limonium, Ang.

An huc referendum

Alisma sive Damasoniū, quæ Fistula pastoris &

Plant. aquatica Germanis, Cord. in Diosc. Lon?

II. *Plantago aquatica angustifolia.*

Plant. aquat. humilis angust. & longifolia, Lob.

Plantago aquatica minor, Cæs. Tab.

Plantago aquatica humilis, Ger.

III. *Plantago aquatica stellata.*

Alisma pusillum angustifoliū muricatum, Lob.

Plant. aquatica minor altera, Lob. ico. (ob.)

Damasonium stellatum, Lugd.

IV. *Plantaginella palustris.*

Plantago aquatica minima, Clus. hist.

HOLOSTEUM.

O *Agrostis Dioscorides, lib. 4. cap. 11. descripsit: & Plinius, lib. 27. cap. 10. inquit, Holosteum sine durezza est herba ex adverso à Grecis appellata, sicuti sel dulce.*

I. *Holosteum hirsutum albicans majus.*

Holosteum Salmaticum prius, Clus. hisp. majus, Eid. hist. Lob.

Holost. Salmaticense Clusij, Lugd. Cam. Ger.

Holosteum majus, Tab.

Holosteum quorundam, Cam. in Matth.

Plantago angustifolia albida, Dod.

II. *Holosteum hirsutum albicans minus.*

Holosteum Salmaticense minus, Clus. hist.

Holost. parvum Monspeliense, Ad. Lob. Ger.

Holosteum Monspelianum, Tab.

III. *Holosteum hirsutum nigricans.*

Holosteum quorundam, Lugd.

an Lanceola montana, Gesn.

IV. *Holost. sive Leontopodium Creticum:*

in Phyt. & Prod. descriptum

Leontopodium Creticum, Clus. hist.

Leontopodium legitimum, quod Catanance

creditum, Imperato.

Leontopodium, Catanance non est, Belli ep. 1. ad Clus.

V. *Holosteum Creticum alterum.*

Leontopodium Creticum aliud, Clus. hist.

Habbures, Cam.

Gorne albi catartici nomine Alpinus misit.

an Planta Plantagini similis, Lugd. ap.

VI. *Holosteum strictissimo folio majus.*

Coronopus sive Serpentina, Matth.

Coronop. syl. Matth. Gesn. Lob. Lug. Cast. Tab.

Serpentina, Dod. Ad.

Plantago marina, Cam.

Coronopus, Ger. ico. montanus, Cæs.

VII. *Holosteum strictissimo folio minus.*

Serpentaria omnium minima, Lob. Dod. Lugd.

Coronopus altera, Cæs. minor, Tab.

Coronopus sive Serpentina minima, Ger.

VIII. *Holosteum Mafsilienfe.*

Coronopi & Sedi montani media planta Maf-

silienfe, Ad. Lob.

Coronopus Mafsilienfe, Lugd. Tab.

Coronopus sive Serpentina minor, Ger.

IX. *Holosteo affinis, Cauda muris.*

Coronopus sylvestris, Trag.

Myofuros, Dod. gal. Lob. ico. quorundam, Thal.

Cauda muris, Dod. Ad. Lob. Lug. Tab. Cam. Ger.

Holosteon, Lon. Lugd. Cam. Thal.

CORONOPUS.

K *Coronopus Dioscoridi, lib. 2. cap. 158. & Theophrasto 7. hist. 9. ubi Gaza Silaginem vertit: Plinio, lib. 21. c. 16. & 1. 22. c. 19. Coronopus dicitur. Latini, pes cornicis à foliorum forma: & cornu cervi, nominatur.*

I. *Coronopus hortenfe.*

Coronopus, Trag. Matth. Fuch. Ang. Tur. Lac.

Lon. Ad. Tab. Eyft.

Coronopus fativus, Cord. hist. Cast. Cæs. Cam.

verus, Cord. in Diosc. Gesn. hort.

Pseudocoronopus, Dod. gal.

Cornu cervinum, Lob. Ger.

Herba stella, sive cornu cervinum, Dod.

II. *Coronopus sylvestris, hirsutior.*

Coronopus sylvestris, Cæs.

Coronopus Prochytae, Col.

III. *Coronopus maritima major.*

Plantago marina, Dod. gal. Ad. Lob. Tab. Ger.

Plantago maritima, Gesn. hort. Lugd.

Plantag.

Coronopus minimus tenuifolius maritimus,
Colum.

Coronopus marinus, Cam.

V. *Coronopus maritimus minimus hirsutus*: in Prod. descriptus.

IV. *Coronopus maritimus tenuifol. lævis.*

P S Y L L I U M.

Ψ YLLOR Dioscorides lib. 4. c. 70. folijs Cornopo non dissimilibus scribit, hisutis, longioribus : sic dictum quod
 404as, id est, pulices, si virens domum importetur, in ea gigni non finat : vel ut Dioscoridi & Plinio, a se-
 mine pulci simili. Theophrasto 7. hist. 8. novum dicitur : oculum canis & canariam Gaza vertit, Plinium forte
 imitatus, qui l. 25. c. 11. Psyllum & Cyncides nominavit, Latinis pulicaria.

I. Pŷŷŷium Dioŷcoridis, vel Indicū crenatis folijs: pro i. in Prod. deŷcriptum.

III. *Psyllium majus erectum.*

Phyllium primum, Ang.
H. DC. 11.

Psyllium, Trag. Matt. Fuch. Tur. Cord. in Diof.
& hist. descr. Dod. Ges. hor. Ad. Lob. Cast. Ger.

II. Psyllium majus supinum.

Cynops Theophrasti, Gef. hort.

Psyllium alterum, Matth. Cast. Lugd. Tab.

Pulicaris herba, Lugd.

Plyllium perenne, Gef. hist. an Cam.

Pfyll.minus, Cæf. secundum, Ang. primū, Tab.

Phyllium Plinianum fortè, majus radice perennifolium, Ad. Lob.

IV. Psyllium minus, quod Gottne rubri & Botrio rubro nomine accepimus, & pro 2. in Prodr. descr.

Psyllium tertium, Ang. majus, Cæs.

lan Kaly 3. Alpini, minus rectè pictum.

Psyllium semper virens, Ger.

SECTIO SEPTIMA.
PYROLA; BISTORTA; LIMONIUM; POTAMOGETON; NYMPHÆA; TRIBULUS AQUATICUS; SAGITTA; DRACONTIUM;
Arum; Arisarum; Asarum; Tussilago; Petalites;
Cacalia & Lappa.

P Y R O L A.
Pyrola, nomen à folio, quod pyri folium referat, accepit: quam aliqui Limonium, alij Britannicam volunt.

I. *Pyrola rotundifolia* major.

III. *Pyrola folio mucronato ferrato.*

Pyrola rotundifolia major.

mbrosia, Dalech. in Diosc. montana, Lugd.

Lob. Cast. Lüg. Tab. Car. Frut.

pyrola 2. & tenerior, Clus. pan. & hist.

Pyrola vulgaris, Clus. hist.

Urola minor, Thal.

Limonium, Fuch. Tur. sylvestre, Trag.

IV. *Pyrola alfinis* flore Europæa.

Beta sylvestris Cord. in Dic. C.

herba trientalis, Cord. ob. Franc.

pyrola major five Beta sylv. Thal

finanthemos, Thal.
fine alpina, Svvencck.

Hæc folia

Major est & minor, ut & sequens.

...folio est vel ampliore molliq̃: vel mi-
nore & duriore.

V. *Pyrola alfinis* flore Brasiliiana: in Prod.
scr.

Pyrola rotundifolia minor.

V I. *Pyrola frutescens arbuti folio.*

Pyrola minima, Clus. pan. & hist.

rola 3. vel frutescens, Clus. pan. & hist.

minima, Eyst.

BISTOR-

BISTORTA.

Bistorta dicitur, quod radice in se contorta & convoluta constet: quam alij Limonij, alij Britannicae, alij Behen rubri speciem faciunt. Hujus Plinius l. 24. c. 16. & l. 25. c. 11. inter Dracontia meminisse videtur: forre ejusdem l. 25. c. 13. Molybdana, id est, Plumbago, quod plumbum, oculi vitium tollat.

I. Bistorta major radice minus intorta.
Colubrina & Dracunculus major, Brunf.
Bistorta foemina, Eidem.
Bistorta major, Trag. Dod. gal. Ang. Ges. col. Ad.
Thal. Tab. Ger. Clus. hift.
Bistorta, Cord. in Dioscor. & hift. Matth. Dod.
Caes. Cast. Lugd.
Bistorta Britannica, Lob.
Serpentaria foemina & Colubrina, Fuch.
Colubrina, Lon.
Limonium, Ges. hort.
Bulapathum seu Bistorta, Fracast.
II. Bistorta major radice magis intorta.
Colubrina & Dracunculus minor, Brunf.
Bistorta mas, Eidem.
Colubrina minor, Trag.
Serpentaria mas seu Bistorta, Fuch.
Bistorta, Lon. minor, Dod. gal. Ges. ho. Lac. Tab.

Bistorta media, Ang.
Bistorta latifolia, Ger.
Bistorta major, Eysl.
In folijs & radice differentiae: folia alteri
majora & rugosa: alteri minor & laevia: &
hujus radix magis intorta: illius major, minus-
que complicata.
III. Bistorta alpina maxima: in Prod. desc.
& Schvvenck.
IV. Bistorta alpina media.
Limonij species minor, Ges. hort.
Bistorta minor, Ad.
Bistorta minor seu alpina, Camerar. in Mat-
thiolo.
V. Bistorta alpina minor.
Bistorta minor, Ang. Clus. pan. Ger.
Bistorta alpina minor, Clus. hift.
Bistorta minima alpina alia, Cam.

LIMONIUM.

Limonium ὀνόμαζεν Dioscoridi l. 4. c. 16. quod οὐ λεμῶσι in pratis (quamvis & in palustribus) proveniat.
Plinio l. 20. c. 8. Beta sylvestris, quam Limonium vocant, alij neuroides.

I. Limonium maritimum majus.
Limonium, Matth. Lac. (cui & Been rubrum)
Ad. Lob. Caes. Cast. Lugd. Ger.
Been rubrum, Limonio seu Bistortae cognata,
Ges. hort.
Behen rubrum officinarum, Guil.
Valerianae rubrae similis, Dod.
Limonium primum, Tab. Cam.
II. Limonium alterum, Matth. Lugd. Tab.
cui & Pyrola: quid est?
Limonium Matthioli secundum, Ad.
III. Limon. maritimum minus oleae folio.
Limonium parvum Narbonense oleae folium,
Ad. Lob. ico. Tab.
Limonium parvum Narbonense, Lugd. Cam.
Limonium alterum exiguum, Caes.

Limonium parvum, Ger.
In hoc magna varietas occurrit.
IV. Limon. parvum bellidis minoris folio.
Limonium pumilum, Clus. hift.
V. Limonium maritim. minus foliolis cor-
datis: quod i. in Prod.
VI. Limonium maritim. minimum: quod
2. in Prodr.
VII. Limonium peregrinum folijs asplenij
Limonij elegans genus, Rauv. & Lugd. ap.
Limonium peregrinum, Clus. cur. post.
Limonium Syriacum, Eysl.
Cichorium globulare, Imper.
VIII. Limonium peregrinum folijs forma
flore Aristolochiae.
Limonio congener, Clus. hift.

POTAMOGETON.

Potamogeton, quasi fluminibus vicina, quod palustribus & aquosis nascatur, Diosc. l. 4. c. 101. & Aelianus
l. 6. anim. c. 46. quo berinaceum interfici scribit. Et ex vinctis, quasi spicata, ob caulem, quem floribus & se-
mine spicatum ex se mittit. Plinio l. 26. c. 8. Potamogeton folijs Betae & c. subjungit: Castorem hanc aliter novisse
tenui folio veluti equinis seris, thyrso longo & laevi, in aquosis nascentem: hoc Myriophyllum aquaticum videtur.
I. Potam.

I. Potamogeton rotundifolium.
 Potamogeton, Trag. Matt. Fuch. Ang. Lac. Lon.
 Cæs. Cast. Lugd. Tab.
 Potamogeton, Dod. gal. latifolium, Ger.
 Potamogeton, Λιόφυλλον, Thal.
 Potamogetoni similis rotundiore folio, Cord.
 in Diosc.
 II. Potamogeton, Salicis folio.
 Phyllitis lacustis, Cord. hist.
 Potamogeton, Dod.
 Potamogeton, sive fontalis & spicata, Ad. Lo-
 bel. icon.
 Potamogeton 2. Dalechampi, Lugd.
 Potamogeton λιόφυλλον, Thal.
 Potamogeton angustifolium, Tab. Ger.
 III. Potamogeton longo serrato folio.
 Lappathi genus sylvestre, Gef. hort.
 Oxylapathum aquaticum, Lugd.
 IV. Potamogeton folijs latis splendentibus.
 Potamogeton altera, Dod.
 Potamogeton μελανόφυλλον, Thal.
 Habetur major & minor species.
 V. Potamogeton folijs angustis splenden-
 tibus.

Potamogeton alterum, Dod. ed. belg. & post.
 VI. Potamogeton folijs crispis, sive Lactu-
 ca ranarum.
 Alga secunda, Trag.
 Fontilapathum pusillum, Ad. Lob. ico.
 Tribulus aquaticus minor, Clus. pan. & hist.
 Potamogeton 3. λιόφυλλον seu crispum, seu fimbri-
 atum, Thal.
 an Alga Hydrolapathi folio, Gef. col.
 Hæc duplex: altera sarmentis planis, altera
 rotundis, & hæc brevioribus, mucronatis, &
 minimè in ambitu ferratis: utriusque Clusius
 meminit.
 VII. Potamogeton ramosum angustifo-
 lium.
 Tribuli aquatici minimi nomine, D. Francus
 misit: quod 1. in Prodr.
 VIII. Potamogeton gramineum ramosum.
 Fontilapathi graminei nomine, à D. Bursero ex
 Austria: quod 2. in Prodr.
 IX. Potamogeton minimum capillaceo fol-
 io: quod 3. in Prodr.
 X. Potamogeton capillaceum capitulis ad
 alastrifidis: hoc 4. est in Prodr.

N Y M P H Æ A.

N *Νύμφαια* Theophrasto 9. hist. 13. Dioscoridi l. 3. c. 148. cui sic dicta, quoniam aquosa amet. At Plinio l. 25.
 c. 7. natam tradit ex Nympha Zelotypia erga Herculem, unde quibusdam Heracleon dicatur. Officinis
 Nenuphar. Genera duo Dioscoridi & Plinio: altera flore albo, radice nigra: altera flore luteo, radice alba.

Nymphaea alba.

I. Nymphaea alba major.
 Nenuphar album, Brunf.
 Nymphaea alba, Brunf. Matth. Ang. Dodon.
 Cord. hist. Lon. Ad. Lobel. Taber. Thal. Ger.
 Clus. hist.
 Nymphaea candida, Trag. Fuch. Tur. Cæs.
 Nymphaea major alba, Lugd. Cast. Eyf.
 Lotus Ægyptia, Alpini.
 Nymphaeæ folia D. Sigfridus Helmstadio ad-
 meminit, quæ latissima, tenuissima, pallide vi-
 rentia: an talia sint prima Nymphaeæ folia, &
 quæ sub aqua latitant, quæ dein extra aquam
 duriora & crassiora reddantur, ut cum mariti-
 mis sit, considerandum.
 Addit Eyfset. aliam quæ nullatenus primi sit
 dissimilis, nisi quod omnia minora habeat.
 Nymphaea alba minor, Eyf.
 II. Nymphaea alba minor.
 Nymphaea parva, Matth.
 Nymphaea altera lutea minor, Lugd. ico.

Nymphaea alba minor, Ad. Tab. Ger.
 III. Nymphaea alba minima.
 Morfus ranæ, Dod. Ad. Lob. ico. Cast. ap. Tab.
 Nymphaea minor alba, Lugd.
 Nymphaea parva, Cæs.
 Florem ex tribus foliolis subrotundis & gla-
 bris observavimus: at hist. Lugdun. florem ex
 quinque foliolis oblongis & subhirsutis com-
 positum, pingit.
 IV. Galum radix aquatica in Sunda valde
 refrigerans: par. 4. Ind. Ord. 8. quid?
 Nymphaea lutea.
 I. Nymphaea lutea major.
 Nenuphar luteum, Brunf.
 Nymphaea lutea, Trag. Matth. Fuch. Ang. Tur.
 Dod. Lon. Lob. Cast. Tab. Ger. Eyf.
 Nymphaea lutea major, Lugd. Clus. hist.
 Nymphaea altera, Cord. in Diosc. flore ex toto
 luteo, Cæs.
 Nymphaea citrina, Cord. hist.
 II. Nymphaea lutea minor magno flore.

B b

Nym-

Nymphæa lutea minor, Lug. Ger. Dod. ed. belg.
Nymphæa secunda, Tab.

III. Nymphæa lutea minor parvo flore.

Nymph. lutea minor, Septentrion. Ad. Lob. ico.

Nymphæa altera lutea, Lugd.

an Nymphæa parva alia, Cam. in Matth.

IV. Nymphæa lutea minor flore fimbriato.

Nymphæa alia minor, Lugd.

TRIBULUS AQUATICUS.

Tribulus & *trivulus* Dioscoridi l. 4. c. 15. Theophrasto 4. hist. 11. (id est Tribulus aquaticus) à triplici cuspidē, ad similitudinem machinularum ferrearum, quæ forma trigona sunt, dicitur.

Genera duo Dioscoridi & Theophr. 6. hist. 5. alter terrestris folijs effigie portulacæ, vel ut Theophr. cicerio folio: alter palustris vel aquaticus. Plinio l. 22. c. 10. Tribuli unum genus in hortis, alterum in fluminibus tantum: qui l. 21. c. 16. scribit Tribulum non nisi in palustribus nasci. folio ad Ulmi effigiem: at in reliquo orbe genera duo, uni Cicerula folia, alteri aculeata esse.

Tribulus aquaticus: & Trag. Matth. Dod. Ang.

Lac. Cord. in Diof. Ges. hort. Lon. Ad. Lob. Cæ.

salp. Cast. Lugd.

Butomos Damocratis, Ang.

Tribulus lacustris, Cord. hist.

Tribulus aquaticus major, Clus. pan.

SAGITTA.

Sagitta, à foliorum forma tricuspidi, superne in unam, inferne in duas desinentium, nomen habet. Phleum Theophrasti 4. histor. 9. & 11. esse volunt: Notandum tamen apud Theophrastum Phleum & Phleos differre: nam Phleum genere neutro, palustris planta est: at Phleos & Stæbe 6. histor. 1. idem sunt, & forte Poterium erit. Plinio lib. 21. cap. 17. Magopistanam dicit à Græcis vocari, quam inter ulvas Sagittam vocamus.

I. Sagitta aquatica major.

Sagitta major, Matth. Dod. Cast. Tab.

Pistana Magonis sive Sagittaria aquatica Plinij, Ad. (cui an Stæbe foemina) Lob.

Phleos mas latifolia, Lugd.

Barba sylvana recentioribus, Cæf.

Sagittaria major, Ger.

II. Sagitta aquatica minor latifolia.

Sagitta minor, Matth. Dod. Ad. Lob. Lugd. Cast. Tab.

Pistana Plinij, Ang.

Sagitta & Sagittalis, Cord. hist.

Sagittaria minor, Lob. ico. Ger.

III. Sagitta aquatica minor angustifolia.

Phleos sive Stæbe Theophr. angustifolia, Lugd.

Sagitta minor angustifolia, Tab. Ger.

DRACUNTIIUM.

Δracuntium Dioscoridi lib. 2. cap. 196. à maculis purpureis, quæ in caule visuntur, ita ut anguem planè, ut Diosc. loquitur, reserat: sic & Theophr. 7. hist. 11. & 9. ejusd. 22. At Plinius lib. 24. cap. 16. de Dracunculo & Dracuntio egit.

Genera: in quibusdam vetustis Dioscoridis codicibus majoris minorisq; Dracunculi historia, speciatim derivis capitibus adnotata, reperitur: Major quidem folijs rumicis sibi invicem implicitis, caule bicubitali, versicoloribus, draconum maculis notato, purpureis tamen eminentibus. Minor verò, folio est hederaceo magno, candido notis insignito, caule versicolore anguis effigie, maculis purpureis resperso. Verum Galenus, Aegineta & Serapio, qui in simplicium materia Dioscoridem secuti sunt, unius tantum meminere, quare prius caput aliqui ut supposititium removere. Plinius tria fecit: primum, folijs Beta & Aro simili: alterum radice longa articulosa: tertium, folio majore quam cornu radice arundinacea nodis geniculata: at lib. 25. cap. 3. alium Dracunculum, versicoloribus viperarum maculis notatum proponit: de quo sic Theophr. sunt qui genus quoddam Dracunculi Arum vocent, quod ejus caulis varietatem quandam habeat.

I. Dracunculus bistortæ folio.

Dracunculus major, Matth. Dod. gal. Cast.

Dracontium majus, Tab. Ger. Eyst.

Serpentaria major, Lugd.

Hunc

Hunc nec dum vidimus, de quo Dod. edit. lat. an in rerum natura sit, dubitat, & si sit, Bistortæ speciem esse: at Adversaria inveniri negant. Guil. in suo Theo. quæsito prætextu, ut doctior videretur, Matthiolum effinxisse scribit.

I. Dracunculus polyphyllus.

Dracontium majus, Brunf. Dod. Ger. Eyf.
Dracunculus, Fuch. Tur. Gefn. hort. Cæf.
Dracunculus major, Trag. Lac. Fuch. Tur. Cord. in Diosc. Lon. Cam.
Dracunculus minor, Matth. Cast. Tab.
Dracunculus polyphyllus, Cord. hist.
Serpentaria Dracunculus major verus, Ang.
Anguina dracontia, Ad. & Serpentaria colubrina, Lob.

Dracunculus sive Serpentaria major, Lugd. cui & Serpentaria minor Matthioli.

III. Dracunculus sive Serpentaria triphylla Brasiliana, in Prod. descripta.

IV. Dracunculus palustris, sive radice arundinacea, Plinij.

Dracunculus Plinij 3. Fuch.
Hydropiper rubeum, Eid. ico.
Dracunculus aquaticus, Matth. Dodon. Cast. Cam. Ger. Eyf. sylv. Tur.
Dracunculus palustris, Dod. gal. Lugd. minor, Lon.
Aron palustre, Gefn. hort.
Anguina aquatica sive Dracunculus, Ad. Lob.
Dracontij genus in palustrib. Germaniæ, Cæf.

A R U M.

Arum apud Syros *Αρούρα* vocatum, folijs est Dracunculi Dioscoridi, lib. 2. cap. 197. Aron cui folium cum latitudine cavum atque cucumeracium (de vulgo dicta Colocasia intelligendus) Theophrasto 7. hist. 12. Verum Plinius, lib. 24. cap. 16. scribit, quosdam Aron eandem cum Dracontio dixisse. Glaucias satum dixerit, Dracontium sylvestre Arum pronunciando: aliqui radicem, Aron appellaverunt, caulem vero, Dracontium. Aron feminam in cibus prætulit, quoniam mas durior sit, & in coquendo lentior. At lib. 19. cap. 5. inter bulbi genera esse ait, quod in Aegypto Aron vocent Scilla proximum, amplitudine folijs lapathi, &c. radice mollioris nature, que edatur & cruda. Observavimus Aron vulgatum, communiter nullis maculis notatum: aliquando lituris nigricantibus vel purpureis signatum. Sic aliud folio majore & acutius, aliud rotundius, durius, per totam ætatem vivente. Illius folia aliquando maculis albis asperguntur, aliquando foliorum venæ omnes albicant. Et pistillus colore variat, alteri purpurei, alteri ex albo lutei coloris est.

I. Arum venis albis.

Arisarum, Matth. Dod. gal. Ad. Cast. majus, Gef. hort. prius Matthioli, Lon. Lugd.
Arisarum latifolium Matthioli, Tab. Ger.
Dracunculus alter, seu hemicophyllos, Cord. hist. descript.
Dracunculus minor, Gefn. ap. Lac.
Dracontium minus, Dod.
Arum maculatum, Cord. schol.
Aron aliud folio maculato, Thal.
Arum majus Veronense, Lob.
Callæ primum genus Plinij, Dalech. in Plin.

II. Arum maculatum, maculis candidis, vel nigris.

Ari tertium genus, Trag.
Arum nigricantibus lituris signatum, Dod.
Arum, Matth. Lugd. Eyf. majus folijs albis maculis notatis, Cast.
Arum offic. Lob. quoad ico.
Arum maculatum, Tab.
Gicherum sive Gigarum vulgo folijs maculosis, maculis candidis vel nigris, Cæf. alp.

III. Arum vulgare non maculatum.

Aron, Brunf. Gefn. col. Eyf.
Ari primum genus, Trag.
Arum, Fuch. Tur. Cord. in Diosc. & hist. Gefn. hort. Lac. Lon. Thal. Tab. vulgare, Cam.
Arum Dioscoridis, Ang.
Arum majus, Ger.

IV. Arum minus, Matthioli. Cast. Lugdun. Tab. Ger.

V. Arum Byzantinum, Clus. hist.

Variat folijs quibusdam, maculis nigris exilibus distinctis, alijs minimè: flos etiam colore variat: nam quod folijs est maculatis, penicillum folliculo inclusum habet, alia candicantem.

VI. Arum maximum Ægyptiacum, quod vulgo Colocasia.

Arum Ægyptium, Matth. Gefn. hort. Dod. Lob. Cast. Lugd. Camer. (qui vult hodie Ægyptijs Colocasia dici) Col.
Colocasia, Gefn. hort. Tur. Lugd. Clus. hisp. & hist. Eyf.

Faba Ægyptia, Bellonio, cui & Lotus & Faba Ægyptia.

Colocasja quæ faba Ægyptia non est, Ang. Colocasja, an Aron Ægyptium putatum, Ad. Culcas, Faba Ægyptia, Alpi. Aron magnum, Colocasja vulgo, Pampina Paradyfi, Cæs.

Talasse, Javanensibus: Lolade, Malayce: Colcaz. par. 4. Ind. Orient. c. 6, fig. 15.

Nec fructum nec florem ferre Bellonius asserit: at Lugd. ex Mycone cum flore pingit, qui imaginarius potius, ut rectè Doctiss. Columna: Horti Pisani olim præfectus Casaubonus florem observavit, qui odoratissimus fuit, cum aliarum Aaronis specierum flores forteant.

VII. Colocasja, sive Faba Ægyptia veterum, Diosc. l. 2. c. 128. *κόκκος αἰγυπτίος* Faba Ægyptia, quam aliqui ponticam vocant, folium habet amplum instar petali florem roseum: radix harundinis radice crassior, quæ *πολύκωμος* vocatur, &c.

Et Theophrastus 4. hist. 10. inter cetera scribit, fabam Ægyptiam in paludibus, caput super caulem esse favo orbiculato vesparum non absimile, inque singulis cellis singulas fabas contineri, paulo super id eminentes, multitudine plurimum terdenas: radicem habere validam spinis subhortentem, &c. Et Plinius, l. 21. c. 15. in Ægypto nobilissima est Colocasja, quam cymon aliqui vocant. Hanc à Nilo metunt, &c. folijs latissimis, etiam si arboreis comparentur, ad similitudinem eorum, quæ Personata in nostris annibus vocamus: adeoque Nili fuit doribus gaudent, ut implexis Colocasjæ folijs

in variam speciem vasorum, potare gratissimum habeant.

Ex his liquet, Fabæ Ægyptiacæ radicem, Colocasiam veteribus dictam fuisse, & minimè à Faba hac Colocasiam separandam: dein radicem non fuisse bulbosam, qualis est Colocasja recentiorum, sed arundinaceam & asperam.

Quare rectè Doctiss. Columna, Aron Ægyptium (sive Colocasja recentiorum) non est Colocasja, seu Faba Ægyptia veterum: Et Cordus

in Diosc. rectè, dum Fabæ Ægyptiacæ radicem, Colocasiam dicit. At dum Anguillara, Colocasiam, Fabam Ægyptiam non esse asserit, de Colocasja recentiorum intelligendus est. Verum

Matthiolus ne videretur (ut rectè Columna) Fabam Ægyptiam ignorasse, quam alias rectè

ab Aron Ægyptio diversam fecit, ex idæa affabre depictam iconem historię accomodatam proposuit, non animadvertens vesparum favum

minimè rectè fuisse expressum, ut Ciborion (*κύβωρον ἢ κύβωρον* quasi loculamentum Dioscoridi) exprimeret, quod etiam genus vasculi &

poculi esse apud antiquos, Athenæus refert. Hunc secuti sunt Lac. Lugd. Cast. Durantes, Fabam Ægyptiam vocantes & pingentes: Lonicerus item & Durantes, sed Colocasiam nominantes. Et Guilandinus vult Matthiolum pro

Faba Ægyptia Ari genus, quod in multis Italiæ locis frequens, perperam proposuisse.

VIII. Fabæ Ægyptiacæ Dioscoridis affinis. Fructus peregr. an Faba Ægyptia, Diosc. Clus.

exot. lib. 2. cap. 13. Fabæ Ægyptiacæ fructum peregrinum Clus. belle respondet, Colum.

exot. lib. 2. cap. 13. Fabæ Ægyptiacæ fructum peregrinum Clus. belle respondet, Colum.

exot. lib. 2. cap. 13. Fabæ Ægyptiacæ fructum peregrinum Clus. belle respondet, Colum.

exot. lib. 2. cap. 13. Fabæ Ægyptiacæ fructum peregrinum Clus. belle respondet, Colum.

exot. lib. 2. cap. 13. Fabæ Ægyptiacæ fructum peregrinum Clus. belle respondet, Colum.

ARISARUM.

A *ῥιζαὶ Dioscoridi, lib. 2. cap. 198. exigua herbula est, cujus radix olivæ magnitudinem implet: majoris quam Aron acrimonia. Plinio, lib. 24. cap. 16. Arisarum similis Aro, minor tantum, minoribus folijs & utique radice, quæ tamen olivæ grandis magnitudinem implet.*

Genera duo Plinio: alba, inquit, geminum caulem: altera unum tantum emittit: utraque medetur ulceribus manantibus, &c.

I. Arisarum latifolium majus. Arisarum latifolium alterum, Clus. hisp. & hist.

II. Arisarum latifolium alterum. Arisarum alterum, Ang.

Arisarum Narbonense. Ad. an idem sit cum latifolio Clusij, dubitat Lob.

Arisarum latifol Clus. hisp. Dod. Lob. Tab. Ger. Arisarum primum, Clus. hist. (eiusdem.)

Arisari alt. genus, Cæs. an potius Aron parvum

Callæ alterum genus Plinij, Dalech.

III. Arisarum, Thal. in sua Hercynia recenset, quod ab alijs Arisari speciebus à Matthiolo exhibitis, diversum sit; quid sit ignoramus.

IV. Arisarum angustifolium, Dioscoridis, fortè.

Arisarum, Gesn. ap. Lac. Cæs. Arisarum primum, Ang. alterum, Matth. Dod.

gal. Lon. Lugd.

Arisarum

in quo semen, quod non margaritis simile, sed oblongum, later, num de nostra intelligendi sint, dubitamus: nisi velimus assentiri Dalechampsio, qui in florum umbilico, granum rotundum niveum, margaritæ simile promittere (cui rectè Plinius comparavit) quod excusso flore nudum nitidumque, dependeat, scribit.

I. Cacalia tomentosa: in Phytop. & Prod. descripta.

II. Cacalia folijs crassis hirsutis.

Cacalia Ghini, in desc. Pilati, Lugd. du Choul.

Cacalia 1. & vulg. incano folio, Clus. pan. & hist.

Cacalia, Ang. Cæf. Lugd.

III. Cacalia folijs cutaneis acutiorib. & glabris. Cacalia, Dalech. in Diosc. Ad. Lob. (brist.)

Cacalia 2. vel Cacalia glabro folio, Clus. hist.

Tussilago alpina, sive montana, Dalech. Lugd.

cujus flores luteos dicit. (quid?)

IV. Cacalia: congener planta, Cl. pan. & hist.

LAPPA SIVE ARCIUM.

Arcium sive *περσώνιον* aut *περσώνιον* (id est Personata, quasi Larva) folia habet cucurbitæ, majora tamen, duriora, nigriora, & hirsutiora, & c. Dioscoridi, l. 4. c. 107. Personata Græci Arcium vocant folia habet majora, cucurbitinis hirsutiora, nigriora & crassiora, & c. Plin. l. 25. c. 9. Genera duo Galeno 6. simp. primū Personata simile, quod Diosc. l. 4. c. 106. *Ἀρκίου ἢ Ἀρκίου* vocat: & Plin. l. 27. c. 5. Arcium: Alterum folijs cucurbitinis, quod Dioscoridis est *Ἄνερον* & Plinij Personata, & etiam Personata, cui folio nullū sit latius, & grandes lappas fert. At vulgo alia est major, quæ & Arcium & Arcium est Diosc. alia minor, quæ Diosc. l. 4. c. 138. *Ἄνερον* (quod flavos capillos reddat) dicitur, & *χοιρανόχορον*, quasi strumarū perniciēs: hinc quibusdā Strumaria nominatur.

I. Lappa major, Arcium Diosc.

Lappa major, Brunf. Trag. Tur. Cæf.

Personata, Lac. Lon. Ad. Lob. Lugd.

Personata major, Matth. Cast.

Personata, Fuch. Fracast.

Bardana sive Lappa major, Dod. desc.

Arcium, Ang. Dod. gal. Cord. in Diosc.

Arcium personata, Thal.

II. Lappa rosea: in Prod. descripta.

III. Lappa major montana, capitulis tomentosis, sive Arcium Dioscoridis.

Personata seu Lappa major altera, Matth. Lug.

Bardana sive Lappa major, Dod. ico.

Arcium montanum, an Personata Plinij, Ad.

Arcium mont. & Lappa minor Galeni, Lob.

Arcium, Cæf. alp.

IV. Lappa montana altera lanuginosa.

Arcium quorundam, Lugd.

V. Arcium ex cod. Cæf. Dod. Lugd. quid?

VI. Lappa minor, Xanthium Dioscoridis.

Lappa minor, Brunf. Trag. Ericio Cordo.

Xanthium, Matth. Ang. Dod. ut: Fuch. Tur.

Cord. in Diosc. & hist. Gefn. hort. Lac. Lon.

Thal. Cæf. Cast. Tab. Lugd.

Xanthium sive Strumaria, Ad. Lob.

Bardana minor, Ger.

CASPARI BAVHINI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER SEXTVS.

SECTIO PRIMA.

VIOLA; LEUCOIUM; HESPERIS; LYCHNIS
ET SAPONARIA.

VIOLA MARTIA.

Viola, l. 4. c. 122. alijs, l. 4. c. 122. *ἡ ποικυλὴ*, Viola purpurea, à floris colore. Theophr. 1. hist. 15. l. 1. & 1. hist. 21. l. 1. *ἡ μέλαινα ἢ μελαύουσα*, nigram violam, à florum colore nigricantis purpurea, vocat. Plin. l. 21. c. 6. Ex Viola quæ spontè apricis & macris locis proveniunt purpurea, latiore folio statim ab radice carnosio excunt, solag. Græco nomine à cæteris discernuntur, appellata *Fa*, ut ab his *Fanthina* vestis. l. 1. Græcis vocatum in Geoponicis Nicander credidit, Hermolaο referente, quod Nymphæ quædam *Fonie*, florem eum Jovi primum munere dederrint. Alij l. 1. volunt dici, quod cum Jupiter puellam *Fo* adamatam in vaccam convertisset, terra florem hunc pabulo ejus produxerit, qui propter ipsam factus, ab ipsa nomen acceperit. Hinc Latinis Viola, quasi virula. Genera

Genera plura Plinio, purpurea, lutea, alba: sed de purpureis primum, quarum unum genus apud Dioscoridem & Plinium.

Viola Martia rotundifolia.

I. Viola Martia purpurea flore simplici odore.
Viola fativa, Brunf.
Viola Martia odorata nigra seu purpurea, Trag.
Viola purp. Fuch. Matt. Lac. Ad. Cæf. Cast. Lug.
Viola nigra, Dod. Cord. in Diosc. Ger. Clus. hist.
Viola, Lon. & Viola nigra, Gef. hort.

Viola Martia purpur. Tab. præcox purpur. Lob.
Flos communiter coloris in cæruleo subnigro purpurei: qui cultura grandior fit: quandoq; folijs latioribus Calthæ æmulis, quæ

II. Viola Martia inodora sylvestris.

Viola sylv. Brunf. Ang. inodora, Dod.
Viola purpurea sylv. five canina, Trag.
Viola nigra sylv. species, Gef. hor.
Viola canina, Lon. Tab. sylv. Ger. desc.
Viola can. cærulea inodora syl. ferotina, Lob. ic.
Viola Martia sylv. Thal. Martia canina, Eyf.

Flos cæruleus, aliquando pallidus: duplex est, altera major folijs majoribus & rotundioribus: altera minor, folijs mucronatis oblongis ac striatioribus: & Gesnerus in monte fracto meminit montanæ, quæ solum folijs minoribus & solidioribus à vulgari differat: est &

III. Viola Martia alba.

Viola alb. Brunf. candida, Dod. Cæf. fl. albo, Ger.
Viola Martia candida, Trag. alba, Tab. Eyf.

Viola sylv. albo flore, Gef. hort.

Viola Martia alba hort. & camp. odora, Lob. ico.

Hæc aliquando odora: aliquando nullo aut languido odore: & hæc folijs est gracilioribus.

IV. Viola Martia multiplici flore.

Viola nigra flore pleno, Dod. gal.

Viola dasypodion, dasyphyll. malim, Ger. hor.

Viola Martia purpurea, Lob. ico.

Viola purp. & alba multiplex, Tab. Ger. Eyf.

Viola flore multiplici, Dod. fl. pleno, Cast. Cam.

Viola cærul. fl. numerosis folijs constantib. Cæf.

Variat floribus colore purpureo, rubello, candido, ex purpureo & albo variegato: hinc

Viola Martia alba, flore multiplici albo: flos albus, exterius purpureus, ut Viola variegata

dici possit, Eyf. est & biflora, Viola species Byzantij colitur, Martia similis, sed flore infinitis

foliolis constructo, & Rosam Damascenam æquante, non solum magnitudine, sed & odore

nostrates superante: Costæus in Mesuë, & Cam.

V. Viola alpina folio in plures partes dissecto.

an Viola montana laciniato folio, Clus. hist.

VI. Viola alpina purpurea exiguis foliis.

Viola montana 2. Clus. pan. & hist. (Lun.)

an Viola Martia folio min. & solidiore, Gef. de

VII. Viola alpina rotundifolia lutea.

Viola luteola minore flore, Gef. hort.

Viola montana fl. luteis, Lob. obs.

Viola montana. 1. Clus. pan. & hist.

Viola lutea, Lob. ico. Cæf. Cast.

Viola Martia lutea inodora alpina, Cam.

Gramen Parnassi aliud, Lugd.

Viola Martia foliis oblongis.

I. Viola montana pumila angustifolia flore niveo inodoro.

Viola montana pumila, Clus. cur. post.

II. Viola Martia arborescens purpurea.

Viola arboresc. Matt. Cast. Tab. vel potius recta,

Viola fruticosa, Gef. hort. (Cam.)

Mater Violarum, Dalech. Lugd.

Viola elatior, Clus. hist.

Viola erecta flore cæruleo, &

Viola erecta flore albo, Eyf.

Flore est ex cæruleo purpurascente, vel ex cyaneo albescente.

III. Viola tricolor erecta, an Jovis flos Theophrast. 6. hist. 6.

Viola assurgens tricolor, Dod. Ger.

Viola purpurea varietas, Ad.

Viola Martia surrectis cauliculis, Lob.

IV. Viola montana tricolor odoratissima.

Viola montana 3. five tricolor, Clus. pan. & hist.

Viola flamm. major violaceo colore mixta, Eyf.

V. Viola tricolor hort. repens: an φλέγυ φλέγυ, Theoph. 6. hist. 6.

Herba Trinitatis, Brunf. Fuc. Lon. fativa, Trag.

Jacea five flos Trinitatis, Matth.

Jacea major five Viola tricolor, Cast.

Viola flammea, Dod. gal. Cæf.

Viola nigra perfimilis, flos Trinit. vel heptachrum, Gef. hort.

Viola tricolor, Dod. Clus. Ger.

Viola flammea, coloria, calida, Ad. Lob.

Viola flammea seu tricolor major, Lugd.

Viola Trinitatis 1. Tab.

Flos colore & magnitudine variat: est flore purpureo & cæruleo: albo & luteo: cum pa-

doc.

do cæruleo, purpureus & luteus etiam permiscetur: quandoque lituris quibusdam notatur: raro flore penitus albo reperitur, quæ est Viola trinitatis 2. Tab.

Datur quæ duplo majore flore est coloris unius, nigra purpurea, & instar holoferici nitente, vel pallido, hinc

Flos trinitatis major violaceus, &

Flos trinitatis pallidus major, Eyf.

V I. Viola bicolor arvensis.

Herba Trinitatis sylv. Trag.

Jacea altera, Matth.

Jacea minor, Cæf.

Viola nigra similis arvensis minor, Gef. hor.

Viola sylvestris, Lob. ico.

Viola flammea minor, Lugd.

Viola trinitatis minor petraea, Tab.

Viola tricolor petraea, Ger.

Haftenus trium colorum non observavimus, sed candido & luteo, cæruleo & luteo, cæruleo & candido: aliquando tamen vel totus luteus, vel totus albus occurrit: Alia est valde parva, Augusto florens.

VII. Viola montana lutea grandiflora: & Camer.

Viola nigra perfoliata mont. lutea, Gef. hor.

Viola mont. 3. aliud genus, Clus. pan. & hist.

Viola flammea lutea, Lugd.

Viola Martia arborescens lutea, Tab.

Viola flammea major pallido colore mixta, Eyf.

Flore est luteo, sed magna ex parte lineis purpureis intermixtis: aliquando sine lituris: rarius flore albo reperitur.

VIII. Viola montana lutea folijs non crenatis.

Viola sylv. longifolia, Tab.

Viola martia lutea, Ger. desc.

LEUCOIUM NON BULBOSUM.

A Eundem Dioscoridi l. 3. c. 138. id est, Viola alba, non ratione florum, sed potius à canitie cinericeæ foliorum colore: quamvis differentiam in floribus ostendat, siquidem aut cærulei, aut albi, aut purpurei, aut lutei reperiantur. Plin. l. 21. c. 6. Violas luteas & albas agnoscit.

Leucoium incano folio hortense.

I. Leucoium incanum majus.

Viola candida, Trag.

Leucoium album, Matt. Lob. ob. Lug. Tab. Ger.

Leucoion, Dod. gal. Gef. hor. Ad.

Viola matronalis alba, Fuch. Tur.

Viola domestica, Ang.

Leucoium candidum majus, Dod.

Viola alba, Lob. ico.

Viola alba, quæ & matronalis, Cæf.

Leucoium album hortense fruticosum, Cam.

Leucoium flore albo simplici, Eyf.

Flore est albo, vel cinericeo.

II. Leucoium purpureum vel rubrum.

Viola purpurea, Trag. Lob.

Viola matronalis purpurea, Fuch. Tur.

Leucoium purpureum, Mat. Dod. gal. Lug. Tab.

Leucoium rubrum & purpureum, Cam.

Viola matronalis floribus rubentibus, aut ad purpuram inclinantibus, Cæf.

Leucoium flore rubro simplici, Bry. Eyf.

Flore est rubente, ex purpura puniceo, violaceo, ex cæruleo purpureo, in summa ob colorem dilutiorem & saturatiorem differentiae aliorum sunt: hinc

Viola matronalis purpurea, alia punicea, Fuch. Tur. Lugd.

Leucoium purpureum, & aliud violaceum Tab.

At cærulei coloris in hoc genere haftenus non vidimus, licet Dioscorides auctor sit, nisi forte id verbum superfluum fuerit.

III. Leucoium incanum minus.

Viola alsiola & minor, Trag.

Leucoium candidum minus & annum, Dod.

Floribus est candidis, rubentibus, puniceis, à prioribus magnitudine differentibus, & quod hoc annum sit.

IV. Leucoium incanum majus multiplex.

Leucoion duplis floribus, Ad.

Leucoium sive Viola purpurea, fl. pleno, Lob. ico.

Leucoium multiplici flore, Dod.

Flos est vel saturatioris, vel dilutioris purpureæ, vel purpureo violacei, vel albi: hinc

1. Leucoium flore rubro pleno, Eyf.

2. Leucoium flore purpureo pleno, Eyf.

3. Leucoium sive Keyri purpureo violaceum pleno flore, Svvert.

4. Leucoium flore albo pleno, Bry. Eyf.

V. Leucoium incanum majus variegatum simplici flore.

Hoc varium est & permixtum maculis in albo rubris, vel purpureis, aut quasi strijs in æqualibus notatum: hinc

1. Leucoi. varieg. alb. rubris maculis, Bry. Eyf.

2. Leucoi.

2. Leucoium varieg. purpureis maculis, Eyst.
VI. Leucoium incanum majus variegatum
pleno flore.

Leucoium sive Keyri viola purp. variegata, Svv.
Et hoc varium est:

I. Leucoium purpureum variegatum sangui-
neis maculis signatum, Bry.

Leucoium purpureū variegat. flore pleno, Eyst.

2. Leucoium sive Keyri violaceo purpureum
pleno flore, lineis viridibus distinctum, Sver.

3. Leucoium pleno flore album, sanguineis
maculis signatum, Eyst.

4. Leucoium pleno flore album purpureis
maculis signatum, Eyst.

VII. Leucoium lividè rubente colore.

Leucoium melancholico colore, Eyst.

Leucoium incanum maritimum.

I. Leucoium maritimum latifolium.

Tripolium, Ang.

Leucoium marinum alterum latifol. Lob. Lug.

Leucoium marinum cæruleo purpureum, Tab.

Leucoium marinum latifolium, Ger. marinum
aliud, Cam.

an Leucoium maritim. minus, Hesperis quo-
rundam, Lugd.

II. Leucoium maritimum sinuato folio.

Leucoium marinum purpureum, Gef. hor. Ger.

Leucoium maritimum majus, Ad. Lob. ic. Cluf.

hisp. & hist. desc. Lugd. Cam.

Leucoium marinum majus purpureum, Tab.

Flos dilutioris purpuræ, ad vini rubri faciem
tendente.

III. Leucoium maritimum angustifolium.

Leucoium marinum minus, Cluf. hisp. & hist.

Ad. Cam. Tab. Ger.

Leucoium angustifolium, Lob.

Leucoium sylv. angustifolium, Dod.

Flores sunt dilutè purpurei, quandoq; rubri:

& luteos reperiri Lob. & Tab. scribunt: hinc

Leucoium marinum minus luteum, Tab.

Leucoium marinum minus, Ger.

IV. Leucoium maritimum repens.

Viola marina repens, Eyst. ico.

An ex semine prioris in horto natum: cum

in hortis satum longioribus quidem sit cauli-

culis, sed in terram reflexis, folio latiore, flore

purpureo, tota quæ æstate floreat.

V. Leucoium maritimum candidum.

Keiri marinum flore candido, Lob. ico.

Leucoium marinum majus, Cluf. hist. ico.

VI. Leucoium maritimum minimum, quod
6. est in Prodr.

VII. Leucoium saxatile thymi folio hirsu-
tum cæruleo-purpureum.

Lithoreoleucoion minimum supinum, Col.

Leucoium Creticum.

I. Leucoium Creticum thlaspidifolium.

Leucoium marinum Creticum 1. Cluf. hist.

Flos rubet mox ex cæruleo purpurascit.

II. Leucoium Cretic. folijs oblongis crenatis.

Leucoium marinum Creticum 3. Cluf. hist.

III. Leucoium Creticum floribus minoribus.

Leucoium marinum Creticum 2. Cluf. hist.

In hoc flores prioris dimidio minores, pro-

fus albi, paulatim purpureum contrahentes.

IV. Leucoium Creticum spinosum incanum

luteum.

Leucoium Creticum spinosum, Cluf. hist.

Glastivida Cretensium, Belli, ep. 3. & 4. ad Cluf.

Cluf. hist. ap. alt. ad.

Glastivida prima Cretica, Ponæ.

V. Leucoium Creticum minimum folio sub-

rotundo.

an Leucoium Creticum, Ponæ Ital.

Hæc quinto loco in Prod. describitur.

Leucoium luteum folio hirsuto.

I. Leucoium alyssoides clypeatum majus.

Lunaria aspera, Gef.

Alysson Dioscoridis, Dod. Cam. Lugd. cui &

Alyssum Dalechampi fig. duplici.

Alysson Diosc. putatum, Lob.

Alyssos, Gef. hort. & Lunariæ Græcæ similis.

Lunaria Græca tertia, Cæf.

Leucoium montanum lunatum, Col.

Minoris & congeneris plantæ Columna me-

minit.

II. Leucoium alyssoides clypeatum minus.

Leucoium peltatum Romanum minus, Col.

III. Leucoium incanum filiquis rotundis.

Eruca peregrina, Cluf. hisp. & hist. Lugd.

Leucoium marinum Patavinum, Lob.

Leucoium marinum luteum majus, Tab. Ger.

IV. Leucoium luteum erucæ folio.

Leucoium terrestre majus, Col.

V. Leucoium luteum sylv. hieracifolium,

quod 3. in Prodomo.

Leucoij lutei sylv. species, Thal.

Leucoium sylv. inodor. fl. parvo pallidior, Eyst.

VI. Leucoium luteum montan. serrato folio.

Leucoium luteum montanum, Ponæ Ital.

Ct

Leu-

Leucoium folio viridi.

I. *Leucoium album odoratissimum folio viridi: quarto loco in Prod. descriptum.*

Leucoium rarius flore albo odorato, Cam.

Leucoium fruticosum fol. viridi, flore albo odorato Camerarij, Eyft.

II. *Leucoium luteum maxim. folijs tuberculis obfistis.*

Flos Cheyri Eystettenfis maximus, Eyft.

Flores amplitudine thalerum Philippicum superant.

III. *Leucoium luteum magno flore r. loco in Prodr. desc.*

Flos Cheyri simplex medius, Eyft.

IV. *Leucoium luteum ferrato folio fl. grandiore: 2. in Prodr.*

V. *Leucoium luteum vulgare.*

Leucoium, Brunf. Cord. in Diosc. Lac.

Viola lutea, Trag. Fuch. Dod. gal. Cæs. Ger.

Viola petraea lutea, Tab.

Leucoium aureum, Matth. Lugd.

Leucoium luteum, Fuch. ico. Dod. Ad. Lob. Camerarij, Camer.

Leucoium fativum luteum, Clus.

Keiri vel Cheiri, Ges. hor. Lon.

Flos Cheiri simplex minor, Eyft.

Quibusdam *φλογισ* Theophr. quod totus flos flammei, id est, lutei coloris sit: luteum enim colorem flammeum dici, ex Plin. lib. 22. cap. 8. colligunt.

VI. *Leucoium luteum pleno flore majus.*

Viola lutea multiplex, Lugd. Ger.

Leucoium flore luteo pleno majus, Eyft.

VII. *Leucoium pleno flore minus.*

Leucoium five Keiri duplici flore, Ad. Lob. ico.

Leucoium luteum flore multiplici, Dod.

Viola petraea lutea multiplex, Tab.

Leucoium flore luteo pleno minus, Bry. Eyft.

VIII. *Leucoium luteum sylv. angustifolium.*

Viola lutea sylv. Trag.

Leucoium sylv. minus, Ges. hor.

Leucoium sylv. Clus. pan. & histor. Cam. Tab.

ber. Ger.

Leucoium sylv. flore luteo, Bry.

IV. *Leucoium palustre flore subcaeruleo.*

Gladiolus palustris, Clus. cur. post.

VIOLA MATRONALIS SEU HESPERIS.

Viola Matronalis, quod a Maronis in hortis colatur dicta, apud Plinium l. 21. c. 7. Hesperis censetur, cum hac Viola noctu magis oleat, quod sua Plinius tribuit, addens, inde nomen invenisse.

I. *Hesperis hortensis.*

Viola alba, persica Hermolai, Trag.

Leucoium & Viola purpurea, Fuch.

Leucoium Diosc. album, purpureum, Fuch. ico.

Viola alba, Tur.

Viola matronalis, Ges. hor. Dod.

Viola purpurea & alba, Lugd.

Viola matronalis five Damascena, Ad. Lob.

Viola sylv. alba & purpurea, Cæs.

Hesperis 3. Clus. hist. ico. nostra, Cam.

Viola Damascena flore purpureo, Svvert.

Variat colore floris, candido, dilute purpureo, rubro: habetur & tota minor floribus albis & suavissimi odoris: hinc

1. *Viola hyemalis flore purpureo, Tab. Ger.*

Viola matronalis flore purpureo, Eyft.

2. *Viola hyemalis alba, Tab. Ger.*

Viola matronalis flore albo, Eyft.

II. *Hesperis hort. flore viridi: hæc magnitudine, quoad omnes sui partes, à vulgata differt, flore est viridi & inodoro.*

III. *Hesperis montana pallida odoratissima.*

Hesperis prima & montana, Clus. pan. & hist.

Viola sylv. species, Cæs.

Hesperis pannonica, Cam.

Variat ex semine nata, nonnulli flores maternum colorem retinent, alij aut dilutius pallescunt, aut magis obsoletum acquirunt, crebris venis ex atro purpureiscentibus discurrentibus.

IV. *Hesperis sylv. inodora.*

Hesperis 2. vel altera pannonica, Clus. pan.

Hesperis tertia, Eid. hist. desc.

V. *Hesperis sylv. flore parvo: r. in Prodr.*

VI. *Hesperis peregrina siliquis articulatis.*

Hesperis Syriaca, Cam. Clus. hist.

Leucoium Syriacum, Cam.

Leucoium melancholicum quibusdam.

Hesperis Syriaca Rauvolfij, ab hac non videtur aliter differre, quam quod strigosior sit, quod forte loci ratione contingit.

VII. *Hesperis siliqua corniculata fl. obsoleto.*

Leucoium corniculatum saxatile, Col.

VIII. *Hesperis villosa flore obsoleto siliqua brevi.*

IX. *Hesperis sylvestris hirsuta folijs Hieracij: 2. in Prodr.*

VIOLA

LIB. VI. SECT. I.
VIOLA LUNARIA.

203

Viola ratione florum, Lunaria verò à siliquarum forma dicitur, quæ lata, plana & propemodum rotunda sunt, & Lunam non falcata, sed prope completam referunt: vel à siliquarum splendore, quæ per siccitatem videntur.

I. Viola Lunaria major siliqua rotunda.

Viola latifolia, Dod. Clus. pan. Lugd.

Bulbosa folliata, Officinarum Bolbanac, Ad.

Lunaria Græca, Lon. Cæf. Lob. Cast. rotunda,

Lunaria major, Cam. (Gef. h.

Bulbonach (à radicibus bulbosis) Gef. h. hort.

Viola lunaris i. Tab. Ger.

Thlaspi montanum, Gef. h. hort.

Lunaria Græca annua, Eyf.

Thlaspi alterum Cratæ quibusdam.

Variat florum colore & odore: colore purpureo, subcæruleo: odore, uni flores odorati, alteri inodori sunt.

II. Viola Lunaria major altera: & Cam.

Viola latifolia altera, Dod. Lugd.

Præcedente minor & flore albo est.

III. Viola Lunaria major siliqua oblonga.

Lunaria Græca siliquis longis, Gef. hor. Thal.

Lunaria Græca siliquis oblongioribus, Thal.

Lunaria odorata, alijs Lunaria Græca major,

Gef. h. hort.

Lunaria Raphanitis, sive Bolbonac, radice rediviva, Lob. ico.

Lunaria Græca altera, Cæf.

Viola latifolia, Clus. hist.

Viola lunaris 2. Tab. longioribus siliquis, Gef.

Lunaria Græca perennis, Eyf.

Flores ex albo subcærulei: siliquæ longiores, laminosæ, ita ut aliquando tres membranulæ separatæ suis seminib. annexæ divelli possint.

LYCHNIDES.

Lychnis, id est, Lucernula. Dioscoridi, l. 3. c. 114. & 115. duas species, altera *λυχνις* *στέφανοειδης*, Lychnis coronaria: altera *λυχνις* *αγρια*. Lychnis sylvestris dicitur. Primam, Lychnidem coronariam à recentioribus nominatam, videtur Theop. 6. hist. 7. Lychnidem vocasse: & Plinij, l. 21. c. 4. Lychnis & Rosa Græca censetur: cujus Lychnis agria, Antirrhinum est. Recentiores, Lychnidis nomen plurimis imposuere, de quibus ordine.

Lychnis flore coccineo.

I. Lychnis hirsuta flore coccineo major.

Ocymoides peregr. Gef. h. hort. vel flos Hierosolymitanus, alijs Creticus: vel Croceus, Eid. ap.

Flos Constantinopolitanus, Dod. Lugd. miniatus, Eyf.

Lychnis Chalcedonica sive Constantinopolitana miniata, Ad. Lob.

Lychnis fortè aliquorum coccineo colore splendens, Cæf.

an Flos Scarlati, Lon.

Lychnis Chalcedonica, Tab. Ger.

Lychnis Constantinopolitana, Cast. ap. Cam.

Lychnis byzantina minuto flore, Clus. hist.

Colore variat, communiter coccineo colore splendet: vel croceus est floris Calendulæ colore, vel lilij purpurei, subinde candidi: etiam incarnatus: hinc

Flos Constantinopolitanus albus, &

Flos Constantinopolitanus incarnatus, Eyf.

Aliquando variegato: rarius flore pleno. Alia est flore ex puniceo purpurascens, folijs lævibus ac mollibus: est & miniato, quæ

Lychn. Chalcedonica colore orengiaca, Svvert.

Flos Constantinopolitanus miniatus, Eyf.

Hæc quibusdam veterum est *λυχνις*: alijs *στέφανοειδης* Theop. 6. hist. 6. Alijs *στέφανοειδης* apud Theop. 6. hist. ult. cujus duo genera: unum cui flos hyacintho similis: alterum decolor, album. Idem

& Plin. lib. 21. cap. 6. habet: sunt etiam qui Rosam Græcam Plinij velint.

II. Lychnis flore coccineo minor.

Ocymoidis peregrini species minor, Gef. h. hort.

Flos Constantinopolitanus minor, Dod.

Flos coccineus, Lugd.

Lychnis coronaria.

I. Lychnis coronaria Diosc. sativa.

Rosa mariana sativa, Trag.

Lychnis, Matth. Lac. Cam.

Verbascum montanum, Cord. in Diosc.

Lychnis sativa, vel coronaria, Dod. gal. Gef. h.

Lychn. coronaria, Lon. Ad. Lob. Dod. Cæf. Lug.

Flamma vel Flammula Jovis, Gef. h. hort.

Jovis flos Theop. Eidem.

Flos colore variat: est rubro veluti flammeo fulgens, est dilutè rubente: habetur & albo:

Item floribus albis, lineis vel punctis rubris variegatis: & incarnatis punctatis: hinc

1. Lychnis candida, Lob. ico.

Lychnis coronaria alba, Tab. Ger.

Cc 2

Lychnis

Lychnis coronaria fl. albo simplici, Eyf.

2. Lychnis coronaria rubra, Tab. Ger.

Lychnis coronaria flore rubro simplici, Eyf.

Lychnis rubra, Lob. ico.

3. Lychnis coronaria flore incarnato punctato, Eyf.

4. Lychnis coronaria flore incarnato non punctato, Eyf.

II. Lychnis coronaria sativa multiplex.

Lychn. altera rubra, Lob. ico. flore pleno, Cam.

Lychnis coronaria floris foliolis multiplicatis, Dod.

Lychnis flore rubro pleno, Bry.

Lychnis, Svvert.

Lychnis coronaria flore rubro pleno, Eyf.

Solum eam quæ flore rubro est multiplicem notavimus.

III. Lychnis coronaria sylvestris.

Lychnis sylvestris, Matth.

Lychnis coronaria ruri nata, Ad.

Lychnis sylv. urbanæ similis, Cast.

Jovis florem sylv. reperiri ait Matth. Gef. hort.

Hanc in Rhætia albus, flore hortensiodoratiore inveniri, Gefn. hort. meminit.

IV. Lychnis sylvestris alba simplex.

Rosæ marianæ similis tertia, Trag.

Ocymastrum seu ocymoides, Matth. Lac. Tab.

Ocymoides, Gefn. hort.

Ocymoides majus, Cæf. Lugd.

Lychnis sylv. alba, Dod. gal. Cam.

Lychnis sylv. altera, Ad.

Struthio similis *Walcenfrut*/ Lon.

Basilicum sylvestre, Cast. ap.

V. Lychnis alba multiplex.

Lychnis sylv. multiflora, Ad.

Lychnis multiflora Anglica, Penæ, Lugd.

Lychnis alba sylv. Lob. ico.

Ocymastrum multiflorum, Ger. Tab.

Lychnis flore albo, Bry & Svvert.

Lychnis sylv. flore pleno albo, Eyf.

VI. Lychnis prolifera flore viridi.

Lychnis agrestis abortiva, multiplici viridi flore, Lob. ico.

Ocymastrum fl. pleno viridi, Cam. ep. Matth.

VII. Lychnis syl. sive aquatica purp. simplex.

Rosæ marianæ similis quarta, Trag.

Ocymoides purpureum, Gef. hor. rubrum, Thal.

Ocymastrum rubrum, Tab.

Lychnis syl. purpurea, Dod. Lugd. rubra, Cam.

Lychnis sylv. rubello flore, Ad. Lob.

Melandryum Plinij genuinum, Clus. hist.

Lychnis sylvestris, Eyf.

Mas in hoc genere, cui apices è medio flore prominent: fœmina cui nulli, idque in utroque colore: nam & mas albus purpureusque repetitur, & fœmina similiter, Gefn. hort.

VIII. Lychnis purpurea multiplex.

Lychnis sylv. in hortis plantata flore pleno, Dod. & Gefn. in Ocimoides.

Lychnis agrestis multiflora, Ad. Lob. ico.

Ocymoides flore pleno, Cam. ep. Matth. & hort.

Lychnis flore rubro pleno, Svvert.

Lychnis sylv. flore pleno rubro, Eyf.

Lychnis segetum.

I. Lychnis segetum major.

Nigella, Brunf. vulgaris, Lac.

Githago Rosæ marianæ 6. genus, Trag.

Lolium, Fuch.

Lolium quibusdam flore parvæ rosæ, Cord. in Diosc.

Anthemion, Dod. gal.

Pseudomelanthium, Matth. Lac. Lon. Ad. Lob.

Cast. Lugd. Thal. Ger.

Nigellastrum, Dod.

Lychnis alia inter triticum, Cæf.

Lychnis arvensis, Tab.

Flore est communiter rubescente, rarissime

albo: hinc

Pseudomelanthium flore rubescente, &

Pseudomelanthium flore albo, Eyf.

Nec Lolium, nec Melanthium est: quibusdam *αὐθιγὸν φουδάριον* Theoph. 7. hist. 9.

II. Lychnis segetum minor.

Alfene corniculata, Clus. hisp. & hist. Lob. Cast. Lugd. Tab. Ger.

III. Lychnis segetum rubra folijs perfoliata.

Polygonaton sive *Lydwitich*/ Trag. ico.

Thamecnemon, Cord. hist.

Vaccaria, Dod. Gefn. hort. Ger.

Lychnis quibusdam, nonnullis perfoliata rubra, Gefn. hort.

Glastum, Ang.

Glasto similis inter segetes, Cæf.

Isatis sylv. Vaccaria dicta, Ad. Lob. Lugd.

Vaccaria rubra major & minor, Lugd.

Myagrurn, Vaccaria quorundam, Tab.

Condurdum Plinij quibusdam, l. 26. c. 5.

Variat magnitudine: folijs item latoribus

& angustioribus: floris colore rubro, pallido:

hinc tres figuræ apud Lugdunenses.

Lychnis

Lychnis sylvestris.

- I. *Lychnis sylv.* quæ Been album vulgo.
Lupinus & Smilax horrensis, Brunf. ico.
Polygonaton & Rosa mariana ꝑ. Trag.
Polemonium, Dod. gal. Lac. Cast. Lugd. Thal.
Polemonia, Cæf.
Polemonium pratense nostrum, Gefn. hort.
Been album, Gefn. hort. Dod. Ger.
Lychnis sylv. Lon. Eyf. ico.
Papaver spumeum (propter asperginem sputo
similem) Ad. Lob. (cui & *Ocymastrum* alte-
rum,) Cam.
Herba articularis, Tab.
Melandrium Plinij quorundam, Cluf. hift.
Duum generum: i. in pratis albicante flore:
2. in montibus, flore ex viridi purpurascen-
te. Est etiam alia folijs latioribus, alia angustiori-
bus & acutioribus.
II. *Lychnis syl.* latif. caliculis turgidis striatis.
Lychnis sylv. 3. Cluf. pan. at 2. in hift.
Lychnis syl. 3. cauliculis striatis, Lob. Lug. Tab.
Lychnis cauliculis striatis, Ger.
III. *Lychnis sylv.* angustifol. cauliculis tur-
gidis striatis.
Lychnis sylv. altera incana cauliculis striatis,
Lob. Lugd.
IV. *Lychnis* flore obsoleto autumnalis ca-
liculis turgidis.
V. *Lychnis* frutescens myrtifolia, Been al-
bo similis.
Ocymoides fruticosum, Cam.
Lychnis sylv. semper virens, sive *Ocymoides*
arborescens semper virens, Cluf. hift.
VI. *Lychnis* noctiflora.
Ocymoides noctiflorum, Cam. quod noctu tan-
tum florem odorem explicet per æstatem: au-
tumno verò inodorum.
Ocymastrum noctiflorum, flore albo, Eyf.
VII. *Lychnis syl.* pluribus folijs simul junctis.
Lychnis sylv. prima, Cluf. hisp. Lobel. Lugd.
Tab. Ger.
Lychnis sylv. octava, Cluf. hift.
VIII. *Lychnis* maritima repens.
Lychn. marina Anglica, Ad. Lob. Lug. Tab. Ger.

Lychnis viscosa.

- I. *Lychnis montana* viscosa alba latifolia.
Floris cuculi syl. genus, Trag.
Hohersteinbrech/ id est, Saxifraga elatior, Lon.
Polemonium petraeum, Gefn.

Lychnis sylv. 2. vel albo flore, i. Cluf. pan. at
sylv. 9. in hift.

Lychnis syl. Tab. flore albo, Eyf.

Ocymoides minus sive album, Lugd.

Lychnis sylv. album, Thal.

Odontis quorundam flore candido, Cam.

II. *Lychnis viscosa alba angustifolia* major.

Caryophyllus minimus humilis alter exoti-
cus, flore candido amœno, Lob. ico.

Lychnis sylv. 3. vel albo flore 2. Cluf. pan. at
sylv. 10. in hift.

III. *Lychnis viscosa alba angustifolia* minor.

Lychnidis sylv. tertiæ secunda species, Cluf.
pan. vel 10. alba species, Eid. hift.

IV. *Lychnis syl.* viscosa rubra angustifolia.

Lychnis sylv. 1. vel flore rubro, Cluf. pan. sylv.
4. Eid. hift.

Lychnis sylv. purpurea, Tab.

Lychnis sylv. Hesperis quorundam, Thal.

Lychnis viscosa sylv. flore incarnato, Eyf.

V. *Lychnis sylv.* viscosa rubra altera.

Muscipula, Adv. Lobel. cui & *Silene* Theoph.
Aldroandro.

Lychnis sylv. 4. Cluf. hisp. Lugd. Tab.

Lychnis sylv. 3. Cluf. hift.

Viscaria, Cast.

Viscago major, Cam.

Lychnis sylv. incana, Ger. ico.

VI. *Lychnis viscosa purpurea latifolia lævis.*

an Flos Constantinopolitan' alter minor, Gef.

Armerius flos 3. Dod. 8. at in folio 4.

Lychnis sylv. 2. Cluf. hisp. Lugd.

Lychnis sylv. 1. Cluf. hift.

Muscipula, sive *Armoraria altera*, Lob. Lugd.

Alfene purpurea, Lugd.

Lychnidis fortè antiquorum 3. genus, Cæf.

Muscipula, Cam.

Viscaria sativa, Tab.

Alijs Been rubrum: alijs *Centaureum minus*

purpureum viscosum: rectè ad *Lychnidem* re-

fertur, cum Diosc. lib. 3. cap. 9. *Centaureum* di-

cat flore *Lychnidis*.

Variat floris colore, communiter est purpu-
reo, rarius albo reperitur: hinc

Muscipula flore rubro, &

Muscipula flore albo, Eyf. (asperfis.

VII. *Lychnis viscosa folijs brevi lanugine*

Lychnis syl. 1. ex semine nata, Cluf. hift.

VIII. *Lychnis viscosa floribus foris purpu-*

rascentibus, intus albis.

Cc 3

Lychnis

Lychnis sylv. 2. ex semine nata, Clus. hist.

IX. Lychn. viscosa fol. lanuginosis, fl. carnis.

Lychnis sylv. 3. ex semine nata, Clus. hist.

X. Lychnis viscosa flore muscoso. (Ad.

Muscipula sive Viscaria altera flore muscoso,

Muscipula altera flore muscoso, Lob. Lugd.

Muscipula sive Armoria altera, Lob. ico.

Sesamoides magnum Salmanticum, Clus. hisp.

& hist. Tab. Cam. Ger.

Κραυρόφιλον, Thal.

Viscago, Cæs. major, Cam.

Orites, Lychnidis sylv. genus, Tab.

Eodem semine duæ nascuntur: 1. flore majusculo, quæ sterilis: 2. seminifera, minore flore.

XI. Lychnidi præcedenti affinis folijs lini.

Sesamoides Salmanticum parvum, Eyst.

an Sesamoidis Salmantici secundum genus,

quod Behen floris parvi appellatione accepit,

Clus. hist.

XII. Lychnis plumaria Tab. quid? an Muscipula flore muscoso.

XIII. Lychnis auriculæ Urfsi facie: 1. in Prod.

Lychnis sylv. latifolia, Clus. hist.

Lychnis hirsuta.

I. Lychnis sylv. campanulæ flore.

Lychnis sylv. species Myconi, Lugd.

II. Lychnis sylv. lanuginosa major.

Lychnis sylv. 5. Clus. hisp. & hist. Lugd. Tab.

Lychnis sylv. hirta, Lob. Ger.

III. Lychnis hirta angustifolia Cretica.

Lychnis sylv. 7. Clus. hist.

Ocimoides minus flore rubro Candia à Cæfabona.

IV. Lychnis sylv. lanuginosa minor.

Lychnis sylv. 6. Clus. hisp. & hist. Lugd.

Lychnis sylv. hirta minima, Lob. Ger.

Lychnis sylv. minima, Tab.

V. Lychnis sylv. minima exiguo flore: pro 2. in Prod. describitur.

VI. Lychnis incana repens.

Ocymoides Lychnitis, Col.

Lychnis alpina.

I. Lychn. vel Ocimoides repens montanum.

Cneoron, Matth. cui & Cneoron album.

Cneoron aliud Theoph. Matth. Lugd.

Myuros Aëtij, Ang.

Ocimoides alpinum, Gesn. hort.

Ocimoides repens, Cam. polygoni folio, Adv.

Lob. Lugd.

Ocymoides alterum genus parvum, Cæs.

Saponaria minor, Dalech. Lugd.

II. & III. Ocimoidis angustifolij flore rubello: & alterius flore suaverubente, ex monte

Arba meminit Cam. sed quid?

IV. Lychn. alpina pumila folio gramineo, sive

Muscus alpinus Lychnidis flore.

Muscus floridus, Gesn. epist. & Fracto.

Caryophyllus pumilio alpinus, vel 7. Clus. pan.

at in hist. sylv. 9.

Ocimoides muscosus, Ponæ.

Flos colore variat, est carnei sive rubri dilu-

tioris: reperitur & totus niveus.

SAPONARIA.

Saponaria dicta, quod Saponis vicem præbeat ad pannos purgandos: Quibusdam Struthium Diosc. l. 2. c. 193. qui vulgo notum scribit, quo fullones purgandis lanis utantur. Plin. l. 19. c. 3. Radicula lavandis lanis succum habet, mirum quantum conferens candore mollitię: addit Struthion Græcos vocare, florere æstat, gratam aspectu: verum sine odore, spinosam, & caule lanuginoso: semen ei nullum esse (cui Columella versui repugnat: à Syriis venit qua semine radix) radicem magnam, quæ concidatur ad dictum usum. Et l. 24. c. 11. tingentibus & Radicula ramos præparat, quam Struthium vocari diximus à Græcis. Hac Saponaria quarta convenirent, nisi spinosam diceret. Nonnullis Urceolaris Plinij, l. 22. c. 16. Sunt qui Alifina Diosc. l. 3. c. 169. censeant, cum multas Alifinatis notas habeat.

I. Saponaria major lævis.

Saponaria, Trag. Lac. Gesn. hort. Dod. Ad. Lob.

Cæs. Tab. Cam. Ger. Eyst.

Viola agrestis, Trag.

Struthium, Fuch. Lon. Thal. Lug. fativū, Fuch.

Saponaria major, Lugd.

(ico.

Floris color communiter dilute purpureus,

aliquando ex roseo rubet: nonnunquam candi-

dus est: interdum pro floribus sunt copiosi flores

ramuli foliacei, paucis floribus intermixtis.

II. Saponaria concava Anglica: in Prod. de-

Gentiana concava, Ger.

III. Saponaria frutescens oleæ folio.

Saponaria altera fruticosior ex Sicilia, Cæs.

an Saponaria Apula, Claudino.

IV. Saponaria Lychnidis folio flosculis al-

bis, an Condifi Arabum.

Struthion Diosc. sive Radicula & Lanaria vulgo

Neapoli, quia succo foliorū & radicū ad lanas

purgandas utuntur, Imperato, qui ad nos misit.

SECTIO

SECTIO SECUNDA.

DE CARYOPHYLLEIS FLORIBUS SIVE ARMERIIS.

Caryophyllum florem ab odore Caryophyllorum, recentiores nominarunt: Hunc alij Cantabricam Plinij l. 25. c. 8. qua in Hispania à Cantabris Divi Augusti tempore reperta fuit, esse volunt. Alijs est Vetonica sive Betonica altera, inter notha Dioscoridis: nec forte ineptè. Alijs herba tunica: quibusdam Iphium Theoph. 6. hist. 2. & 7. ejusd. 12. sed malè. Quidam inter Saxifragias numerant, præsertim sylvestre genus, quam Gal. 5. tuend. sanat. Saxiphagon appellasse videtur: nam & sylvestris nostra calculum frangit & educit, quod Galenus de Cestri seu Betonica in Gallia proveniente, restatur, Hermolao notante. Forè & Theoph. 6. hist. 1. & 6. per Jovis florem, inter coronarios frutices minutis folijs conditum, cujus flos sine odore tantum in coronarum usu, sylvestrem Caryophyllam intellexit. Armerij flores dicuntur, à Gallico nomine Armoires & Armoiries.

Genera summa duo sunt: Altilis & Sylvestris. Altilis species multe, magnitudine, colore & foliorum numero differentes: flores namq; sunt vel minores vel medij, vel majores, vel maximi: vel multiplici, vel simplici florum textura, majoribus vel minoribus foliis constantes. Sunt colore nivei, dilutè purpurè candicantes, croceorutilantes, miniati: aut versicolores, ut candidi & crocei, candidi & rubei, candidi rubris punctulis aspersi: rubentes, aut violaceo admixto purpurei, aut rubei lacteis notis aspersi, sicq; guttati, aut rosei sylvestris colore. Sic ex uno caule duo florum genera, partim candidi, rubriq; maculis aspersi, partim crocei: sæpe etiam uno pediculo, flores diversi colores videas: aliquando unus ex alio mediis excrescere conspicitur: aliquando in una planta florum trium colorum: in summa mangonio & arte in his floribus magna varietas fit. Sylvestrium quoq; magna diversitas existit, & in magnitudine, & coloris, & floris, & calycis figura, pleriq; tamen simplici flore sunt.

Caryophyllus pleno flore.

I. Caryophyllus maximus ruber.

Caryophyll. maximus plenus flore rubro, Eyft.

II. Caryophyllus maximus variegatus.

Caryophyllus major rub. & albicans flore pleno, Lob. ico.

Caryophyllus multiplex maximus, Tab. Ger.

Caryophylli, Cast. ap.

Caryoph. multiplex max. variegatus, Eyft.

In hoc varietates:

1. Caryophyll. maxim. & plenissimus, colore mixto carneo, quibusdam cornicul. lacteis, Bry.

2. Caryophyllus maxim. & plenissim colore vario in diversis folijs, Scarlatino, dilutius rubente, albo, Bry.

3. Caryoph. max. & pleniss. colore rubro saturatiore, staminulis tribus niveis in medio, Bry.

III. Caryophyllus altilis major.

Caryophyllæ, Trag.

Betonica altilis, Fuch. Gef. col. coronaria, Lac.

Veronica altilis, Dod. gal. coronaria, Gef. hor.

Viola flammea Scaligero, Gef. hor.

Cantabrica, Tur.

Caryophyllus domesticus, Matth. Cam. Cast.

Flos caryophyllorum, Lon.

Caryophylli nostrates, an Cantabrica Plin. Ad.

Caryophyll. Lob. multiplex, Lob. ico. Tab. Ger.

Caryophyllus altilis, Lugd.

Flos Gariofilus, alijs Viola Damascena, Cæf.

Caryophyllus flore majore, Eyft.

Caryophylli flores etiam in Senarum regione, sed non ita odore grati, Garz.

Herba tunica quibusdam.

Varietas multiplex.

1. Caryophyllus multiplex flore albo, etiam rubro & carneo, Eyft. & apud Svvert.

Caryophyllus totus albus.

Caryophyllus rubeus & sanguineus.

Caryophyllus incarnatus.

2. Caryophyllus pleno flore coloris albi, mixta & sparsa rubedine, Bry.

Caryoph. albus lineis & notulis rubris distinctus, Svvert.

3. Caryoph. alb. flammulis ruberrimis, Svve.

4. Caryophyll. albus lineis rubris subtilissimè distinctus, Svvert.

5. Caryoph. multiplex flore ex purpura rubescente, Eyft.

6. Caryophyll. flore majore partim carneus partim albus, rubris strijs ac punctulis variegatus, Eyfster.

7. Caryoph. multiplex singulis florum folijs è rubro & albo colore dimidiatim divisis & punctatis, Eyft. qui

Caryo-

Caryoph. hortorum multiplex major, Lob. ico.

8. Caryoph. plenus colore umbilicotenus rubescens instar florum Perfici mali, folijs latioribus, Eyft.

9. Caryoph. plenus purpurascens, punctatis folijs, Eyft.

10. Caryoph. purpureus punctulis intense purpurei coloris, Svver.

10. Caryophyllus subviridi flore, Svver.

IV. Caryophyllus altilis medius.

1. Caryoph. albus lineis cremesini coloris, & Caryophyl. minor albus lineis purpureo violaceis distinctus, Svver.

2. Caryoph. miniatus medio albescens, Eyft.

3. Caryoph. pleno flore colore violaceo, Bry.

V. Caryoph. pleno flore mali arantij colore.

Caryoph. pleno fl. Silefiacus miniatus, Cl. hist. Caryoph. plenus miniato colore, Eyft.

Varietas.

1. Caryophyllus dimidia parte arantij colore, altera candida & permista, Bry.

2. Ex semine libenter provenit, sed alij flores nativum eumque saturatiorem aut dilutiorem retinent: alij albi, alij rubri fiunt: nonnulli simplici quoque foliorum serie constant, Cl. hist.

VI. Caryophyllus pleno flore minor.

Caryoph. hortorum multiplex minor, Lob. ico.

Caryophyl. pleno flore species exigua, coloris carnei, Bry.

VII. Caryophyllus supinus flore pleno rubro argenteis micis aspersis.

Caryophyllus 7. pleno flore, Cluf. hist.

Caryophyllus flore minore pleno rubescens punctus, Eyft.

VIII. Caryophyllus multiplex laciniatus. Caryophyllus purpureus flore multiplici profundè laciniato, Lob. ico.

Varietas.

1. Caryophyl. multiplici laciniat. flore incarnato, Eyft.

2. Caryoph. purpureo flore multiplici profundè laciniato, Eyft.

3. Caryoph. purpureo flore multiplici laciniato, Eyft.

Caryoph. purpur. flore multiplici, Bry. & Svver.

Caryophyllus hortensis simplex.

I. Caryophyllus hortensis simplex flore majore.

Caryoph. sylv. major vulgatiore, Lob. ico.

Caryophyllæi flos simplex, Dod.

Caryophyllus simplici flore, Svver.

Varietas magna in colore: est enim simplex miniatus, est pallide purpurascens, vel incarnatus: est vericolor, ob guttarum & rubrarum macularum asperginem: est variegatus, cujus folia albescencia stigmatibus rubris aspersa sunt: duo posteriores in Eyft. proponuntur, nomine Caryophylli simpliciis hortensis vericoloris, & Caryophylli majoris sylv. variegati.

II. Caryophyl. arborefcens Cret. i. in Prod. descriptus.

III. Caryophyllus simp. fl. minore pallide rubente.

Caryophyllus sylv. 3. flore pallido suaverubente, Lob. ico.

Caryophyllus hortulanus, Tab.

Caryoph. syl. simplex suaverubens, Ger.

IV. Caryoph. simp. minor flore punctato. Caryoph. alter minimus, flore simplici micis aureis asperso, Lob. ico.

Habetur & repens flore parvo punctato.

V. Caryoph. simplex supinus latifolius.

Caryophyll. minimus pulchellus supinus, maculis aureis argenteisve aspersus, Lob. ico. Caryophyllus sylv. 7. Cluf. hist.

VI. Caryoph. simp. supinus angustifolius.

Caryophyllus virgineus, Tab. Ger.

Caryophyllus barbatus & prolifer.

I. Caryophyllus barbatus flore multiplici. Armeria alba & rubra multiplex, Lob. ico. Bry. Svver.

Armerius pleno flore, Cluf. pan. & hist.

Caryophyllus Carthusianorum 3. Tab.

Armeria rubra latifolia, Ger.

Armerius pleno rubro flore, Eyft.

Duplex est: vulgatiore rubro flore, rariore albo: Hujus præter rubrum & album adhuc differentia apud Svvertium, quæ Armeria alba multiflora.

II. Caryophyllus barbatus flore roseo. Armeria multis & separatim positis floribus duplicibus & magnis, coloreque ruberrimis, Svver.

III. Caryophyl. barbatus hortensis latifolius. Lychnis monachorum, Gef. hort.

Armeria altera, multis in latum orbiculum congestis floribus, Lob. ico.

Viola barbata latifolia, Lugd.

Caryophyllus Carthusianorum 1. Tab.

Armeria suaverubens, Ger.

an *Lychnis* fortè antiquorum altera, Cæs.
Flos *Scarleti*, Lon. Ges. ap.

Flore est communiter rubro, habetur albo
maculis lactei coloris notato: est & diversico-
lor, ex albo rubro & medio: hinc

1. *Armeria simplex* flore rubro, Bry, & Svver.
Flos *armerius* ruber, Eyst.

2. *Armeria* flore albo, Bry, Svver.
Flos *armerius* albus, Eyst.

3. Flos *armerius* variegatus, Eyst.

IV. *Caryoph. barbatus* horrenf. angustifolius.
Armeria altera suaverubente flore, Lob. ico.

Armerius flos alter, Dod.

Armerius simplici flore pannonicus, Clus. hist.

Caryophyllus *Carthulianorum* 2. Tab.

Armeria rubra, Ger.

Hujus differentiæ quinq;: 1. eleganti est flo-
re, eoq; aut planè rubro, aut lactei candoris ma-
culis asperso, aut niveo, oris carnei coloris: 2. om-
nino niveo: 3. flores pauciores dilutius ru-
bentes & carnei coloris: 4. flos purpurascens,
oris albis: 5. flores die primo & secundo quo a-
perti sunt, lactei prorsus candoris, sequentibus
paulatim albedine evanescente, tandem omni-
no purpurascunt, sic ut in eadem umbella flores
lacteos, alios exalbidos, & media ex parte pur-
purascences, alios omnino purpureos conspi-
cere liceat.

V. *Caryophyllus barbatus* sylvestris.

Armeria sylv. altera, Lob. ico.

Viola barbata angustifolia, Lugd.

Caryophyllæ sylv. prima, Thal.

Flos *Gariofilus* syl. minimi floris saturatæ pur-
puræ, Cæs.

VI. *Caryophyllus* sylv. prolifer: & Eyst.

Caryophyllæ sylv. quarta, Thal.

Armeria prolifera, Lob. ico.

Armerius flos proliferus, Cam.

Caryophyllus sylv. minimus, Tab.

Viscaria, Ger. ico.

Huic ex capitulo, sæpè septem, octo, aliquan-
do novem flores prorumpunt.

VII. *Caryophyllo* prolifero affinis, unico
ex quolibet capitulo flore.

Caryophyllæ syl. quaræ, alia species, Thal.

Caryophyllus sylvestris.

I. *Caryophyllus* sylv. vulgaris latifolius.

Dondernaegelin, Brunf.

Caryophyllæ sylv. Trag.

Caryophyllæ sylv. Matth. Lugd. Cast.

Betonica sylv. prima, Fuch.

Vetonica, Dod. gal.

Cantabrica sylv. Tur.

Tunica sylv. Lon.

Caryophyllæ sylv. 3. Thal.

Armerius flos primus, Dod. Lugd.

Armeria five *Caryophyllus* minor sylv. minùs
odorus folijs latoribus, Ad. Lob.

Flos *gariofilus* sylv. Cæs.

Caryophyllus montanus primus, Tab.

Armeria alba, Ger. ico.

Caryoph. minor sylv. flore simplici, Eyst.

Flore est odoro & inodoro purpureo: simpli-
ci & pleno: hinc

Caryophyllus minor sylv. flore pleno, Eyst.

Caryophyllus montanus multiflorus, Tab.

Caryophyllus montanus purpureus, Ger.

II. *Caryophyllus* syl. vulgaris angustifolius.

Caryophyllus montanus albus, Tab. Ger.

III. *Caryophyll.* sylv. biflorus: 3. in Prod.

IV. *Caryoph.* pumilus latifolius: 4. in Prod.

V. *Caryoph. syl.* flore magno inodoro hirsuto.

Caryophyllus sylv. 2. Clus. pan. & hist.

VI. *Caryophyllus* sylv. humilis flore unico.

Armerius flos tertius, Dod.

Caryophyllus repens humilis minimus vulga-
tissimus rubellus, Lob. ico.

Caryophylli sylv. Cast. ico.

Caryophyllus sylv. 1. Clus. pan. & hist.

Singuli cauliculi unicum florem, diluta pur-
pura rubentem odorum sustinent.

VII. *Caryophyll.* albus parvus repens, Cam.

Osteocallon Ab. yrti Italij, Eidem.

VIII. *Caryoph. cæruleus* *Monspeliensium*.

Aphyllanthes *Monspeliensium*, Ad. Lob. ico.

Caryophyllus cæruleus, Tab. Ger.

Rarius flore niveo reperitur.

IX. *Caryophyll.* sylv. repens multiflorus:
2. in Prodr.

X. *Caryophyllus* sylv. *Carinthiacus* ruber.

Caryoph. syl. 4. vel *Tauricus*, Clus. pan. & hist.

XI. *Caryoph. alpinus* calyce oblongo hirsuto.

Caryophyllæus pumilio *Tauricus*, five 3. Clus.

pan. sylv. 7. Eid. hist.

Caryophyllus montanus tertius, Tab.

Caryophyll. mont. Clusij, Ger.

Caryophyllus simplex laciniatus.

I. *Caryophyllus* flore tenuissimè dissecto.

Superba, Trag. Lon. Thal. Cam.

Diosanthos *Theophrasti*, Ang.

Dd

Vetoni

Caryo-

Caryophyllus montanus.

I. Caryophyll. mont. major flore globofo.
 Gramen polyanthemum majus, Dod.
 Gramen marinum majus, Cluf. pan. Tab.
 Caryophyllo marino fimilis, Ad.
 Caryophyllus mont. Lob. mediterraneus, Ger.
 Statice, à sistendo sanguine, Lugd. Cam. cui vi-
 detur Britannica, Ang.

Armerius mont. tenuifol. major, Cluf. hist.

II. Caryophyllus montanus minor.

Pseudomoly, Dod. gal. Gefn. hort. Lugd.
 Gramen polyanthemum minus, Dod.
 Gramen marinum minus, Cluf. pan. Tab.
 Caryophyllus marinus minimus, Ad. Lob. Ger.
 Armerius mont. tenuifol. minor, Cluf. hist.

Hic caule est aliquando prolifero.

Caryophyllus saxatilis.

I. Caryophyllus saxatilis folijs gramineis,
 umbellatis corymbis.
 Symphytum petraeum, sive Gypsophyton ma-
 jus, Thalia.

II. Caryoph. saxatilis folijs gramineis minor.
 Symphytum petraeum sive Gypsophyton mi-
 nus, Thalia.

III. Caryophyllus saxatilis siliquosus: qui
 Caryophyllus 14. in Prod.

Gypsophyti siliquosi nomine à D. Ffiro acco-
 IV. Caryophyllus saxifragus. (pimus.

Saxifraga magna, Matth. Lob. Lugd. Cam.

Saxifraga 5. Cast.

an Saxifraga Bavarica, Cam. Ponæ.

V. Caryophyllus saxifragus strigosior, vel
 Caryophyll. sylv. flore minimo. (ico.

Saxifragia sive Saxifraga antiquorum, Ad. Lob.

VI. Caryophyllus saxatilis Ericæfolius um-
 bellatis corymbis: 12. in Prod.

VII. Caryophyllus saxatilis Ericæfolius
 ramosus repens: 13. in Prod.

VIII. Caryophyllus saxatilis floribus ru-
 bris: 13. altera species in Prod.

IX. Caryophyllus minimus muralis.

Tunica minima, Lugd.

SECTIO TERTIA.

ANTIRRHINUM; LINARIA; LINUM; POLYGA-
 LA; ONOBYCHIS; CLAUX; STOECHAS;

LA VANDULA; ROSMARINUS.

ANTIRRHINUM.

Ichnidem agriam Plin. l. 25. c. 10. ipsum Antirrhinum ex Galeno (cui *ῥοῦς ἀγρία* & *βουνόκρινος*) vocavit.
 quia flore sit Leucoj, minore tamen ut Diosc. l. 4. cap. 133. loquitur. Quare post Lychnides & Caryo-
 phyllos flores, Antirrhinum (cum & ipsum flore placeat) subungere volumus.

ῥοῦς ἀγρία Dioscoridi, l. 4. c. 133. dictum, quod fructu sit vituli narium simili. Theophrasto 9.
 hist. 21. *ῥοῦς ἀγρία* fructum tanquam naves vituli parit. Plinio loco citato Antirrhinon sive Anarrhinon, sive
 Lychnis agria. Sunt qui velint ab eodem, l. 30. c. 2. Cynosephalum herbam dici, id est, canis caput, quod se-
 minis conceptaculum canis calvam, cute & carne ex utraque representet. Veteres unius tantum meminisse vi-
 dentur, at recentioribus plures sunt differentia.

I. Antirrhinum majus rotundiore folio.

Cynosephalus Plinij, Lugd.

Antirrhinum majus flore roseo, Cam. hort.

II. Antirrhinum majus alter folio longiore.

Antirrhinum 2. Matth. Lugd.

(Cam. Antirrhinum magnum, Dod. gal. Lugd. majus,

Antirrhinum, Gefn. Dod. Ad. (vulgo caput ca-

nis & caput vituli) Lob. Tab. cui Antirrhinū &

Antirrhinum album: at Ger. purpureum & al-

Os leonis vulgo, Caef. (bum.

Antirrhinum flore rubro & flore albo, Eyst.

Flore habetur roseo, rubente, aliquando ma-

culato, ex candido dilute purpurascens: can-

dido: an hoc, quod flore est albo, sit

Antirrhinum 4. Matth. Lugd.

Est & flore albo, oris tantum rubris, vel ru-

bentibus, vel luteis, & dicitur

Antirrhinum flore albo oris rubentibus, &

Antirrhinum flore albo oris rubris.

Antirrhinum flore albo oris luteis, Eyst.

Folij quoque variat latioribus & angustiori-

III. Antirrhinum luteo flore. (bus.

Antirrhinum flore luteo, Gefn. hort. Ad. Lob.

ico. sub luteo, Dod. luteo grandi, Cam.

Antirrhinum luteum, Tab. Ger.

Hoc à priore & floris colore & folio variat:

quod verò flore est albo non item.

IV. Antirrhinum folio dissecto: hoc inter

Dd 2

plantas

plantas fccas Monspessuli collectas apud fratrem Joh. Bauhinum p. m. vidimus.

V. Antirrhinum arvense majus.
Antirrhinum, Eric. Cord. (cui & Rhinoceros)
Tur. Lac. Lon.
Antirrhinum i. Matth. 4. Lugd. Cam. ep. Matth.
Orontium, Dod. gal.
Antirrhinum Cynocephalæa & Bucranion,
Cord. in Diosc.
Antirrhinum minus, Gesn. hort. (vel folijs
hylopi Eid. col.) Tab. Ger.
Antirrhin. minimum, Ad. (forfan Archigenis
Orontium, vel Aurantium) Lob. medium, Cam.
Antirrhinum parvum, five caput Simiæ, Lugd.
Antirrhinum sylv. (five Phyteuma) Dod. Eyf.
Phyteuma *χρονία* Cydoniæ, Belli ep. 12. ad
Clus.

Os leonis alterum, Cæs.

Antirrhinon rubrum arvense, Thal.

Hoc quibusdam Phyteuma Dioscoridis, l. 3.
c. 130. alijs Orontium Archigenis, quasi Aurantium, quod auriginem morbum lever: quod aliquando procerius, aliquando brevius pro ratione foli reperitur.

VI. Antirrhinum arvense minus.

Antirrhinum 3. Matth. Lugd.

Antirrhinum arvense, Gesn. col.

Antirrhinum minimum, Thal. Cam.

Antirrhinum alterum minimum repens, Lob. icon.

Antirrhinum sylv. Cæs.

Os leonis in vineis, Cæs.

VII. Antirrhinum saxatile, folijs serpylli: quod in Prodr. describitur.

LINARIA EJUSQUE SPECIES.

Cum Linaria quibusdam Antirrhini species videatur, & an Antirrhinum Plinij sit quidam dubitent, hic proponemus. Quibusdam Oxyris censetur, ex qua, Galeni seculo, ut & nunc in Italia, scopæ conficiuntur. Oxyris folijs est lini initio nigro, dein rubescentibus, &c. Dioscoridi, l. 4. c. 143. & Plin. l. 27. c. 12. Oxyris folijs est nigris seu lini, semine initio nigro, dein rubescente, &c. Linaria latifolia, quod folijs lini sit.

Linaria erecta latifolia.

I. Linaria latifolia Dalmatica magno flore: quæ 1. in Prodr.

II. Linaria Americana, parvo flore luteo: quæ 2. in Prodr.

III. Linaria latifolia triphylla major: 3. in Prodr.

Linaria Cretica latifolia, Clus. hist.

IV. Linaria triphylla minor lutea.

Linaria Valentina, Clus. hisp. Dod. Lob.

Linaria Hispanica 1. Clus. hist.

V. Linaria triphylla cærulea.

Linaria cærulea Apula, Col.

VI. Linaria tenuifolia, æruginei coloris.

Linaria Hispanica 2. Clus. hist.

VII. Linaria bellidis folio.

Linaria odorata, Clus. hisp. & hist. Dod. Lugd.

Linaria purpurea, Ad. odorata, Lob. Ger.

Oxyris odorata purpurea, Tab.

Linaria erecta angustifolia.

I. Linaria scoparia.

Belle videre, Gesn. hort.

Scoparia, Gesn. hort. Ad. Lob. Lugd. Ger.

Oxyris, Ang. Dod. Cæs. Cam.

Linaria magna, Lugd.

Herba studiosorum, Tab.

Oxyris græcorum quibusdam: alijs id negantibus, quamvis hodie in Græcia *αγρια* nominetur: alijs an Chamæcyparissus Plinij sit dubitant.

II. Oxyris frutescens baccifera. (ep.

Cassia poetica Monspeliensium, Ad. Lob. Cam.

Cassia quorundam, Clus. hisp. & hist. Tab.

Cassia lignea, Cæs.

Cassia lignea maritima, Lugd. (Plin.

Polygonum 4. Plinij quibusdam, Dalech. in

Variat: communiter atrovirens, aliquando

tota rubet & ramis & folijs, ideo quidam

Genistam rubeam vocant, Cæs.

Oxyris Plinij, lib. 27. cap. 12. videtur, quæ ut

habet ramulos fert nigros, tenues, lenros, & in

ijs folia nigra seu lini, semenq; in ramulis ni-

grum initio, dein colore mutato, rubescens:

smegmata mulieribus faciunt ex his: Galenus

8. simpl. ex Oxyride *νεγμαστα* fieri tradit, quæ alijs

interpretantur smegmata, ut Plinius, alijs sco-

pas, alijs *νεγμαστα* *νεγμαστα*.

III. Linaria vulgaris lutea flore majore.

Linaria (& Pseudolin.) Brunf. Ger. i. Dod. Lon.

Linaria vulgaris, Trag. Cam. Eyf. vulgo, Gesn.

hort. Cæs.

Oxyris, Matth. Fuch. Dod. gal. Cord. in Diosc.

Tur. Lac. Ad. Lob. Lugd. Cæs. major, Tab.

Floris

Floris color luteus, luteopallidus, rarius albus: flore minore etiam, in agris reperiri Tragus asserit.

IV. Linaria lutea montana Genistæ tinctoriæ folio: hæc ad montem S. Bernhardi, floribus aureis, mediæ magnitudinis, reperitur.

V. Linaria lutea flore minimo: hæc in agris Provinciæ Galliæ, brevibus & angustis folijs & minutissimis flosculis luteis, occurrit.

VI. Linaria folioso capitulo luteo major. Linaria 3. & Heliochrylos, Trag. quarta, Lon.

Linaria aurea Tragi, Lobel. Lugdun. Tab. Ger. Eyflett.

Linaria Austriaca, Cam.

Oxyris Austriaca, Clus. pan. & hist.

Chrysocome Diosc. & Plinij, Guil. Col.

Linosyris nuperorum, Lobel. recentiorum, Lugd.

VII. Linaria folioso capitulo luteo minor.

Linaria aurea minor, Tab.

Oxyris purpureo cærulea, Ger. ico.

VIII. Linaria flore pallido rictu aureo.

Linaria pannonica 1. Clus. pan. & hist. Tab.

Linaria purpurea altera, Ger. ico.

an Oxyris alba, Lob. ico.

IX. Linaria flore pallido rictu purpureo.

Linaria flore albicante inodoro, Cam.

Linaria flore albicante, Eyflett.

X. Linaria purpurea major odorata.

Oxyris altera, Dod. gal.

Linaria altera purpurea, Dod.

Linariæ purpureæ varietas, Lob.

Linaria cærulea, Cast. Lugd. Cam.

Linaria purpurea elatior, Eyflett.

Varia flosculis purpureis, purpuroviolaceis albis & cæruleis: folijs etiam magis minusve angustis.

XI. Linaria capillaceo folio odora, quæ 4 in Prod.

Linaria caryophyllata, Cam.

Flore est albicante: ex cæruleo & albo mixtis, rictu linea flavescens distincto.

XII. Linaria capillaceo folio altera.

Linaria tenuifolia, Lugd.

Flos priusquam hiet, rubet; cum apertus est ex rubro albicat: est & coloris varij ex albo, cæruleo & luteo mixtis.

XIII. Linaria folijs angustis ex viridi canescentibus.

Linaria Hispanica 3. Clus. hist.

Flos utcumque odoratus: externè exalbidus, internè purpureus, rictu ex flavo albicante, labio purpureo.

XIV. Linaria arvensis cærulea: 5. in Prodromo.

Flore est cæruleo, est & violaceo.

XV. Linaria montana flosculis albicantibus.

Anonymos tenuifolia, Clus. pan. & hist.

Anthyllis montana, Lugd.

Linaria montana sive sylvatica, Thal.

Linaria adulterina, Tab.

Linosyris nuperorum, Ger. ico.

XVI. Linaria quadrifolia exiguis flosculis cinereis.

Linaria Cretica angustifolia, Clus. hist.

XVII. Linaria quadrifolia lutea.

Linaria tetraphylla lutea minor, Col.

XVIII. Linariæ aureæ affinis: quæ 6. in Prod.

Linaria pumila seu repens.

I. Linaria pumila supina lutea.

Linaria pumila, Clus. hisp.

Linaria Hispanica 5. Clus. hist.

Oxyris flava sylv. Lob. ico.

Oxyris minor, Tab.

Linaria Valentina, Ger. ico.

II. Linaria pumila foliolis carnosis, flosculis minimis flavis.

Linaria 2. Moravica 1. Clus. hist.

III. Linaria folijs carnosis cinereis.

Linaria Hispanica 4. Clus. hist.

Flos cærulei dilutioris ad cinereum tendentis, rictu flavo.

IV. Linaria cærulea repens.

Oxyris purpureocærulea repens, Ad. Lob. ico.

Linaria altera floribus purpurascens, Cæs.

Linaria minor Dalechampiij, Lugd.

Linaria parvo flore cæruleo, Cam.

Linaria 4. Moravica 2. Clus. hist.

Floris color cæruleus, ex violaceo purpurascens.

V. Linaria quadrifolia supina.

Linaria alpina, Gesn. hort. & ep.

Linaria pannonica 2. Clus. pan.

Linaria alpina pumila, Tab.

Linaria 3. Styriaca, Clus. hist.

Linaria Styriaca repens, Eyflett.

Dd 3

LINUM

LINUM EJUSQUE SPECIES.

Ante Dioscoridi, lib. 2. cap. 125. Theoph. 8. hist. 7. qui 3. caus. 21. in *Lolium mutari* scribit. *Linum* Plinib. lib. 19. cap. 1. cuius generatione loci natalij recenset.

Linum latifolium.

I. *Linum sativum.*
Linum, Brunf. Matth. Fuch. Cord. in Dioscor.
 Tur. Lac. Lon. Cæs. Lugd. Cast.
Linum sativ. Trag. Dod.
Linum vulgare cæruleum, Ad. Lob.

II. *Linum arvense.*

Linum sylvestre, Trag. Tur.
 Caulibus & folliculis crassioribus à priori differt, & inter avenam reperitur.

III. *Linum syl. latifol. hirsutum cæruleum.*

Linum sylv. 1. Clus. pan. Dod.

Linum sylv. latifol. Lob. ico. Clus. hist.

Flos cæruleus, aut vegetior, aut dilutior.

IV. *Linum sylv. latifol. hirsut. candidum, purpureis venis distinctum.*

Linum sylv. latifol. 1. Clus. hisp. at 2. in hist.

Linum sylv. latifol. folijs hirsutis Tithymali helioscopij, Lugd.

V. *Linum fruticosum niveum.*

Linum sylv. fruticosum, vel 3. Clus. hisp. at in hist. 7. fruticosum.

Linum sylv. 2. flore albo, Lugd.

VI. *Linum sylv. latif. caule viscoso flore rubro*: ex montibus Bononiensibus & Sumano habemus, quod & circa Ingolstadtium reperitur.

VII. *Linum sylv. cæruleum flore aureo*: quod 2. in Prod.

VIII. *Linum sylv. latifolium luteum.*

Linum sylv. 2. Clus. pan. at 3. in hist.

Linum sylv. pannonicum, Tab.

Linum sativum, Ger. ico.

IX. *Linum sylv. luteum folijs subrotundis. Campanula lutea linifolia*, Ad. Lob. Lugd.

X. *Linum luteum ad singula genicula floridum.*

Linum luteum sylv. latifolium, Col.

XI. *Linum fruticosum subflavum*: quod 1. est in Prod.

XII. *Linum maritimum luteum.*

Linum sylv. Matth. Dod. Cæs. Cast. Lugd. Cam.

Linum marinum luteum, Adv. Narbonense, Lobel.

XIII. *Linum Virginianum.*

Linum sponte prodit, ab Anglico caule & fo-

lijs diversum, materia tamen perinde bona: in desc. Virgin.

Linum sylv. angustifolium.

I. *Linum sylv. angustifolium flore magno.*
Linum sylv. 4. Clus. pan. sylv. 5. angustifol. 2. Eid. hist.

Linum sylv. 3. Dod. Tab. Cam. ep.

Linum sylv. floribus albis, Lob. Ger.

Linum sylv. 2. floribus albis, Lugd.

Linum sylv. tenuifolium, Cam.

Flore est cæruleo intenso, violaceo, albo, albo lineis purpureis distincto. Reperitur colore cæruleo in candidum languescente & veluti cinereo, capitulis etiam longè amplioribus, quod Lini sylv. angustifol. albi aliud genus, Clus. pan. & hist.

II. *Linum sylv. angustifol. floribus dilutè purpurascens, vel carneis.*

Linum sylv. angustifol. vel 2. Clus. hisp. Dod.

Lini sylv. 4. species 3. Clus. pan. at 6. in hist.

III. *Linum sylv. angustis & densioribus folijs flore minore.*

Linaria, 4. Trag.

Linum sylv. 3. Clus. pan. Lugd.

Linum sylv. tenuifolium, Lob. Tab. Ger.

Linum sylv. cæruleo flore, Cam. ep. Eyst.

Linum sylv. 4. angustifol. 1. Clus. hist.

Flos ex diluta purpura albicat, & quasi carneus.

IV. *Linum syl. angustifol. folijs rarioribus.*

Linum sylv. 2. Tab. sylv. tenuifolium, Ger.

Flore est cæruleo; reperitur & albo.

V. *Linum sylv. minus.*

Linum sylv. 5. Clus. pan. at 8. in hist.

Chamælinum, Lob. Lugd. cæruleum, Tab.

Chamælinum perpusillum, Ger.

Linum pusillum candicantibus floribus, Cam.

Flore est candido, vidimus & luteo.

VI. *Linum minimum stellatum*: quod 3. in Prodromo, & quibusdam dicitur.

Passerina minor saxatilis.

VII. *Linum pratense flosculis exiguis.*

Linum sylv. pusillum candicantibus floribus,

Linocarpos, Thal.

Linum sylv. exiguum, Cam. ad Thal.

POLY.

POLYGALA EJUSQUE SPECIES.

Pολύγαλον frutex brevis est, palmi altitudinem petens, folijs Lenticula, gustu subacerbo (astricto Plinio) porus lactis abundantiam facere creditur (facit Plin.) unde nomen habet, Dioscoridi, l. 4. c. 142. Plinio l. 27. c. 12. Sunt qui nostram intellexisse velint, cum nostra potius ad Onobrychidem Diosc. referenda videatur.

I. Polygala major.

Polygala vulgaris major, Clus. pan. & hist.

Polygala major, Tab.

Variat flore, qui modo dilutioris purpuræ,

modo cæruleus, modo albus; hinc tres figuræ

Polygala major alba: cærulea: purpurea, Tab.

Polygala purp. flore cæruleo: rubris florib. Ger.

II. Polygala vulgaris.

Polygalon, Trag.

an Theion, Ang.

Polygala, Dod. gal. Tur. Lon. Thal. Cam. Tab.

Ger.

Polygala recentiorum, Ad. Lob.

Onobrychis vera Dioscoridis, Eid.

Flos ambervalis, Dod.

Amarella, Gesn. ep.

Crucis flos, Eid. col.

Polygala vulgaris minor, Clus. hist.

Floribus est cæruleis, violaceis, dilutioris

purpuræ seu rubris, vel berfilici, vel sanguinei

coloris: rarius niveis albisve: hinc tres figuræ

Polygala recent. rubris floribus: albis floribus,

Lobel.

Polygala cærulea: purpurea: alba, Tab.

Polygala obsoleto flore: albis floribus, Ger.

Polygalon flore rubro purpurascente: & flore

cæruleo, Eyst.

Est & alia foliolis circa radicem rotundiori-

bus, flore cæruleo, sapore admodum amaro, qui

in cæteris nō ita insign. animadvertitur, Thal.

III. Polygala acutioribus folijs Monspeliaca.

Onobrychis 3. Lugd.

IV. Polygala lutea.

Polygala, Ang. Cam.

V. Polygala repens nivea.

Polygala, Cast. repens, Lob. Lugd. Tab. Ger.

VI. Polygalæ affinis.

Chamæmyrtine quorundam, Lugd.

ONOBRYCHIS.

Onobrychis folia habet Lentis serè longiora, caulem dodrantalem, florem puniceum, radicem exigua, Dioscoridi, l. 3. c. 170. Alij Polygalæ vulgatæ, non adeo male: alijs Capiti gallinaceo, de quo inter Viriæ agitur: alijs sequentibus tribuunt, & ab asini ruditu nomen habere volunt.

I. Onobrychis 4. lutea, Dalech. Lugd. quid?

Onobrychis altera Belgarum, Lob. Eyst.

II. Onobrychis arvensis: vel Campanula

Elatine, Cæsal.

arvensis erecta.

Onobrychis, Dod. gal. prima, Lugd.

Avicularia Syloij, Gesn. col.

Viola anonymos inodora, Eid.

Campanula parva tertia, Dod. 8.

Campanula arvensis minima, Dod.

Speculum Veneris, Ger.

Folij ludit, superioribus latioribus caulem

amplexantibus, inferioribus longioribus, nul-

lis crenatis, sed quibusdam crispatis: hinc a-

pud Tab. duæ figuræ, nomine

Violæ arvensis, & Violæ pentagoniæ.

GLAUX.

Glaux folijs Cytiso aut Lenticula similis est, superne virens, inversa candicans: ramulis quinis fensive à terra, tenuibus, à radice dodrantalibus: flores violæ alba, purpurei exeunt, at minores: nascitur juxta mare: in sorbitione lactis ubertatem intermissam restituit, Dioscorides lib. 4. cap. 141. Plinius lib. 27. cap. 9. cui Glaux antiquitus engalacton. Fortè γλαῦς quasi γάλαξ lac. Glaucis nomen, Tragus Polygalæ flore rubro tribuit: at eam qua flore est albo, Polygalam Dioscorid. facit. Sunt qui Glaucis nomen cuidam legumini, de qua suo loco, tribuant.

I. Glaux maritima.

Glaux, Dod. gal. Lugd. Cam.

Glaux exigua maritima, Ad. Lob. Ger.

Glaux marina minor, Tab.

II. Glaux latiore folio Thuringiaca.

Glaux, Cord. in Diosc. altera, Cam.

Varie.

Varietas in hac: alia enim major, folijs modo latioribus, modo angustioribus: alia minor densis cespitibus, cauliculo inferius ob folia delapsa, ceu geniculato: qualis circa Egram locis nitrosis provenit: Similem ex Scotia habemus.

STOECHAS ARABICA.

Σ *Τρυάς, ab Insulis ejusdem nominis, è regione Mafilia, ubi nascitur, cognomentum accepit, teste Dioscoride l. 3. c. 32. Plin. l. 28. c. 12. Sunt qui rectius Stachyn, quasi spicam, dici existiment.*

I. Stoechas purpurea.
Stoechas, Trag. Matth. Ges. hor. Lac. Ad. Lobel.
Lon. Cast. def. Lugd.
Stichas, Fuch. Dod. gal. Tur.
Stichas Arabica, Cord. in Diosc. & hist.
Stoechas Arabica, Camer.
Spica Italica sylv. Cæs.
Stoechas brevioribus ligulis, Clus. hist.
Variat: namea, quæ ex Arabia adfertur, densioribus est ramulis.
II. Stoechas cauliculis non foliatis.
Stoechas, Cast. ico. Dod. 8. in Belgio nata, Eid. fol.
Stoechas nudis cauliculis summis, Lob.
Stoechas capitulis foliatis, Lugd.

Stoechas longioribus ligulis, Clus. hist.
III. Stoechas latifolia flore albo.
Folij est Lavendulæ flore magno albo: in Murena Castiliæ D. Albinus legit.
IV. Stoechas folio ferrato: & Dod. Ger.
Stoechas prima, Clus. hisp.
Stoechas folio ferrato & crispo, Lob.
Stoechas ferrata, Tab.
Stoechas crispo folio, Clus. hisp.
Succudus Avicennæ Myconi, Lugd.
Ex horto Clarissimi Contareni accepimus.
V. Stoechadi ferrati affinis.
Tragium alterum Dioscor. Secudus & Sucudus Avicennæ, Rauvvolf. & Lugd. ap.

LAVANDULA.

L *Avandula, quod lavacris expetatur, huc refertur, & propter formam & propter nomen, cum Stoechas Arabica à Mesueo dicatur. Pseudonardus Plinij l. 6. c. 12. censetur. Alij Stoechadi veterum cognatum faciunt: alij Cneorum, sive Cassia albam Theophrasti volunt: quidam Ipbium Plinij suspicatur.*

I. Lavandula latifolia.
Spica Nardus Germanica, Trag.
Nardus Italica, Matth. Lob. Germanica, Lon.
Lavandula, Ang. (cui & Cneorum Theophr.
Ges. hor. Dod. Ad. fœmina, Dod. gal.
Lavandula major, Cord. in Diosc. & hist.
Pseudonardus, Matth. Cast. mas, Fuch. at in ico. fœmina.
Lavandula mas, Lugd. latioribus folijs, Cam.
Lavandula altera longiore folio & spica, Clus. hist.
Cassia alba Theophrasti, Dalech. in Plin.
Flore est cæruleo: habetur & albo, & purpureo: hinc figuræ duæ apud Tab. Ger. & Eyf. sub
Lavandula 1. & spica hortulana flore albo, Tab.
Lavandula flore cæruleo: & Stoechas sive Spica hortulana, Ger.
Lavandula flore cæruleo: & Lavandula flore albo, Eyf.
Quæ flore est albo, folia vulgari paulo latiora habet.
II. Lavandula angustifolia.
Lavandula, Trago. (cui & Cassia Germanica)

Matth. Lac. Lon. vulgaris, Cord. in Diosc.
Lavandula minor, Cord. h. fœmina, Lugd.
Pseudonardus fœmina, Matth. Fuch. (at in ico. mas) Cast.
Stachys, Ang.
Nardus vulgo dicta, Ges. hor.
Lavandula mas, Dod. gal. altera, Eid.
Spica, Ad. Lavandula, Lob.
Spica Italica & domestica, Cæs.
Spica Nardi, Cam.
Lavandula brevior folio & spica, Clus. hist.
Flore est cæruleo: habetur & albo: huic duæ figuræ apud Lob. Tab. Ger.
Spica lavendula, & Lavandula alba, Lob. ico.
Lavandula alba, & Spica alba, Tab.
Lavandula flore albo, & Lavandula hort. minima, Ger.
Spica vulgaris flore cæruleo & flore albo, Eyf.
III. Lavandula folio dissecto.
Lavandula multifido folio, Clus. hisp. & hist.
Lob. Lugd.
Lavandula secunda, Tab.
Stoechas multifida, Ger.

ROSM A.

R O S M A R I N U S.

Alexandris Dioscoridi l. 3. c. 89. ab odore Thuris nomen habet. Galeno 7. simpl. λεβανωτὶς στεφανωμάτων, id est, Libanotis coronaria, quod ea οὐ στεφανωμάτων coronarij, ad corollas utantur.

Genera tria fecit Dioscorides & Galenus: umbelliferi genera duo, unum secundum, alterum sterile: tertium non umbelliferum à coronarijs expetitum. Theoph. 9. hist. 12. duo genera proposuit, fructiferum folio helioselinii, semine & radice candidis: & sterilem folio Lactuca. Plinio lib. 24. c. 11. genera duo: alterum sterile: alterum cui & caulis & semen resinaceum, quod Cachrys vocatur: folijs odor thuris. At lib. 19. cap. 12. Rosmarinum coronarium, cum alijs speciebus confundit.

Hic de coronario agimus (de alijs inter umbelliferas dictum fuit) quem aliqui Cneoron nigrum Theoph. & Castam Hygini volunt.

I. Rosmarinus hortensis angustiore folio.

Rosmarinus, Brunf. Trag. Fuch. Tur. Lon.

Rosmarinum coronarium, Matth. Ang. (cui &

Cneoron Theophr. & Casta Latinorum) Dod.

gal. Lac. Ad. Lob. Cæf. Lugd. Cam. Eyst.

Libanotis coronaria, Cord. in Diosc. Gef. hor.

Rosmarinus minor sive tenuifolius, Gef. hort.

Castia nigra Theophrasti, Dalech. in Plin.

Hyssopus Hebræorum quibusdam.

Florib. est communiter subceruleis, rarius albis.

II. Rosmarinus spontaneus latiore folio.

Rosmarinus sylv. seu major, Cord. hist.

Rosmarinus alter ignobilior, Gef. hor.

Rosmarinum sylv. Cæf.

Hic sponte Monspeffuli cum Epirosmarino reperitur.

Est & alius Rosmarinus sylv. de quo inter Ledi genera.

S E C T I O Q U A R T A.

HYSSOPUS; SATUREIA SIVE THYMBRA; THYMUS; EPI-
THYMUS; CUSCUTA; SERPILLUM; POLIUM; AGERATUM; PU-
legium; Dictamnus; Origanum; Tragoriganum; Sampsuchus sive Amarus;
Marum sive Majorana; Clinopodium & Acinos; Erinus;
Ocimum sive Basilicum.

H Y S S O P U S.

Yesum & Dioscoridi l. 3. c. 30. sic dici volunt quasi ὑέσμον (προχονόμαζον ἐπὶ τὸν ὄψα quia super vultus ef-
fundatur: quam Dioscorides inter umbelliferas stirpes retulit: communis vero spicata est.

Genera duo Dioscoridi, ὀρεῖον montana: & ὑπὸ σῶν hortensis: Verum Græcorum Hyssopus, ab Arabum
& Officinarum Hyssopo differt, qui a nonnullis Symphytum petraum Diosc. l. 4. c. 9. esse videtur: alijs Polium
Hyssopus Dioscoridi est. Plinius Hyssopi lib. 26. cap. 3. vires proposuit: & l. 14. c. 16. Hyssopi ex Cilicia, ad vini
confectionem, meminit, multis plantæ notis additis.

I. Hyssopus officinarum cærulea, sive spicata.

Hyssopus, Brunf. Trag. Tur. Cord. in Diosc. Lac.

Lon. Tab. Cam. flore cæruleo, Eyst.

Hyssopus, Matth. Cæf. Cast.

Hyssopus hort. Fuch. communis, Ang. Dod. gal.

Hyssopus vulgaris, Gef. hor. Dod. Cluf. hist.

Hyssopus sativa, Cord. hist. Lugd.

Hyssopus Arabum, Ad. Lob. Ger.

Floret aliquando ex una, aliquando ex utra-

que parte, quæ

Hyssopus utrinque florifera, Dod.

Alia odore moschum redolente à priore dif-

fert, quæ facile in vulgatam degenerat.

Hyssopus moschata vel de Cilissa, Gef. hort.

Meminit Gesn. & Crispæ: habetur & folijs

dilectis: item communiter est folijs atroviren-

tibus: est & pallide luteis: spica quoq; brevi &

rotunda à priore variat: circa vulgatum & Epi-

hyssopus reperitur.

II. Hyssopus rubro flore.

Hyssopus Arabum flore rubro, Lob. Lugd. Cam.

Ger. Eyst.

Hyssopus Arabum, Tab.

Flores sæpius uno tantum, aliquando utroq;

ordine digesti: satione quoq; in colorem cæru-

leum degenerare solet.

Ec

III. Hyf.

III. Hyssopus vulgaris alba.

Hyssopus albis florib. utrinq; digestis, Lob. ico.
Hyssopus flore albo, Lugd. Cam. Eyft.

IV. Hyssopus Anglica.

Hyssopus ab una parte alba, altera viridis, Ad.
Lugd. Tab.

V. Hyssopus minor angustifolia.

Hyssopus alter, Dod. ut:

Hyssopus parva angustis folijs, Lob. ico.
an Hyssopus Hispanicus minor, Clus. hist.

VI. Hyssopus hirsuta: in Prodr.

VII. Hyssopus umbellata.

Hyssopus vulgaris comosus, Clus. hist.

VIII. Hyssopus latifolia, in Prod. descripta.

IX. Hyssopus rotundif. spicata, fortè Dioscor.
Hyssopus folio Origani Dalechampiij, Lugd.

X. Hyssopus latifolia coma rotunda confert.

Hyssopus ex codice Cæsar. Dod. Lugd. Col.

XI. Hyssopus angustifolia spicata.

Hyssopus angustifolius spicato flore, Clus. hist.

XII. Hyssopus angustifolia montana aspera.

an Hyssopus sylv. & montana, Trag.

Hyssopus montana, Matth. Lugd. Cast.

an Hyssopus montana odora, Cam.

XIII. Hyssopifolia.

Grafe poley, Cord. ob.

Gratiola minor, Gef. col.

Hyssopoides, Cam.

Est major latioribus folijs, minor angustioribus: floribus est cæruleis minoribus, rarissimè albis: at ex Hispania habemus, floribus oblongis, saturatoris cærulei coloris.

S A T U R E I A.

Ⓜ *Y'abpa* Dioscoridi l. 3. c. 25. *Θυμבר* Theoph. 7. hist. 1. (fortè *and rē dēuē ob fragrantiam*) dicitur ipsa *Satureia*. At *Satureia*, alijs à saturando dicta, quod cibi loco condimenti addatur: alijs à *Satyr*is nomen traxisse putant, eo quod coitus marcescentes stimulet.

Genera duo Dioscoridi: *sylvestris* & *fativa*. Theoph. 7. hist. 6. *sylvestris* urbana aspectu vicina: at 6. hist. 1. plura ejus Genera esse monet. Plinio l. 19. c. 8. *Thymbra*, quæ *Cunila*, quæ & *Satureia* dicta in condimento generis: & l. 20. c. 16. *Cunila* præter *fativam*, plura sunt in medicina genera: est quæ *bubula* appellatur, alia *gallinacea*, quæ *Origanum Heracleoticum*, &c.

I. *Satureia hort.* five *Cunila fativa*, Plinij.

Hyssopus agrestis, Brunf.

Satureia, Trag. Lac. Lon. Dod. Lob. Cæs. (cui &

Cunila & *Thymbra* agrestis) Tab. Cam.

Satureia altera, Matth. vulgaris, Dod. gal.

Thymbra secunda species, Ang.

Satureia fativa, Fuch. Tur. hortensis, Gef. hort.

Ad. Lob. ico.

Thymbra vera, Gef. hort.

Satureia five *Thymbra fativa*, Cord. in Diosc.

& hist.

Satureia vulgaris hortensis, Lugd.

Satureia sylv. altera, Cast.

Satureia hortensis æstiva, Ger.

Satureia domestica, Eyft.

Flosculis est candidis, aut dilutè purpureis: aliquando caule & folijs subcæruleis. Addit

Tabern.

Satureiam Romanam 2. quam sub

Hyssopo albo flore, Ger. pinxit, quid est?

II. *Satureia montana*.

Thymbra, Dod. Cord. in Diosc. & hist. Lugd.

Tab. Eyft.

Thymbra sylv. Ang. agrestis, Gef. hor.

Satureia altera, Lac.

Satureia hortensis, Lob. ob. Cæs.

Satureia five *Thymbra altera*, Ad. Lob. ico.

Saxifraga secunda, Cam. ep. Matth.

an *Satureia perennis*, Cam.

Flosculis est purpureis, aut candidis: in hortis folijs est latioribus, ut Lob. in *sylvestribus* angustioribus, ut Dod. & Lug. pingunt: utramque Camer. in Matth. expressit. Huic *Cuscuta* etiam innascitur, quam

Epithymbrum five *Cuscutam thymbra* adnata, Cord. in Diosc.

Epithymbrum æginetæ, Cord. hist.

Epithymbrum, Cast. vocat.

III. *Satureia spicata*.

Saxifraga prima, Matth.

Thymbra S. Juliani, five *Satureia vera*, Ad. Lob. ico.

Saxifraga vera, Diosc. Lugd.

Clinopodium, Cæs.

Thymbra vera, Lugd. Tab.

Satureia S. Juliani, Ger.

Duplex est: quæ in mente *S. Juliani*, folijs est angustissimis: quæ verò Romæ & Neapoli in rectis & parietibus provenit, folijs est latioribus.

IV. *Satureia Cretica*.

Thym-

Thymbra Cretensis, Alpi.
Thymbra legitima, Clus. hist.
Thymbra Bellonij, antiquorum legitimam
centet Belli ep. ad Clusum.
Satureia legitima Dioscoridis, Ponæ.
Hanc Thymbrae legitimæ nomine, & quæ
vulgo *τῆς βῆς* dicatur, ab Honorio Belli

ex Creta accepimus.
V. Satureia thymi folio.
Satureia Dioscoridis, Matth. Cast. Lugd.
Polium foeminam recentiorum esse volunt, Ad.
Thymū vulgatiorem folio tenuiore, dicit Eyst.
Hanc ex horto Clarissimi Contareni Thym-
brae nomine habemus.

T H Y M U S.

Θ *μ* Dioscoridi l. 3. c. 44. & Theoph. 4. hist. 7. & 6. ejusd. 2. & 1. caus. 5. *ἐν τῇ βῆς*, quod ijs qui animi
deliquium patiuntur adhibeatur; alij *ἐν τῇ βῆς* deducunt, quod hoc veteres in sacris,
quæ igne accenso fiebant, primum usi sint, ut apud Rhodiginum l. 3. c. 23. legere est.

Genera: Dioscorides l. cit. capitatum descripsit: at l. 4. c. 179. Thymi durioris meminit. Ex Theoph. 6.
hist. 2. duo genera, Plinius l. 21. c. 10. & 21. candidum & nigricans, proposuit.

I. Thymus vulgaris folio tenuiore: & Eyst. Thymum vulgare, Lugd.
Thymus, Brunf. Trag. Fuch. Tur. Cord. hist. Thymus niger, Tab.

Lon. durior, Cam. Thymus alter durior, Cam.
Thymus nostras, Cord. in Dioscor. vulgaris,
Gefn. hort. Flore est purpureo, nunc albicante.

Thymum durius, Dod. gal. III. Thymus capitatus, qui Dioscoridis.
Serpillum hortense, Dod. ico. Thymum, Matth. Ad. Lob. Creticum, Cord. in
Pepolina, Cæf. Diof. Dod. gal. Lugd. Cæf. legitimum, Clus.
Foliorum colore variat: alteri virentia &
suaveodora: alteri candida & graveolentia,
qui rariore est.

II. Thymus vulgaris folio latiore.
Thymum durius, Dod. Lob. ico. Clus. hisp. Ger. Thymus capitatus, Cord. hist.
Thymus verus capitatus sive Creticus, Cam.

IV. Thymum inodorum, in Prod. desc.

E P I T H Y M U M E T C U S C U T A.

E *n* *θυμ* Dioscoridi l. 4. c. 179. & Plinio l. 26. c. 8. flos est *ἐ* Thymo durior, Satureia simili. Verum non
solum Thymo, sed & Thymbra, Polio, Dictamnino, Chamedri, Hyssopo, Serpillo, Majorana, Origano,
Stæbe, Ebulo alijsq. Cuscuta modo circumnasci observavimus.

Cuscuta, recentioribus Græcis *νασίδα*, quam aliqui Androsacen Dioscoridis l. 3. c. 150. alioqui Cadytam
Theoph. 2. caus. 3. & Plinij l. 16. c. 44. esse volunt. Sed ad Orobanthen Theoph. 5. caus. 22. referri potest. Non-
nullis podagra lini, quod linum amplectatur: *λινὸς ἀνδρῶν*, Gesnero.

I. Epithymum sive Cuscuta minor.
Epithymum, Matth. Lac. Ad. Cast. Lugd. (qui
& Matth. & Lob. figuram habet) Cæf. alp. (qui
Thymo Italico innasce scribit) Alp. Tab.

Epithymum Græcorum & Arabum, Lob.
Epithymum vulgare, si ex Thymo simili abla-
tum, verum Dioscoridis Epithymum est, Col.

II. Epithymum capitulis Platani crinitis.
Epithymus, peculiaris planta à Thymo & Cu-
scuta, quæ in Sclavonia provenit folijs Thym-
brae hirsutis, in cauliculorum summis capitula
hirsuta rotunda, Platani pilulis similia, ex
cujus flosculis capillamenta rufescentia pro-
deunt: radicem habet crassam, nigram, intus
albam, quæ exiccata non secus quam capilla-

menta purgat: & apud Sclavonios Verduun
Xeglie, id est, Herba coleram purgans: hæc
Anguil. Sed qui est?

III. Cuscuta major.
Adrosaces, vulgo Cuscuta, Trag.
Adrosace Dioscoridis, si legatur *ἄνδρῶν*, id est,
sine folijs, Ang.

Cuscuta, Matth. Ang. (cui & Cuscuta) Lac. Lon
Cast. Cæf. Clus. pan. & hist. Ger.

Casslytha, Dodon. gal. Gefn. hort. Adv. Lobel.
Tabern.

Casslytha, Fuch. Tur. Dod. Lugd. Thal.
Hæc passim herbis & fruticibus adnascitur,
potissimum Urticæ majori, lino, trifolio cor-
niculato, lupulo, rubo & vepribus: colore vel
albo vel rufo.

SERPYLLUM.

Eρποντορ Dioscoridi, lib. 3. cap. 26. ἀπὸ τῆς ἑρπεν ἀ σερπενδο dictum: quia aliqua ejus particula terram tangente, ab ea radices demittantur: Sic & Plinio, lib. 20. cap. 22. Genera duo Dioscoridi sunt: primum hortense, odore: impsuchi: alterum sylvestre Zygis dictum, quod non serpat, sed in altitudinem excrescat. Theophrastus 6. hist. 7. duo genera agnovisse videtur. cum dicat Serpylli sylvestre quoque genus esse. Plinius & sativi & sylvestris meminit, & hoc serpente tradit: quod non intelligendum de eo Serpyllo, quod lib. 16. cap. 44. arboribus se circumdare scribit.

I. Serpyllum majus latifolium.

Thymum latifolium, Lob. ico.

II. Serpyllum latifolium hirsutum: quod
i. in Prod.

III. Serpyllum sativum.

Serpyllum, Matth. Lac. Lugd. Tab.

Serpyllum domesticum, Cast.

Serpyllum folijs amaraci, Ger.

IV. Serpyllum vulgare majus.

Serpyllum majus flore purpureo, & aliud candido, Cam. Ger.

Serpyllum album i. & 2. Tab.

Flore est albo, est & purpureo.

V. Serpyllum folijs citri odore.

Serpyllum alterum citratum, Matthiol. citrum

olens, Gesn. hort. Thal. citratum, Tab. Eyf.

Serpyllum sylv. i. citratum, Cast.

Serpyllum referens planta, odore citri, Cæs.

Serpyllum pannonicum i. Clus. pan. & hist.

Thymum latifolium, Ger. ico.

VI. Serpyllum vulgare minus.

Serpyllum, Brunf. Trag. Fuch. Ang. Gesn. hort.

Tur. Lac. Lon. Ad. Lob. Cæs. Lugd.

Serpyllum vulg. Dod. Ger. & vulgare flore albo.

Serpyllum sylv. Matth. Cord. in Diosc. sylv. alterum, Cast.

Serpyllum minus flore albo, & flore purpureo, Tab.

Serpyllum vulgare repens, Clus. hist.

Aliud folijs est rotundis, aliud acuminatis & angustioribus: flos subpurpureus, roseus, candidus: pro cæli & loci diversitate odorem mutat, & inodorum reperitur: aliquando Thymum durius in Serpyllum degenerat: sic Theoph. 5. caus. 8. Ocymum in Serpyllum transire scribit.

Hoc quandoque cum capitulis lanuginosis occurrit.

VII. Serpyllum angustifolium glabrum.

Serpyllum pannonicum 2. Clus. pan. & hist.

Aliquando inodorum est: aliquando odorem foliorum Nucis refert.

VIII. Serpyllum angustifolium hirsutum: vel montanum repens hirsutum.

Serpyllum pannonicum 3. Clus. pan. & hist.

IX. Serpyllum folio Thymi.

Serpyllum alterum, Dod.

Serpyllum Narbonense folijs & facie perpusilli angustifolij Thymi, Lob. Lugd.

Serpyllum sylvest. Zygis Dioscoridis, Clus. hist.

Serpyllum Creticum, Tab. Ger.

POLIUM.

Pόλιον Dioscoridi, lib. 3. cap. 124. sic dictum propter caniciem, quæ in capitulis, secundum Dioscoridem, at secundum Plinium, in folijs apparet: πόλιον namque canitiem & canum significat.

Genera duo Dioscorides agnovit, τὸ βέλιον montanum, alterum fruticosius: Galenus 8. simpl. majus & minus. Plinius, lib. 21. cap. 7. campestre majus, & sylvestre minus proposuit.

Polium montanum.

I. Polium Lavandulæ folio.

Polium alt. Matth. Gesn. hort. Lac. Lugd. Cam.

Polium majus, Cord. hist. campestre, Lon.

Polium recentiorum femina Lavandulæ folio, Adv. Lob.

Polium pannonicum i. vel majus, Clus. pan.

Polium 7. flore albo, Clus. hist.

Polium folijs & facie Lavandulæ, Eyf.

Variat folijs latioribus & angustioribus; hinc

Polium femina, & Polium campestre, Tab.

Hujus speciem per omnia majorem, cana lanugine candicantem, magis odoratam & aromaticam, Cordus in sua historia notavit, Polium minus nominans.

II. Polium montanum luteum.

Polium, Tur. Dod. ico. ar. 7. desc.

Polium luteum, Ad. Lob. Lugd. Clus. pan.

Polium 3. Clus. hisp. montanum 3. Eid. hist.

Polium montanum luteum, Tab. Ger.

Flos modo luteus, modo pallidus, interius pallescens & foris exalbidus: interdum ex luteo vire-

virescens: Ex hujus semine natum, flore ex albo purpurascens, quod
Polium 4. Clus. hist.

III. Polium montanum album.

Polium montanum, Ang. Lob. Tab. Ger.

Polium minus & mediterraneum, Adv.

Polium alterum seu parvum, Dod. gal.

Polium tenuius & 2. Dod.

Polium montanum, 1. Clus. hisp. & hist.

Polium montanum alterum, Cæs.

an Polium minus, Cord. in Diosc. & hist.

Est duplex: alterum cauliculis humi sparsis, folijs incanis & denticulis vix conspicuis: alterum cauliculis erectis, folijs angustioribus, capitulis longioribus, quod

Polium montanum 2. flore albo, Clus. hist.

IV. Polium montanum repens.

Polium 4. & repens, Dod.

Polium 6. Clus. hisp. montanum 8. Eid. hist. & pannonicum minus, Eid. par.

Polium mont. supinum minimum, Lob. Lugd.

Polium montanum 3. Cæs.

Polium montanum minimum, Tab. Ger.

Polium maritimum.

I. Polium latifolium incanum Creticum: in Prod. descr.

II. Polium angustifolium Creticum.

Polium erectum Creticum & fortè frutescens Diosc. Ponæ.

III. Polium maritimum erectum Monspelicum.

liacum.

Polium 1. Matth. desc. at 2. ico. Clus. hisp.

Polium, Lac. Matthioli, Lugd.

Polium 1. five montanum Diosc. Gesn. hort.

Origani 3. species Dioscoridis, Quadramio.

Hoc & locis maritimis, & diversis collibus,

& arenosis littoribus, ut ad Cetium montem,

& Magalonam insulam Narbonensis Galliae

fruticat, ita ut & maritimum & montanum dici

possit: in quo Epipolium notavimus.

IV. Polium maritimum supinum Venetum.

Polium 1. Dod. gal.

Polium repens 3. Dod. ico. at 4. desc.

Polium Venetum, Ad.

Polium 4. Clus. hisp. Lugd.

Polium montanum, Cast. Cæs.

Polium montanum purpureum, Lob. Tab. Ger.

5. purpureum, Clus. hist.

Origanum 3. genuinum Dioscoridis, Quad.

Hyllopus Apolus Diosc. & Serapionis, Col.

Illud erectum est, & omnibus partibus cras-

sus: hoc vero repit, tenuius & candidius est:

utrumque loco natali legimus.

V. Polium montanum supinum alterum.

Polium 5. Clus. hisp. 6. albo flore, Eid. hist.

Sola teneritate & floris colore à priore differt.

VI. Polio affinis Guacatane.

Guacatane plantula Polio montano haud ab-

similis, sed inodorum, Monard. & ex eo, Lugd.

Castor.

Guacatane pilosellæ comparare possumus,

Frag.

AGERATUM.

A γέρων Dioscoridi, lib. 4. cap. 59. cui nomen inditum, διὰ τὸ ἐν τῷ χρόνῳ τὸ ἄκρῳ ὁμοιωθεὶς ποιεῖται, quoniam flos in sua coloris specie diutissime conseruetur: quasi dicas senectutis expertus, quod & γέρων dicitur: vel ut Plinius, lib. 27. cap. 4. quoniam diutissime non marcescat.

I. Ageratum folijs serratis.

Eupatorium Mesuæ, Trag. Gesn. hort. Matth.

Lon.

Ageratum, Matth. Gesn. hort. Lac. Cast. descr. p.

Lugd. Cam. Tab. Col. Eyf.

Ageratum Septentrionalium, Ad. Lob. Eyf.

Mentha corymbifera minor, Cord. hist.

Cofus minor hortensis, Gesn.

Herba Julia, Ang. Gesn. col.

Balsamita minor, Dod.

Balsamita femina, Ger.

Camphorata, Cæs.

Floribus est luteis: rarius candidis, & hoc

Ageratum florib. candidis, Ad. Lob. Tab. Cam.

Ageratum 2. Matth. Lugd.

Hoc etiam majus est & minus: nam quod in

Hetruria provenit multò minus est, quod

Ageratum minus, Cam. in Matth.

Circa Monspelium etiam Corymbis lon-

gioribus & magis compactis reperitur.

II. Ageratum folijs non serratis.

Ageratum 3. Matth. Lugd.

Ageratum minus, Lob. Cam. Tab.

III. Ageratum serratum alpinum.

Ageratum purpureum & Moschatella cærulea

Germanis quibusdam, Lugd.

Ec 3

PULE-

P U L E G I U M

Γαλῶν Dioscoridi lib. 3. cap. 36. cui & βαλῶν, à βαλῶν balatu, quoniam dum florer, gustatum à pecoribus
βαλῶν ἐπὶ οὐλῶν αὐτῶν balatum concitet: quod & Plinius lib. 20. cap. 14. notavit. Pulegium Latinis, quod
jus flos recens incensum, pulices interficiat.

Genera duo Plinius fecit, sativum & sylvestre: illud marem & feminam: mas candidum, femina pur-
pureum florem habet, quo solo inter se differunt: sylvestre, quibusdam Dictamnus dicitur.

I. Pulegium latifolium.

Pulegium, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Tur. Cord.
in Diosc. & hist. Dod. Lon. Cæs. Cast. Cam.

Pulegium vulgatum, Ang.

Pulegium femina, Fuch. in ico.

Pulegium aquaticum, Gesn. hort.

Pulegium regium, Ad. Lob. Lugd. Eyst.

Floribus est cæruleis ex roseo albicantibus,
rarissime albis.

II. Pulegium latifolium alterum.

Pulegium, Cast. mas Plinij, Lob. ico.

III. Pulegium folijs Nummulariæ: in Prod.
describitur.

IV. Pulegium angustifolium.

Pulegium cervinum, Gesn. hor. Lugd. Cam. Eyst.

Pulegium alterum folijs oblongis, Dod.

Pulegium angustifol. sive cervinum, Ad. Lob.

In folijs aliqua notatur differentia; hinc

Puleg. Cret. & Pulegium Malsilioticum, Tab.

Pulegium mas & Pulegium regium, Ger.

D I C T A M N U S.

Διταμνον Dioscorides lib. 3. cap. 37. meminit, & aliquibus γαλῶν ἀγρῶν Pulegium sylvestre dici. Videtur
διταμνον vox, ἀπὸ τῆς διτῆς deduci, ed quod, ut Dioscorides & Theoph. ἐστὶν ὁνομασία: cum non modo po-
tuit, sed appositum quoque parvis defunctos ejiciat. διταμνον Theoph. 9. hist. 16.

Genera tria Dioscoridi & Theoph. Creticum, pulegio simile at majoribus & lanuginosioribus folijs: Pseu-
dodictamnus, minus illo acre, & ut Theoph. minus, & viribus longè inferius: & Dictamnus Creticum alterum
folio Sisymbrii, floribus origani sylvestris: quod Theoph. veluti æquivoce sic appellatum scribit, nec enim spe-
ciem, nec vim eandem habere. Idem Plinius l. 25. c. 8. Officina Dictamnus album etiam habent.

I. Dictamnus Creticus.

Dictamnus, Brunf. Dictamnus, Ang. Tur.

Dictamnus, Matth. Lac. Ad. Lob. Cast.

Dictamnus Creticum, Matt. Cæs. verum, Dod.

Dictamnus vera, Cord. in Diosc. Gesn. hor. (Lugd.)

Dictamnus Creticus, Trag. Dod. gal. Lon. Cam.

Qui ex Creta adfertur, crassioribus & villo-
sioribus folijs: qui ex hortis Italiæ majoribus,
minusque incanis: quoniam Clus. hist. ap. in Sar-
dinia minoribus, candidioribus & odoratissi-
mis folijs reperiri.

II. Pseudodictamnus verticillatus inodorus.

Pseudodictamnus, Mat. Dod. gal. Lac. Cast. Cam.

Lugd. qui & Matth. & Dod. figuram proponit.

Pseudodictamnus florib. verticillatis, Ad. Lob.

Καλ. μυρτιάς, Ang. (Eyst.)

Pseudodictamni nomine ex Creta, Cæs.

Gnaphalium Dioscoridis, Ponæ.

III. Pseudodictamnus alter odoratus, quid?

Dictamni 3. genus, sive Dict. non Cret. Dod. gal.

Pseudodictamnus, Eid. in ico.

IV. Pseudodictamnus acetabulis Moluccæ.

Pseudodictamnus Cydoniæ, sive Dictamnus 2.

Theoph. Ponæ.

Ex horto Clarissimi Contareni.

V. Dictamnus albus vulgo, sive Fraxinella:

quia vulgo Dictamnus dicitur, huc retulimus,
alias rectius in aliam classem referretur.

Dictamnus putatus, Brunf. (Lon.)

Dictamnus vulgaris, Trag. Gesn. hor. Cam. Offic.

Pæonia mascula, Eidem.

Dictamnus album, nonnulli pumila fraxinus,

Matth. Lac. Cæs. Cast.

Tragium, Dod. gal. Gesn. hor. (qui tamen negat)

primum Dioscoridis, Ad.

Tragium Creticum, Guil. the.

Dictamnus nostra, Cord. in dif.

Fraxinella, Cord. hist. Dod. Lug. Cl. pan. & hist.

Natrix Plinij, Ang. (Ger. Eyst.)

Diptamnus album, Belli ep. 3. ad. Clus.

Polemonium, Tab.

Plinio l. 27. c. 12. Natrix vocatur herba, cujus

radix evulsa virus hirci redolet. Tragium Diosc.

l. 4. c. 49. in Creta tantum nascitur habet folia Len-
tisco similia & ramos & fructus, minora tamen

omnia. Tragium negat Belli, quia hirci odore non

spiret, sed gravem, neque in tota Creta inveniri.

Duplex est 1. elatius, oblongiore spica satu-
ratiore, folijs nigricantibus: 2. humilior læ-
vior spica, floribus & folijs dilutioribus.

ORIGA-

MUSCUM ORAIGANUM

Organum Dioscoridi l. 3. c. 32. *ὄργανον* dicitur, Eustachio volente, qui ab ὄρε & ὄργανον deri-
vat: alij παρὰ τὸ ὄρεον ὄργανον, quia visus claritati conducit, deducunt.

Genera quatuor Dioscoridi: ὄργανον, quasi asinus pabulo gratum sit: ὄργανον, ὡς τρεπε-
ῖται: Theophr. 6. hist. 2. duorum tantum meminit: nigri sterilis, & candidi fructuosi. Plin. l. 20. c. 16. Orga-
num Heracleoticum Græcorum, quod Cunilam gallinaceam Romani appellant, refert: at c. 17. Onitidis, quod
prafion appellant Hyssopo non dissimile, & Tragorigani Heracly, cuius tria sint genera (Dioscoridis utrumq,
Tragoriganum intelligens) Cretici, Smyrnaei, tandem Heracleotici, quod Oniten vocent, historiam sed con-
fusorem tradit.

I. Origanum sylv. Cunila bubula, Plinij.

Origanum, Brunf. Ang. Tur.

Origanum vulgare, Trag. Matt. Lon. Lug. Eyf.

Origanum sylv. Dod. Cord. in Diosc. Fuch. Gef.

hort. Lac. Tab. Cam.

Origanum onitis majus, Ad.

Agrioriganum five Onitis major, Lob.

Origanum Italicum, Cæf. Anglicum, Ger.

Folij longiorib. rotundiorib. variat: florib.

ex candido rubentibus, phoeniceis, sanguineis.

Tragoriganum Dioscoridis quibusdam.

II. Origanum sylv. album.

Origanum sylv. Cam.

Origanum album, Tab. Ger. desc.

III. Origanum sylv. humile: in Prod. descrip.

IV. Origanum Heracleoticum: Cunila gal-

linacea Plinij.

Origanum peregrinum 1. vel 6. Trag.

Origanum Heracleoticum, Matt. Gef. hor. Lac.

Ad Lob. Lugd. Cast. Cam. Ger. 1. & 2. Tab.

Origanum Græcum, Ang.

Origanum alterum, Cæf.

Est flosculus ex albo purpurascens: est &

candidis.

V. Origanum Creticum.

Origanum Heracleoticum in Creta, Cord. in
Dioscorid.

Origanum Creticum, Gef. hor. Cæf. Cam.

Origanum Anglicanum, Dod.

Hyssopus Dioscoridis, Ang.

Origanum Syriacum sylvestre, Ad.

VI. Origanum Onites: & Matth. Gef. hor.

Lac. Lon. Cast. Lugd.

Origanum Heracleoticum, Ruel.

Marum quibusdam, Dod. gal. Lac. Lugd.

Hyssopus genuina Græcorum, Ad. Lob.

Hyssopus legitimus & Mesuæi, scarfapepe He-
truseis, Cæf.

Majorana major Anglica, Tab. Ger.

Origanum sylv. potius quam majorana, Col.

VII. Origanum Onites fl. albicantibus.

Origanum Onites, aliud à Matthioli, Cam. hor.

Origanum Onites dictum, Eyf.

VIII. Origanum folio subrotundo.

Origanum Onitis Galloprovinciæ minus, Ad.

Origanum Montepeliasum, Cam. ep. Matth. &

hort. Tab.

IX. Origanum cognata Zatarendi: quid?

Zatarendi, Alpino, quod siccatum, instar Ori-
gani pro obfonio comedunt.

TRAGORIGANUM

Tragoriganum Dioscor. l. 3. c. 35. (origani 4. genus eadem, quod aliqui bivennum interpretantur, cum sic di-
ctum videatur, quasi capris gratum sit) quod pro locorum ratione variat: quoddam speciosius latioribus
folijs: alterum gracilius, folijs exilioribus, quod aliqui μάκρον vocant. Plinio l. 20. c. 17. Tragoriganum simi-
lius est Serpyllo syl. Is Tragorigani differentias à Dioscoride propositas, sub Origano Heracleo recenset.

I. Tragoriganum Serpyllifolium.

Tragoriganum, Matt. Lac. Cast. Lug. Ger. 1. Tab.

II. Tragoriganum latifolium.

Marum, Matth. Cast. Lugd. Tab.

Tragoriganum, Dod. Lugd.

Tragoriganum alterum, Gef. hor. Ad. Lob.

Thymum Creticum, Ger. ico.

III. Tragoriganum angustifolium.

Tragoriganum 2. Clus. hisp. & hist. Dod. Lugd.

Cam. ep. Tab.

Tragoriganum flore albo, Lob.

IV. Tragoriganum Creticum.

Tragoriganum Cretense apud Venetos, Ad. Lob.

Tragorigani 2. altera species, Clus. hisp.

Tragoriganum Hispanicum 3. Eid. hist.

Thymum magnum, Alp.

SAMPSU.

SAMPsuchUM, SIVE AMARACUS; MARUM
SIVE MAJORANA.

Σ *Αμύγαν* in Cyzico & Cypro laudatissimum, secundum locum sibi vendicat Aegyptium: vocatur à Cyzicenis & Siculis *διὰ γανον*, Dioscorides l. 3. c. 47. Et Theophr. l. 1. hist. 15. 6. hist. 1. & 7. Amaracum (vel ut Gaza reddit *Samisucum* vel *Sampsuchum*) suffrutex est & coronaria herba minutis folijs condita ut *Serpillum*, &c. Amaracum, Dioscorides medicus & Sicula gens appellare, quod Aegyptus & Syria *Sampsuchum*. Plinius l. 21. c. 11. & 12. *Sampsuchum* sive *Amaracum* in Cypro laudatissimum & odoratissimum, ex quo oleum, quod *Sampsuchinum* & *Amaracinum*, &c. Μαύρον ἢ δούβρον Dioscoridis l. 3. c. 49. Majoranam esse volunt.

Genera duo Plinio l. 12. c. 24. Maron in Aegypto nascitur pejus quam *Lydium*, majoribus folijs ac varij: illa brevia ac minuta & odorata.

I. *Sampsuchus* sive *Marum*, *Masticen* redolens.

Clinopodium, Dod. gal. Gef. hor. (cui & herba *Sampsucho* cognata) Cam.

Helenium, Theoph. forte *Tragoriganum* Diosc.

Marum, Gef. hor. Cast. Tab. Ger. peregrin. Eyft.

Marum, *Mastic* Gallorum & Anglorum, Ad.

Marum, an *Helenium* odorum Theoph. Lob.

Marum verum, vulgo *Mastic*, Lugd.

Marum vulgare sive *Clinopodium*, Dod.

Tragoriganum 1. Clus. hisp. & *Tragoriganum*

Hispanicum 1. cujus semen *Ambræ* dulcis nomine missum, Eid. hist.

Ludit folijs nunc longioribus, nunc rotundioribus, modò angulosis & hederaceis.

II. *Marum* repens verticillatum:

Sampsuchus Diosc. sive *Amaracus* serpens, Ad.

Marum supinum, Lob.

Marum ex Sicilia allatum, *Sampsuch*, Diosc. Gef.

Marum repens, Tab.

Pulegium angustifolium, Ger. ico.

III. *Majorana* Syriaca vel Cretica.

Marum Syriacum, Ad. Lob. Lugd. Tab. Ger.

Marum Cretense, Alp.

IV. *Majorana* tenuifolia.

Majorana nobilis, Brun. Ang. fativa, Trag. Lon.

Majorana gentilis, Tur. tenuifolia, Tab. Ger.

Amaracus sive *Major*. tenuif. Matt. Cast. Lugd.

Amaracus, *Sampsuchum*, Gef. hor.

Majorana tenuior & minor, Dod.

Amarac. tenuior, Ad. Lob. tenuif. urbana, Cam.

Hæc apud nos in *Majoranam* vulgarem de-

generat: & huic *Cuscuta* circumnascitur, quæ

Epimajorana, Tab. Ger.

V. *Majorana* vulgaris.

Majorana, Brunf. Dod.

Amaracus, Matth. Fuch. Lugd. qui Matth. &

Fuch. iconem proponit.

Sampsuchus sive *Amaracus*, Latinis *Majorana*,

Cord. in Diosc. & hist.

Amar. vulgarior, Ad. Lob. ico. Eyft. major, Cast.

Amaracus, *Majorana*, *Sampsuchum*, Gef. col.

Sampsuchus, Lac. Lob.

Majorana vulgo, Maron, Diosc. Cæf.

Majorana sive *Amarac*. major, Gef. h. Tab. Ger.

Amaracus sylv. annua, Cam.

Hanc latis admodum folijs & capitulis rotun-

dioribus sub *Majorana* latifolia Eyft. proponit.

VI. *Majorana* sylv. perennis: & Cam.

Majorana sylv. Trag. Gef. hor.

Origano cognata *majorana* major, Eid.

Hanc Londino folijs sublateis accepimus.

VII. *Majorana* sylv. latifolia.

Amaracus sylv. folijs latioribus, Cam.

Majorana sylv. Eid.

Hanc ex horto Sprengeri Heidelb. habemus.

CLINOPODIUM ET ACINOS.

Κ *Ανόνιδαν* Dioscoridis l. 3. c. 109. quod flores habeat ὡς ἡ δάμνη ἀνόνιδαν: Et Plinio l. 24. c. 15. quod orbiculato florum ambitu speciem pedum leiti præbeat, ex intervallis Marrubij modo dispositis: quod sunt *Clinopodium* primo pulchro convenit. Verum ab alijs *Ocymoides* nominari monet, & *Serpillo* similem. surc. illosam palmæ altitudine: quæ de secundo dici recte possunt, propter foliorum formam cum *Serpillo* & odorem cum *Ocimo*. *Ανόνιδαν* ἢ *ἀνόνιδαν* herba coronaria *ocimo* similis, sed hirsutior atq. odorata, Diosc. l. 3. c. 50.

I. *Clinopodium* *Origano* simile.

Origanum quartum & minus, Trag.

Clinopodium, Cord. in Diosc. Gef. h. Lac. Cast. Tab.

Clinopodium vulgare, Matth. majus, Cam.

Beroni.

Betonica Pauli, Guil.
 Pulegium montanum, Lon.
 Origanum sylv. Eid. verticillatum, Thal.
 Calamintha prima, Tur.
 Acynus sive sterilis, Ad.
 Acinos, Lob. Ger.
 Acinos, sive Clinopodium sylv. Lugd.
 Clinopodium primum, Matth. Clus. pan. Lugd.
 Herba Origano vulgari similis, Cæs.
 Duplex est: elatius majore folio: humilior
 alterum, minore: flore communiter purpura-
 scente, rarius albo.
 II. Clinopodium arvense Ocimi facie.
 Basilicum tertium, Trag.
 Calaminthum montanum, Eid.
 Pseudoclinopodium, & Clinopodium alterum, Matth.
 Acinos, Dod. gal. Fuch. ico. Lac.
 Ocymastrum, Fuch. Lugd.
 Pulegium petraeum, Gesl. hort.
 Ocimum parvum, Lon.
 Ocimum sylv. sive Acinos, Dod. Ger.
 Clinopodium, Ang. Tur. Cæs. majus, Thal.

Clinopodium alterum Matthioli, Lugd. Tab.
 Clinopodium aut Lectipes, Ad.
 Clinopodium vulgare, Lob. Clus. hist.
 Folij est modò latioribus, modò angustiori-
 bus, ratione loci: modò erecta, modò repens: a-
 liquando hirsutissima, aliquando penè lævis:
 floribus cæruleis, rarius albis.
 Hanc Matth. ut ex ejus descriptione patet,
 Manardum secutus, & hist. Lugd.
 Acinos nomine exhibuere.
 III. Clinopodium Ocimi facie alterum.
 Acinos Anglicum, Clus. pan.
 Acinos Dioscoridis fortè, Eid. hist.
 IV. Clinopodium montanum.
 Clinopodium Austriacum, Clus. pan. & hist.
 Flore est purpureo intenso seu violaceo: ra-
 rius albo.
 V. Clinopodium alpinum hirsutum.
 Clinopodium alpinum, Ponæ.
 VI. Acinos latifolia.
 Acinos, Urtichella olitoribus, Col.
 Acinos Dioscor. nomine ab Imperato accepim⁹.

E R I N U S.

E ^{Præ} Dioscoridi l. 4. c. 29. folijs ex Ocimi minoribus, & lacteo succo turget, &c. Plinio l. 23. c. 7. Herba
 quam Græci Erineon vocant, &c.
 Erini nomine quatuor à recentioribus planta proponuntur.

1. Erini seu Ocimi aquatici nomine à Matth.
 quem sequuntur, Lac. Lon. & Lugd. hist.
 Basilicum aquaticum, Cast. cujus folia incisuris
 carent: pro hac
 Hieracium Sabaudum latifolium, Guilandi-
 nus nobis ostendit.

2. Erinus Dalechampi, in hist. Lug. sed quid?
 3. Erinus Cæs. & Columnæ: est Rapunculi
 minimi species.
 4. Erinos vel Caprificus, Nicandro & Pli-
 nio, fortè Esula dulcis, Tragi: vel altera Esula
 sylv. ejusdem, Adversar.

O C I M U M.

O ^{Quæ} Dioscoridi l. 2. c. 171. Theoph. 7. hist. 3. cui. ut & Varroni & Plinio l. 19. c. 7. à celeritate proveniendi
 dicitur. Recentioribus Græcis βασιλινός, id est, regale: unde ab Aetio ὀνισσιν βασιλινός appellatur.
 Genera plura recentioribus, quæ potissimum differunt magnitudine foliorum. quæ latiora, angustiora,
 plana vel crispa: colore eorundem quæ viridia, nigricantia, maculata: florum. qui candidi, vel purpurascens:
 & odore, cum in aliquibus caryophyllos, in alijs curum redoleant.

I. Ocimum latifol. maculatum vel crispum.
 Ocimum latifolium, Cæs.
 Basilicum Indicum, vel potius Hispanicum,
 Camer.
 Ocimum aut Basilicum crispum exoticum aut
 Hispanicum, Cam. ep. Matth.
 Ocimum crispum Hispanicum, Tab.
 Ocimum Indicum, Clus. hist.
 Basilicum Indicum maculatum, Eyst.

Est majus & minus.
 II. Ocimum viride folijs bullatis.
 Ocimum Indicum viride majus, folijs protube-
 rantibus, Eyst.
 III. Ocimum folijs fimbriatis viridibus.
 Ocimum crispum viride, Eyst.
 Odore est inter Camphoram & Citrum con-
 fuo.
 IV. Ocimum caryophyllatum maximum.
 Ff Ocy-

Ocimum in viridarijs Alexandriae, Alp.

Ocimum latifolium magnum, Eyst.

Folijs est oblongis colore rubro suffusis eximie odoratis.

V. Ocimum caryophyllatum majus.

Basilica major, Trag. Lon.

Ocim. maj. Matth. Fuch. Dod. gal. Lac. magn. Tur.

Ocimum maximum, Dod. Lugd.

Ocimum nigrum, Cord. in Diosc. & hist.

Ocimum maximum caryophyllatum, Ad. Lob.

Ocimum caryophyllatum, Gef. hort.

Hoc cum magis minusve hirsutum sit, ab alijs hirsutum, ab alijs laeve pingitur: color tam foliorum, quam florum, in alio alb. in alio niger est.

VI. Ocimum citri odore.

Ocimum citratum, Gef. hor. Cæs. Eyst.

Ocimum maximum citratum, Lob.

Ocimum medium sive citratum, Ad. Tab. Ger.

VII. Ocimum vulgatius.

Basilicum sive Ocimum, Brunf. Lon.

Ocimum medium vulgatius, Ad. Eyst.

Basilica minor, & Baccharis Germanica, Trag.

Ocimum medium, Matth. Cast. Cam. Lugd. qui Matth. & Fuch. figuram exhibet.

an Ocimum Nabathæum, Cord. in hist.

Ocimum mediocre, Fuch. 3. & medium, Cæs.

Ocim. sive Basilicum medium vulgatius, Lob.

Ocimum magnum, Tab. Ger.

VIII. Ocimum minus angustifolium folijs serratis.

Ocimum minus angustifolium flore albo, Eyst.

IX. Ocimum anisi odore.

Ocimum anisatum, Eyst.

Medio vulgatiore, figurâ respôdet odore Anisi.

X. Ocimum minimum.

Ocimum crispum, Brunf. Lon.

Ocimum caryophyllatum, vel minus, Matth.

Ocimum exiguum, Fuch. minus, Dod. gal. Tur.

Basilicum minus, Cast.

Ocimum minus caryophyllatum, Cord. in Dioscor. Tab. Ger.

Ocimum minimum Amaraci figura caryophyllatum, Lob. Eyst.

Ocimum parvum, & Ocimum caryophyllatum, Lugd. duæ figuræ.

Ocimum alterum tenuifolium, Cæs.

XI. Ocimo affinis.

Albahaca herba, quæ odoris gratia in nova Hispania excolitur, Joseph. Acosta l. 4. c. 27.

SECTIO QUINTA

MENTHA; MENTHA SYLVESTRIS SIVE MENTASTRUM; MENTHA AQUATICA. SEU SISYMBRIUM; MENTHA CATARIA;

Calamintha; Melissa; Marrubium; Galeopsis sive Lamium & Urtica mortua; Urtica; Alysson; Sideritis; Euphrasia; Melampyron & Cratæogonon;

Betonica; Serratula; Scrophularia & Ruta

canina; Stachys.

M E N T H A.

Mentha veteribus Græcis, Plin. l. 19. c. 8. auctore, quoniam dicebatur: at odoris suavitatis nomen apud Græcos mutavit, & ὀσμήν ab ὀσμός i.e. suavis odor, vocatur. quæ voce Dioscor. l. 3. c. 21. usus est. Hydrasmi Theophr. 7. b. 7. ubi Gaza Mentastrum convertit: at Mentæ (fortè Mentastrum intelligens) 6. b. 7. meminit. Genera: Dioscoridi sativa est & sylvestris, quam Mentastrum dici, volunt interpretes, Plinium. Galeno 6. simpl. Mentha est odorata, quæ Dioscoridi sativa est, & altera inodora, quam Calamintham vocitent. Et Plin. l. 6. c. 14. Mentæ genus ejus sylvestre Mentastrum est. Sic l. 20. c. 14. Nepetæ mentionem facit, ex qua sit & Mentastro, Origano, Cunila, Serpillo, Marrubio vinum confici, l. 14. c. 16. ostendit.

Mentha sativa.

I. Mentha horrentis corymbifera.

Balsamita, Brunf. major, Dod. gal.

Alisma, Trag.

Mentha Sarraçenica, Nicolao in Marriat. Ang.

Cord. in Dioscor. qui Chrysocome cognatam

vult) Lac. Lon. Cam. Eyst.

Mentha Græca, Matth. Gef. hort. Cast.

Mentha Romana, Lac.

Mentha corymbifera major, Cord. hist.

Costus hortorum, Gef. hor. Ad. Lob. Lugd.

Ovaria, Gef. hort.

Herba S. Mariæ vulgo, Cæs.

Hæc quibusdam Lepidium Dioscoridis: at

Cæsal.

Casalpino Melilotus Dios. Plinij & Avicennæ.

II. *Mentha corymbifera angustifolia.*

Mentha Sarrac. species altera, Myconi, Lugd.
an *Mentha* Sarracenica species sylv. in sylva
Martia, Cam.

III. *Mentha hortensis verticillata ocimi o-*
Mentha hortensis 4. Fuch. Tur. (dore.

Mentha sativa 4. Dod. Lugd.

Mentha 3. Gesn. hort. 4. Lon.

Mentha Romana angustifolia, Ad Lob.

Mentha cardiaca, Cam.

Calamintha ocymoides, Tab.

Ocymoides repens, Ger. ico.

IV. *Mentha crispa verticillata*: & Eyst.

Mentha sativa 1. Fuch. Dod. gal. Lac.

Mentha sativa, Tur. sativa crispa, Lugd.

Mentha vulgata serpens rotundiore folio, pu-
legij flore, Ad. Lob.

Mentha cruciata, Lob. ico. titulo transposito.

Mentha altera, Cam. ep. Matth.

V. *Mentha rotundifolia crispa spicata.*

Mentha sativa seu crispa, Trag. Cord. in Diosc.

Mentha sativa altera, Mart. Fuch. Dod. Tur. Lac.

Mentha crispa, Lon. Cam. five Balsamita.

Mentha rotundifolia altera flore spicato, five

cruciata *mentha*, Lob. (transp.

Mentha vulgata, five fusca sacra, Lob. ico. tit.

Mentha hort. rotundifolia, seu Romana, Cæs.

Mentha sativa minor, Cast. (exhibet.

Mentha spicata quinque varietates Lobelius

VI. *Mentha rotundifolia spicata altera.*

an *Mentha* rubra, Trag. Lon.

Sisymbrium 1. Ang. hortense, Matth. Lac. Cast. Lug.

Mentha hortensis altera, Gesn. hort.

Sisymbrium *mentha* agrestis, Lob.

VII. *Mentha angustifolia spicata.*

Mentha, Brunf. Ang.

an *Nepeta* aquatica, vel *Mentha* agrest. 3. Trag.

Mentha 1. Matth. Cast. hortensis 1. Gesn. hort.

Mentha sativa, vel hortensis 3. Dod. Fuch. Tur.

Sisymbrium 1. altera species, Cord. in Diosc.

Mentha acuminata, Lon. acuta, Tab. Cæ. in Mat.

Mentha Romana five præstantior angustifolia.
Adv. Lob.

Mentha sativa, Lugd. cruciata, Ger.

Mentha hortensis oblongo folio, Cæs.

Mentha odorata angustifolia, Cam.

Latoribus aliam, aliam angustissimis & lon-
gissimis folijs in hortis observavimus.

VIII. *Mentha spicata folio variegato.*

Menthastrum alterum, Dod.

Menthastrum Anglicum cinereum & niveum, Ad.

Menthastrum niveum Anglicum, Lob. Lugd. Eyst.

cujus solum nomen apud Tabernmontanum.

Interdum in eodem ramo folia quædam ni-
vei coloris, quædam partim nivei partimque

viridis, in quibusdam nihil nivei.

Mentha sylvestris five *Menthastrum*.

I. *Mentha* syl. rotundiore folio: & Gesn. hor.

Menthastrum, Cord. in Diosc. Tab.

Menthastrum folijs orbiculatis, Gesn. ap.

Mentha aquatica, Ger.

II. *Mentha* sylv. longiore folio: & Gesn. hor.

Mentha equina, Brunf.

Menthastrum, Trag. (vel *mentha* agrestis alte-
ra) Matth. Fuch. Dod. Cord. hist. Lac. Ad. Lob.

Cast. Clus. hist. ico.

Menthastrum syl. Eyst. vulgare, Lugd.

Sisymbrium campestre, Ang.

Mentha sylv. Tur. Lon. sylv. altera, Cæs.

III. *Mentha* sylv. longioribus nigrioribus

& minus incanis folijs.

Menthastrum aliud, Lob.

Menthastrum Campense, Lugd.

IV. *Mentha* sylv. angustifolia.

Pulegium aquaticum, seu palustre spicat. Eyst.

V. *Mentha* montana verticillata.

Menthastrum montanum, & 1. Clus. pan.

Menthastrum montanum pannonic. Eid. hist.

Menthastrum pannonicum, Cam.

VI. *Menthastrum* cæruleum, Cam. quid?

VII. *Mentha* tuberosa radice. (Cam.)

Menthastrum tuberosa radice, Clus. pan. & hist.

VIII. *Mentha* radice geniculata: quæ 2. in Prod.

MENTHA AQUATICA, SIVE SISYMBRIUM.

Σίσυμβριον, ἰσχυρόν & γόνυ: *Sisymbrium*, alij *Serpillum* sylv. vocant, *Mentha* hortensis similitudine, sed
lterioribus folijs atque odoratis, Dioscoridi, l. 2. c. 155.

Genera duo fecit: alterum *Mentha* simile: alterum quod *Cardamine* dicitur: & Plinius, lib. 20. cap. 22.
Sisymbrium sylv. à quibusdam *thymbræum* appellatum, pedali non amplius altitudine: quod in riguis nasci-
tur simile *Nasturtio* est, & l. 19. c. 8. *Sisymbrium* latissime nascitur in piscinis & stagnis.

I. *Mentha* rotundif. palustris, seu aquat. major. | *Mentha* rubra, Brunf.

ff 2

Balsa-

Balsamina agrestis & Nepeta 3. Trag.
 Sifymbrium sylv. Matth. Lugd.
 Sifymbrium, Fuch. Dod. primum, Thal.
 Sifymbrij 1. species prima, Cord. in Diosc.
 Calamentum 3. Ang.
 Calamintha aquatica, Gefn. col. Tab.
 Sifymbrium agreste aquaticum, Gefn. hort.
 Menta sylv. altera, & Menta aquatica, Lon.
 Menta sylv. 1. Cæf.
 Aquatica, five Sifymbria mentha, Ad. Lob.
 Sifymbria mentha, Ger.
 Balsamita officinarum, Eyft.

Hæc aliquando tota ruber: magis minufve
 hirsuta exiftit.

II. Menta rotundifolia palustris minor, five
 floreglobofo: pro 5. in Prodro mo descripta.

III. Menta palustris folio oblongo.
 Mentastrifolia aquatica hirsuta, Ad. Lob. Lug.
 Calamintha 3. Dioscoridis, Lob. ico.
 Mentastrum minus spicatum, Lugd.
 Mentastrum aliud hirsuto folio, Cam.

Menta cataria.

I. Menta cataria vulgaris & major.

Menta non odorifera, Brunf.
 Nepeta vulgaris, Trag.
 Nepeta fruticosa, Cord. in Diosc.
 Herba gattaria, Matth. Cast.
 Calaminthæ 1. genus, Fuch. 3. genus, Dod. gal.
 Tur. Thal.
 Calaminthæ species quibusdam, Gefn. hort.
 Calamintha montana, Lon.

Balsamita major, Lac.
 Cattaria herba, Dod.
 Cattaria, five Menta catti, Ad.
 Menta cataria, Lob.
 Gattaria vulgò, Calamintha 3. Diosc. Cæf.
 Herba felis, Lugd.
 Menta felina, Tab. Ger. Eyft.
 Nepeta Germanica, Cam.
 Alij Calaminthæ, alij Meliffæ, alij Nepetæ,
 alij Urticæ, quæ Herculeana Plinio, speciem
 faciunt: alij inter Calamintham & Meliffam
 mediam volunt.

II. Menta cataria minor.

Cattaria minor, Clufpan.
 Cattaria tenuifolia Hispanica, Eid. hist.
 Nepeta minor, Cam.

III. Menta cataria minor alpina: pro 4.
 in Prodro mo descripta.
 Nepetella, Eyft.

IV. Menta cataria latifolia.
 Menta cataria peregrina latifolia, Lob. Lugd.
 Menta felina sativa latifolia, Tab.
 Menta cattaria altera, Ger.

Nepeta peregrina, Eyft.
 V. Menta cataria angustifolia major.
 Menta cataria peregrina angustifolia, Lob. Lugd.
 Cattaria folio longiore, Dod.
 Menta felina sativa angustifolia, Tab.

Salvia Romana, Ger. ico.
 VI. Menta cataria angustifolia minor: sub
 3. in Prodro mo descripta.

CALAMINTA.

Kalaminta, quasi bona & utilis mentha, nidore enim suo, ut habet Aristophanes, serpentes, vel accensas,
 vel substrata, ait Dioscorides, L. 3. c. 43. fugare solet.

Genera tria Dioscoridi: 1. folijs Ocimi, montibus familiaris: 2. pulegio similis, sed major, quam hyssopus
 ὄχιμα pulegium sylv. Romani ventrem vocant (& Plinius, L. 20. c. 14. Nepeta obiter meminit) 3. Menta sylv.
 vestri cognata est, folijs oblongis, caule & ramis, quam superiora majoribus, sed viribus inefficacior.

I. Calamintha incana ocimi folijs.

Calamintha 2. incana, Lob. Lugd.
 Calamintha Cretica, Cam.
 Calamintha montana incana minor, Tab.
 Calamintha montana vulgaris, Ger.

II. Calamintha pulegij odore, five Nepeta.

Calamintha altera, Matth. Lugd. (fortè pulegi-
 um Diosc.) Lac. ico. Lug. (duplici figura) Cam.
 Nepeta agrestis, Cord. in Diosc.
 Calamintha Italica pulegij odore, Gefn. hort.

Calamintha altera odore gravi Pulegij, folijs
 maculatis, Ad. Lob.

Pulegium sylv. five Calamintha altera, Dod.
 Calaminthum, quod vulgo Nepeta, Cæf.
 Calamintha arvensis 2. Tab.
 Calamintha montana præstantior, Ger. ico.
 Calamintha angustis folijs, Eyft.

III. Calamintha vulgaris, vel officinarum
 Germaniæ.

Calamintha, Matth. 2. Thal. vulgaris, Cam.
 Calamintha montana, Gefn. hort. Lac. Dod.
 Cast. Lugd.
 Calamintha montana vulgaris, Lobel. Tab.
 Eyfett.

Nepeta

Nepeta montana, Cord. in Diosc.

Calamintha 3. Dioscoridis Dalechampia, Lug.

Mentha sativa rubra, Ger. ico.

IV. Calamintha magno flore.

Calamintha montana præstantior, Adv. Lob.

Lugd. Cam. Tab. Eyft.

Calaminthum 1. Ang.

Calamentum montanum, Cæf.

Scordonia five Salvia agrestis, Ger. ico.

V. Calamintha vulgaris exiguo flore: quæ in Prodomo describitur.

VI. Calamintha arvensis verticillata.

Mentastrium, Brunf.

Nepeta agrestis, vel 4. Trag. Lugd.

Mentha aquatica exigua, & Pulegium sylv. Eide-
dem, & floris colore solum differt.

Calamintha aquatica, Matth. Lugd.

Calamintha aquatica Belgarum, an Polycne-
mon, quasi multitibia, Ad. Lob.

Calamintha altera, Dod. gal. Fuch. Tur.

Calamintha arvensis, Gefn. hort. Tab.

Nepeta, Lon.

Polycnemon Lobelij, Lugd.

VII. Polycnemon Dalechampi, Lug. quid?

MELISSA.

Mελισσόφυλλον & Melistama, id est, Apiastrum, quod hac αμελνταυ apes delectentur, Dioscoridi, lib. 3. cap. 118. Plinio, lib. 21. cap. 20. Melysophyllum five Melittis: & prius, lib. 21. cap. 9. Melissophyllum quod apiastrum. Latinis Melissa ab apibus, quæ etiam μέλισσα dicuntur.

I. Melissa hortensis: & Lon.

Melissa, Brunf. Ang. Dod. Cæf. Ger. officin. Eyft.

Melissa domestica, vel 1. Trag. descr. nostras.

Cam.

Melissoph. Matth. Gefn. hort. Cast. Lugd. Tab.

Melysoph. vulgare vel adulterinum, Fuch.

Apiastrum, Matth. Cord. in Dioscor. Lac. Tur.

Ad. Lob.

Citrageo, Gefn. hort.

Hanc in montibus sponte nasci Matth. asse-
rit, quam

Melissophylli sylv. genus Matthioli, Gef. hort.

nominat.

II. Melissa peregrina folio oblongo.

Melissa Moldavica, Matth. Cast. Lugd.

Melissa vel Cedronella, id est, Citrigo Turci-
ca, Gefn. hort.

Melissophyllum Turcicum, Ad. Lob.

Melissæ genus ex Oriente, Cæf.

Melissa Turcica Dalechampi, Lugd. Camer.

Tab. Ger.

Variat magnitudine: hinc duæ figuræ in

Lugd. hist: colore quoque flores, qui cæruleus,

purpureo cæruleus, & albus.

Melissa Moldavica flore cæruleo, & flore albo,

Eyftett.

III. Melissa Moluccana odorata.

Melissa Constantinopolitana, Matth.]

Cardiaca Melica, five

Molucca Syriaca, Ad.

Molucca lævis, Dod. Ger.

Cardiaca melica, five Molucca minus aspera,

Lobel.

Molucca five Melissa Constantinopolitana,

Cam. 1. Cast.

Molucca 1. Cæf. (Lugd.

Molucca five Melissa Turcica Dalechampi,

Melissophyllum Constantinopolitanum, Eid.

Cardiaca Syriaca, Tab.

Molucca odorata spinosa, Cast. Eyft.

Alteram lævem, alteram aculeatam Matth.

dicit: aculeis carentem nullam vidimus.

IV. Melissa Moluccana fetida.

Melica, vel Molucca asperior, Ad. Cam.

Molucca asperior Syriaca, & Maseluc Turco-
rum, Lob.

Molucca spinosa, Dod. Lugd. Ger.

Molucca altera, Cæf.

Molucca, vel Melissa Constantinopolitana 2.

Cardiaca Syriaca aspera, Tab.

(Cast.

Molucca lævis inodora, Eyft.

Utramque Moluccam Alyssio Galeni conge-
nerem, ut & Dioscoridis & Plinij Cæsalpinus

voluit.

MARRUBIUM.

Marrubium Dioscorides, lib. 3. c. 119. id quod Marrubium album dicitur, nominat: at quod nigrum, Βαρβαρὸν
& μέλαν μαρόριον, lib. 3. cap. 117. vocat. Plinius, lib. 20. cap. 22. Marrubium, quod Græci Prasum vocant:
& lib. 27. cap. 8. Balloten, alio nomine Melampyrion Græci vocant.

Genera duo Theoph. 6. hist. 1. & 2. proposuit: aliud folio herbido, incisuris profundioribus, quo unguentarii
utuntur:

Ff 3

utuntur: alterum rotundius squallens, incisuras habens obscuriores (Prasium innuere videtur.) Et Plin. l. 20. c. 22. duo genera, ex Castorū sententia, nigrum, & quod magis probat candidum.

Marrubium nigrum.

I. Marrubium Cardiacum dictum, forte primum Theophrasti.
Marrubium mas, Brunf.
Melissa sylv. Trag.
Cardiacum, Matth. Dod. gal. (& Sideritis i.) Gef.
hort. Lac. Lon. Ad. Lob. Cæs. Thal. Cast. Lugd.
Tab. Ger.

Lycopsis, branca lupina, Ang.
Cardiacum, vel Lycopus, Fuch.

Alysson Galeni & Aëtijesse, Cæs. alp. censet.

II. Marrubium palustre glabrum.
Marrubium aquat. Trag. Ad. Lob. Dod. Thal.
Marrubium palustre, Dod. gal. Lon. (Lugd.)
Sideritis i. Matth. Ang. Gefn. hort. Lac. Lugd.
Cast. Cam. 2. Lon.

Lancea Christi, Gefn. hort.

Verbenæ alterum genus, Cæs.

III. Marrubium palustre hirsutum: quod i. in Prodomo.

IV. Marrubium nigrum foetidum, Ballote Dioscoridis. (Lon.)

Marrubium majus, vel i. Trag. nigrum, Gef. h.

Ballote, Matth. Fuch. Tur. Cord. in Diosc. Lac.

Dod. Lob. Cæs. Cast. Lugd.

Marrubium nigrum foetidum, Ad.

Marrubiastrum, Tab.

Marrubium aquaticum, Ger.

Variat folijs majoribus & minoribus.

V. Marrubium nigrum rotundifolium.

Ocimastrum Valentinum, Clus. hisp. & histor. Lugd.

Marrubium Hispanicum odore Stœchados, Lob.

Marrubium Hispanicum, Tab. Ger.

GALEOPSIS SIVE LAMIAM VEL URTICA MORTUA.

Galeopsis ἢ γαλεόψιδος tota frutice, cum caule & folijs Urticam refert: at folia leviora & trita graviter dolent: flores tenues sunt ac purpurascetes, Dioscoridi, l. 4. c. 95. Et Plinio, l. 27. c. 9. Galeopsis aut Galeobdolon, &c. Urtica mortua & iners, quod folijs innoxia sit, quam Plinius, l. 21. c. 15. inter Urticas recensent, Lamium vocavit eam qua innoxia sit & morsu careat: & l. 22. c. 14. addit album habere in medio folio, &c.

I. Lamium purpureum foetidum, folio subrotundo, sive Galeopsis Dioscoridis.

Urtica labeo mas, Brunf.

Lamium, Trag. (vel Urtica 8. 9. 10.) Fuch. Dod.

gal. Lugd.

Galeopsis Ericio Cord. Cord. in Diosc. Lon.

Cæs. 2. Tab.

Galeopsis vulgaris foetens purpurea, Adv. sive

VI. Marrubium nigrum longifolium.

Herba venti Monspel. Gefn. hort. Lob. Lugd.

Sideritis Monspelienfium, Lugd.

Parietariam Monspelienfium à Cordo vocari,

Lob. & Lugd.asserunt.

Marrubium album.

I. Marrubium album vulgare.

Marrubium foemina, Brunf. candidum, Trag.

Marrubium, Matth. Cord. in Diosc. Fuch. Dod.

Tur. Lac. Cæs. Cast. vulgare, Clus. hist. Eyst.

Marrubium album odorum, Ad.

Marrubium, Gefn. hort. Lob. Lugd. Tab. Ger.

Praefium, Ang.

II. Marrubium album villosum, an Praefium

Dioscoridis: quod 2. in Prodomo.

III. Marrubium album crispum: quod 3.

in Prodr. (num.)

IV. Marrubium album latifolium peregrinum

Marrubium candidum, Dod. Ger. Hispanicum, Tab.

Marrubium candidum alterum Hispanicum,

Lob. (hist.)

Marrubium alterum pannonicum, Clus. pan. &

Marrubium Creticum, Cam. (grinum.)

V. Marrubium album angustifolium peregrinum

Marrubium Creticum angustiore folio, Adv.

Lob. Eystett.

Marrubium Creticum, Dod. Ger. Tab. Lugd.

qui à priore non distinguit.

Marrubium Creticum aliud, Cam.

VI. Marrubium album peregrinum brevibus, & obtusis folijs.

Marrubium Creticum angustis folijs inodorum, Eystett.

Habe-

Habetur major & minor: flore quoque purpurascens, vel rubro communiter: rari9 albo, luteo, & vario: est & reptilis magis humiq; procumbens.

II. Lamium purpureum vel album non foetens folio oblongo.

Urtica labeo femina, Brunf.

Galeopsis, Trag. (vel 5. 6. 7. Urtica) Matth. Lac. Lugdun.

Lamium sive Archangelica fl. alb. Ad. Lob. Lug.

Urtica iners sive Lamium 1. Dod.

Galeopsis flore verticillato, Thal.

Leucas tertia, Cæs.

Lamium purpureum & album, Tab. rubr. Ger.

Galeopsis vera Dioscoridis, Clus. hist.

Tres species flore tantum differentes: est purpureo, vel ex rubro albo purpurascens, labelis albis venis notatis: albo, luteo & croceo.

III. Lamium folio oblongo luteum.

Galeopsis flore croceo, vel Urtica 6. Trag.

Urtica iners 3. sive Lamium flore luteo, Dod.

Lamium luteum, Ad. Lob. ico. Tab. Ger.

Leucas montana, Cæs.

Galeopsis flore luteo, vel Urtica labeo, Cam.

Flores majore ex parte & nonnihil rubicundi & caerulei coloris, quare

Urtica fatua aquatica, sive Lamium ποταμοφύον, aut ποταμόχορον, Thal.

IV. Lamium maculatum.

Urtica fatua λανθάνουσα, Thal.

Galeopsis prima, Tab.

Lamium album, Ger.

Urtica mortua maculis albis respersa, Col.

V. Lamium alba linea notatum.

Urtica lactea, Matth.

Lamium Plinij, Ang. Cam.

Milzadella vulgo, Leucas Dioscor. forte, Cæs.

Lamium Plinij montan. Campoclarense, Col.

Huic linea semper per medium folij decurrit: cujus altera species folijs brevioribus, profundius incisis & linea angustiore, &

Lamium æquicolorum, Col. dicitur.

VI. Lamium folijs caulem ambientib. majus.

an Lamium 3. vel peregrinum, Clus. pan.

an Lamium pannonicum 3. Clus. hist.

Ballote crispa major, Lugd.

Narrubium χαμαιμερίς, Thal.

Alfines species, Tab.

Alfina hederula altera, Ger.

VII. Lamium folio caulem ambiente minus.

Morsus gallinæ folio hederulæ alterum, Lob. ic.

Leucas quarta, Cæs.

Ballote crispa minor, Lugd.

VIII. Lamium maximum sylvaticum foetidum.

Heraclea vel Urtica 11. Trag.

Urtica sylvana, Lon.

Urtica foetida maxima πορφυράδμον, Thal.

Urtica Heraclea, Lugd. herculea, Tab.

an Sideritis alia, Lugd.

Galeopsis legitima, vel vera Dioscoridis, Clus. hist.

Huic simile aliud, folijs non ita amplis, sed inferius incanis & lanuginosis, (Lamium incanum dici poterit) Thal.

IV. Lamium maximum sylvaticum alterum.

Galeopsis maxima pannonica, Clus. pan. & hist.

X. Lamium montanum Melissæ folio.

Melissa prima, Trag. ico. sylv. Lon.

Melissophylli species, Dod. gal.

Melissophyllum verum, Fuch. sylv. Cord. obf.

Melissophyllum Fuchij, Ges. hor. Lob. (& Herba sacra Agrippæ) Lugd.

Melissa Fuchij, Lob. ico. Cam. Eyf.

Herba sacra quorundam Dalechampi, Lugd.

Melissa altera, Cæs.

Variat floribus communiter pallide purpurascens: reperitur & albis & versicoloribus, hinc

Lamium pannonicum 1. versicolore flore, &

Lamium pannonicum 1. albo flore, Clus. hist.

Est & altera caulibus infirmioribus & frequentiorib. & folijs paulo angustioribus, &

Lamij pannonicum 1. species altera, Eid. dicitur.

X. Lamium peregrinum, sive Scutellaria in Prodromo descripta.

Betonica sylv. Pauli, Quadramio.

Scutellaria, Cortuso.

Cassida, Colum.

Scordalis secunda Plinij, Ponæ.

Floribus est purpureis, rarius albis.

U R T I C A

A καλὴν Dioscoridi l. 4. c. 94. & Theoph. 7. hist. 7. παρὰ τὸ μὴ ἔχειν καλὴν ἀφ' ὧν, quod in jucundo sit tactu, & pruritus cietur, Athenæo: dicitur & νιόβη, quasi pruriginosa, à νίβη, quod pungat & suo morsu sensum laessat. Latine Urtica ab urendo dicta, quod pruritus & pustulas igni similes excitet, Plinio.

GENERA

Genera duo Dioscoridi: una agrestior, altera non aequae aspera, &c. at Plinio l. 21. c. 15. plures sunt differentiae: sylvestris, quam seminam vocant, mitior: & in sylvestri quae dicitur Cania, acrior: quae vero odorem fundit, Herulanae: quae innoxia morfu carens, Lamium vocatur. Vide etiam l. 22. c. 13. & 14. Distinguiamus in pungentes & non pungentes: pungentes in maiorem & minorem: non pungentes, in faridas & non faridas, & haec in maculatas, & non maculatas: quae floris colore purpureo albo, lutes variant.

Urtica urens.

I. Urtica urens maxima.

Urtica major, Brunf. Fuch. Dod. gal. Lon. Thal. Taber.

Urtica vulgaris urens 1. Trag.

Urtica secunda, Matth. Lac. Cæs. Lugd. Cast.

Urtica, Cord. in Diosc. urens, Cer. urens altera, Dodon.

Urtica sylv. major, Ges. hor. sylv. asperior, Lob.

Urtica communis, sive major & foemina, Ad.

Hujus & caulis & radix aliquando parum rubent, & dicitur

Urtica rubra, Tab. Ger.

II. Urtica urens altera.

Urtica vulgaris urens altera, Trag.

Urtica oligophyllos (à folior. paucitate) Lug.

III. Urtica urens minor.

Urtica minor, Brunf. Fuch. Dod. gal. Cord. hist.

Lon. Thal. Tab. Ger. sylv. minor, Ges. hor.

Urtica tertia, Trag. Matth. Lac. Lugd. Cast.

Urtica exigua, Cæs. urens minima, Dod.

Urtica minor sive Cania Plinij acrior, Ad.

Urtica minor acrior, Lob.

IV. Urtica urens pillulas ferens: 1. Dioscoridis semine lini.

Urtica, Ang. legitima, Clus. hist.

Urtica Romana, Trag. Fuch. (& vera) Tur. Ges. hort. Eyst.

Urtica sylv. sive Romana offic. semine Lini, Ad.

Urtica Rom. vel macula, Lob. Cam. Tab. Ger.

Urtica prima, Matth. Lac. Cæs. Cast. Lugd.

Urtic. 1. quae in Alexandria Angiar dicitur, Alp.

Urtica sylvestris, Dod. gal.

Urtica urens prior, Dod.

Urtica fatua aculeata.

I. Urtica aculeata folijs serratis.

Cannabis sylv. Trag. Lugd. spuria, Ger.

Cannabis sylv. spuria altera, Lob. ico.

Cannabina alba, Tab.

Floribus communiter purpureis: rarius candidis.

II. Urtica aculeata folijs serratis altera.

Cannabis sylv. spuria tertia, Lob. ico.

an Sideritis Cordi, Thal.

Alyssum arvense album, Tab.

Urtica mortua quarta, Dod. post.

III. Urtica aculeata folijs non serratis.

Sideritis altera Matthioli, ipsi Lugd.

Cannabis spuria facie Urticae, Lob. ico.

Urtica fatua sylv. aculeata, Thal.

A L Y S S O N.

Alysson Galen. 2. de Antidotis, herba est Marrubio similis, orbes habens in surculorum summitatibus, asperiores & magis spinosos: flores ad caeruleum vergentes: sic dicta eidem, 6. simpl. quod demorsos à cane rabido mirifice juvet. Sed haec à Diosc. l. 3. c. 105. quae folijs est rotundis, & fructu duplicium scutulorum effigie, plantae diversae: ut & Plin. l. 24. c. 11. licet eandem nominis ratione assignet, cui & alia est, & ad Rubiam levem referenda.

I. Alysson verticillatum folijs profunde incisigere suspicatur, Lugdun.

Alysson Galeni, Clus. hisp. & hist. Dod. Lobel. Cast. Ger.

Alysson Galeni aliud, Cam.

Alyssum Galeni Hispanicum, Tab.

Moluccam spinosam Clusium pro Alyssopin-

Planta Hispanica Marrubio similis, Col.

Ex horto clarissimi Contareni.

II. Alysson verticillatum folijs crenatis.

Sideritis Alysson, & Sideritis Heraclea Dios-

coridis, Alysson Antonij Coi ex Galeno, Col.

S I D E R I T I S.

Σιδερίτις (ἀπὸ σιδήρος ferro, ob vim vulnera glutinantem) Dioscoridi l. 4. c. 33.

Genera: Dioscoridi triplex est: 1. aliquibus Heraclea folijs Marrubij: 2. folia longis pediculis harentia, seu silicis, urring, numerosa: quae Heraclea Crateva, folijs Coriandro similibus. Plin. l. 25. c. 5. sub Achillaea sex differentias recensuit: prima Achillaea, quae & Dioscor. altera est Myriophyllum Diosc. tertia est Sideritis Heraclea 1. Diosc. quarta & quinta Sideritis Heraclea Crateva & tertia Diosc. sexta est Sideritis secunda Dioscor.

Sideris

*Sideritis hirsuta.*I. *Sideritis* folijs hirsutis profundè crenatis.*Sideritis* herbariorum 5. Tab.*Sideritis* Monspelica Scordiodides, Ad. floribus luteis, Lob. Lugd.

Tragoriganum Prassoides, Peninij.

II. *Sideritis* hirsuta procumbens.*Sideritis* Heraclea, Clus. hisp. at 3. in hist.

Tetrahit herbariorum, Lob. Lugd.

Herba Judaica, Dod.

Sideritis Herculea Dioscoridis, Cæs.*Sideritis* prima Herculea, Cam.*Sideritis* herbariorum 4. Tab.III. *Sideritis* hirsuta procumbens altera minimum crenata.*Sideritis* quarta & quinta, Clus. hist.IV. *Sideritis* vulgaris hirsuta erecta.*Sideritis* prima, Fuch. Tur. Cord. in Diof. Gefn. hort. Thal.*Sideritis* vulgaris, Cam. in Matt. vel 2. Clus. hist.*Sideritis* quarta, Lon.*Sideritis* Heraclea, Cord. hist. Tab.*Sideritis* sive ferrunatrix, Ad. Lob. ico.*Sideritis* Herculea altera in vineis, Cæs.

Herba Judaica, Gef. col.

Tetrahit, Lugdun.

V. *Sideritis* hirsuta vulgaris humilior.*Sideritis* secunda, Clus. pan. & hist.

Illius flos candidus, rictu sanguineis notis asperfo: hujus flos amplior, albus luteo pallens paucis rubris punctis asperfis.

VI. *Sideritis* hirsuta pallido flore.*Sideritis* pannonica 3. Clus. pan. at 6. in hist.VII. *Sideritis* montana parvo varioq; flore.*Sideritis* mont. parvo flore nigro purpureo, Col.

Caput purpureo nigrescit, umbilico luteo &

rarius albo.

collo candicante, à D. Columna accepinus.

VIII. *Sideritis* alpina Hyssopifolia.*Sideritis* montana, Ad. Lob. ico. Lugd.*Sideritis* herbariorum 6. Tab.*Sideritis* septima, Clus. hist.

Variat folijs quandoq; angustioribus, quandoq; latioribus & in summitate crenatis, qualem ex Pyrenæis habemus.

IX. *Sideritis* querno folio, Dalech. Lugd.

Huic similem Britannicæ nomine, ann. 1578.

in horto Patavio legimus.

X. *Sideritis* alfine Trixaginis folio: quæ 2.

in Prodromo.

*Sideritis glabra.*I. *Sideritis* arvensis latifolia glabra.*Sideritis* 2. Matth. quamvis hist. Lugd. velit esse

Cannabinam spuriam Lobelij: alij Marrubium pannonicum Clusij.

Sideritis Heraclea altera, Cæs.*Sideritis* arvensis flore pallido, Cam.*Sideritis* prima arvensis species altera, Thal.

Alyssum majus, Tab.

Alyssum Germanicum, Ger.

II. *Sideritis* glabra oblongo splendente folio: quæ 1. in Prod.III. *Sideritis* arvensis angustifolia rubra.*Sideritis* alia in vineis flore purpureo, Cæs.*Sideritis* arvensis flore rubro, Cam.*Sideritis* 1. congener secunda, Thal.

Ladanum segetum Plinij, & Tetrahit angustifolium alijs, Lugd.

Alyssum Galeni flore purpureo, Tab.

Plinius lib. 26. cap. 8. inquit, Ladano sistitur

alvus utroque quod in segetibus nascitur confuso & cribrato: hæc ille. Flore est purpureo,

rarius albo.

E U P H R A S I A.

Euphrasiam olim *Εὐφροσύνη* dictam aliqui volunt, eò quod oculos, eorum caliginem discerniendo, delet: hinc nonnullis Ophthalmica & Ocularia: quæ cum paulo supra ducentos annos inventa fuerit, veteribus indicta videtur. Fortè hac vox à Buglossa mutuata, quæ etiam *εὐφροσύνη* dicitur: quod eo modo quo Buglossa in vinum conjicitur, animi letitiam faciat: sic & Euphrasia, quam primo loco proponimus, oculos juvet: hinc Germanis, oculorum solatium.

I. Euphrasia officinarum.

Eufragia alba, Brunf. vulgaris, Col.

Eufragia, Matth. Ang. Cæs. Cast. desc. altera major, Thal.

Euphrasia & Eufragia, Fuch. Dod. Lac. Gef. Ad.

Lob. Lugd. Tab. Ger. vulgaris, Lon.

Euphrasia Argentinesium, vel 2. & 6. Trag.

Ophthalmica sive Ocularia, Eric. Cord.

Altera major est & ramosior, folijs minoribus: altera minor folijs latioribus, & in montibus ferè semper unicaulis, quandoq; in alpi-

bus Helveticorum parva, luteis floribus: floris

Cg colore

colore variat, communiter ex luteo albicat, aliquando eleganter ex cæruleo purpurascit: hinc Euphrasia ramosa pratensis flore albo, & Euphrasia minus ramosa, flore ex cæruleo purpurascente, Eyst.

II. Euphrasia folijs lini angustioribus.

Eufragia linifolia, Col. par. 2.

Hæc flore, fructu, semine ac sapore congener & dodrantem non excedit.

III. Euphrasia pratensis rubra.

Eufragia altera, Dod. Lob. Lugd. Col.

Sideritis pratensis rubra, Lugd.

Ericoides rubrum, Thal.

Cristæ alterius generis prima, Cæf.

Odontites, Tab.

Cratæogonon Euphrosyne, Ger.

Habetur brevis & palmaris.

IV. Euphrasia pratensis Italica latifolia.

Eufragia 3. non scripta, sive media, Col.

Brunellæ Italicæ nomine in Phytopinace: ac in Prod. sub Euphrasia purpurea minore descripta: quæ floris colore purpureo, vel candido variat.

V. Euphrasia Italica latifolia altera.

Eufragia major sylv. purpurea latifolia, Col.

VI. Euphrasia pratensis lutea.

Sideritis pratensis lutea, Lugd.

Ericoides luteum, Thal.

Cristæ alterius generis altera, Cæf.

Odontites secunda flore luteo, Tab.

Eufragia sylv. major lutea angustifolia, Col.

VII. Euphrasia lutea alpinefolia, radice

squammata: pro: in Prod. descripta.

Anonyma radice dentariæ, Col. par. 2.

MELAMPYRUM.

Mελανθρον, id est, Triticum nigrum, Galeni i. aliment. ult. quod ex tritici mutatione generari censetur: & Theophrasto 8. hist. 5. de nostro i. & 2. intelligere oportet: quod quibusdam Plinij l. 21. cap. 17. Stelephuros, alijs ejusdem Alopecuros, cui nomen à spica molli & lanugine densa, vulpium candidis non dissimili, cui proxima Stelephuros, nisi quod illa particulatim flore at: hæc Plinius. An forte Aera Plinij l. 18. c. 17. Triticum simili modo enecat aera: quamvis hoc nomen & jam Lolio tribuatur.

I. Melampyrum purpurascens coma.

Trifolium majus, Brunf. ico.

Triticum vaccinum, Trag. Dod. Lon. Lugd.

Melampyr. Dod. gal. Ad Lob. Cam. Tab. 5. Thal.

Parietaria sylv. tertia, Clus. pan. & hist.

Variat floris colore: flore est infernè superneq; puniceo, medio candido, folijs laciniatis: sic infernè puniceo, superne luteo, folijs minorib. flore luteo in summo albicante: infernè candido superne luteo: sic ex albo viridiq; mixto.

II. Melampyrum cærulea coma.

Parietaria Lipsensium, Trag.

Parietaria sylv. Cam. sylv. 1. Clus. pan. & hist.

Coma, coloris est, modo violacei, modo purpurei, nunc dilutioris, nunc saturatioris: modo candidi.

III. Melampyrum lanuginosum Boeticum.

Parietaria montana Boetica, Clus. cur. post.

IV. Melampyrum luteum latifolium.

Parietaria sylv. 2. Clus. pan. & hist. sylv. Eyst.

Cratæogonon, Ad. Lob. Lugd. rubrum & album, Ger.

Satureia lutea Dalechampij, Lugd.

Hyssopus nemorensis & lutea, Lugd.

Melampyrum primum, Thal.

Crista prima, Cæf.

Milium sylvaticum primum & secundum (solum colore floris differunt) Tab.

Κραταίονος Dioscorides l. 3. c. 139. folijs Melampyro similibus describit, & c. quæ notæ huic conveniunt. At Plinio l. 7. cap. 8. Cratæogonon duplex, alterum Dioscoridis respondens, alterum forte Persicaria erit.

V. Melampyrum luteum angustifolium: quod sub Melampyro 4. in Phytopinace, & pro Melampyro luteo linariæ folio, in Prod. descriptum Melampyrum sextum, Thal.

VI. Melampyrum luteum minimum.

Melampyr. perpusillū luteum, Ad. Lob. ic. Lug.

Melampyrum luteum, Tab.

BETONICA.

Kετόν à remediorum copia & varietate: Αχέρπερον, quod frigidis locis inveniat: Romanis Betonitron, Plinio lib. 25. cap. 8.

I. Beto-

I. *Betonica purpurea.*

Betonica, Brunf. Trag. Matth. Ang. Fuch. (purpurea, Eid. ico.) Dod. Gefn. hort. Tur. Lac. Lon. Ad. Lob. Cæs. Thal. Lugd. Cast. Tab. Ger. *Betonica vulgaris*, Clui. hist. *Veronica*, Cord. in Diosc. & hist. Duplex est: altera spica brevior, altera longior, molliore, serius florente, & altius excrefcere.

II. *Betonica alba.*

Betonica alba, Brunf. Tab. *Betonica albo flore*, Dod. Cluf. pan. & hist. Cam. *Betonica candida*, Trag. Lob. *Veronica alba*, Cord. hist.

III. *Betonica folia capitulo Alopecuri.*

Alopecuri genus, siue *Alopecuros montana*, Lugd.

SERRATULA.

Serratula à folijs minutim serratis nomen accepit.

Serratula, Matth. Dod. Adv. Lobel. Cluf. histor. Lugd. Cast. Cam. Ger.

Serratula tinctoria, Tab. tinctoris, Eyf.

Cerretia siue *Serretia*, Cæs.

Centauroides, vel *Centaureum majus* syl. German. Th. qui vult *Schartam* seu *Tinctoriū* florem à Trago nominari: quod ego, sed malè, a *Solidago Serracena* 4. Lon. ico. (liàs credidi.

Differentia in folijs ratione incisuræ quadruplex est, ut rectè Thalius:

i. Folijs omnibus serratis, sed incisura carentibus, etiam flore candido, quæ

Serratula tinctoria 1. Tab.

Serratula purpurea, Ger.

2. Folijs ad radicem integris, reliquis profundè incisis, quæ

Serratula 2. Tab.

Serratula flore albo, Ger.

3. Primum folium ad radicem integrum habet, reliqua omnia dissecta, quemadmodum *Lobelius* 1. figurâ pinxit.

4. Folia utroque latere omnia similibus divisionibus divulsa sunt, quæ

Serratula 3. Tab. Ger. & 2. apud Lob.

Serratula tinctoris, Eyf.

Majorem & minorem *Cæsalpinus* agnoscit.

BEHEN ALBUM ET RUBRUM.

Serratulæ affinis capitulo squamoso luteo, ut & flore.

Behmen ab *Arabum*: id est *Behen album*, nam rubrum *Behmen Ackmar* incolæ appellant, *Rauvvolff*. & Lugd. ap.

Behen Arabibus, ut *Serapioni* sunt radices pastinacæ radicibus similes: quare *Haliabbas* scribit *Behen* & *Pastinacæ* sylv. radices, nulum inter se discrimen habere. Equidem in officinis radices duæ nomine albi & rubri ostenduntur, sed quid sint controvertitur: *Al-*

bum aliqui *Polemonia* siue *Lychnidis*, quæ *Papaver spumeum* & *Behen album* *Montpelienfibus* dicitur speciem esse existimant: *Ben* verò rubrum, alij *Limonij* maritimi, alij *Valerianæ* rubræ, alij *Bistortæ* esse autumant: alij qui verò *Garzia* & monente & reprehendente, *Zerumbeth* esse statuunt. Quare aliqui in descriptionibus *Arabum*, substituunt *Eryngium*, alij *Tormentillam*, alij *Angelicam*, alij denique *Caryophyllatam*. Licet *Aëtarius* & *Myrepsus* *Behen Hermodactylos* esse velint.

SCROPHULARIA.

Scrophularia & à radice nodosa & ab effectu, quod ad *Scrophulas* prodesse credatur, nomen accepit. Alia tamen radice est nodosa, alia fibrosa nodis carens.

I. *Scrophularia nodosa* foetida.

Scrophularia major, Brunf. Gefn. hort. Tur. Lon. Adv. Lobel. Cæs. Thal. Lugd. Camer. Tab. Ger.

Scrophularia, Matth. Lac. Dod. Cast.

Ocimum alterum, Trag.

Galeopsis, Dod. gal. Fuch. cui minor, in ico.

Clymenum mas, Gefn. hort.

Sunt qui *Galeopsis* alij *Clymenum* *Plinij* 125. c. 7. cui *hederæ* folia tribuit: alij *Chrysip-*

peam ejusdem 1. 26. c. 9. (cujus tamen notas nulas addidit) velint. Alij *Millemorbia*, *Ficaria*, *Ferraria*, siue *Castrangula*.

II. *Scrophularia palustris* non foetida, seu aquatica minor.

Scrophularia scemina, Cam. ep. Matth.

Betonica aquatica septentrionalium species minor, Lob. obf.

III. *Scrophularia aquatica* major.

Ocimum majus, Trag.

Gg 2

Galco-

Galeopsis 2. Dod. gal.
 Scrophulariæ majoris altera species, Gef. hor.
 Clymenon fœmina, Eid.
 Clymenon, five Betonica aquatica, Tur.
 Betonica aquatica, Dod. Ad. Lob. Lugd. Taber.
 Ger.

Scrophularia major aquatica, Thal.

IV. Scrophularia folio Urticæ.

Galeopsis, Ang.

Scrophularia peregrina, Cam.

an Scrophularia Cretica 2. Clus. hist.

V. Scrophularia flore luteo.

Lamium pannonicum, 2. Clus. pan. alterum five
 exoticum, Eid. hist.

Scrophularia montana maxima, Col.

In Phytopinace, Matthiolo & Prodomo
 descripta.

VI. Scrophularia folijs lacinitatis: quæ 2.
 in Prod.

VII. Scrophularia folijs filicis modo laci-
 natis, vel Ruta Canina latifolia.

Scrophularia Cretica 1. Clus. hist.

VIII. Scrophularia, Ruta canina dicta vul-
 garis, Sideritis 3. Matth. Cam. qui addit forte à
 pictore non rectè expressam.

Sideritis altera Diosc. Lac. Cast. Tab. prima,
 Lon.

Galeopsis 3. Dod. gal.

Ruta canina, Ad. Lob. Lugd. Tab. Clus. hist.

Scrophulariæ similis planta major: Sideritis 2.
 Dioscoridis, Cæs.

In Matthioli figura folia inferiora cum Ta-
 nacetum referant, aliqui Tanacetum inodorum
 esse suspicantur: at Rutam caninam ipsum ex-
 primere voluisse non dubitamus, cum à No-
 bilis. Cortuso Sideritidis 3. nomine, Rutam
 hanc accepimus, qui eam Matthiolo commu-
 nicaverat.

STACHYS.

Stachys frutex est Marrubio similis, sed longior, folijs subhirsutis, duris, odoratis, candidis, Dioscoridi lib. 3.
 cap. 120. At Plinio lib. 24. cap. 15. Stachys porri similitudinem habet, longioribus & pluribus folijs, odoris
 jucundi, coloris in luteum inclinati. Stachys id est spica.

I. Stachys major Germanica.

Marrubium agreste, vel 3. Trag.

Stachys, Matth. ed. prim. Fuch. Dod. gal. Cord.

in Diosc. & hist. Tur. Lac. Lon. Ad. Cast. Lugd.

Tab. Ger. Dioscoridis, Lob.

Sphacelus alijs Stachys, Guil.

Stachys Germanica, Gefn. ap. minor, Cam.

Pseudostachys, Matth. Lugd.

Salvia sylvestris, Cæs.

Marrubium montanum alterum, Thal.

Sideritis, Heraclea, Col.

Floribus est purpurascens, rarius albis.

II. Stachys Cretica: pro Pseudostachyde 1.
 in Prodomo describitur.

III. Pseudostachys alpina.

Marrubium montanum 1. Thal.

Alpenkraut/ forte Sphacelus Theophrasti, Lon.

Salvia sylv. nigrior, Cæs.

Salvia alpina, Tab. Ger.

Hujus altera species gravi odore carens: u-
 traque sub Pseudostachyde 2. in Prodomo
 descripta.

IV. Stachys minor Italica.

Stachys, Matth. Dod. Lugd. Taber. Ger. minor,
 Cam.

Stachys floribus gravioris odoris, Gefn. ap.

Stachys spuria Flandrorum, Ad. Lob. ob.

Stachys lychnitis, Eid. ico.

Salvia sylvestris 3. Cæs.

V. Stachys Lusitanica, Lob. Lugd.

VI. Stachys spinosa Cretica.

Stachys spinosa & Gaiderthymo, id est Afini-
 num Thymum, Clus. ap. 1.

Gaiderothymum Creticum, Hon. Belli ep. 5. ad
 Clus. Ponæ Ital.

VII. Stachys palustris fœtida.

Stachys palustris Gefneri, Cam.

Betonica fœtida, Gefn. col.

an Herbæ Judaicæ cognata, Eid.

Sideritis 1. gravis odoris, Thal.

Clymenon minus, Lugd.

Terriola, quod tertianas sanet, Cæs.

Marrubium aquaticum acutum, Ger.

Lyfimachia galericulata adulterina, Eyst.

SECTIO

SECTIO SEXTA.

SALVIA; HORMINUM; VERBASCUM; BLATTARIA;
ÆTHIOPIS; VERBASCULUM SIVE PRIMULA VERIS;
Sanicula Alpina vel Auricula Urſi; Pinguicula; Digitalis;
Ephemerum.

S A L V I A.

Salvia, quod ad multa, præſertim ad ſecunditatem, ſalutaris ſit: cum ſteriles, huius uſu frequenti gravida reddantur: quare Agrippa ſacram herbam vocavit, *Ærio auctore*. *Ελαιοφικον* Dioſcoridi l. 3. c. 40. (quæſi in tabem redacta, cum herba ipſa ſemper retorrda & exucca videatur: id enim *επανος* & *επανιδ* ſignificat: folia enim attritis veſtibus comparantur) & *ιδαιοφικον* & *επακρον* dicitur. Plinius l. 22. c. 25. Lenti ſylveſtri annuerat, putans Eleliſphacon à Lente dictum, ab alijs Phacon. Eſt, inquit, & ſylveſtris Eleliſphacos à Græcis dicta, ab alijs Phacos: Eſt ea ſativa lente levior & folio minore atque ſiccior & odoratiore (quibus Sphacelum Theophrasti innuit.) Eſt & alterum genus ejus ſylveſtris, odore gravi: hæc mitior: folia habet Cotonei mali effigie, ſed minora & candida) hæc eſt apud Dioſcoridem hiſtoria Salvia, quam cum Phaco & Aphaca confundit) ſubjungit: noſtri, qui nunc ſunt herbarij, Eleliſphacon Græcè, Latine Salviam vocant, mentaſimilem, canam, odoratam (majorem haud dubie intelligit.) At l. 26. c. 6. Salvia meminit: an verò de hac, vel Stachy, vel Sphacelo Theophrasti, vel Hormino vulgari, vel Aethiopide loquatur, ambigitur.

Genera: Dioſcorides unius meminit: quæ major vulgaris eſt: at Theoph. 6. hiſt. 1. Salviae plura ſunt genera: ſubjungens Sphacelum & Salviam inter ſe diſtare, quaſi alterum urbanum alterum ſylveſtre genus dixerit.

I. Salvia major, an Sphacelus Theophrasti?

Salvia latifolia, Brunf. deſc. Trag. Geſ. hor. Lon. Cluſ. hiſt. Cam.

Salvia major, Matth. Fuch. Dod. Tur. Lac. Lugd. Caſt. Tab. Ger.

Salvia hortulana, Eric. Cord.

Salvia, Ang. Cord. in Dioſc. domeſtica, Cæſ.

Salvia major ſcabrior Dioſcoridis, Ad. Lob.

Salvia major latifolia flore cæruleo, Eyſt.

Varietas in folijs & floribus: folijs eſt viridibus, ijsque criſpis & non criſpis, purpureſcentibus, verſicoloribus: ſic vel totis, vel partim albidis: floribus communiter cæruleis, rarius candidis.

II. Salvia nigra.

Salvia major alba, Dod.

Foliorum pediculi, ac nervi, & recens enata folia attrubent.

III. Salvia minor aurita & non aurita.

Salvia nobilis, Brunf. Geſn. hort.

Salvia anguſtifolia & minor, Trag.

Salvia minor, Matth. Fuch. Dod. gal. Cord. in

Dioſc. Lac. Tur. Lob. Cæſ. Tab. Ger. pinnata, Ad.

Salvia acuta, Lon.

Salvia anguſtifolia, Cluſ. hiſt.

Salvia tenuifolia auriculata, Cam.

Sphacelus verus Theophrasti, Lugd.

Variat folijs auritis, vel pinnatis, & non auritis: folijs aliquando Lavandulæ concoloribus, ſed latioribus, & graviſſis odoris: rarius luteolis: flore cæruleo, rarius albo.

IV. Salvia minor altera: hæc odore & ſapore eſt Abſinthij, floreque rubente: quam primum Baſileæ in horto Pharmacopæi Johannis Heitzmanni: dein in horto Montebelgardiano, legitimus.

V. Salvia folio tenuiore.

Salvia Hiſpanica odoratiſſima, Cam.

Salvia Indica, Tab. Ger.

Salvia Hiſpanica flore albo, Eyſt.

VI. Salvia latifolia ferrata: quæ 1. eſt in Prodromo.

VII. Salvia anguſtifolia ferrata.

Salvia Cretica anguſtifolia, Cluſ. hiſt.

VIII. Salvia anguſtifolia lanuginofa: quæ 3. in Prodromo.

IX. Salvia baccifera.

Salvia fructum inſtar gallæ ferens, Matth.

Salvia Græca, quæ hodie *φλασκουμυλτα*, Ang.

Salvia Cretica, Dod. Tab.

Salvia coccifera ſive baccata Cretenſis, Ad.

Salvia Cretica baccifera, Lob. ico. Lugd. Cam. ep. Matth.

Hujus folia aliquando aurita, nonnunquam

Gg 3

appen-

appendicibus carentia: subinde quædam cauliculorum pars inter genicula in crassitudinem extuberant ut gallarum (sunt excrescentiæ quædam) magnitudinem & similitudinem, seu baccarum & pomorum orbiculatorem, in Creta assequantur. At in regionibus frigidis nulla profert: hinc duæ figuræ apud C'ul. hist. Salvia Cretica pomifera, & non pomifera.

X. Salvia folio subrotundo: quæ 2. in Pro-

HORMINUM.

Quævis herba est folijs Marrubio similis, caule quadrangulo, &c. Dioscoridi l. 3. c. 145. dictum videtur phraſtus Hormini (Gaza Geminalem vertit) inter fruges meminit 8. hist. l. 1. & 7. Galeno 8. simpl. φέκιον: Aegina & φέκιον & φέκιον dicitur. Plinius l. 18. c. 7. Horminum à Grecis dictum, Cumino simile scribit.

Genera duo Dioscoridi: sativum & sylvestre: in sylvestri semen rotundum ac fuscum, in altero nigrum & oblongum reperitur. Et Plinio l. 22. c. 25. Horminum Cumino simile, &c. duorum generum, alteri semen nigrum & oblongum, alteri candidius & rotundius: qui vires à Dioscoride prius propositas subiungit.

I. Horminum sativum.

Horminum, Matth. Ang. Lac. Dod. Adv. Lob. Cæſalp. Lugd. Taber. Caſt. fativum, Dod. gal. Cæſalp. Cam.

Orminum verum, Gefn. hort. minus, Lon.

Horminum sylv. folijs purpureis, Ger.

II. Horminum Syriacum: & Eyſt. in Phy-

topinace, Matthiolo & Prodromo descriptum. Bifermas, Cam. Aman quibusdam.

III. Horminum Sclarea dictum.

Gallitricum sativum, Trag.

Gallitricum, Dod. gal. Lugd. Cam. Ger.

Sclarea, Matth. Caſt. Cam. Tab. vulgo & Centrum galli, Guil. pap.

Sclarea hortensis, Gefn. ap.

Sclarea Æthiopis, Ang.

Orminum sativum, Fuch. Tur. Cord. in Dioſc.

Horminum & Orminum minus, Gefn. hort.

Scarlea, Ad Lob.

Sideritis Heraclea, Frac. cui & Alyſſon Galeni.

Scordium alterum Plinij, Dalech. in Plin.

Orvala, Dod. Caſt.

Horminum sylv. i. Cluſ. hist.

Horminum hortense, Eyſt.

Marrisalvia major, Col.

Quibusdam scopa regia Plinij, inter Sideritides lib. 25. cap. 5. & Tusſilago altera, quæ quibusdam Salvia, Plinij lib. 26. cap. 6. cum qua in multis convenit: alijs Phorbion Galeni: alijs Baccharis Dioscoridis l. 3. cap. 51. alijs Scordium alterum Plinij l. 25. cap. 6. quibusdam Aleatorophos Plinij lib. 27. cap. 5. in cujus descriptione seminis forma & usus, cum Sclarea semine convenit: alijs Horminum sativum Dioscoridis.

IV. Horminum luteum glutinosum,

Orvala 3. Dod.

Colus Jovis, Ad. Lob. Cluſ. pan. Lug. Cam. Eyſt.

Melinum, Caſt.

Galeopsis lutea Dalechampij, Lugd.

Horminum sylv. 2. Cluſ. hist.

Camphorata quibusdam, quia summitas Camphoram redolet: Sphacelus alijs, quod ejus succus in ulceribus malignis valeat. Stachys Plin. quibusdam.

V. Horminum syl. latifolium verticillatum.

Horminum sylv. i. vel sylv. latifolium alterum, Cluſ. pan.

Horminum sylv. 3. Eid. hist.

VI. Horminum pratense folijs ferratis.

Salvia agrestis, Brunf. flore purpureo, Eyſt.

Salvia sylv. vera, Trag. sylv. Gefn. hort.

Horminum sylv. Fuch. Dod. gal. Tur. Cord. in

Dioſc. Gefn. hort. Lon. Ad. Lob. Lugd. Camer. majus, Thal.

Horminum sylv. 2. vel sylv. 4. flore violaceo, Cluſ. pan.

Hormini quarti species i. Eid. hist.

Orvala sylv. species 4. Dod.

Sideritidis Heraclea species, Fracast.

Gallitricum vulgo, Caſt.

Sclarea sylv. Tab.

Colus Jovis, Ger. ico. Eyſt.

Quibusdam Verbenacæ rectæ genus: alijs Aleatorophos Plinij.

Hujus differentiae plures, florum colore non nihil differentes: ut flore cæruleo, violaceo, rubicundo: Sic Camerarius absque ullo flore per æstatem, sed hyeme cæruleo, lupuli odore, observavit.

VII. Horminum pratense niveum folijs incanis,

Hor-

Horminum syl. quartum niveo flore, Clus. pan.

Hormini syl. quarti altera species, Clus. hist.

Horminum syl. Ger.

Sclarea syl. flore albo, Tab.

Salvia agrestis flore albo, Eyst.

VIII. Horminum syl. majus folijs profundius incis.

Hormini syl. 4. altera species, vel dilutior flore, Clus. pan. syl. 4. species 3. Eid. hist.

Pars externa non purpurascit, sed virescit:

folia inferiora quasi lacinia: flos dilutioris

coloris, aliquando quasi cinereus. Hoc etiam

flore est minore & rubro, quod

Hormini syl. quarti species 4. Clus. hist.

IX. Horminum syl. Lavandulæ flore.

Hormini syl. secundi species 5. Clus. pan. 4.

Species 5. Eid. hist.

Sclarea Hispanica, Tab.

Gallitricum alterum, Ger.

X. Horminum syl. salvisfolium majus, vel

maculatum.

Horminum syl. Matth. Cæs. Cast. Lugd.

Verbascum salvisfolium, Lob. ico.

Verbascum nigrum salvisfolium, Ad. Lob. ob. Lug.

Orvala altera, Dod.

Hormini syl. tertij altera species, Clus. pan.

Hormini syl. quinti altera species, Eid. hist.

XI. Horminum syl. salvisfolium minus.

Horminum syl. 3. vel Horminum syl. 5. salvi-

folio, Clus. pan.

Hormini syl. quinti species prior, Eid. hist.

Flos ex cæruleo purpurascens & quasi viola-

ceus, interdum colore dilutior, nonnunquam

quasi cinereo.

XII. Horminum minus supinum.

Horminum syl. sextum sive minus supinum

Creticum, Clus. hist.

XIII. Horminum angustifolium lacinia-

tum: quod 2. est in Prodromo.

Folia inferiora aliquando in profundas laci-

nias dividuntur: aliquando Scolopendriæ fo-

lia referunt.

XIV. Horminum minus album Betonicae

facie: quod 3. in Prodromo.

XV. Horminum tenuifolium angustis folijs

Erythrodani sylvestris longiorib⁹, Thal. quid?

V E R B A S C U M.

Verbascum φλόξ Dioscoridi lib. 4. cap. 104. ἀφλόξ uro, quasi φλόξ flamma, quia hujus pro elychnijs usus est.

Genera summa duo Dioscoridi: album & nigrum: in albi genere mas & femina: mas folijs albis, oblongis, angustis: feminae folia brasiæ latiora, candida, flores candidi aut ex luteo pallescentes. Nigrum folijs est albo latioribus & nigris. Est sylvestre folijs Salviae flore verticillato luteo. Sunt & Phlomis duæ hirsutæ, humiles, rotundi folijs. Tertia præter has est qua Lychnitis & Thryallis, folijs crassis ad lucernarum elychnia aptis. Et Plinio lib. 25. cap. 10. Verbascum Græci Phlomon, genera habet prima duo: album in quo mas: alterum nigrum, in quo femina, tertium, non nisi in sylvis reperitur, sunt folia brasiæ latiora pilosa, &c. Sylvestri folia Eleisphaci alba, ramis lignosis. Sunt & Phlomis duæ hirsutæ, rotundi folijs humiles. Tertia Lychnites vocatur ab alijs Thryallis folijs ad lucernarum lumina aptis.

I. Verbascum mas latifolium luteum.

Verbascum i. Matth. Cord. in Diosc. Lugd. Cæs.

Verbascum mas, Ang. Ad. Cast. Tab. (Thal.

Verbascum candid. mas, Lac. Lon. album mas,

Verbascum latius, Dod. latifolium mas, Eyst.

Verbascum mas & Candela regia, Lob.

Verbascum aut Phlomos vulgaris mas, Lob.

Thapsus barbatus, Ger.

II. Verbascum mas angustioribus folijs flo-

ribus pallidis.

Verbascum secundum, Matth. Lac. Cast. Lugd.

Verbascum syl. majus, Lon.

III. Verbascum femina flore luteo magno.

Verbascum sive candela regia, Trag.

Verbascum nigrum, Fuch. Lon.

Verbascum album femina luteo flore, Dod. gal.

Lugdun.

Verbascum album mas, Ang.

Verbascum maximum albū femina flore sub-

pallido, Lob. ico.

Verbascum alterum flore aureo, Cæs.

Verbascum luteum, Tab.

Verbascum lychnite minus, Ger.

IV. Verbascum femina flore albo.

Verbascum sylvestre, Trag.

Verbascum candidum mas, Fuch. Dod. gal. Tur.

Gef. hort.

Verbascum tertium flore candido, Cæs.

Verba-

Verbascum album foemina, Ang. Lon.

Verbascum angustius, Dod.

Verbascum flore albo, Tab.

Thapsus barbatus maximus odoratus Septentrionalium, Ad. foemina flore albo, Lob. ico.

Thapsus barbatus flore albo, Ger.

Varietas in folijs observatur, quam notant nomine

Verbasci albi secundi, Tab.

Verbasci albi, Ger.

V. Verbascum Lychnitis flore albo parvo.

Verbascum primum, Brunf.

Verbascum lychnite, Matth. Lac. Tab. Ger.

Verbascum candidum foemina, Fuch. Gef. hor.

Verbascum album foemina, albo flor. Dod. gal. Lug.

Verbascum foemina, Ad. Lob. obf. Lugd.

Verbascum quartum, Cæf. Eyf.

Phlomos mas alter, Lob. ico.

Phlomos lychnitis, Lugd.

Verbasci tertia altera species, Cæf.

VI. Verbascum nigrum folio papaveris corniculati: & Cam.

Verbascum aliud, Matth.

Verbascum laciniatum, Lugd.

Verbascum sylv. tertium, Dod.

Verbascum syl. Salvifolium, fruticosum, lignosum, Ad. ubi legendum Verbascum purpureum

Erucae folium.

Verbascum syl. Salviflorum laciniatum, Lob. ob.

Verbascum Intubaceum, Tab.

VII. Verbascum nigrum flore ex luteo purpurascete.

Verbascum nigrum, Trag. Dod. Lob. ico. Tab. Ger.

Verbascum tertium, Matth. Lac. Cæf. Lugd.

Verbascum syl. Fuch. Tur. Gef. hor. syl. minus, Lon.

Verbascum nigrum Salvifolium purpureo flore, Ad. Lob.

Verbascum nigrum latifolium, Thal.

Blattaria Plinij, seu Verbascum nigrum, Eyf.

Flore variat: alterius ex citrino purpurascit: alterius ex flavo candido: alibi flore prorsus cadido.

VIII. Verbascum folijs subrotundis flore Blattariæ: in Phytopinace & Prodomo describitur.

IX. Verbascum humile Creticum laciniatum.

Arcturus Creticus, Belli ep. i. ad Cluf. Ponæ.

Verbascum Brasice folio, Col.

Verbascum fruticosum auriculatum, Ponæ Ital.

Variat: nam illud folijs est latioribus, capitulis rotundis: est & alterum, longioribus, & angustioribus folijs, capitulis oblongiusculis, & hoc est

Arcturi secunda species, Ponæ Ital.

Verbascum Salvifolium.

I. Verbascum latis Salviæ folijs.

Verbascum syl. Matth. Ang. Lac. Gef. hor. Lugd.

Cluf. hisp. & hist. Cæf.

Verbascum sylv. alterum, Dod.

Verbascum syl. Salvifolium fruticosum lignosum, Ad.

Verbascum salvifol. fruticosum, luteo flor. Lob.

Verbascum sylv. folijs Salviæ, Cam.

Verbascum quartum, Lob. ico. 7. Cæf.

II. Verbascum angustis Salviæ folijs.

Verbascum sylv. Dod. Gef. hort. Lugd. Cæf.

Verbascum sylv. Salvitenuifolium Narbonensem, Ad.

Verbascum sylv. folijs Salviæ tenuifoliae, Lob.

Phlomis lychnitis, Cluf. hisp. & hist. Lugd. duplici figurâ.

Salvia sylv. Monspeliensium, Gef. hor.

Hæc Angarathi aliquibus dicitur.

III. Verbascum acuto salviæ folio.

Phlomis lychnitis altera Syriaca, Lob.

Verbascum syl. folio Salviæ tenuifoliae, Lugd.

IV. Verbascum subrotundo Salviæ folio.

Verbascum syl. Salvifoliū exoticum, Lob. Lug.

Hoc Verbasci cistioidis nomine ex horto clarissimi Contareni habemus.

B L A T T A R I A.

Blattariam Plinius l. 25. c. 9. sic expressit: Est similis Verbasco herba, quæ sæpe fallit pro ea capi, folijs minus candidis, cauliculis pluribus, flore luteo. Hæc abjecta blattaria in se contrahit, ideoque, Roma Blattariam vocant, hæc ille. Hoc Dioscorides l. 4. c. 104. Verbascum sylvestri cui flos est æreus tribuit.

I. Blattaria lutea folio longo laciniato.

Blattaria, Trag. Matt. Ang. Fuch. Dod. Gef. h. (&

Verbasci nigri species) Lon. Lug. Cæf. Tab. Ger.

Chrysogonom, an porius Blattaria Plinij, Ad.

Blattaria, Lob. Plinij, Eid. ico.

Blattaria flore luteo, Eyf.

Verbascum leptophyllum, Cord. hist.

Verbascum nonum, Cæf.

Duplex est: altera quatuor cubitorum, tria,

quatuor, quinque; & plura vascula conjuncta habens:

altera humilior, singula vascula profertrens, folijs multò vixidioribus.

II. Blat-

II. Blattaria alba.

Blattaria flore albo, Lob. ico. Cam. Eyst.
an Verbasculum quintum, Cæs.
Ad Verbasculum lychnitis referri potest. Variat
flore parvo, eoq; albo vel viridi, vel viridi pur-
purascēte & magno flore, quare hæc
Blattaria altera: illa verò
Blattaria flore viridi.
Blattaria flore ex viridi purpurascēte dicitur,
Lobel. icon.

III. Blattaria magno flore: & Lob. ico.

IV. Blattaria purpurea.

Blattaria flore purpureo, Gef. hor. Lob. ico. Lug.
Cam. Ger.
Blattaria phœnicea, Tab.
an Verbasculum octavum, Cæs.
Folijs est nigrioribus non laciniatis, parum-
que ferratis: flos modo dilutè rubet, obsoleto
colore purpurascit: quandoq; nigra violæ co-
lore eleganti nitet.

ÆTHIOPIA.

Aethiops Dioscoridi lib. 4. cap. 105. folia Verbasco similia, per quam hirsuta habet, &c. Et Plinio lib. 27.
cap. 4. Aethiops folia habet Phlomo similia, magna, multa & hirsuta, &c. à loco natali forte nomen
habet, quæ Plinio l. 6. ex Aethiopia eximia venit: hæc, inquit lib. 26. cap. 4. clausa omnia tactu aperiri. At
lib. 24. cap. 17. Aethiopa in Meroë nascitur, ob id Meroidum appellarunt folio Lactuca, &c. hic sanè aliam
quàm Dioscorides intelligit.

I. Aethiops folijs sinuosis.

Aethiops, Matth. Ang. Lac. Dod. Gef. hor. Lon.
Cæs. Lugd. Cast. Tab. Ger. Eyst.
Aethiops sive Phlomitidis, Ad. Lob.
An potius Verbasculum lychnitis Dioscoridis:
cùm hujus Aethiopidis vascula, non solum bina

semina necervi magnitudine contineant, nec
radicem viscidam habeat, neque in exsiccata
cornu durities sentiatur, quæ à Dioscoride suæ
tribuuntur.

II. Aethiops folijs in profundas lacinias di-
visis: quæ in Prodomo describitur.

VERBASCVLVM SEV PRIMVLA VERIS.

Primula veris, quod primo Veris floreant, Dioscoridis lib. 4. cap. 104. & Plinij lib. 25. cap. 10. Phlo-
mides censentur. Alijs verò Plinij lib. 25. cap. 4. & lib. 26. cap. 11. Dodecatheon, cui sunt folia septem,
Lactucis similima, à lutea radice exeuntia. Verum apud Plinium lib. 25. cap. 10. alterum genus Alismatis in
sylvis, nigrius, majoribus folijs, videtur.

Verbasculum flore simplici.

I. Verbasculum pratense odoratum.
Herba Paralysis, Brunf. Cast. desc.
Herba Paralysis vulgaris, Trag. altera, Cæs.
Dodecatheon, Ang.
Primula veris, Matth. Lugd. Taber. hortensis,
Thalio.
Primula veris major fl. luteis odoratis, Dod.
Primula pratensis, odora lutea, Ad. Ger.
Primula veris flore luteo, Eyst.
Primula pratensis, Lob.
Primula veris flavo flore elatior, Clus. hist.
Verbasculum odoratum, Fuch. Dod. gal.
Arthritica, Gef. hor. simplex luteo flore, Cam.
Alisma pratorum, Col.

II. Verbasculum pratense vel sylvarum in-
odorum.

Herba Paralysis alba, Brunf. sylv. Trag.
Primula veris altera, Matth. Lugd.
Verbasculum non odoratum, Fuch.
Verbasculum album, Dod. gal.

Primula veris maj. (fl. albidis inodor.) Dod. Ger.
Primula pratensis pallida, Ad.
Primula pratensis inodora luteopallida, Lob.
Primula veris, Paralysis sylv. Thal.
Primula sylv. tertia, Tab.

III. Verbasculum sylv. majus singulari flore.

Verbasculum minus, Dod. gal.
Primula veris minor, Eid. Lugd. Ger.
Primula sylvarum, Ad. Lob. Lugd.
Arthritica species flore singulari, Gef. hor.
Herba Paralysis, Cæs.
Primula veris pallido flore humilis, Clus. hist.
Alisma sylvarum, Col.
Primula sylv. secunda, Tab.
Primula veris sylv. flore pallido, Eyst.
Arthritica caule exiguo vel nullo, Cam.

Flore est pallido, reperitur etiam niveo, quæ
Sylvarum primula alba, Ad.

IV. Primula veris montana incana lutea.

Paralytica rotundifolia montana, Col.

Hh

Verba-

*Verbasculum flore multiplici.*I. *Verbasculum hortense multiplex.*

Arthriticae genus dasypodium, sive densifolium, Gesn. hort.

Arthritica pleno flore, Cam.

Primula hortensis Anglica flore pleno, Ad. Lob. Lugd. Ger.

Primulae veris flos multiplex, Dod. multiflora, Tab.

Primula veris Anglicana flore pleno, Eyst.

II. *Verbasculum sylv. magno plenq; flore.*

Primula veris sylvarum flore pleno specioso, Ad. Lob. ico. Eyst.

Primula veris sylvarum flore multiplici, Lugd.

Primula veris multiflora sylv. Tab. veris flore pleno, Ger.

III. *Verbasculum syl. minus singulari flore.*

Primula sylvarum flore obscure virentibus fibratis, Ad. Lob. Lugd.

Primulae veris minoris altera species, Dod.

Primula sylv. flore viridi, Tab. Ger.

IV. *Verbasculum proliferum.*

Primula veris flore gemino altero alteri innato, Lob. Lugd.

Primula veris prolifera, Tab.

Primula veris flore geminato, Ger. Eyst.

*Verbasculum alpinum.*I. *Verbasculum umbellatum alpinum minus.* Majele, Cord. obl.

Berchenbümlein/ Gesnero, monente, Cam.

Verbasculus alpinus sive caeruleus, Lugd.

Sanicula alpina minor sive media, Lob. Lugd.

Primula veris flore rubro, Clus. pan. & hist. Ger.

Arthritica flore purpureo, Cam.

Primula alpina media, Tab.

Primula veris angustifolia rubra & alba, Eyst.

Flore est subcaeruleo, aut carnei coloris, aut

dilutiori purpurâ nitente, interdum saturatius

rubente: raro candido & exalbido, omnes ta-

men circa umbelicum luteoli sunt.

II. *Verbasculum alpinum umbellatum majus.*

Räyserlin/ Simlero de alpinibus.

Paralitica alpina, Sanicula angustifolia major,

Lub. Lugd.

Primula veris albo flore, Clus. pan. & hist. Ger.

Primula alpina angustifolia, Tab.

Variat floris colore: est albo: rubro: rubore

& candore confuso.

SANICULA ALPINA VEL AURICULA URSI.

Sanicula à sanandis vulneribus: Auricula Urfi à forma foliorum dicitur: αν' α' λ' ο' u' x' sive α' μ' α' c' ο' v' o' u' s' folijs Plantaginis sed angustioribus, & in terram convexis, &c. Dioscoridis l. 3. c. 169. Et Plinij l. 25. c. 10. Alisma sive Damafonium folijs Plantaginis sed angustioribus, magisq; laciniosis, convexisq; in terram, &c.

*Sanicula alpina folijs serratis.*I. *Sanicula alpina lutea.*

Sanicula sive Auricula Urfi, Matth.

Arthriticae genus alpinum, & Sanicula alpina, Gesn. hort.

Lunaria arthritica, Eid. de lun. & fracto.

Auricula urfi, Dod. Cast.

Auricula urfi prima vel luteo flore, Clus. pan. & hist. Ger.

Paralytica alpina, Sanicula sive auricula urfi, Lob. flore luteo, Ad.

Auricula urfi seu lupi, Cæf.

Primula veris pachyphyllos, Lugd.

Auricula urfi floribus luteis, Cam. Tab. Eyst.

Alisma sive Damafonium Dioscoridis, Col.

Variat folijs & floribus: folijs lævibus & vi-

ridibus, interdum incanis vel canescentib. den-

sioribus, tenuioribus: majorib. & minoribus:

floribus pallidis, luteis, aureis, rarissimè candi-

dis vel caeruleis, ijsq; modò majorib. modò mi-

noribus, modò denis, vicanis, tricenis, hinc

Auricula urfi floribus pallidis: & candidis.

Auricula urfi floribus luteis.

Auricula urfi floribus aureis & caeruleis, Tab.

II. *Sanicula alpina purpurea.*

Britannica, Ang.

Arthriticae species flore purpureo, Gesn. hor.

Paralytica alpina, Sanicula flore purpureo, Ad.

Auricula urfi, Castor. icon. flore purpureo, Lo-

bel. icon.

Auricula urfi suaverubens, Ger.

Auricula urfi 2. Clus. pan. & hist.

Primula alpina latifolia, Tab.

Sanicula alpina rubra, Eid.

Flore est purpurascens, rubescens sangui-

nis modo, & atro colore.

III. *Sanicula alpina folijs rotundis.*

Auricula urfi quinta, Clus. hist.

Hæc etiam minoribus folijs reperitur, quæ

Auriculæ urfi quintæ similis, Clus. ap. alt. auct.

IV. *Sanicula alpina flore variegato.*

Auricula urfi tertia, Clus. pan. & hist.

Auri-

Auricula urfi floribus guttatis, Tab.

Floribus est rubris, albis maculis aspersis.

V. Sanicula alpina angustifolia.

Auricula urfi 5. Clus. pan. 7. in hiftor. at 8. in cur. post.

Auricula urfi 8. Tab. flore purpureo, Ger. Eyft.

Flores dilute rubent: huic similis brevioribus tamen folijs, cuius Clus. in cur. post. meminit.

VI. Sanicula alpina folijs quasi farina aspersis. (fis.)

Auricula urfi 7. Clus. cur. post.

Flores exalbidis carneo colore perfusi.

VII. Sanicula alpina minima carnea.

Arctica cæruleis flosculis, Gefn. hort.

Sanicula alpina minima, Lob. Lugd. Tab.

Auricula urfi 6. Clus. pan. 8. Eid. hift. 10. cur. post.

Auricula minima, Ger.

VIII. Sanicula alpina minima nivea.

Auricula urfi minima flore niveo, Clus. pan. & hift. Tab. Ger.

an Auricula urfi flore albo, Eyft.

Folia pallescunt & flos omnino niveus, cum illius viridia folia & flos dilute rubens five carneus.

IX. Sanicula alpina folijs borraginis villosa.

Auricula urfi Myconi, Lugd.

Auricula urfi ex Pyrenæis, Clus. hift. ap. alt. aut.

Auricula urfi 9. Eid. cur. post.

Sanicula folijs non serratis.

I. Sanicula alpina rubescens, folio non serrato.

Auricula urfi 4. Clus. pan. & hift. 7. Tab. (to.)

Auricula urfi rubescens, Ger.

II. Sanicula alpina alba folijs non crenatis.

Auricula urfi 6. Clus. hift.

Similis flore pallido, quæ

Auricula urfi pallido flore, Clus. cur. post.

III. Sanicula alpina minima pilosa: quæ pro 2. in Prodomo descripta.

Sanicula rotundifolia.

I. Sanicula montana latifolia laciniata.

Cortusa, Matth. Cast. Lugd. Cam.

Caryophyllata Veronensis fl. Saniculæ urfi- næ, Ad. Lob.

Sanicula montana, Clus. hift. altera, Eid. pan.

Sanicula alpina, Tab. Ger.

Duplex figura apud Clusium, Tab. & Ger.

1. Sanicula montana, Clus. hift.

Sanicula alpina Clusij, Tab. Ger.

2. Cortusa Matthioli, Clus. hift. & cur. post.

Saniculæ alpina icon verior, Tab.

Cortusæ rarior icon, Ger.

In figura Saniculæ Clusij male averfa parte puncta aspersa sunt.

Flore est eleganter rubro, & ad purpureum tendente: habetur & violaceis, rariùs albis floribus.

II. Sanicula montana rotundifolia major.

Sanicula alpina alia, Gefn. hort.

Garyophyllata, five Geum alpinum recentiorum folio hederaceo, Ad. Lob. ico. Lugd.

Sanicula montana 1. Clus. pan. altera, Eid. hift.

Eyftett.

Sanicula alpina, Cam. ep. guttata, Eid. hort.

Cortyledon 3 Dalechampi, Lugd.

III. Sanicula montana rotundifolia minor.

Sanicula montana minor, Clus. pan.

Saniculæ montanæ alterius species 2. Eid. hift.

IV. Sanicula montana longifolia ferrata.

V. Sanicula montana flore calcari donato.

Pinguicula (vel Liparis) Gefn. Cl. pan. & hift.

Cucullata, quibusdam Criâs Apuleij, Lugd.

Pinguicula vel *livergov*, Viola humida aut palustris: Dodecatheon Plinij, Gesnero, Cam.

Variat floris colore, qui albus, purpureus & cæruleus.

DIGITALIS.

Digitalis, quod flores digitale referant, nomen habet. Sunt qui ad Verbascum, alij ad Alismatis genus alterum Plinij referant. At Doctis. Fabius Columna, Ephemerum Dioscoridis lib. 4. cap. 85. censet.

Digitalis folio Verbasci.

I. Digitalis purpurea folio aspero.

Campanula syv. Trag.

Digitalis rubra, Dod. gal. purpurea, Fuch. Ang.

Gefn. hort. & ap. Lon. Dod. Ad. Lob. Lugd. Cam.

Tab. Ger.

Aralda Bononiensibus, Gefn. hort.

Verbascum digitale, Costæo.

Virga regia major flore purpureo, Cæf.

Ephemeris alia species major, Col.

Flos purpureus, nigris punctulis insignitus,

tuber, incarnatus, five ex purpureo candidus,

intus punctatus: aliquando flores in rotundam spicam in gyrum coli effigie in summo dispositi rufescunt ex luteo, intus guttis purpureis asperis, hinc

Hh 2

Digita-

Digitalis flore rubro, & flore incarnato, Eyst.

II. Digitalis alba folio aspero.

Digitalis 2. Dod. alba, Lob. Lugd. Eyst.

Virga regia major flore pallido, Cæf.

Ephemeris altera species major candida, Col.

Flos nivei candoris, intus nigris punctis intercurfantibus.

Digitalis folio virescente.

I. Digitalis lutea magno flore.

Campanula sylv. flore luteo, Trag.

Digitalis lutea, Fuch. Anguil. Lon. Thal. Lugd.

Cam. Tab. Ger. flore luteo, Eyst.

Digitalis minor, Gef. hor. flore minore, Eid. col.

Digitalis lutea flore amplo, Ponæ.

Digitalis 3. Dod.

Calathiana viola Plinij, Dalech. in Plin.

EPHEMERON.

Cum doctissimus Fabius Columna, *Digitalis* censet esse *Ephemeron* Dioscoridis, pauca aspergamus. *Ephemeron* sive *Leis* & *Agryx* caulem & folia lilij habet sed hac tenuiora: flores candidos, amaros, semen molle, radicem unam digitali crassitudine, longam astringentem, odoratam, &c. Diosc. l. 4. c. 85. *Ephemeron* folia habet lilij, sed minora, caulem parem, florem caruleum, semen supervacuum, radicem unam digitali crassitudine, Plinio l. 25. c. 13. Subjiciamus & Matthioli & Lobelij *Ephemeron* utrumque nobis incognitum.

I. *Ephemeron* quod aliqui *sylvestrem* Irin *Ephemerum* spurium, Lob. Dod.

appellant, Marth. Lacunæ. Cast. desc.

Ephemerum non lethale Matthioli, Lpg. Tab.

Ephemerum Matthioli, ex spurij appositis plantis esse videtur, Colum.

II. *Ephemerum* Matthioli, vel potius

Ephemeron Dioscoridis, Col.

Flore est luteo pallido, rarissime albo: & intus vario.

II. *Digitalis* major lutea vel pallida, parvo *Digitalis* major, Gef. hor. 4. Dod. (flore.

Digitalis flore minore albidior, Gefn. col.

Digitalis lutea, Ad. parva, Lob. ico. sub ramo minore exprimitur.

Virga regia: Alisma & Damafonium Dioscoridis, & Fistula pastoris Avicennæ, Cæf.

III. *Digitalis* minor luteo parvo flore: in Prodrōmo descripta.

IV. *Digitalis* angustifolia lutea.

Digitalis lutea parva, Lob. ico.

V. *Digitalis* angustifolia flore ferrugineo.

Digitalis gilvo flore, alias ferrugineo, Lob.

CASPARI BAVHINI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER SEPTIMVS.

SECTIO PRIMA.

LYSIMACHIA; VERONICA; TEUCRIUM; SCORDIUM;
CHAMÆDRYS; CHAMÆPYTIS; ALSINE; SPERGULA;
ANAGALLIS; ELATINE.

LYSIMACHIA.

Λυσιμαχίον & *λίσσον* Dioscoridi l. 4. c. 3. caules emittit cubitales fruticosos: folia salignis similia, flor. flavus aureusve, &c. Sic dicta à Rege *Lyfimacho* Agat boctli filio, ejus inventore: folia habet *Salicis* viridia, florem purpureum (aureum habet vetus) fruticosa, &c. Plinius l. 25. c. 7. addit tantam ei vim esse, ut jumentis discordantibus jugo imposita, asperitatem colibeat. Unde videtur innuere, *αγορά* τὸ ἰσχυρὸν ἔχειν dictam esse. *Salicaria* etiam, à foliorum cum *salicis* folijs similitudine vocatur. Hujus species est *siliquosa*, quæ à siliquato setu præcoci, qui auctu & incremento florum eruptioni antevertit, quasi proles parente prior, Filius ante patrem vocitatur.

Lyfima-

Lyfimachia lutea.

I. *Lyfimachia lutea* major: quæ Dioscoridis. Centaurium majus quibusdam, Hermol. Mar-
nard. Ruel.
Lyfimachia lutea, Trag. Fuch. Tur. Ang. Adv.
Lob. Cæf. Tab. Cam. Ger. Eyst. lutea communis,
Cluf. hist.
Lyfimachia, Matth. Lac. Lugd. n. Lon.
Lyfimachia vera, Cord. in Diosc. falsa, Cæf.
Lyfimachium verum, Dod. gal. legitimum, Eid.
Lyfimachium luteum, Gesn. hort. Thal.
Salicaria, Gesn. hort.

Folij nunc ternis, nunc quaternis, nunc bi-
nis reperitur.

II. *Lyfimachia lutea minor*, folijs nigris
punctis notatis.

Lyfimachia lutea in alis foliorum florens, Cæf.

Lyfimachia lutea altera, Cluf. pan. & hist.

Lyfimachia flore luteo majore, Cam.

Lyfimachia lutea Pannonica major, Eyst.

Folij est quaternis, etiam ternis.

III. *Lyfimachia trifolia lutea* spicata.

Lyfimachia lutea altera, Cluf. Col.

IV. *Lyfimachia bifolia* flore globofo luteo.

Lyfimachia lutea altera, Lob. Cluf. hist.

Lyfimachium aquatile, Dod. belg.

Addit Clufius *Lyfimachiam luteam* 3, sive
minorem, quæ à priori solùm radice & caule,
quæ melius exprimentur, differt.

V. *Lyfimachia lutea corniculata*.

Lyfimachia Virginæ nomine ipsum semen
Paravio missum quod anno 1619, in horto ele-
ganter crevit & ex semine deciduo se faciliè ha-
bitus propagavit.

Lyfimachia filiquosa.

I. *Lyfimachia filiquosa* hirsuta magno flore.

Lyfimachia seu *Salicaria altera*, Trag.

Lyfimachia purpurea, Fuch. (Tur.

Lyfimachia purpurea primum genus, Eid. ico.

Lyfimachium purpureum 1. Dod. gal. Lugd.

Antoniana major hirsuta, Gesn. hort.

Epilobij 4. species, Gesn. ad Cord.

Lyfimachia filiquosa, Ger. 1. Tab.

Lyfimachia 2. & 3. fl. purpureo vel rubro. Lon.

Lyfimachij majoris purpurei 1. species, Thal.

Onagra campestris hirsuta, Cæf.

Flore est majore violaceo, purpureo.

II. *Lyfimachia filiquosa* hirsuta parvo flore.

Lyfimachia filiquosa 2. Tab.

Major est & minor, utraq; in Prod. descripta.

III. *Lyfimachia filiquosa glabra* major.

S. Antonij herba 3. Gef. ad Cord. cui & filius an-
te patrem.

(hist.
Lyfimachia filiquosa, Ad. Lob. Cast. major, Cl.

Pseudolyfimachium purpureum 1. Dod.

Onagra genus alterum, Cæf.

Lyfimachia filiquosa flore albo, Tab.

Lyfimachia campestris, Ger.

Lyfimachij majoris purpurei 2. species, Thal.

Flore est parvo pallide rubente, rarius albo;
quibusdam Delphinium Dioscoridis censetur.

IV. *Lyfimachia filiquosa glabra* minor.

Filius ante patrem minor, Gesn. col.

Lyfimachia filiquosa varietas, Ad.

Lyfimachia medium genus, Thal.

Lyfimachia minor, & 3. Tab.

Flosculi rubicundiores: alij ex rubicundo
pallidiores: alij prorsus candidi.

V. *Lyfimachia filiquosa glabra angustifolia*.

Lyfimachia media altera species, Thal.

Lyfimachia filiquosa minor, & 7. Tab.

Chamænerion, Ger. ico.

VI. *Lyfimachia Chamænerion dicta latifolia*.

Antoniana, sive S. Antonij herba maxima, Gef.
hort. ap.

Chamænerion & *Epilobion*, Gesn. ad Cord.

Eyst. Thal. cui &

Lyfimachia omnium maxima.

Filius ante patrem maximus, Gesn. col.

Onagra, Lugd. Cæf.

Lyfimachia vulgo altera, Cam.

Sub *Chamædaphne* male in Matth. meo Ty-
pographi errore posita, cum ad *Onagra* caput
p. 816. reponi debuisset, ut ex synonymijs, quili-
bet tantillū in plantis versatus colligere potest.

Onagra Dioscoridis 1. 4. c. 118. & *Oenothera* Pli-
nij l. 6. c. 11. & 14. censetur: flore est cæruleo, ra-
rius albo, ut & subsequens.

(stifolia.

VII. *Lyfimachia Chamænerion dicta angu-*

Epilobium (id est *for. En. 1662* viola super filiquā)
sextum, Gesn. ad Cord.

Pseudolyfimachium purpureum minus, Dod.

Lyfimachia filiquosa varietas altera, Ad.

Chamænerion Gesneri, seu *Delphinium buc-*

cinum, Diosc. Lob.

Lyfimachia filiquosa alia, Lugd. 3. Cluf. hist.

Lyfimachia species in uliginosis, Thal.

Linaria rubra, Lugd.

VIII. *Lyfimachia Chamænerion dicta al-*

pina: quæ in Prodromo describitur.

Lyfimachia spicata.

I. *Lyfimachia spicata* purpurea, fortè Plinij.
Solidaginis Sarracenica alia species, Trag.
Lyfimachia altera, Matth. Lac. Lugd. Cast. Eyst.
Lyfimachium purpureum, Gesn. hort. Thal.
Lyfimachium purpureum alterum, Dod. gal.
Lyfimachia 3. Tur.
Lyfimachia fortè Pliniana, Ad.
Lyfimachia purpurea, Lob. Cæs. Cam. Tab.
Lyfimachia flore purpurascens, Ang.
Pseudolyfimachium purpureum alterum, Dod.
Lyfimachia purpurea communis major, Clus. hiftor.

Lyfimachia purpurea spicata, Ger.

Folia bina communiter, aliquando ternaria quaternaria, simul caulem ambiunt.

II. *Lyfimachia spicata cærulea*.

Lyfimachium cæruleum, Dod. gal.

Lyfimachia 3. genus, Dod. Gesn. hort.

Pseudolyfimachium cæruleum, Dod.

Lyfimachia cærulea hortensis, Ad. Lob. Lugd.

Lyfimachia cærulea flore, Clus. hift.

Veronica recta cærulea, Eyst.

Lyfimachia non spicata.

I. *Lyfimachia rubra non siliquosa*.

Lyfimachia 2. vel minor rubro flore, Clus. pan.

Lyfimachia purpurea 2. five minor, Eid. hift.

II. *Lyfimachia linifolia purpureocærulea*.

Lyfimachia rubra minima, Clus. hift.

III. *Lyfimachia cærulea galericulata*, vel *Gratiola cærulea*.

Lyfimachia galericulata, Lob. Lugd. Clus. hift.

Lyfimachia flore cæruleo galericulato, Cam.

Sideritis cærulea, Thal.

Gratia Dei, Cæs.

Tertianaria, Tab.

Herba Judaica altera, Dod. belg.

Hæc in Anglia flore albo quoque reperitur.

EXOTICA.

I. *Poutiou ex Malacca ad febres abigendas* par. 4. Ind. Orient. 8.

II. *Sary flos seu pollen*, quo corpus inungentes contra ventorum vim se tutos afferunt, l.c.

III. *Sodouvaya in Java oblinendo corpori idonea*, l.c.

IV. *Surahan*, vili pretio venditur, l.c.

VERONICA.

Veronica, apud recentiores herba est celebratissima, Græcis & Latinis scriptoribus fortè incognita, quàmvis Dodonæus velit esse *Betonica* Pauli lib. 7. *Casalpinus* verò ad *Myosotidem* *Dioscoridis* lib. 2. cap. 214. ac *Columna* ad *Alysson* *Dioscoridis* lib. 3. cap. 105. referendam censet. Germanis *Ehrenpreis* & *Grundheil*, ob mirificam facultatem ulcera ac vulnera sanandi.

I. *Veronica mas erecta*.

Veronica mas, Matth. Ang. Lugd. Cast.

Veronica assurgens, Dod.

Veronica recta mas, Lob. vulgaris recta, Clus. hift.

Duplex est: major & minor: illa latiore folio & longiore spica: hæc angustiore folio & brevior spica.

II. *Veronica mas supina & vulgarissima*.

Teucrium, Trag.

Veronica mas, Fuch. Lon. Lugd. Thal.

Veronica mas serpens, Dod.

Betonica Pauli, Dod. gal.

Veronica vulgo dicta, Gesn. hort.

Veronica vera & major, Ad.

Veronica major septentrionalium, Lob.

Veronica, Tab. vera & major, Lob. ico. Cam. Ger.

Veronica vulgaris supina, Clus. hift.

Veronica humiculis & supina, Col.

Auricula muris 3. Cæs.

Floribus est subcæruleis, rarius candidis, reperitur nonnunquam folijs vulgaræ formæ quidem similibus, sed triplo minoribus.

III. *Veronica spicata latifolia*.

Veronica prima, vel major latifolia, Clus. pan.

Veronica erectior latifolia, Eid. hift.

Alia est folijs atrovirentibus & splendentibus: in altera nec splendent, nec adeo atra sunt: spica etiam in alia oblongior.

IV. *Veronica spicata angustifolia*.

Veronica recta herbariorum, Lob. Lugd.

Veronica recta vulgaris major, Clus. hift.

Auricula muris 4. Cæs.

Veronica recta 1. & 2. Tab. assurgens, Ger.

Veronica spicata cærulea, Cam.

Variat folijs latioribus & paulò angustioribus: spica flosculorum cæruleorum, & spica dilutior.

Addit

Addit Clusius in hist. alterius figuram, quam à priore non distinguo, nomine

Veronica secundæ erectioris angustifoliæ.

V. Veronica spicata minor.

Veronica recta minima, Lobel. Lugdun. Ger.

Clus. hist.

Veronica recta minor, Clus. pan. Tab.

Flore est cæruleo, rarius albo.

VI. Veronica pratensis sepillifolia.

Eufragia, & Eufragia nobilis, Brunf.

Teucrium alterum, Trag.

Veronica fœmina, Dod. gal. Lugd. Thal.

Beronica Pauli, Turn. Gesn. hort. quorundam,

Cam.

Veronica pratensis, Dod.

Veronica minor serpillifolia, Ad. Lob.

Auricula muris prima in pratis, Cæf.

Folij est communiter integris, rarissime crenatis: floribus cæruleis, frequentius pallidis & dilutis: hinc

Veronica minor, Tab. Ger.

Veronica minor fœmina flore candido, Tabernamont. sub

Veronica mare, apud Ger.

VII. Veronica alpina frutescens.

Veronica tertia fruticans, Clus. pan. & hist.

Veronica alpina serpillifolia, Ponæ.

VIII. Veronica alpina bellidis folio hirsuta, in Prodr. descripta: quæ duplex est major & minor.

TEUCRIUM.

T *Ευκρίον* Dioscoridi l. 3. c. 111. (eò quod *Teucer* ejus inventor existimetur, Plinio l. 25. c. 5. auctore) & *Χαμαίριον* ex aliorum sententia. Plinio l. c. & l. 26. c. 8. *Teucrium*.

I. *Teucrium*.

Teucrium secundum, Matth. Lugd. r. Tab.

Teucrium, Fuch. Ang. Dod. gal. Cord. in Diosc.

Lac. Lon. Ad. Lob. Cæf. Cast. verum, Gesner.

hort. Eyst.

Chamaëdris altera seu assurgens, Dod.

Teucrium vulgare fruticans, sive i. Clus. hist.

Teucrium latifolium, Ger.

II. *Teucrium* folijs *Scorodoniae*.

Teucrium verum, Cam.

III. *Teucrium* *Creticum* incanum.

Teucrium *Creticum*, Clus. hist.

IV. *Teucrium* peregrinum folio sinuoso.

an *Pæderota*, Pausaniæ?

Teucrium Boeticum, Clus. hisp. Lugd. Tab. Ger.

Teucrium fruticans Boeticum, Clus. hist.

Camærarus, *Teucrij* Boetici, quod à Clusij diversum sit & *Teucrij* Belgici, solum nomine meminit: sed quid utrumq;

V. *Teucrium* alpinum inodorum magno flore: in Prodr. descriptum.

VI. *Teucrium* alpinum coma purpureo cærulea.

Clinopodium alpinum, Ponæ.

VII. *Teucrio* affinis, *Chamaerops*.

Chamaerops, Plinio l. 26. c. 7. Lugd.

SCORDIUM.

Σ *Κόρδιον* Dioscoridi l. 3. c. 125. quod *Allium* aliquantum redoleat: at Galenus 8. simpl. propter acrimoniam *Scorodo*, id est, *Allio* ad similem, nomen sortitum putat: quibusdam, *Cratæa* auctore, uideatur, ab inventore dicitur: Plinio l. 25. c. 6. *Scorodori* sive *Scordion*.

Genera: *Græci* unius meminere: at Plinius l. c. duplex habet: alterum folijs lanuginosis, quæna similitudine. Est & alterius generis latioribus folijs mentastro similibus, &c.

I. *Scordium*.

Scordium, Frag. Matth. Dodon. Lac. Tur. Lon.

Ad. (cui & *Trixago palustris*) Lob. Cast. Lugd.

Cam. Eyst.

Scordium verum, Ges. hort.

Scordium commune, Ang.

Scordium, Tab. minus, Ger.

Magnitudine variat: hinc figuræ tres apud

Tabernamontanum.

Scordij majoris & medij nomine.

Scordium majus & minus, Ger.

II. *Scordium* lanuginosum.

Scordium *Creticum* lanuginosum, Cam.

III. *Scordium* alterum, sive *Salvia sylvestris*.

Salvia sylv. Trag. (& *Nepeta altera*) Lon. Tab.

Sphacelus sylv. Dod. gal.

Scorodonia, Cord. in hist. Thal. Ger.

Salvia

Salvia montana & Ambrosia quibusdam, Gesner. hort.

Scordium majus Plinij, Eid.

Scordium alterum Plinij, Ad. Lob. Cam.

Salvia agrestis sive Sphacelus, Dod. Lugd.

Melinum alterum brevius, Cæs.

Scordium 2. folijs amplis instar Melissæ, vel

Calaminthæ primæ, in Samnitibus ad ripas Pi-

scaræ nasci, Anguillara scribit: idemq; in Græ-

cia reperiri, quod odore & qualitate à primo dissimile non sit.

IV. Scordium alterum lanuginosius verticillatum.

Scordotis Plinij, Hon. Belli, epistola quinta ad Cluf.

Scordotis legitimum Plinij, Ponæ.

V. Scordio affinis, Elephas ob florem.

Elephas Campoclarensum, Col.

CHAMÆDRYS.

X *Amædrys* Dioscoridi l. 3. c. 112. quasi humilis quercus, quod folia Quercus habeat, & hujus respectu quasi humi repat: cui & *χάμαιοδρυς*: & quibusdam *χάμαιοδρυς*, propter similitudinem cum Teucurio. *Triffaginem* Gaza vertit apud Theoph. 9. hist. 10. Sic Plinio l. 24. cap. 15. *Chamædrys* quæ latine *Triffago*, quam aliqui *Chamædromem* alij *Teucrion* appellavere. Sic alij *Serrata*, à folijs serratis, à qua *serram* inventam dixeret, & *Quercula minor*.

Unius solum apud Dioscoridem & veteres mentio fit.

I. *Chamædrys arborea* Ægyptiaca.

Chamædrys arborea in Insula Cocyræ, Alp.

Ad cubitos duos exurgit, folijs duplo aut triplo, quàm in Italica majoribus.

II. *Chamædrys major repens*.

Triffago, seu *Chamædrys*, Matth. Lugd.

Triffago, Lac. *Trixago*, Cast.

Chamædrys, Ang. Ad. Lob. Cæs. major primus, Cluf. pan.

Chamædrys major repens, Dod.

Chamædrys mas, Cam.

Chamædrys major 1. & 2. Tab.

Chamædrys major, & *Chamædr. latifolia*, Ger.

Folio majore & minore variat: floribus item albis ac rubellis in eadem planta.

III. *Chamædrys minor repens*.

Chamæpitys, Brunf.

Chamædrys, Dod. gal. Cord. hist. Gesn. hor. Tabern. Eyf.

Chamædrys vera, Trag. Tur. Cord. in Diosc.

Chamædrys vera mas, Fuch.

Chamædrys vulgaris mas, Lon.

Chamædrys major, Lob. ico. Lugd. minor, Ger.

Chamædrys repens minor, Dod.

Chamædrys major, vel 2. Cluf. pan.

Chamædrys vulgaris, vel 2. Eid. hist.

Flore est purpurascens, rarius niveo.

IV. *Chamædrys spinosa*: in Phycop. Matthiolo & Prodomo descripta.

V. *Chamædrys alpina* Cisti flore.

Cervaria, Gesn. hort.

Herba cervi quibusdam, Eid. fracto,

Chamædrys montana frutescens durior, Ad. Lobel.

Chamædrys 3. sive montana, Cluf. pan. & hist.

Chamædrys montana, Lugd. Tab.

Chamædrys alpina Simleri, Cam.

Argentina Mompelliaca, Tab.

Teucrium alpinum Cisti flore, Ger.

VI. *Chamædrys alpina saxatilis*.

Teucrium 3. Cluf. pan. 6. pumilum, Eid. hist.

Veronica petrea sempervirens, Ponæ.

VII. *Chamædrys alpina minima hirsuta*, quarto loco in Prodomo descripta.

an *Teucrium minimum*, Cluf. hist.

VIII. *Chamædrys unicaulis spicata*.

Trixago Apula unicaulis, Col. cui forte

Verbena recta Dioscoridis.

IX. *Chamædrys Austriaca* folijs tenuissimè laciniatis: quæ 2. in Prodomo.

X. *Chamædrys Hispanica* folijs tenuissimè divis: 3. in Prodomo.

XI. *Chamædrys spuria major latifolia*.

Veronica maxima, Lugd.

an *Chamædrys mas altera*, Cam.

XII. *Chamædrys spuria major altera*, sive frutescens.

Teucrium 1. vel *Teucrium majus pannonicum*

latifolium, Cluf. pan. at in hist.

Teucrium quartum.

Hujus duæ species: altera virgis erectis caulibus quadrangulis, nonnunquam rotundis,

magis minusq; hirsutis lignescens, & ex una ala communiter cauliculis 4. prodeuntib. folijs latiori-

coloribus: altera virgis humi diffusis, frequentibus, ut interdum magnos cespites late tegant, folijs minoribus & flore dilutioribus: & hæc est Teucrij quarti species secunda, Clus. hist.

XIII. Chamædrys spuria hederacea repens, sive Scutellata repens.

Chamædrys hederacea, in Cat. Altorff.

XIV. Chamædrys spuria major angustifolia.

Chamædrys altera, Trag.

Teucrium primum, Matth. Lugd. 2. Tab.

Chamædrys vulgaris mas, Fuch. Tur. Lugd.

Hierobotane femina, Dod. gal. Lugd.

Pseudochamædrys, Gesl. hort.

Chamædrys (sylv. Dod.

Veronica lupina facie Teucrij pratensis, Lob. ic.

Auricula muris quinta, Cæf.

Teucrij quarti species tertia, Clus. hist.

XV. Chamædrys spuria minor rotundifolia.

Chamædrys, Brunf. falsa, aliquibus Teucrium,

Gesh. hort.

Chamædrys vulgaris femina, Fuch. Tur. Lon.

Lugdun.

Hierobotane mas, vel Verbenaca lupina mas,

Dodon. gal. Lugd.

Teucrij species quam Chamædryn vocant,

Cord. in Diosc.

Teucrium pratense, Ad. Lob. & Teucrium spurium Chamædryoides, Lob. ico.

Pseudochamædrys, Thal.

Auricula muris sexta, Cæf.

Teucrium tertium minus, Tab.

Chamædrys sylv. Ger. Clus. hist.

Alia caulibus altioribus, folijs rotundioribus, amplioribus, flore cæruleo: alia folio rotundiore, sed minore, hispidiore, dentato.

XVI. Chamædrys spuria minor latifolia.

Teucrium secundum, vel Teucrium pannonicum minus, Clus. pan. at. s. Eid. hist.

Teucrium pannonicum, Tab. Ger.

Flos aut cærulei saturati coloris aut dilutioris & quasi cinerei: sic ex carneo candicans.

XVII. Chamædrys spuria latifolia minima.

Veronica tetragona mont. recta minima, Col.

XVIII. Chamædrys spuria minor angustifolia: pro quinta in Prodrom. descripta: quam

Teucrij quarti speciem 3. Clus. hist. secundum descriptionem diceremus, nisi figura ejus aliam ostenderet.

XIX. Chamædry spuria affinis rotundifolia scutellata.

Alyssum Dioscoridis montanum, Col.

CHAMÆPITYS.

X *Αμνιρίς* Dioscoridi lib. 3. c. 175. & 176. quasi humilis picea, quod folia Piceam oleant. Plinio l. 24. c. 6. Chamæpitys, Latinis *Ajuga* appellatur, diciturque, propter abortus, ab alijs Thus terra.

Genera tria Dioscor. 1. herba est quæ humi serpit incurva similis, folijs sempervivi minoris: at multo tenuioribus pinguioribusque, & hirsutis: floribus luteis, vel candidis: 2. cubitalibus ramis in anchora speciem incurvatis flore candido: 3. mas est, herbula levius, foliolis tenuibus, albis, pilosis: caule scabro, candido: pusillis floribus luteis, &c. Plin. l. c. cubitalibus ramis flore pinus & odore: altera brevior & incurva similis: tertia eodem odore, & idem nomine quoque, parvulo cauliculo, crassitudine digitali folijs scabris, exilib. albis, in petris nascent.

I. Chamæpitys incana exiguæ folio.

Chamæpitys prima, Fuch. Ang. Lon. (qui flores

purpureos tribuit.)

Chamæpitys tertia, Dod. Matth. Ital. Lac.

Ajuga 1. Tur. sive Chamæpitys altera, Matth.

Chamæpitys 1. Dioscoridis odoratior, Ad. Lob.

Chamæpitys tertia, sive altera, Matth. Lugd.

Folius est incanis, hirsutis flosculis luteis distincta ab Echio scorpioides, Chamæpityde vermiculata, & Anthylloide, Thalij.

II. Chamæpitys moschata, folijs serratis:

an prima Dioscoridis?

Chamæpitys species Monspelij, Gesl. hor.

Iva moschata Monspelensium, Ad. Tab. Ger.

Anthyllis altera, Clus. hisp. & hist. Cast. Lugd.

Anthyllis Chamæpitides minor, Lob.

Chamæpitys spuria prior, sive Anthyllis altera, Dodon.

Chamæpitys altera & major, Cæf.

III. Chamæpitys lutea vulgaris, sive folio trifido.

Chamæpitys tertia, Trag. Fuch. Ang.

Chamæpitys secunda, Tur. Lon.

Chamæpitys 1. Matth. Dod. Lac. Cord. hist. Lugd.

Chamæpitys, Gesl. hor. Cæf. vera, Cord. in Diosc.

Chamæpitys major, Tab. mas, Ger. Eyft.

Ajuga sive Chamæpitys mas Dioscoridis, Ad.

Lobel.

Ajuga, Cast. tertia, Tur.

Ajuga luteo flore, Clus. pan. & hist.

Peristerona Cratæ, Ang.

Flore est luteo: at Clusius in hist. meminit

Ajugæ multifidis folijs flore rubescente, quod

Fuchfio & Dod. tertium sit.

IV. Chamæpitys cærulea Auftriaca.

Chamæpitys Auftriaca, Clusius pan. & histor.

Eystett.

Chamæpitys cærulea, Cam.

Flore est communiter cæruleo: rarius purpureo.

V. Chamæpitys spuria multifido folio, Lamij flore.

Ajuga adulterina, Clus. hisp. Lugd.

Chamæpitys spuria altera, Dod. qui duplicem figuram habet, quem Lugd. historia imitatur.

Chamæpitys adulterina, Lob.

Chamæpitys alia, Cam. ep.

Pseudochamæpitys, Clus. hist.

A L S I N E

A *Activa Dioscoridi l. 4. c. 37. quod lucos, quos ἄλσιν nominant & umbrosa loca amat: & Mvdr Sr, id est, muris auricula, quod muscutorum auribus folia similia habet. Sic Plinio l. 27. c. 4. Alfine quam quidam Myosoten appellant, nascitur in lucis, unde & Alfine dicta. Unius uterq, meminit.*

I. Alfine hederulæ folio.

Alfine quartum genus, Fuch. ico.

Elatine, Dod. gal. Lac. Thal. prior, Lugd.

Lappago Plinij, Ang.

Alfine mas, Gef. hor. species in vinetis, Eid. col.

Alfine spuria prior, Dod.

Morsus gallinæ folio hederulæ, Ad. Lob.

Centunculus hirsutior, Cæf.

Alfine hirsuta, Cam.

Alfine hederacea, Tab. Ger.

Varia foliorum magnitudine: flore purpurascente, aut dilute purpurascente: rarius lacteo.

II. Alfine Veronicæ folijs flosculis cauliculis adherentibus.

Elatine polyschides, Lugd.

Alfine folio Veronicæ, Tab. Ger.

Alysson, Col. in phytobas.

III. Alfine Chamædrifolia flosculis pediculis oblongis insidentibus.

Morsus gallinæ tertiæ, Trag.

Alfine media, Fuch. Lugd. Cam.

Alfine, Tur. alterum genus, Fuch. ico.

Elatine altera, Dod. gal. Lugd.

Alfine altera folijs serratis, Gef. col.

Alfine folijs Triflaginis, Lob. ico, Tab. Ger.

Alfine spuria altera, Dod.

Antirrhinon Dioscoridis, Cæf.

IV. Alfine triphyllis cærulea.

Hendelstraut, cæruleis flosculis, Trag.

Alfine parva recta, Lob. ico. Cam.

Elatine triphyllis, Lugd.

Dactylioboranon cæruleo flore, Thal.

Alfine recta, Tab. Ger.

Altera majoribus & crassioribus folijs: altera minoribus.

V. Alfine Symphyti petraei capitulis.

Alfine alia, Clus. hisp. Boëtica, Eid. hist.

VI. Alfine scandens baccifera.

Cyclaminus altera Dioscoridis, Chini.

Recentiorum planta, Alfine majoris facie baccis Solani, an Cucubalus Plinij, Ad.

Alfine repens, Clus. hisp. & hist. ap. alt. Lob. Dodon. Cast. Cam.

Alfine major, Clus. hist. maxima, Thal.

Cucubalus Plinij, Lugd.

VII. Alfine baccifera similis suis acinis.

Herbæ adversus hæmorrhoides admirabilis acini, Clus. hist. app. alt. ad lib. 6.

VIII. Alfine altissima nemorum.

Morsus gallinæ majus, Brunf.

Morsus gallinæ 2. genus, Trag.

Alfine major, Dod. Cam. Tab. Ger.

Alfine major, & Alfine genuina Diosc. Lugd.

Alfine maxima, Lob. ico. media, Thal.

Centunculus viticulis cubitalibus, Cæf.

IX. Alfine angustifolia.

Alfine maxima, Lugd.

X. Alfine major.

Alfine marina, Dod. Tab. Ger.

Alfine sive Hippia major, Lob. ico.

Centunculus, Cæf.

XI. Alfine media.

Morsus gallinæ primum genus, Trag.

Alfine, Math. Ang. Lac. Lon. Lob. Lugd. Cast.

Alfine major, Fuch. 1. genus, Eid. ico.

Alfine media, Dod. gal. Tab. cui & Alfine, Ger.

Hippia minor, Cord. hist.

Alfine minor, Dod. Ad. Lob. ico. Thal.

Alfine morsus gallinæ femina, Gef. hor.

XII. Alfine minor multicaulis.

Morsus

Morsus gallinæ minor, Brunf.
Morsus gallinæ species 4. Trag.
Alfine, Turn. minor, Fuch. Dod. gal. Lon. Thal.
Lugd. Tab.

Alfines 3. genus, Fuch. ico.
Alfine minima, Dod. Ad. Lob. Cam. Ger.
Centunculus minutissimis cauliculis, Cæf.

XIII. Alfine minor lini capitulis.
Alfine minima suffruticis instar, Thal.

Alfine petraea minima, Tab. petraea, Ger.

Variat : alia suffrutici similis, rigidis cauliculis : alia cauliculis tenerioribus : tertia medio modo se habet cauliculis non adeo implexis : & hujus, ut & prioris, plures differentiae notantur, foliorum longitudine, tenuitate, hirsutiae differentes.

XIV. Alfine minor folijs rotundis.

Alfines minoris alia species, Thal.

Variat : alteri enim folia sunt latiora, rotundiora : alteri subrotundiuscula & mucronata : alterius, medio modo se habent.

XV. Alfine verna Androsaces capitulis : sub 6. in Prodomo descripta.

XVI. Alfine affinis Androsace dicta major. Androsace altera, Matth. Lugdun. Clus. pan. & hist. Cam. Tab.

Androsace annua spuria, Ger.

Morsus gallinæ, vel Alfines species non ex Syria, sed ex quadam antiqua macerie, Ad.

XVII. Alfine affinis Androsace dicta minor : sub 5. in Prodomo descripta.

XVIII. Alfine nodosa gallica.

Alfine nodosa, Lugd.

Alfine Spergula dicta.

I. Alfine Spergula dicta major.

Spergula, Dod. Lugd.

Sagina Spergula, Ad. Lob.

Alfine tenuifolia altera, vel terrestris altera *repens*, Col.

II. Alfine Spergulae facie media.

Spergula marina, Lugd.

Anthyloides, Thal.

III. Alfine Spergulae facie minor : sive Spergula minor flosculo subcaeruleo : quæ sub

Alfine 9. in Prodomo describitur.

an Asterias sive Stellaria, Lugd.

Alfine palustris.

I. Alfine aquatica major.

Alfine palustris, Tab. Ger.

II. Alfine aquatica media.

Alfine fontana, Tab. Ger.

III. Alfine aquatica minor & fluitans.

Alfine fluviatilis, Tab. Ger.

IV. Alfine palustris minor, folio oblongo : quæ 2. in Prodomo, &

Portulacæ aquaticæ nomine missa.

V. Alfine palustris minor serpillifolia : quæ 1. in Prodomo.

VI. Alfine littoralis folijs Portulacæ.

Alfines genus pelagicum, Clus. hist.

VII. Alfine maritima flore rubente.

Alfine maritima Neapolitana, Col.

VIII. Alfine minor Androsaces alterius Matthioli facie : quæ 5. in Prodomo.

IV. Alfine nodosa Germanica : quæ 8. in Prodomo.

X. Alfine tenuifolia muscosa.

Alfine muscosa, Lugd.

Alfine alpina.

I. Alfine alpina glabra : in Phytopinace sub 21. at in Prodomo sub 3. descripta.

II. Alfine alpina junceo folio : sub 22. in Phytop. at sub 4. in Prodomo proposita.

III. Alfine montana capillaceo folio.

Alfine saxifraga angustifolia minima montana, Col.

IV. Alfine alpina cauliculis nudis prolifera. an Saxifraga 3. Col.

V. Alfine alpina minima glabra : quæ 7. in Prodomo.

VI. Alfine montana latifolia flore laciniato.

Alfine montana hederacea maxima, Col.

Alfine hirsuta arvensis.

I. Alfine hirsuta magno flore.

Auricula muris quibusdam, Dod. gal.

Alfine spuria 3. Eid. lat.

Alfine myofotis, Ad.

Alfine hispida 1. Thal.

Hæc duplex est : alterius folia minore hirsutitie donantur : alterius pilosiora sunt.

II. Alfine hirsuta altera viscosa.

Auricula muris 3. Dod. gal.

Alfine species glutinosa, Ges. col.

Alfine spuria 4. Dod.

Alfine viscaria, Cam.

III. Alfine hirsuta minor.

Alfine hispida minuta, Thal.

LIB. VII. SECT. I.
ANAGALLIS.

A *Anagallis* Dioscoridi lib. 2. cap. 209. *Anagallida*, aliqui *Corchorum* vocant, Plinio lib. 25. cap. 13. Genera duo Dioscoridi & Plinio florēt tantum distantia: quæ cæruleo est flore, femina: quæ phæniceo mas iisdem dicitur.

Anagallis terrestris.

I. *Anagallis phæniceo flore.*
Anagallis, Cord. in Diosc. Ges. hor. mas, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dod. Tur. Lac. Lon. Lugd. Cast. Ger.

Anagallis rubro flore vel purpureo, Ges. col.
Anagallis phænicea mas, Ad. Lob.
Anagallis phænicea, Tab. punicea, Cæf.
Anagallis phæniceo flore, Cam. mas, Clus. hist.
Anagallis terrestris mas, Thal.

Corchorus Cratævæ, Theoph. & Nicandri, Ang.

Hæc Dioscoridis mas est: aliquibus *Corallina* Aginetæ: alijs *Corchorus* Plinij: alijs *Molochia Serapionis*. Variat floris colore: phæniceo est communiter: est & purpurascens sive obsolete purpureo, cui phæniceum quidpiam permixtum conspicitur, mōnente Clus. hisp. & hist.

II. *Anagallis cæruleo flore.*

Anagallis femina, Brunf. Trag. Matth. Fuch.

Dod. Tur. Lac. Lon. Cast. Lugd. Ger.

Anagallis cærulea femina, Ad. Lob. Clus. hist.

Anagallis cærulea, Cæf. Tab. cæruleo flore, Cam.

Anagallis terrestris femina, Thal.

Flore est cæruleo, rarius albo.

III. *Anagallis cærulea*, folijs binis ternisve ex adverso nascentibus.

Anagallis tenuifolia Monnelli, Clus. hist. ap. alt.

IV. *Anagallis lutea nemorum.*

Numularia sylvatica vel mas, Ges. hort.

Anagallis lutea, Ad. Lob. Lugd. Thal. Tab. Ger.

Anagallis luteo flavo flore, Cam. Clus. pan.

& hist.

Alfina lutea, Lugd.

Folio aliquando ampliore reperiri, auctor est Clus. hist. ap. alt.

Anagallis aquatica.

I. *Anagallis aquatica major folio subrotundo.*

Anagallis aquatica, folio maximo, Thal.

Berula sive *Anagallis aquatica*, Tab.

Anagallis sive *Beccabunga*, Ger.

II. *Anagallis aquatica minor folio subrotundo.*

Sion, Brunf. non odoratum i. Trag.

Sium, Ang. Eric. Cord. Fuch. Lon. non odoratum quibusdam, Ges. hort.

Sij alterum genus, Fuch. ico.

Cepæa, Tur. Dod. gal.

Anagallis aquatica, (sive *Beccabunga Germanorum*) Ad. Lob. Dod. Lugd. Thal. Cæf.

Anagallis aquatica minor i. Tab.

Anagallis aquatica minor flore pallido, Ger.

Quibusdam Sium Dioscoridis lib. 2. cap. 154. sed folia olusatris defunt & inodora sunt: alijs

Cepæa Dioscoridis lib. 3. cap. 168. sed folia *Portulacæ* hæc non habet.

III. *Anagallis aquatica major folio oblongo.*

Berula major, Tab.

Anagallis aquatica, Ger. major, Ges. col.

IV. *Anagallis aquatica minor folio oblongo.*

Anagallis aquatica minor 2. Tab.

Anagallis aquatica minor, Ger.

V. *Anagallis aquatica folijs pulegij* serpillive.

Sium alterum & *Anagallis aquatica*, Trag.

VI. *Anagallis aquatica folio rotundo non crenato.*

Anagallis aquatica altera, Lob. Lugd.

Anagallis aquatica 3. Lob. ico.

Guilandinus modò *Alisma*, modò *Cochleariam* nobis nominavit: & alij *Samolus* Plinij

lib. 25. cap. 11. faciunt.

VII. *Anagallis aquatica angustifolia.*

Anagallis aquatica 4. Lob. ico.

VIII. *Anagallis aquatica angustifolia scutellata*: hæc in Prodomo, & pro 9. in Phyt-

pynace descripta.

ELATINE.

E *Elativa* folia habet Helxina, at minora & rotundiora pilosa, &c. in segetibus, Dioscoridi lib. 4. cap. 40. Idem Plinius lib. 27. cap. 9. *Elatine* nomine.

I. *Elatine folio subrotundo.*

Veronica femina, Matth. Fuch. Ges. hort. Tur. Dod. Lon. Cæf. Cast. Lugd. (qui Matthioli & Fuchij figuram exhibet) Cam. Ger.

Elatine

Elatine Dioscoridis, Ad. Lob.

Verbasculum quorundam, Lugd.

Elatine t. Tab. altera folio rotundo, Thal.

Reperitur folijs latioribus oblongis : dein folijs decuplo minoribus, rotundis Numulariae forma, quam

Elatines alteram speciem Thallius facit.

II. Elatine folio acuminato in basi auriculato, flore luteo.

Elatine, Matth. Cast. Lugd. resta, Lob.

Elatine altera, Dod. Lob. ico. Tab. Ger.

Elatine folio acuminato, Thal.

Linaria hederulae folio, Col.

In agris hirsutior & minor : in hortis glabrior & laetius virens.

III. Elatine folio acuminato flore caeruleo.

Differt à priore folijs rotundioribus, ad basin minus auriculatis : ac floribus, qui subcaerulei, vel caerulei sunt : & Monspeffuli in loco Gramuntio, & hinc inde circa vias reperitur.



SECTIO SECUNDA.

HELIOTROPIUM; AURICULA MURIS; ECHIUM; ONOSMA; ANCHUSA; LYCOPSIS; BUGLOSSA ET BORRAGO;

Cynoglossum; Cerinthe; Lithospermum; Symphytum; Pulmonaria; Consolida media; Brunella; Bellis.

HELIOTROPIUM.

H *ἡλιοτρόπιον* Dioscoridi lib. 4. cap. 193. quod τὰ φῶτα τῶν ἡλίου σὺν ὡς ἐγγίενται, quod folia cum Sole circumagat : & *ονοπίς* & *ονοπίς*, quod ramuli cum floribus, Scorpionum cauda modo inflectantur. Theophrasto 7. hist. 3. & 9. Solaris herba *Gaza* vertente. Plinio lib. 22. cap. 21. Heliotropium quod cum Sole se circumagat, etiam nubilo die, tantus sideris amor est, noctu velut desiderio contrahitur caruleus flos.

Genera duo Dioscoridi : majus flore candido, aut subfulvo : minus, femine verrucarum (hinc *Verrucaria*) pensiti. Plinio, tricoccum & Heliotrophium : parvum & magnum intelligens.

I. Heliotropium majus Dioscoridi.

Heliotropium majus, Matth. Ang. Dod. Gesn.

hort. (& Scorpoides album) Lac. Adv. Lobel.

Caef. Lugd. (& Verrucaria) Cast. Taber. Camer.

Ger. Clus. hist.

Herba cancri majus, Lon.

II. Heliotropium minus supinum.

Heliotropium supinum, Dod. Clus. hisp. & hist.

Ger. desc.

Heliotropium humi sparsum, Lugd.

Heliotropium minus t. Tab.

III. Heliotropium supinum alterum.

Heliotropium minus folio ocimi, Gesn. col.

Heliotropium minus, Lob. ico. Ger. repens, Ad.

Heliotropium minus 2. Tab.

Verrucaria altera minor, Lugd.

IV. Heliotropium tricoccum.

Heliotropium minus, Matth. Lac. Cast. Lugd.

Dod. Cam. ep. & hort. cui & herba Clytiæ.

Heliotropium minus tricoccum, Gesn. hort.

Clus. hisp. & hist.

Heliotropium vulgare Tornesol Gallorum, si-

ve Plinij tricoccon, Ad.

Heliotropium parvum Dioscoridis, Lob.

Heliotropium tricoccum, Caef. Lugd. Tab. Ger.

V. Heliotropium alterum, Matth. Lug. quid?

AURICULA MURIS SIVE ECHIUM SCORPIOIDES.

M *ὤριον* sive *ἰριον* *αὐριόλα*, id est, muris auricula, quam *Myosotida* vocant, Dioscoridi lib. 2. cap. 214.

Myosota sive *Myosotis*, Plinio lib. 27. cap. 12.

Echium scorpioides : *Echium*, propter foliorum formam : *Scorpioides*, eo quod ramulos floribus onustos caudarum Scorpionum instar contorqueant, vocamus : & cum alij *Myosotida*, alij *Heliotropium* faciant, *Heliotropium* sequi, & *Echium* precedere volumus.

li 3

I. Echium

I. Echium Scorpioides arvense.
 Auricula muris minor, Trag.
 Euphrasia 4. & Pilosella sylvestris, Eid.
 Scorpioides mas, Dod. in ico.
 Scorpioides aquaticum, Gesn. hort.
 Scorpioides 3. Dod.
 Myofotis hirsuta reptans, Adv. Lob.
 Alfine myofotis, five Auricula muris, Lobel.
 icon.
 Heliotropium minus alterum, Cæs. tertium,
 Taber.
 Echij palustris altera species, Thal.
 Auricula muris cærulea, Tab.
 Pilosella flore cæruleo, Ger.
 Heliotropium erectum, Eid.
 Echium minimum vel Buglossum, Col.
 Scorpioides tertium minus Dodonæi, Eyst.
 Variat magnitudine, aliquando vulgata
 quadruplo major est & hispidior.

II. Echium Scorpioides minus flosculis luteis: in Prodrómo descriptum.

III. Echium Scorpioides palustre.
 Cynoglossa minor, Brunf.
 Euphrasia cærulea, Trag. Tab. Ger.
 Scorpioides fœmina, Dod. in ico.
 Scorpioides aquaticum, vel palustre, vel cæruleum, Gesn. hort.
 Heliotropij species altera, Eid.
 Leontopodium, Lon. Lugd.
 Myofotis Scorpioides partim repens, partim erecta, Lob. ico.
 Heliotropium minus in palustribus, Cæs.
 Echium palustre, Cordo, Thal.
 Scorpioides tertium majus Dodonæi, Eyst.
 an Auricula muris, Matth. Dod. gal. Lac. Cæs. Lugd.
 Est glabrum, aliquando leviter hirsutum: flore est cæruleo, rarius niveo.

E C H I U M.

Eχίον, ἢ ἀλυσσίδιον Dioscoridi lib. 4. cap. 27. Echium dictum volunt quoddam contra viperarum idus valeat: alij quoddam floreat capitula viperæ similibus: sed Dioscoridi, quoddam semina νεφάρη εχέειν, capiti viperino similia habeat.

Genera: Plinio lib. 25. cap. 9. Echios utriusque generis, pulegio similis folijs coronata: Item altera, quæ lanugine distinguitur spinosa, cui & capitula viperæ similia sunt. Verum Dioscoridis Echium, Plinio lib. 22. cap. 20. Psendoanchusam dici putant, quam à quibusdam Enchusam, aut Dorion, & multis alijs nominibus appellatum scribit.

I. Echium majus & asperius flore albo.
 Echium flore albo, Cam. ep. Matth. & hort.
 II. Echium vulgare.
 Echium, Matth. Aug. Lac. Gesn. hort. Dod. Lob.
 ico. Cæs. Lugd. vulgare, Clus. pan. & hist.
 Echium, five Alcibiaceum, Dod. gal.
 Lycopsis, Cord. in Diosc.
 Buglossum sylv. Lon.
 Echium, Buglossum agreste, Ad.
 Echium floribus purpurantibus rubellis, Lob.
 Anchusa major, Cæs.
 Anchusa sylv. Thal.

Flos communiter cæruleus est: aliquando ex purpura rubet, vel subcinereus est. Caulis aliquando duorum triumve digitorum latus, quemadmodum in Beta, Digitali purpurea, Cucurbita, Tithymalo cyparissia & alijs observavimus.

III. Echium Creticum latifolium rubrum.
 Echium 3, vel Echium Creticum 1. Clus. hist.

IV. Echium Creticum angustifol. rubrum.
 Echium 4. vel Echium Creticum 2. Clus. hist.

V. Echium sylv. lanuginosum.
 Echium 1. & Echium pullo flore, Clus. pan. & hist.

VI. Echium sylv. hirsutum maculatum.
 Echium 2. vel rubro flore, Clus. pan. & hist.
 Flos nunc saturatè rubente, modo dilutiore colore præditus est.

VII. Echium alpinum luteum.
 Echium montanum Dalechampi, Lugd.
 Trachelium buccoides, Clus. pan.

VIII. Echium pumilum flore luteo.
 Echium flavo flore, Clus. cur. post.

IX. Echium luteum minimum.
 Echiodides lutea minima Apula campestris, Col.

X. Echium pumilum album.
 Echiodides parva alba Amphibia, Col.

XI. Echium Hispanicum flore calcari donato: quod 1. est in Prodrómo.

ONQ.

O N O S M A

Onosma Dioscoridi l. 3. c. 147. folijs Anchusa sine caule, semine & flore: & Plinio l. 27. c. 12. cui Onosma. Onosma, Matth. Lac. Lon. Cast. Lugd. Tab. Ger. Hactenus plantam non vidimus: esse autem Lycopsi- di cognatam & in Anchusis habendam, figura ostendit: & Adversariorum auctores, id velle videntur.

A N C H U S A

Anchora Dioscoridi l. 4. c. 23. παρὰ τὸ ἄλγαν quod vim suffocatoriam habeat, dicta videtur: alijs verò à florido radicis colore, siquidem ἀγγεῖον erat fuco illinire: hinc Galenus in Oratione sua for. ad artes 6. Anchusa pictas dicit. Anchusa etenim ab Echio, Lycopsides & Buglossa, radicis sanguineo succo, quo manus in- ficiuntur, Dioscoride monente, differt.

Genera tria Dioscoridi: 1. quæ ovòndia, folijs Lactuce hirsutis: 2. quæ ἀνθιαδίων ἢ ὀνοχίλης, quæ priore minor: 3. secundæ non dissimilis, semine puniceo. Plinius lib. 22. c. 20. primam Dioscoridis nomine An- chuse, & l. 27. c. 5. secundam sub Alcibio proposuit: & l. 22. c. 21. Onochiles habetur.

I. Anchusa Echij folijs & floribus.

Anchusa, Ad.

II. Anchusa lutea major.

Anchusa tertia, Matth. Ang. Lac. Cam.

Anchusæ prima species forte, Cord. in Diosc.

Buglossa rubra, vel Anchusa tertia, Lon.

Anchusa lutea, Ad. Lob. ico.

Anchusa quarta seu Pseudoanchusa, Dod.

Anchusa flore exalbido, Clus. pan. & hist.

Flos luteus, rarius albus: aliquando ex albo pallescens.

III. Anchusa lutea minor.

Anchusa Echioides lutea, Col.

IV. Anchusa puniceis floribus.

Anchusa, Gesl. hor. secunda, Matt. Ang. Lac. Lugd.

Buglossa rubra, vel Anchusa 2 Lon.

Anchusa minor seu Alcibiadion, vel Onochi- les, Ad.

Anchusa parva, Lob. ico.

Anchusæ alterum genus Onochiles dictum, Clus. hist.

V. Anchusa minor Patavina.

Anchusa tertia, Cam. ep.

VI. Anchusa angustifolia.

Anchusa lignosior angustifolia, Ad. Lob. icon. Lugd. Clus. hist.

Tragoriganum nothum Dalechampi, Lugd.

Lithospermum minus repens in Phytopynace, at in Matthiolo

Lithospermum fruticosum angustifolium.

L Y C O P S I S

Lycopsis, quibusdam ἀγγεῖον, quia radice etiam rubra est Dioscoridi l. 4. c. 6. Lycopsis, Plinio l. 27. c. 11. Sic dicta forte à caulis, foliorum & florum impexa hirsutie pedem lupinum imitante.

I. Lycopsis.

Cynoglossum, Matth. Lac. Lugd.

Cynoglossa vera, Cast.

Buglossum vulgare, Lon. ico.

Echij altera species, Dod.

Lycopsis, vel Lycapsis degener Anchusa, Ægi- netæ, Ad.

Lycopsis altera Anglica, Lob. Lugd.

Echion, Cæs.

Aliquando caule caret: Monspejiace flore est dilute purpureo: Anglica saturationis est purpureæ.

II. Lycopsis Ægyptiaca.

Lycopsis Dioscoridis, Cynoglossi genus, Rau- vvolf. Lugd. ap.

B U G L O S S A E T B O R R A G O

Bovylasos, Dioscoridi libr. 4. cap. 28. quod linguas bubulas imitetur. Dicitur & Εὐπελάσιον, quod in vinum confecta animi voluptates augeat, Dioscoridi & Plinio libr. 25. cap. 8. cui Buglossos, boum lingue similis.

Borrago

Borrage vero officinis, ad imitationem Marcelli dicta, *Buglossa* vera veterum censetur, & ab officinarum *Buglossa* diversa est, quam aliqui *Buglossam* veterum, alij eorundem *Lycopsin*, alij *Cirsum*, nescio quam recte, dicunt. Utrumq; pro *Buglossa* agnoscimus, ipsam *Borrage* officinarum, *Buglossam latifoliam*: & *Buglossam* officinarum, *Buglossam angustifoliam* nominantes. At *Guilandinus*, *Buglossum* officinarum, *Buglossum antiquorum* esse asserit: *Borrage* vero à *Dioscoride* *Echion* vocari suspicatur.

Buglossum sativum.

I. *Buglossum latifolium*, *Borrage*.

Borrage, Brunf. Trag. Fuch. ico. Ang. Gef. hort.
Dod. Len. Lugd. Cæs. Cam.

Buglossum, Matth. Fuch. Tur. Lac. Ad. Cast.

Buglossum verum, Dod. gal. Cord. in Diosc.

Borrage flore cæruleo: & albo, Eyst.

Buglossum latifolium, Lob. vulgare, Clus. hisp.

Buglossa urbana, Clus. hist.

Borrage floribus albis, Tab. hortensis, Ger.

Flore est communiter cæruleo: aliquando candido, vel ex pallescente roseo: interdum Autumno suaverubente. Et Taber. proponit

Borrage sylv. floribus albis, quæ

Borrage flore albo, Ger. &

Borrage tenuifoliam, quæ

Lycopsis Anglica, Ger.

II. *Buglossum latifolium* semper virens.

Buglossum semper virens, Ad. Lob. ico. Lugd. Camer.

Buglossum Hispanicum, Cæs. Tab.

Borrage semper virens, Ger. Hispan. latifolium, Eystett.

III. *Buglossum angustifolium* majus.

Buglossa, Brunf. Cæs. Italica, Trag. Lon.

Buglossa longifolia, Cord. hist.

Buglossum vulgare, Matth. Lac. Cast. Lugd. Taber. Ger.

Cirsum Italicum, Fuch.

Lycopsis, Ang. *Lycopsis*, Dod. gal.

Cirsum, Cord. in Diosc.

Echium Italicum spinosum, Fuch. ico.

Anchusa, Tur. *Anchusa Alcibiadion*, Dod.

Buglossus Italica, vel *Gallica* major, vel vera, Gef. hort.

Buglossum angustifolium, Ad. Lob.

Buglossum Italicum, vel *Hispanicum* grande, Camer.

Buglossum Italicum flore cæruleo: flore albo, Eystett.

Floris color cæruleus, albus, rubeus, interdum variegatus: folia modo latiora, modo angustiora sunt: hinc figuræ tres apud Tab. & Ger. apud illum *Buglossa vulgaris Italica* mas, & *Italica*

femina: apud hunc, *Buglossa vulgaris*, *Anchusa Alcibiadion* & *Anchusa lutea*, ico.

Aliquando folijs est latioribus, sinuosis, flore albo, qui cum ramo instar *Scorpioidis* incurvatur, eoq; à priore differt, quod

Buglossum folijs sinuosis nominavimus.

IV. *Buglossum* vulgare, asperitate & proceritate discrepans.

Buglossum vulgare violaceo & albo colore, Eystett.

V. *Buglossum angustifolium* minus,

Buglossa minor, Trag.

Cirsum Germanicum, Fuch. *Loniceri*, Lugd.

Echium lanuginosum primum, Fuch. ico.

Anchusa genus, Dod. gal. 3. Eid. lat.

Buglossus minor, Gef. hor.

Cirsum minus, Lon.

Echij facie *Buglossum* minimum, Lob.

Buglossum minus sativum, Lugd.

Buglossum sylvestre.

I. *Buglossum sylvestre* majus nigrum.

Buglossum alterum flore nigro, Matth.

Buglossum sylv. *Matthioli*, Lugd.

Buglossum sylv. majus, Cast.

Buglossa sylv. nigra, Thal.

Flore nigro, rarissime albo.

II. *Buglossum* sylv. minus.

Buglossum sylv. Brunf. Dod.

Borrage sylv. Trago.

Echium, Fuch. *Germanicum* spinosum, Eid. ico.

Echium alterum, Cord. in Diosc.

Lycopsis sylv. Dod. gal.

Buglossa sylv. Dod. sylv. altera: Lon.

Buglossum erraticum asperum *echioides*, Ad.

Echium *Fuchsij*, Lugd. Cam.

III. *Buglossum sylvestre* minus alterum & asperius.

Buglossa sylv. Trag.

Anchusa minor, Cord. hist.

Lycopsis, Lon. Lugd.

Buglossum sylv. minus, Cast. Lugd.

Flos ex cæruleo purpurascit, rarius candidus est.

IV. *Buglossum* sylv. tertium.

Cyno

Cynoglossum, Trag. Tur. officin. Fuch. falsum, Alyssum Germanicum Echiodides, Lobel. Lugdunen.
 Lon.
 Lycopsis, Fuch. icon.
 Cynoglossos altera Plinij, Dod. gal.
 Anchusa aspera, Cord. in Diosc.
 Hoc prædicto simile, sed non idem.
 V. Buglossum syl. caulibus procumbentibus. Borrago minor syl. Col.

CYNOGLOSSUM.

K *Ὠχλῶσος* Dioscoridi lib. 4. cap. 129. id est. *Lingua canina*, à foliorum forma qua Plantagini latifolia similia, at angustiora, minora & lanuginosa Dioscoridi. Plinio lib. 25. cap. 8. Cynoglossos caninas imitans linguas, topiariis operibus gratissima: est & alia similis ei, & quæ ferat lappas minutas. Neutrum Dioscoridis esse censuimus.

I. Cynoglossum maximum Belgicum.
 Cynoglossum maximum, Lob. obl.
 Hoc folijs, floribus & seminibus vulgato duplo majus est.
 II. Cynoglossum majus vulgare.
 Cynoglossa major, Brunf.
 Cynoglossum vulgare, Matth. Lob. Thal. Cast. Lugd. Clus. hist. Eyft.
 Cynoglossum, Dod. Ad. Tab. Ger. officinarum, Lon.
 Cynoglossus vulgaris, Ges. hor.
 Cynoglossa, Cæs. major, Cord. in Diosc.
 Cynoglossa vulgaris major, Col.
 Lycopsis, Lac.
 Hoc sæpe sine caule reperitur, quod tamen à caulifero diversum non est: hinc duæ figuræ apud Matthiolum, Lob. Dod. Rarius flore albo occurrit.
 III. Cynoglossum sylvaticum rubente caule.
 Cynoglossum sylvaticum Hærcynicum, Thal.
 an Cynoglossum montanum, Cæs.
 an Cynoglossa montana maxima frigidarum regionum, Col.
 IV. Cynoglossum sempervirens: in Phytopynace & Prodromo descriptum.
 an Cynoglossa media altera virente folio, Col.
 V. Cynoglossum globoso flore.
 Cynoglossa media montana incana angustifolia altera, Col.
 VI. Cynoglossum fructu umbilicato.
 Cynoglossa altera media fructu *nosferadus* sive *argyrodolys*, Col.
 VII. Cynoglossum medium.
 Cynoglossa similis planta Plinij.
 Cynoglossa minor, Cord. in Diosc.
 Cynoglossum puillum Narbonense, Ad. Lob. ico. Lugd.
 Cynoglossum parvum, Cæs. Italicum. Cam.
 Cynoglossum pumilum, Clus. pan. sive Austria-cum alterum, Eid.
 Cynoglossum Narbonense, Eyft.
 Cynoglossa minor montana serotina altera Plinij, Col.
 VIII. Cynoglossum Creticum argenteo angusto folio.
 Cynoglossum parvum cinereum Creticum, Camer.
 Cynoglossum Creticum primum, Clus. hist.
 an Cynoglossa media argentea Apula campestris, Colum.
 IX. Cynoglossum Creticum latifolium festidm.
 Cynoglossum Creticum secundum, Clus. hist.
 X. Cynoglossum minus.
 Elatine, Trag. Lon.
 Lappula rusticorum, Lugd.
 Cynoglossa minor montana serotina altera Plinij, Col.
 Hæc magnitudine variat, cum vix semipalmaris in Anglia reperiat.

CERINTHE SIVE CYNOGLOSSUM MONTANUM.

C *Erinthe* Plinio lib. 21. cap. 12. est folio candido incano, cubitalis, capite concavo, mellis succum habente: floris avidissima sunt apes.

I. Cerinthe seu Cynoglossum montanum majus.
Cerinthe, Gesn. hort. Cast. quorundam, Clus. hisp.
Cynoglossa montana, Gesn. hort.
Cerinthe major, Lob. Lugd. Cam. Clus. hist. Tabern. Ger.
Telephium Dioscoridis quibusdam, Eid.
Telephium maculosum, Cam.
Maru herba, Dod.
Pulmonaria Romana, Cæs.
Variat flore luteo, purpureo luteo, purpureo & versicolore.

II. Cerinthe flore ex rubro purpurascens.
Cerinthe tertia, Clus. hist.
III. Cerinthe flore flavo asperior.
Cerinthe quorundam major flavo flore, Clus. hist.
IV. Cerinthe minor.
Cerinthe Plinij, Ad. Lob. ico. Lugd.
Cerinthe minor, Lob. Cam. Tab. Ger.
Cerinthe secunda, Clus. hisp. minor seu quarta, Eid. hist.
Maru herba minor, Dod.
V. Cerinthe folio non maculato viridi.
Cerinthes quintum genus, Clus. hist. ap. al.

LITHOSPERMUM.

Aldrovandus recensuit Dioscorides lib. 3. cap. 158. quod à seminis duritie nomen accepit: folijs olea longioribus, latioribus & mollioribus, &c. Semen lapidea duritie, rotundum candicans, ervi parvi magnitudine. Plinius lib. 27. cap. 11. Lithospermo inter omnes herbas nihil est mirabilius, &c. lapillos gerit candore & rotunditate margaritarum, magnitudine cicercis, duritia vero lapidea: & qua pediculis adherent caver-nulas habent & intus semen, &c.

I. Lithospermum arundinaceum, fortè Dioscor. & Plinij.
an Coix Theophrasti, i. hist. 16.
Lachryma Christi, Trag. Gesner. hort. cui & Jodoci.
Lithospermum majus, Trag. Gesner. hort. cui & fruticosum.
Aundo lithospermos, Gesner. hort.
Lithospermon primum, Lacun. arundinaceum, Lugd.
Lachryma Jobi, Ad. Clus. hisp. & hist. Dod. Lob. Cam. Cast. Eyf.
Lachryma vulgo, Cæs.
II. Lithospermum majus, Matth. Lac. Cast. Lugd. quid?
III. Lithospermum majus erectum.
Saxifraga tertia, Brunf.
Lithospermum, Brunf. Fuch. Cord. in Diosc. & hist. Tur. Lon. Ad. primum, Anguil. commune, Gesner. hort.
Miliun Solis sativum, Trag.
Lithospermum minus, Matth. ico. Dod. Gesner. hort. Lac. Lob. Cast. Lug. Ger. vulgare minus, Cam.
Lithospermum sativum, Fuch. ico.
Lithospermum legitimum, Clus. hist.
Lithospermum alterum fruticosum, Thal.
Lithospermum arvense, Tab.
Anchusæ tertiæ similis altera, Cæs.
Miliun Soler Mauritanis, quod in montibus

Soler frequenter nascatur: hinc vulgo miliun Solis ineptè dicitur.

Hujus species minima palmum alta, Lini foliolis angustis, granulis pusillis, rotundis, cujus Adversaria meminere.

IV. Lithospermum minus erectum.
Lithospermum Anchusæ facie, Lob. Lugd.

V. Lithospermum minus repens latifolium.
Lithospermum alterum, Ang.

Lithospermum majus, Dod. Ad. Lob. Lugd.
Lithospermum vulgare majus, Cam.
Lithospermum repens majus, Clus. pan. & hist.
Lithospermum, Cæs. virgatum, Thal.
Pulmonaria minor Dalechampi, Lugd.

Hoc ad Echium, vel Anchusas referri potest, quod aliqui Lithospermum Dioscor. & Plinij censent.

VI. Lithospermum angustifolium umbellatum: in Prodro-mo descriptum.

VII. Lithospermum arvense radice rubra.
Lithospermum sylv. Trag. Fuch. Dod. gal. Camer. epist.

Echium minus herba Lithospermo congener, Gesner. ap.

Anchusa degener facie Milij Solis, Lob. ico.
Anchusa tertia Lithospermo similis, Cæs.

Anchusa arvensis alba, Thal.
Anchusa arvensis minor facie Milij Solis, Tab.

Lithospermum tertium Dod. nigrum, Lugd. Ad

Ad Anchusam, vel Echium, aliqui referunt.
VIII. Lithospermum Linariæ folio Germanicum.

Passerina, Trag. Cam.

Lithospermum sylv. minus, Dod. gal.

Lithospermum quartum exiguum, Dod. lat.

Lithospermum minus, Lon.

Passerina herbariorum unicaulis, Ad.

Lingua passerina, Tab.

Passerina linaria, Ger.

Linaria altera botryodes montana, Col.

IX. Lithospermum linariæ folio Monspe-
liacum.

Passerina linariæ folio, Lob. Lugd.

SYMPHYTUM.

Symphytum Dioscorides lib. 4. cap. 9. & 10. proposuit: sic dictum à facultate conglutinandi, quâ pollet: nam & carnes dum coquuntur conglutinat additum, eodem auctore. Et Plinio lib. 27. cap. 6. unde & Græci (ait) nomen imposuere: hinc Latinis Consolida dicitur.

Genera: Dioscoridi duplex est, nigræque petreæ, quod in petris nascatur, ramulis origano similibus, folijs tenuibus, & capitulis thymi: Alterum, quod aliqui *petron* vocant: caule cubitali, folijs hirsutis ad Buglosi foliorum similitudinem: floribus luteis, &c. Plinius lib. 27. cap. 6. Alum nos vocamus, Græci Symphytum petreum, similis cunila bubula, folijs parvis cacuminibus thymi, &c.

I. Symphytum Consolida major.

Symphytum quidam Inulam rusticam, quidam Alum Gallicum vocant, Scribon. c. 21.

Consolida major, Brunf. Trag. Cam. Thal. Ger.

Symphytum, Tur. Lon. majus, Matth. Cord.

hist. Cam. Cast. Tab.

Symphytum magnum, Fuch. Dod. ut: Lugd.

Symphytum alterum, Ang. Cord. in Dioscorid.

Lac.

Symphytum Alum, seu Alus, Ad Lob.

Consolida vulgo, Cæf.

Marem faciunt & fœminam, floris colore

potissimum differentes: mas, flore est purpureo, vel purpureo-cæruleo: fœmina, flore albo,

vel pallide luteo: rarius luteo: hinc duæ figuræ apud Tabernæmontanum & Gerardum:

tres apud Eystert.

Symphytum majus flore albo, & flore purpureo, Tab.

Consolida major flore albo & flore purpureo, Ger.

Symphytum majus flore purpureo: flore rubro: flore pallido, Eyst.

II. Symphytum majus tuberosa radice.

Symphytum tuberosum, Lob. Dod. Lugd.

Symphytum tuberosum majus, Clus. hist.

Symphytum majus flore subluteo, tuberosa radice, Cam.

Symphytum radice tuberosa, Cam. ep.

Symphytum alterum folio Borriginis, Ang.

Consolida altera minor, Cæf.

Consolida tuberosa vel nodosa, Cam.

III. Symphytum minus tuberosa radice.

Symphytum tuberosum, Clus. pan. tuberosum minus, Eid. hist.

Floribus est pallidis, vel subluteis.

IV. Consolida major amplexicaulis flore purpureo, Thal. quid?

V. Symphytum minus Borriginis facie.

Symphytum pumilum repens Borriginis facie, Lob.

Borrago minima herbariorum, Lugd.

an Asarum muri, Eid.

VI. Symphyto viribus affinis.

Bisa radix quæ ex Bengala & Patane montibus adfertur, Acofta cap. de Datura: sed quid?

SYMPHYTUM MACULOSUM, SIVE PULMONARIA.

Pulmonaria dicta, quod hujus folijs ut plurimum macula alba late aspersa sint, & quod Pulmonum affectibus medeatur: quibusdam Callæ alterum genus apud Plinium lib. 27. cap. 8. cui Calla duorum generum est: una, similis Aro, &c. Alterum genus ejus, quidam Anchusam vocant. folia Lactucæ longiora, plumosa, radice rubra, &c. Illam Arisarum, hanc Pulmonariam volunt. At Fracasiorum Pulmonariam ex genere Englosse esse censet.

I. Symphytum maculosum, sive Pulmonaria latifolia.

Pulmonaria altera, Matth. Cast.

Pulmonaria & Pulmonalis, Dod. gal.

Kk 2

Pulmo-

Pulmonaria Plinij, Gesn. hort.

Pulmonaria, Cæs. maculosa, Ad. Lob. Clus. pan.

Cam. Tab. Ger. Eyf.

Symphytum maculosum, Dod.

Pulmonaria major, Lugd.

Pulmonaria vulgaris maculoso folio, Clus. hist.

Folijs variat, quæ aliquando albis punctis

notantur, aliquando ijs carent: & hæc

Pulmonaria folio non maculoso, sive 2. Clus.

hist.

Floribus est communiter cæruleo rubenti-

bus: rarius albis. Marem & foeminam, nomi-

ne Pulmonariæ Plinij Taber. exhibuit, quem

Gerardus imitatur.

II. Pulmonaria angustifolia rubentecæru-

leo flore.

Consolida major sylv. Trag.

Symphytum sylv. Cord. histor. & Pulmonaria
Plinij, Schol.

Pulmonaria folijs Echij, Lob. ico. Ger.

Pulmonariæ tertiæ species altera, Clus. pan. s.

Pannonica, Eid. hist.

Pulmonaria quarta Plinij angustifolia, Tab.

Variat floribus, alteri flores initio rubenti,

dein cæruleum colorem saturationem contra-

hant: alteri flores pulcherrimè rubentes: illa

Pulmonaria 5. hæc verò 4. Clus. in hist.

III. Symphytum maculosum, sive Pulmo-

naria angustifolia cærulea.

Pulmonaria 2. vel angustifolia cæruleo flore,

Clus. pan. tertia Austriaca, Eid. hist.

Pulmonaria prima angustifolia, Taber. 2. angu-

stifolia, Ger.

Pulmonaria Austriaca secunda, Cam.

CONSOLIDA MEDIA.

Consolida media, quibusdam Chamæcisos spicata Plinij lib. 24. cap. 15. Alijs Anonymos Plinij
lib. 27. cap. 4. (Anonymos inquit, non inveniendū nomen invenit) sortè quia vulneribus sanan-
dis efficacissima sit.

I. Consolida media pratensis cærulea.

Consolida media, Brunf. Matth. Fuch. Taber.

Eyftett.

Consolida media, & Herba Laurentiana, Cast.

Prunella cærulea, Trag.

Bugula, Dod. ut: Clus. pan. & hist. Lugd. Ger.

Bugula, & Prunella quibusdam, Ad. Lob.

Arthetica Pandestarij, Ang.

Symphytum medium, Lon.

Consolida media major, Thal.

Consolida media prima, Tab.

Chamæcisus quorundam, Lugd.

Chamæcisus alterum genus, Cæs.

Flore est cæruleo: rarius cinereo vel albo:

folijs latioribus & angustioribus, leviter inci-

sis vel sinuatis.

II. Consolida media pratensis purpurea.

Prunella purpurea vel quarta, Trag.

Consolida media purpurea, Fuch. secunda,

Taber.

Consolida media minor, Thal.

Bugula carnei coloris flore, Clus. pan. & hist.

Bugula flore albo, Ger.

Hæc repit & folijs priore est rotundiori-
bus, non laciniatis, aliquando etiam non
crenatis: flores, rubicundioris diluti coloris
sunt.

III. Consolida media flore luteo: hæc cæ-
teris multò minor est, folijs rotundis, crenatis,
flore luteo: quam ex Anglia habemus.

IV. Consolida media cærulea alpina, in
Prodr. descripta.

BRUNELLA.

Brunella, quæ ex Consolida speciebus est, ab effectu nomen accepit, ed quod faucium & lingua
affectibus, seu potius malo Castrensi, Germanis die Brūne dicto, medentur: quod malum ab
Aegineta lib. 3. Erysipelas Cerebri dictum videtur. Quibusdam Symphytum petraum: alijs Polynemon
Dioscoridis lib. 3. cap. 108.

I. Brunella major folio non dissecto.

Brunella, Brunf. Dod. ut: Lob.

Prunella vulgaris, & 6. Trag.

Consolida minor, Matth. minima, Cam.

Prunella, Fuch. Ang. Adv. Cæs. Lugd. Camer.

Taber. Ger.

Symphytum petraum, Lobel. ico. an & Cord.

in Diosc.

Prun-

Prunella, aut potius Brunella officinarum, Eyft.

Flore est purpureo, vel cæruleo punicante: aliquando ex diluto cæruleo albicante, rarius albo: folijs integris nonnunquam leviter crenatis.

II. Brunella folio laciniato.

Symphytum petraeum, Lob.

Brunella altera, Dod.

Prunella secunda, Clus. pan. & hist. tertia, Tab.

Prunella altera hirsutior, Cæs.

Prunella Lobelij, Ger.

Flore est purpurei vel carnei coloris, vel cinerei, vel nivei: folijs aliquando solum superioribus, aliquando simul etiam inferioribus laciniatis.

III. Brunella Hyssopifolia: in Phytop. sub 2. descripta.

an Prunella secunda, Tab.

an Prunella flore albo, Ger.

IV. Brunella cæruleo magno flore.

Prunella cærulea altera, vel 3. Trag.

Prunella prima & major, Clus. pan. & hist.

Prunella grandiflora, Cam.

Brunella cærulea magno flore, Eyft.

Folij est integris: reperitur & laciniatis: flore saturatius purpurascens, nonnunquam & dilutioris & exalbidi, rarius albi coloris.

V. Brunella minor alba laciniata.

Prunella candida altera, vel septima, vel foemina, Trag.

Hæc semipalmatis est, aliquando trium quatuorve unciarum.

B E L L I S.

Bellidem etiam ad Consolidam mediam, vel minorem, referunt, quam licet aliqui apud Theophrastum 7. hist. 9. Anthemidis foliacei speciem (Nigellam foliosam Gaza vertit) velint: Grecis tamen indicata videtur. Plinio lib. 26. cap. 3. Bellis in pratis nascitur, flore albo aliquatenus rubente. Et lib. 21. c. 8. luteus & Bellio pastillicantibus quinquagenis quinis barbulis coronatur.

I. Bellis sylv. caule folioso major.

Oculus bovis, Brunf.

Bupthalmum, Eid. majus, Lon.

Bellis major, Trag. Matth. Fuch. Dod. ut: Lac.

Cæs. Cast. Cam. Ger. Lugd. (cum figura Matth.

& Fuchij) Adv. Lob. (cui & Consolida media vulnerariorum) Eyft.

Bellis sylv. Tur. major sylv. Fuch. ico. Gefn. hor.

Bellium majus, Tab.

Folio acutius est, vel rotundius: caule & hirsuto & glabro: flore nonnunquam gemino, etiam pleno, sed rarissime reperitur.

II. Bellis alpina major rigido folio: quæ

1. in Prodomo.

an Bellis alpina, Cam.

III. Bellis alpina alba minor: quæ 2. in

Prodomo.

IV. Bellis montana major folio acuto: quæ

3. in Prodomo.

V. Bellis montana folio obtuso crenato: quæ

4. in Prodomo.

VI. Bellis sylv. media caule carens.

Bellis media, Matth. Ad. Lugd. Tab. Clus. hist.

Bellis minor, Cæs.

Bellis sylv. media, Gefn. hort. Ger.

Bellis sylv. Dod. major sylv. Lob.

VII. Bellis sylv. minor.

Solidago Consolida species, Brunf.

Primula veris, Eid. Cæs.

Bellis minor, Matth.

Bellis minor sylv. Fuch. Dod. gal. Tur. Gef. hor.

Lugd. Tab. Ger.

Bellis pratensis minor, Ad.

Flos colore variat: discum enim luteum ambiunt foliola, vel alba, vel ex candido rubra:

alia ex albo & rubro mixta: alia intus rubra, in ambitu alba: aliquando in viridem colorem degenerant: reperitur vix uncias duas alta.

Bellis sylv. minor flore mixto, &

Bellis sylv. minor flore pleno rubro, Eyft.

VIII. Bellis maritima folijs Agerati: quæ

5. in Prodomo.

Bellis hortensis.

I. Bellis hortensis flore pleno, eoque magno, vel parvo.

Primula veris, Trag. Gefn. hort.

Bellis, Lon. minor, Matth. Lugd. minima, Cæs.

Bellis minor hortensis, Fuch. Dod. gal. Gef. hor.

Lac. Tab.

Consolida minor officinarum, an Bellis Pliniana, Ad.

Bellis hortensis multiplici flore, Lob. Tab. Ger.

Bellis minor fl. multiplici albo & rubro, Eyft.

Primula veris multiplici foliorum ordine, Cæs.

Floris colore variat, albo, incarnato, rubro, vario, scilicet candido & rubro: est & fusco: hinc duæ figuræ, apud Lob. & Ger. tres apud Tabernæmontanum.

Kk 3 II. Bellis

II. Bellis hortensis prolifera.

Primula veris, cujus flores si non citius carpan-
tur, ex se alios generant, ac sæpe ex uno qua-
tuor aut quinque erumpunt, Trag.

Bellis hortensis sua verubens, viridisque proli-
fera, Lob. ico.

Bellis prolifera, Cam. variegata, Eyst.

III. Bellis hortensis pediculo folioso: quæ
7. in Prodomo.

Bellis cærulea.

I. Bellis cærulea caule nudo.
Aphyllantes 3. Lugd.

II. Bellis cærulea caule folioso.

Aphyllantes, id est frondiflora, Ang. Cam.

Bellis cærulea, Globularia Monspeliensium,

Ad. Lob. Tab. Ger.

Bellis montana, Cæf.

Scabiosæ pumilum genus, Clus. hist.

Bellis minor flore cæruleo, Eyst.

Globularia cærulea, Col.

Variat magnitudine, foliorum latitudine,
& caulium altitudine: hinc tres apud Tab. Ger.
icones: Bellidis cæruleæ, Apulæ, & Monspe-
liacæ nomine.

III. Bellis cærulea spinosa: quæ pro 6. in
Prodomo describitur.

IV. Bellis cærulea montana frutescens.

Bellis montana fruticosa in Ilva, Cæf.

Scabiosa quinta, vel Scabiosa montana repens,
Clus. pan.

Scabiosa repens montana, Cam.

Scabiosa odorata, Tab.

Scabiosa montana minor repens, sive 10. Clus.
histor.

Bellis lutea.

I. Bellis lutea folijs profundè incisis major,
Bellis major lutea, Trag.

Chrysanthemum, Dod. Cam. ep. Cast.

Chrysanthemum folio virentiore, Cam.

Chrysanth. segetum folio multiscisso, Adv.

Chrysanthemum segetum, Lob.

Chrysanthemum arvense, Tab.

Chrysanthemum species 4. Cæf.

II. Bellis lutea folijs profundè incisis minor.
Chrysanthemum minus, Cam. ep.

III. Bellis lutea folijs subrotundis.

Chrysanthemum 3. Cæf.

Chrysanthemum Myconi, Lugd.

an Chrysanthemum folio minus dissecto, Cam.
merar.

IV. Bellis spinosa folijs Agerati.

Bellis spinosa elatior, Lob. ad par. alt.

V. Bellis montana globoso luteo flore.
Globularia lutea montana, Col.

SECTIO TERTIA.

PILOSELLA; GNAPHALIUM; LEONTOPODIUM; HELI-
CHRYSUM; STOECHAS CITRINA; CONYZA; ASTER;
TRIPOLIUM; ALISMA; ET VIRGA AUREA.

PILOSELLA.

Pilosella à copiosis pilis quibus vestitur, nomen sortita est, quam aliqui ad Myosotidem, alij ad Holostium
referunt: sunt qui Inrybi minimam speciem faciant.

I. Pilosella major repens hirsuta.

Auricula muris, Brunf. Ericio Cord. alia, Cord.
in Diosc.

Auricula muris minor, Trag. Lon.

Pilosella, Matth. Ang. Ad. Lob. Cast. Tab.

Pilosella major, Fuch. Dod. ut: Lug. media, Th.

Pilosella quibusdam Holostium, Lac.

Pilosella repens, Ger.

II. Pilosella major repens minus hirsuta.

Auricula muris minor secunda, Trag.

Pilosella vulgo, Cæf.

Pilosella major, Cam. ep.

Lactucella sylv. repens, Cam. hort.

III. Pilosella major erecta.

Pilosella major, Ger. altera, Tab.

IV. Pilosella major erecta altera.

Pilosella major prima, Tab.

Pilosella major latifolia, Ger. ico.

V. Pilosella montana hispida parvo flore.

Pilosella major umbellifera *μαρμαρινη* & mon-
tana & pratenfis, Col.

VI. Pilosella Syriaca.

Pilo-

Pilosella maxima Syriaca, Lob. Lugd. Tab.
VII. Pilosella incana saxatilis lutea.

Auricula muris altera incana saxatilis frigida-
rum regionum, Col.

GNAPHALIUM.

I *Napellion* Dioscoridi lib. 3. c. 132. quod folijs *αὐτὶ γναφάλης* pro tomento, ut antur: Et Plinio lib. 27. c. 10. cui *Gnaphalium*, quod alij *Chamaeclon* vocant. Verum apud Plinium l. 24. c. 19. habetur herba, *Impia*, incana, vocata *rosmarini* aspectu, thyrsi modo vestita atq; capitata, unde alij ramuli assurgunt sua capitella gerentes, ob id *Impiam* appellatam, quoniam liberi supra parentem excellent, alij porius ita appellatam, quod nullum animal eam attingat, existimavere: hac Plinius. Sunt qui *Gnaphalium* vulgare esse velint, & esse quoq; *Centunculum* ejusdem: Sic autem Plinius l. 24. c. 15. Itali *Centunculum* vocant, rostratis folijs ad similitudinem capitis penularum, jacentem in arvis, Græci autem *Clematidem*.

I. *Gnaphalium maritimum*.
Gnaphalium, Matth. Lobel. Lugd. legitimum,
Clus. hist.
Gnaphal. marinum, Gef. hor. Ad. Lob. ico. (Cot-
tonaria vulgi five *Bombax humilis*) Tab. Ger.
Gnaphalium marinum tomentosum, Lugd.

II. *Gnaphalium latifolium Americanum*.
Gnaphalium Americanum αὐγυαίου, Clus. pan.
& hist.
Gnaphalium latifolium peregrinum, Eyst.
Centunculi Americani nomine ex America ac-
cepimus, apud quos uti & in Brasilia, apud
Toupinambaulcios frequens est.

III. *Gnaphalium vulgare majus*.
Heliophylos sylv. Trag.
Gnaphalium, Fuch. Gef. hor. Tur. Lac. Cast.
Gnaphalium vulgare, Matt. Ad. Lob. Lug. Tab.
Filago, Dod. ut: Ger.
Centunculus, Tur.

Tomentum, Cord. hist. Lon.
Impia Plinij, Ang. (& *Carta filago*) Gef. hor.
Herba Impia, Cæs.

IV. *Gnaphalium vulgare minus*, Thal.
Gnaphalium medium, Tab. vulgare, Ger.
Filago 4. Dod. gal. minor, Dod. lat. Lob. ico.

V. *Gnaphalium minus latioribus folijs*.
Gnaphalium Plateau tertium, Clus. hist.
VI. *Gnaphalium minus repens*.
Gnaphalium minimum, Lob. ico. minus, Tab.

Filago minor Ger.
Hoc etiam duarum solùm unciarum reperitur.
VII. *Gnaphalium roseum sylvestre*.
VIII. *Gnaphalium roseum hortense*: utrum-
que in Prodomo descriptum.

IX. *Gnaphalium majus lato oblongo folio*.
Gnaphalium secundum Plateau, Clus. hist.
X. *Gnaphal. majus angusto oblongo folio*.
Heliophylos sylvestris, Trag. ico. alt.

Filaginis altera species, Dod. ut:
Filago Germanica altera secundum folia flori-
da, Ad. Lob. ico.

Gnaphalium vulgare majus, Thal.
XI. *Gnaphalium majus angusto oblongo*
folio alterum.

Pseudoleontopodium Matthioli, Lugd.
Gnaphalium Anglicum, vel *Belgicum* folio
longiore, Ad. Lob. ico.

Chrysocome Germanica, Lob. obs.
Chrysocome lanuginosa, an *Impie* species, Lug.
Gnaphalium majus, Tab. Anglicum, Ger.

Gnaphalij genus, Clus. hist.
Leontopodium alterum vulgare, Matth. Cam.
an Herba Impia in montibus, Cæs.

an Chrysocome & Chrysitis, Cast.
Hoc cum à priori parum differat, qui volue-
rit, idem dicat.

Gnaphalium montanum.
I. *Gnaphalium montanum flore rotundiore*.
Lagopus secundus, Trag.

Auricula muris, Lon. quarta, Trag.
Pilosella minor, Fuch. Dod. gal. Lugd. Thal.
Lagopiron Hippocratis, Gef. animal.

Gnaphalij genus, Gef. col.
Gnaphalium montanum purpureum & album,
Ad. Lob. Tab. Ger.

Gnaphalium montanum suaverubens, &
Gnaphalium montanum variegatum, Eyst.

Variat floribus candidis, subpurpureis, ro-
seis, ex candido & rubro mixtis.

II. *Gnaphalium montanum longiore & fo-
lio & flore*.
Gnaphalium montanum purpureum, & suave-
rubens, Lob. ico. Tab. Ger.

Gnaphalium montanum Dalechampi, Lugd.
Pilosella minor, Dod. Clus. hist.
Variat ut prior floris colore; hinc duæ ico-
nes apud Lob. Tab. Gerard.

III. *Gna-*

III. Gnaphalio montano affinis Ægyptiaca.
Baccharis Rauvvolfij, Lugd. ap. Clus. hist.

IV. Gnaphalium alpinum magno flore, folio oblongo.

an Leontopodium Dioscoridis?

Leontopodium verum, Matth.

Leontopodium Matthioli, Lugd. Tab.

Leontopodium, Dod. Cast.

Leontopodium sive pes leoninus, Ad.

Gnaphalium alpinum, Ger. def. Clus. pan. & hist.

V. Gnaphalium alpinum magno flore folio brevi.

Leontopodium sive pes leoninus, Lob. Tab. Ger.

Idem cum priore censet Lug. at cum illud radicem habeat magnam, quasi squammosam, folia oblonga: hoc verò radicem tenuem, foliaque breviora, differre statuimus.

VI. Gnaphalium alpinum minus.

Leontopodium parvum, Lob. Lugd. Tab. Ger. def.

Pilosella minor altera.

LEONTOPODIUM.

L *Ἐοντοπόδιον* Dioscorides l. 4. c. 131. duorum dicit generum & ad amatoria valere, &c. Plinius lib. 26. c. 8. *Leontopodij* quidem meminit, sed à Dioscoridis diversum censuit: Dioscorides fortè de *Gnaphalio alpino* intelligendus: quod *Gnaphalium* à Plinio l. 27. c. 8. *Cemos* appellari nonnulli existimant.

HELICHRYSUM.

E *Ἠλὶχρυσον* aut *Χρυσοθύμνον* ἢ *Ἀμρανθὸν* Dioscor. l. 4. c. 37. ubi folia Abrotano similia & umbellam auream tribuit, At Theophr. l. 9. c. 21. *Ἠλὶχρυσον*, id est, aureum colorem habens, (Aureliam Gaz a vertij) alijs *Coma aurea*. Plin. l. 21. c. 25. *Helichrysum*, quod alijs *Chrysanthemum*, & quæ Dioscorides habet.

I. *Helichryson* folijs Abrotani.

Helichrysum, Matth. def. Cast.

Helichrysum Creticum, Matth. ep. ico.

an *Helichryson* quod vulgo in Creta, *Lagochimithia*, quod leporibus cubilia grata præbeat, appellare solent, Bellon.

Elichryson, Ang. Lac. Dod. Lob. Clus. hisp. & hist. Lugd. Cam.

Heliochryson, Ad.

Helichrysum i. & *Helich.* i. altera icon. Tab.

Coma aurea & *Helichryson*, Ger.

Varietas in folijs advertitur: hinc duæ figuræ apud Taber. & Gerardum.

II. *Elichrysum* folijs oblongis *Stœchadi citrinæ* similis, Dod.

Helichrysum, Cam. ep. ico.

Chrysocome peregrina, Eyst.

III. *Elichrysum* folijs oblongis paucis *Stœchadi citrinæ* angustioribus.

Helichrysum Cretic. Matth. def. Lug. Cam. ep.

IV. *Elichrysum* seu *Stœchas citrina* angustif.

Amaranth. luteus Fuch. Lac. Lon. citrinus, Tur.

Stœchas citrina, Matth. Lac. Gef. hor. Dod. Cast.

Lugd. officinarum, Tab. desc.

Ageratum Aurelia, Dod. gal.

Heliochrysum, Cord. in Diosc.

Helichrysum, & *Amaranthus Galeni*, Cæs.

Chrysocome aurea coma, Ad. Lob.

Chrysocome prima vulgaris, Clus. hist.

Coma aurea, Lob. ico.

V. *Elichrysum* Orientale.

an *Chrysocome* Dioscoridis l. 4. c. 55. & Plinij, cui & *Chrysitris* l. 21. c. 5. in *Phytopynace*, Matthiolo & Prodomo descriptum.

Stœchas citrina comis grandioribus, Cam. ep.

Elichrysum, Belli ep. i. ad Clusium.

Helichrysum Creticum, Eyst.

VI. *Elichrysum* Creticum.

Chrysocome s. vel *Cretica*, Clus. hist.

VII. *Elichryson* sive *Stœchas citrina latifolia*.

Amaranthus & *Heliochryson* primus, Trag.

Amaranthus luteus primus, Tab.

Chrysocome sive *Amaranthus luteus*, Ger.

Variat latioribus & oblongioribus folijs: hinc tres icones.

Amarant. lutei i. 2. & 3. apud Tab. & apud Ger. sub

Chrysocome, *Amarantho Galeni* & *Heliochryso* sylvestri.

VIII. *Elichrysum* sylv. latifolium capitulis conglobatis.

Chrysocome & *Helichryson* sylv. Lob. ico.

Chrysocome montana, Cæs.

Chrysocome altera, Clus. hisp. tertia, peregrina

secunda, Eid. hist.

Chrysocome, Tabern. Ger.

IX. *Elichryson* sylv. angustifolium capitulis conglobatis.

Stœchas citrina altera, Ad. Lob. ico. Lugd.

Ageratum aliud quorundam, Lugd.

Chrysocome, Cæs. altera, peregrina i. Clus. hist.

Elichry-

Elichrysum Creticum, Cam.

Stechas citrina, five Chryfocome Monspeliaca, Taber.

X. Elichrysum sylv. flore oblongo.

Stechas citrina altera inodora, Ad. Lob. ic. Lugd.

Gnaphalium marinum Dalechampi, Lugd.

Chryfocome latioribus folijs, Cæf.

Chryfocome quarta, peregrina 3. Clus. hist.

XI. Elichryfo sylv. flore oblongo similis: in Phytopynace & Prodomo describitur.

XII. Stechas viridis capitulo oblongo. Stechas viridis Dalechampi, Lugd.

C O N Y Z A.

Konysa Dioscoridi l. 3. c. 136. sic forte dicta, quod uxor mas seu culices, suo lentore capiat: apud Theophrastum 6. hist. 1. & 2. Pulicariam Gaza vertit, Plinio l. 21. c. 10. Conyza.

Genera tria Dioscoridi: parva, quæ odore præstantior: major, gravi odore: tertium genus medium inter illas, in jucundioris odoris, & c. Theophrasto plura genera, mas & semina: hac minor, illa major, Plinio genera duo mas & semina, in folio differentia, & c.

I. Conyza mas Theophrasti major Dioscoridis.

Conisa magna, Tur.

Conyza major, Clus. hisp. Dod. Cæf. Alp. Cast.

Camer.

Conyza magna, Lugd.

Conyza major vera, Ad. Lob. ico.

II. Conyza major altera.

Conyza major Dioscoridis Rauvolfij, Clus. hist.

Conyza Syriæ, Lugd. append.

III. Conyza femina Theoph. minor Dioscoridis.

Conyza minor vera, Gef. ap. Ad. Lob. ico. Lugd.

Conyza minor, Clus. hisp. & hist. Cæf. Cast.

Conyza minor, & Eupatorium Mesues, Col.

Conyza minor altera, Dod.

IV. Conyza minor exotica.

Conyza minor Boëtica, Clus. cur. post.

V. Conyza Salviæ odorem spirans.

Planta Bantania, Clus. exot. l. 4. c. 23.

VI. Conyza major vulgaris.

Conyza major, Trag. Matth. Dod. gal. Gef. hor.

Lac. Lon. Cast. Lugd.

Conyza major altera, Dod.

Conyza Helenitis, Cord. hist. Thal.

Baccharis, Matth. Lac. Lon. Tab.

Baccharis Monspeliensium, Gef. hort. Ad. Lob.

Lugd. Cam. Ger.

VII. Conyza pannonica lanuginosa.

Conyza tertia Pannonica, Clus. pan.

Conyza tertia Austriaca, legitima fortè Diosc.

Eid. hist.

VIII. Conyza cærulea acris.

Tinctorius flos alter, Trag.

Erigeron tertium, Dod. gal. quartum, Eid. lat.

Dentelaria, Gef. hort.

Conyza muralis, Eid. col.

Conyzoides cærulea, Gef. corol. Cord.

Conyza odorata, Lugd.

Conyza genus tenuifolium, Thal.

Conyza cærulea, Tab.

Amellus montanus, Col.

Variat folijs, in altera brevioribus & latioribus: in altera longioribus & angustioribus: est & altera erecta, altera repens: flore cæruleo, qui in pappum vel album, vel rufescentem abit.

Conyza montana.

I. Conyza cærulea alpina major: quæ 1. in Prodomo.

II. Conyza cærulea alpina minor: quæ 2. in Prodomo.

III. Conyza alpina pilosissima.

Conyza Helenitis pilosa, Lob. ico.

IV. Conyza incana.

Conyza Helenitis mellita incana, Lob. ico.

V. Conyza montana folijs glutinosis pilosis.

Conyza montana Myconi, Lugd.

VI. Conyza montana lutea, folijs oblongis.

Hæc duplex à Thalyo proponitur, nomine

Conyzae majoris montanae, &

Conyzae majoris alterius: hujus posterioris figura à Camerario in suo horto exhibetur.

VII. Conyzis affinis.

Britannica Gefneri & Lugd. Ad. Lob. ico.

Britannica vera Dalechampi, Lugd.

Bellis lutea Dalech. Lugd.

Conyza palustris.

I. Conyza media Asteris flore luteo, vel tertia Dioscoridis,

LI

Cala-

Calaminthæ tertium genus, Fuch.

Conyza, Cord. in Diof. Tab. altera, Tur.

Conyza media, Matth. Dod. ut: Lac. Ad. Lon. Lob. Lugd. Eyf.

Conyza 3. Matt. ep. Ang. Cast. 3. aquatica, Gef. h.

Conyza 3. vulgaris, Cluf. pan. media vulgaris, Eid. hift.

Conyza aquatica, Thal.

Conyza major, Ger.

Mentha lutea, Lon.

Asteri Actico similis altera quæ Cunilago, Cæf.

Cunilæ 3. genus, quæ Cunilago Plin. l. 20. c. 16.

II. Conyza major flore globofo.

Conyza minor, Trag. Matth. Dod. gal. Lac. Cast. 3. in Prodomo.

Lugd. Tab. Ger.

Conyza prima, Ang. minor seu fœmina, Lon.

Conyza minima, Ad. (five Pulicaria) Lob. Dod. Lugd. Thal.

Pfyllium, Cord. hift. ico. Conyza, Eid.

Major est & minor.

III. Conyza aquatica laciniata.

Conyza Helenitis folijs laciniatis, Lob. ico.

Conyza Helenitis, Dod. belg.

IV. Conyza palustris ferratifolia.

Conyza aquatica, & aquatica folijs ferratis, Gef. hort. & col.

Conyza maxima ferratifolia, Thal.

Lingua major Dalechampi, Lugd.

Conyza quarta, Cam. ep.

Consolida palustris, Tab.

Solidago Sarracenica, Ger.

V. Conyza aquatica, Asteris flore aureo: quæ 3. in Prodomo.

VI. Conyza affinis Germanica.

Solidago Sarracenica tertia, Trag. Lon.

Herba vulneraria ad fluvium Pfrim, Trag.

Consolida Sarracenica tertia, Tragi, Lugd.

Conyza nomine posita in Cordi historia.

ASTER ATTICUS.

Aster & Atticus Dioscoridi l. 4. c. 120. florem habet in cacumine purpureum, aut luteum, per ambitum anthemidis capituli modo divisum, foliis stellæ modo radiatis. Plinio l. 27. c. 5. Aster, ab aliquibus Eubonium appellatur, quoniam Inguinum (sc. inflammationi) præsentaneum remedium est: in cacumine capitula stellæ modo (hinc Asteris nomen) radiat, &c.

Aster Atticus luteus.

I. Aster luteus foliolis ad florem rigidis.

Aster Atticus alter, Matth. Lugd.

Aster Atticus verus, Ang. Gef. hor.

Aster, five Stella Attica Monspeliensium aureo flore, Ad.

Aster Atticus, Lob. (cui & Inguinaria) Ger. luteus, Cam.

Aster Atticus primus flore luteo, Cluf. hisp. vel

Aster atticus legimus, Cluf. hift.

Aster atticus, Cæf.

Aster luteus alter, oculus Christi minor, Lugd.

Oculus Christi, Eid.

Aster atticus Mafsilioticus, Tab.

Est latifolius: est & angustifolius.

II. Aster atticus folijs circa florem mollibus.

Aster cernuus, Col.

Baccharis vel Carpesium Alpini, quo nomine accepiamus.

III. Aster luteus radice odora.

Incensaria, Cæf.

Asteris altera species Apula, an Baccharis, Col.

Baccharis vera Dioscoridis, Malocho, hoc nomine accepiamus.

an Aster luteo flore, Cam. ep.

IV. Aster luteus major folijs succise.

Aster primus, vel pannonicus major, Clufius pannon.

Aster tertius five Austricatus 1. Eid. hift.

V. Aster luteus hirsuto Salicis folio.

Aster pannonicus tertius, Cluf. pan. at quintus, in hiftor.

Aster flore luteo, Tab.

Aster hirsutus, Ger. ico.

VI. Aster montanus luteus Salicis glabro folio.

Aster atticus secundus, Cluf. pan. at quartus five

Austriacus secundus, Eid. hift.

Bellis lutea, Lugd.

Bubonium luteum, Tab.

Aster Italarum, Ger.

VII. Aster luteus folio glabro & crenato.

Aster Italarum, Ad. Lob.

Aster atticus, Dod. atticus Italarum, Cluf. pan.

Aster octavus Italarum, Eid. hift. ico.

VIII. Aster luteus angustifolius.

Aster conyzoides Gesneri, Lob. Lugd.

Aster atticus tertius, Cæf.

IX. Aster

IX. After luteus linariæ rigido glabro folio.

After atticus quartus, Clus. pan. desc.

After sextus, Austriacus 4. Eid. desc.

X. After montanus luteo magno flore.

After montanus, Ad. Lob. ico. Ger.

After montanus luteus mas, Tab.

After atticus alpinus foliolis luteis, Cæs.

XI. After atticus luteus montanus villosus magno flore.

After montanus hirsutus, Ad. Lob. ico. Lugd.

After luteus sive oculus Christi minor, Eid.

After montanus luteus foemina, Tab.

XII. After luteus supinus.

After atticus supinus, Clus. hisp. (at in hist. secundus) Dod. Lob. Lugd.

After atticus repens, Cam.

After Atticus caeruleus.

I. After atticus caeruleus vulgaris.

Tinctorius flos primus, Trag.

After atticus, Matth. (cui & Amellus,) Fuch.

Dod. gal. Cord. in Diosc. & hist. desc. Gesn. hort.

Lac. Lon. Clus. pan. Cast. Lugd.

After Atticus, Amellus non est, Guil.

After atticus purpureus, Fuch. ico.

After atticus i. Dod. caeruleus, Thal. Cam.

After Italorum purpurascens, Lob.

After caeruleus Italicus, sive 8. Clus. hist.

After atticus minor flore caeruleo, Eyst.

Hujus differentiae duæ: est latifolius & angustifolius, & hujus pumilum genus: Sic qui

TRIPOLIUM.

Περδύλον (quasi dicas ter canum seu canescens) Dioscoridi l. 4. c. 135. cujus flores (ut tradunt, inquit) colorem ter die mutant, manè candidi, meridie purpurei, serò puniceo conspiciuntur.

I. Tripolium majus caeruleum.

Tripolium, Dod. ut: Lugd. Cam.

Tripolium litorum, Ad.

Tripolium vulgare, Lob. Lugd. Eyst.

Amelli species palustris, Col.

Flos purpureus, medio luteus aut croceus: aliquando in eodem medio & luteus & puniceus,

ambitu purpureo, qui colores in omni flore

nescente conspiciuntur. Luteis etiam floribus Lobel. observavit: Folij quoque in summitate profundè in aliquot feras divisus notavimus.

II. Tripolium minus: & Lob. & Lugd.

Magnitudine solum à priore differre videtur.

III. Tripolium minus alterum.

Anthyllis minor, Cord. obs.

Tripolium minus, Cam.

ALISMA SIVE DAMASSONIUM.

Ἀλίσμα sive *δαμασόνιον* Dioscorides l. 3. c. 169. folijs dicit plantaginibus sed angustioribus, &c. quem Plinius imitatus l. 25. c. 10. cui duplex, alterum laciniosis angustis, alterum majoribus folijs in sylvis, &c.

Quid verò sit, magna inter auctores controversia, alijs Plantaginem, alijs Calceolum Marie, alijs Digitalem, alijs Mentham græcam, alijs aliam statuentibus. Verum cogitandum, an non Dioscoridis & Plinij primum

Alisma, sit Sanicula alpina, quæ Auricula Ursti dicitur: quemadmodum Plinij secundum, ipsum Verbasculum. In Phytopyrace duplex Alisma proposuimus: primum sub Alismate folio glabro, quod nunc ad Gentianas retulimus: alterum folio hirsuto, de quo inter Doronici species egimus.

VIRGA AUREA.

Virga aurea, quæ à forma & floris colore luteo nomen habet, ab alijs propter vires & Solidago & Consolida vocatur. Quibusdam Panax Chironium Theophrasti 9. hyst. 10. & Plinij l. 25. c. 4. Panax Pharnacium & Phanax Chironium folio Lapathij, censetur: alijs Cunilago Plinij, Panaces dictum: & quia folia aliquando maculata observantur, sunt qui Leucographon Plinij, l. 27. c. 11. autumant.

I. Virga aurea major, vel Doria.

Doria, fortè Panaces Chironium, Gesn. hort.

Dorea Narbonensis, quasi Aurea, Ad. Eyf.

Herba Doria, Lob. Cæs.

Dorea sive herba aurea, Lugd.

Limonium aliud, Lugd.

Panax Chironium Theophrasti, Tab.

Herba aurea Penæ & Lobelij, Lugd.

Variat folijs, ijsque integris non serratis, qualia sunt cum primum erumpunt, & cum in hortis colitur: vel serratis, aculeo folij summi-rati insidente, quemadmodum Monspessuli observavimus: hinc duæ figuræ in Lobelij iconibus & in Lugdunensi historia.

II. Virga aurea latifolia serrata.

Virga aurea, Cam. ep. Thal. Villanovani, Ger.

Virga aurea vulgo dicta, Cæs. serratis fol. Tab.

Virga aurea altera serrato folio, Lob.

Virga aurea margine crenato, Dod.

Virga aurea altera, Lugd.

Virga aurea minor laciniatis folijs, Cam.

an Consolida Sarracenica major, Lugd.

Variat folijs longioribus, latioribus, brevioribus, serratis tamen: & quandoque folia lineis albis notantur.

III. Virga aurea angustifolia serrata.

Solidago, Ang.

Solidago Sarracenica, Trag. Fuch. Dodon. ut:

Lon. Ad. Lob. Lugd.

Virga aurea, Gesn. hort.

Consolida Sarracenica, Thal. Eyf.

Consolida aurea, Tab.

Herba Doria, Ger. ico.

Est latioribus & angustioribus folijs: ex Anglia habemus folio niveo & bicolore.

IV. Virga aurea angustifolia minus serrata.

Virga aurea, Matth. Dod. ut: Lon. Lugd. (qui

& Matth. & Dodonæi figuram exhibet) Cast.

Ger. Eyf.

Virga aurea Villanovani, Ad. Lob.

Virga aurea folijs non serratis, Cam. ep.

Virga aurea Broccenbergensis, Thal.

Virga aurea major angustifolia, Cam.

Virgæ aureæ alterum genus, Cæs.

Leucographis Plinij, Ang.

Symphytum petræum 3. Tab.

Variat folijs, quæ sæpè sine crenis, aliquando saltem minus conspicuis serrata sunt: sic folijs oblongis, aliquando subrotundis & flore luteo, rarius albo: hinc tres figuræ apud Tabernæm, Symphyti petræi 1. 2. & 3. nomine.

V. Virga aurea magno flore.

Consolida aurea nemorum, Limonij folio, Ad.

Lob. ico.

VI. Virga aurea montana serrata magno flore, quam Plantaginis alpinae nomine in summitate montis Calcaris circa tuguriola collectam, habemus.

SECTIO QUARTA.

VERBENA; SUCCISA; SCABIOSA; JACEA; STOEBE;
CYANUS; TRAGOPOGON; SCORZONERA; CALTHA;
HELENUM; FLOS SOLIS.

V E R B E N A.

Iἔρα βότρυς sive νεύρεον (apud Pausaniam νεύρεον) folia habet quernis similia, sed angustiora minoræq; colore aliquatenus glauco. &c. Sacra herba dicta, quod in expiationibus ad amuletum sit perutilis, Dioscoridi lib. 4. cap. 61. Sic verò Plinius lib. 25. cap. 9. Nulla Romana nobilitatis plus habet, quam Hierobotane: aliqui peristereon, nostri Verbenacum vocant: hæc est, quam legatos ferre ad hostes indicavimus: hæc Jovis mensa verritur, domus purgantur, lustranturq;.

Genera

Genera ejus duo sunt Plinio l.c. foliosa, quam feminam putant: mas rarioribus folijs, & c. folia minora quam quercus colos glaucus, &c. quidam unum omnino genus faciunt, quoniam utraq, eodem effectus habeat, &c.

I. Verbenae communis caeruleo flore.

Verbenae mascula, Brunf.

Hierobotanemas, Eid.

Columbaris, Herm. Barbaro.

Verbenae, Gesn. hort. Lon. recta, Trag.

Verbenaca, Matth. Lac. Cast. vulgaris, Lugd.

Verbenaca supina (& femina) Fuch. Cord. in

Verbenae five Verbenaca, Guil. pap. (Diosc.)

Verbenaca recta, Dod. ut: Lugd. Tab.

Verbenae communis & sacra recta, Ad. Lob.

Verbenaca femina, Caes. Cam. vulgaris, Cl. hist.

Herba sacra, Ang. Tur.

Floribus est caeruleis, quandoque albidis.

II. Verbenae tenuifolia.

Verbenaca supina, Clus. hisp. Dod. Lugd. Tab.

Sacra Verbenae Hispanica minor, Lob.

Verbenae supina, Clus. hist.

III. Verbenae Peruanae, quae Hispanicae si-

milis, ex Monardi, Lugdunensis refert.

IV. Verbenae nodiflorae, in Phytopinace,

Matthiolo & Prodromo descripta.

Verbenaca nodiflora, Imperato.

SUCCISA SEU MORSUS DIABOLI.

Succisa dicitur, quod ejus radices circumfusa sint: vulgus enim credit, Demonem cum tanta efficacia radicem hominibus invadeat: eam statim ubi succreverit, undique circumrodere: quare Morsus diaboli dicitur. Sunt qui Geum veterum censent: at Columna videtur Pycnocomon Dioscoridis lib. 4. cap. 176. alijs Nigina Plinij lib. 27. cap. 12. Herba, inquit, quae vocatur nigina, tribus est folijs longis inubacis: Alij ad Scabiosas: alijs ad Jaceas referunt.

I. Succisa glabra.

Jacea nigra, Brunf.

Morsus diaboli, Eid. Trag. Dod. gal. Gesn. hort.

Lac. Ad. Lob. Lon. Lugd. Cam. Tab. Ger.

Succisa, Matth. Fuch. Dod. Cast.

Scabiosa folio integro, Caes.

Pycnocomon, Col.

Folij est glabris & integris, rarius lacinjatis: floribus caeruleis, rarius purpureis, vel incarnatis, rarissime albis: est etiam major & minor.

II. Succisa hirsuta, quae a priore sola hirsutiae differt.

Morsus diaboli hirsuta rarior, Gesn. hort.

SCABIOSA.

Scabiosa, alijs a scabro herbae habitu (quod vulgata convenit) alijs quod scabiei medetur, quod vox Persae praetendere videtur: quare & ὀφθαλμὸν ἄνθ' ἰσχυρὸν αὐτῇ ἀντιπαρατίθεται. Sunt qui ad Staben Dioscoridis l. 4. c. 12. referant.

Scabiosa praetensis & arvensis.

I. Scabiosa praetensis hirsuta, quae officinarum.

Scabiosae primum genus, Trag.

Scabiosa, Lac. desc. Lon. vulgaris, Fuch. com-

munis, Dod. gal.

Scabiosa altera campestris seu segetum, Lob.

ico. Ger.

Scabiosa major, Cast. arvensis, Tab. vulgaris,

Scabiosa folio scisso, Caes. (Eyst.)

Scabiosa major flore ex caeruleo purpureo, Tab.

Huc referenda est

Scabiosa major satorum vulgarior, Ad. Lob.

Scabiosa vulgaris major, Dod. Lugd.

Scabiosa dissectifolia major, Thal.

Variat folijs modo crassius, modo tenuius

utrinque divisis: flore ex caeruleo, purpureo,

vel bresilico colore tincto: hinc duae apud Tab.

& Gerardum figurae.

Scabiosa major, flore ex caeruleo purpureo, Tab.

II. Scabiosa major squammatis capitulis.

Scabiosa, Brunf. quinta, Trag.

Scabiosa major, Matth. Lugd. Cam. Clus. hist.

Jacea nigra major laciniosa, Ad.

Scabiosa major flore purpureo, Tab. Ger.

Cyanus sylv. major arvensis, Thal.

Floribus est ex purpura subrubentibus: reperitur floribus paucioribus, minoribus, fl. candido: folijs altera latioribus, altera angustioribus.

III. Scabiosa major altera, squammatis capitulis, sive Jacea rubra latifolia laciniosa.

Jacea tertia, Tab.

Jacea major, Ger.

IV. Scabiosa fruticans latifolia alba.

Scabiosa nona sive aestivalis, Clus. hist.

Flos vel candidus, vel caeruleis staminibus

ornatur, vel livet, vel ad caeruleum inclinat.

Ll 3

V. Sca-

V. Scabiosa fruticans angustifolia alba.
Scabiosa montana calidarum regionum, Adv.
Lob. Lugd.
Scabiosa quarta & major Pannonica, Clus. pan.
Scabiosa major Pannonica albo flore, vel 8. Eidem hist.
Scabiosa maxima leucanthemos, Cam.
Scabiosa montana, Tab.

VI. Scabiosa angustifolia alba altera.
Scabiosa major alba, Tab.
Scabiosa montana, Ger. ico.

VII. Scabiosa multifido folio flore flavescente.
Scabiosa tertia, Clus. pan.
Scabiosa septima vel *εχρηστικη* flore, Eid. hist.
Scabiosa tenuifolia, five major, five 7. Thal.
Scabiosa lutea è Thuringia, Cam.
Scabiosa Pannonica flore albo, Eyst.

VIII. Scabiosa flore globoso niveo.
Scabiosa alba in hortis Belgij, Clus. hist.
Scabiosa Belgica flore albo, Eyst.

IX. Scabiosa alba gemino capite.
Scabiosa alba gemino tergemino capite, Clus. hist.

Flore purpurascente, vel incarnato, huic non absimilem, in Bavaria Camerarius observavit.

X. Scabiosa prolifera folio latiore.
Scabiosa prolifera, Lob. ico. Tab. prolifero flore, Clus. hist.

XI. Scabiosa prolifera folijs Gingidij: quæ 3. in Prodomo.

XII. Scabiosa tenuifolia prolifera minor.
Scabiosa tenuifolia minima prior, Eyst.

XIII. Scabiosa folio Sinapi fylv. quæ 2. in Prodomo.

Scabiosa montana.

I. Scabiosa alpina folijs Centaurij majoris.
Scabiosa alpina maxima, Ad. Lob. ico. Tab.
Centaurium nortum Dalechampi, Lugd.
Scabiosa alpina Centauroides, Cam. Eyst.

II. Scabiosa montana glabra, folijs Scabiosæ vulgaris.
Scabiosa secunda vel alpina, Clus. pan.
Scabiosa quinta five montana, Eid. hist. desc.

III. Scabiosa montana Dentis leonis folio: quæ 4. in Prodomo.

IV. Scabiosa montana latifolia non lacinata rubra & prima.
Scabiosa latifolia purpurascente flore, Clus. pan. five 4. Eid. hist.

V. Scabiosa latifolia rubra non lacinata secunda.

Scabiosa prima, vel latifolia rubro flore, Clus. pan.

Scabiosa rubra Auftriaca, Lob. ico.

Scabiosa integrifolia prima, Thal.

Scabiosa tertia vel latifolia Pannonica rubro flore, Clus. hist.

Scabiosa Succisæ similis, Cæs.

Scabiosa latifolia septima, Tab.

VI. Scabiosa Virgæ pastoris folio.

Scabiosa latifolia peregrina, Tab.

VII. Scabiosa argentea angustifolia: quæ 6. in Prodomo.

an Scabiosa graminea folio argenteo flore purpureo, Cam.

VIII. Scabiosa montana minor capitulo squammoso.

Scabiosa montana omnium minima, Adv. Lob. ico. Lugd.

Scabiosa æstiva minor, Lob.

Scabiosa montana minor septima, Tab.

Scabiosa capitulo globoso.

I. Scabiosa peregrina rubra capitulo oblongo: quæ 1. in Prodomo.

Scabiosa Indica five sexta, Clus. hist.

Scabiosa Indica flore saturatè rubro, &

Scabiosa Indica flore dilutè rubro, Eyst.

Hanc folijs in tenuiores lacinias divisiss, flo-
reque minore & rubro, nomine Scabiosæ nigre
odore Zibethi, ex horto Patavino habemus.

II. Scabiosa capitulo globoso major.

Scabiosa quinta & sexta, Trag.

Scabiosa minor, Matth. Lob. (cui & Columba-
ria) Lugd. Cast.

Scabiosa minor lævis, Gesn. hort.

Scabiosa media, Dod.

Scabiosa media ferrato angustifolio, flore glo-
bulariæ, Ad.

Scabiosa 20. fœmina herbariorum, Tab.

Scabiosa folijs bellidis sylvestris majoris, ma-
jor, Thal.

Scabiosa quinta five montana, Clus. hist. ico.

Phyteuma Dioscoridis, Col.

III. Scabiosa capitulo globoso minor.

Scabiosæ folijs bellidis species minor, Thal.

Scabiosa minor, 1. 2. 3. 5. Tab.

Scabiosa media, minima, minor & major, Ger.
ico.

Scabiosa angustifolia flore subcæruleo, Eyst.
Folio-

Foliorum dissectionibus variant, cum alteri ad medium nervum tenuissimè dissecta sint, alteri non item: tertia folia inferiora penitus dissecta non habet.

IV. Scabiosa capitulo globoso folijs in tenuissimas lacinijs divisilis

Scabiosæ tenuifoliæ species altera, Thal.

an Scabiosa tenuifolia flore cæruleo, Eyf.

V. Scabiosa minor capitulo globoso odore. Phyteuma minus, Col.

Scabiosa stellata.

I. Scabiosa stellata folio laciniato major.

Scabiosa Hispanica major, Clus. hisp. & hist.

Lob. Lugd. Tab. Ger.

Scabiosa peregrina, Dod. Cæs.

Scabiosa Hispanica, Cam. Eyf.

II. Scabiosa stellata folio laciniato minor, five maritima.

Scabiosa Hispanica minor, Clus. hisp. & hist.

Scabiosa Hispanica minor, vel altera, Lugd.

Scabiosæ peregrinæ alteræ species, Dod.

Hæc si in hortis colatur pedalem altitudinem excedit.

III. Scabiosa stellata minima: quæ s. in Prod.

IV. Scabiosa stellata folio non dissecto.

Scabiosa peregrina, Lob. Lugd. Ger.

Scabiosa arborescens, Cæs.

Scabiosa peregrina folijs non dissectis, Tab.

Scabiosa arborea Cretica, Ponæ.

Habet Camerarius Scabiosam Gallicam folio oblongo, tenui, nigricante, nitido: sed nostræ folia incana sunt.

J A C E A.

Jacea adeo Scabiosæ similis est, ut eam Scabiosam nominare soleant: sunt tamen qui velint Hyosiridem esse Plinij l. 27. c. 11. quam Intubo similem sed minorem, & tactu asperiores, scribit.

Jacea non laciniata.

I. Jacea nigra pratensis latifolia.

Scabiosa vulgaris pratensis, vel 4. Trag.

Centaurij pratensis species, Ges. hort.

Gethia nigra Scaligeri, Eid.

Jacea nigra, Eid. Tab. Ger. flore purpureo, Eyf.

Cyanus sylv. angustifolius, Thal.

Jacea alia nigra, Lugd.

an Solidago Sarracenica altera, Lon.

Hujus folia inferiora quædoq; laciniata sunt:

quæ & floribus albis pingitur in hort. Eyf.

II. Jacea nigra angustifolia, vel Lithospermariensis folijs: quæ 1. in Prodomo.

Variat: alia caule lævi, eoq; cum folijs virente: alia caule aspero rufescente, vel molli ro-

mento vestito, folijsq; incanis.

III. Jacea fruticans pini folio.

Scæbe capitata rosmarini folio, Ponæ.

Chamæpitys fruticosa Cretica Belli, Eid.

Chamæpitys Berthioli.

IV. Jacea integrifolia humilis: quæ 2. in Prodomo.

V. Jacea nigra squammoso capite major.

Jacea Austriaca prima, Clus. pan.

Jacea squammato capite montana prima, Eid.

hifor.

VI. Jacea nigra squammoso capite minor.

Jacea Austriacæ primæ aliud genus, vel Jacea

montana squammoso capite minor, Clus. pan.

Jacea squammato capite montana 2. Eid. hif.

VII. Jacea latifolia capite hirsuto.

Jacea Austriaca secunda, vel Jacea montana vil-

loso capite elatior, Clus. pan.

Jacea Austriaca villoso capite, five 4. elatior,

Eid. hif.

Jacea pannonica capitulo crispo, Camerar. in

Thal.

Cyanus sylv. montanus integrifolius, &

Cyanus sylv. *αυστηριακή*, Thal.

VIII. Jacea angustifolia capite hirsuto.

Jacea montana villoso capite humilior, Clus.

pan. vel quinta, Eid. hif.

IX. Jacea alba hirsuto capite.

Jacea Austriacæ majoris villoso capite flore

albo, nomine, D. Fürerus Northusa misit.

Jacea laciniata.

I. Jacea nigra laciniata.

Jacea nigra, Dod. ut: Lugdunen. vulgaris, Ad.

Lobel.

Hyosiris Plinij, Ang.

Jacea Austriaca tertia, Clus. pan. at sexta in hif.

Jacea pannonica Clusij hirsuto capite, Cam.

II. Jacea humilis alba Hieracij folio.

Jacea pumila, Ad. Lob. ico.

Jacea humilis Hieracij folio, Lugd.

Flore est albo: aliquando ex cæruleo obfo-

lato purpurascit: Est major & minor.

III. Jacea laciniata squammata.

Jacea

Jacea squammato capite tertia Cretica, Clusij histor.

IV. Jacea laciniata lutea.

Jacea montana minima tenuifolia, Col.

V. Jacea latissimo laciniato folio: sub Jacea Babylonica in Prodomo descripta.

Jacea laciniata capite spinoso.

I. Jacea capite longis aculeis spinoso: quæ 3. in Prodomo.

II. Jacea lutea spinosa Centaurioides.

Jacea lævis maxima centaurioides Apula, Col.

III. Jacea lutea capite spinoso.

Jacea major lutea, Ad. Lob. ico. Lugdun. Tab. Ger. Eyft.

Jacea lutea, Clus. hisp. & hist. Lugd. desc.

Spina solstitialis altera, Dod.

Carduus stellatus capitulis spinosis, Lob.

Carduus eriocephalus Dodonæi, Lugd. ico.

IV. Jacea Cyanoides echinato capite.

Jacea major folio multum laciniato, Ad.

Jacea major, Lob. Lugd.

Cyanoides flos, Dod.

Cyanoides major, Tab.

Jacea montana echinato capite, Clus. pan. & hist. five 7.

Stæbe Salmantica secunda, Clus. hist. ico.

Flos purpurascens, rarius albus; rarissime luteus.

V. Jacea folijs Seridis candicantibus, purpurea.

Jacea altera, Clus. hisp.

Jacea purpurea Valentina muricato capite, Clus. hist.

VI. Jacea laciniato Sonchi folio, sive Jacea latifolia purpurea capitulo spinoso: quæ 4. in Prodomo.

VII. Jacea minor folijs aculeatis: Cyani majoris nomine missa.

Jacea laciniata incana.

I. Jacea tomentosa capitulo spinoso: quæ 8. in Prodomo.

II. Jacea montana incana mollis capitulis hispidis: quæ 6. in Prodomo.

III. Jacea montana incana aspera capitulis hispidis: quæ 5. in Prodomo, qui volet has duas jungat.

IV. Jacea montana candidissima Stæbes folijs, quæ in Phytopinace & Matthiolo sub Jacea incana laciniata: at in Prodomo sub 7. describitur.

V. Jacea montana incana capite pini. Chamæleon non aculeatus, Advers. Lobel. icon.

Jacea montana, acanophora, Lugd.

Jacea alia pumila five varia, Cam.

VI. Jacea montana incana odora.

Jacea montana Narbonensis, Lob.

Jacea muscata & quinta, Tab.

Jacea montana, Ger.

Jacea oleæ folio.

I. Jacea incana Cyani capitulis.

Jacea incana altera Cyani aut Jaceæ capitulis, Advers.

Stæbe incana altera, Lob. ico.

Jacea incana, Lugd.

Cyano similis quædam, Cæf.

II. Jacea oleæ folio capitulis simplicibus.

Parmica altera, Matth. Lugd.

Parmica, Lac. Cyano similis, Cæf.

Parmica Austriaca, Lob. Clus. pan. & hist. Dod. Cam. Ger.

III. Jacea oleæ folio minore flore.

Parmica Austriacæ species, Clus. cur. post.

IV. Jacea oleæ folio capitulis compactis.

Jacea pusilla incana altera folio oleæ, Lob.

Jacea incana folio oleæ, Lugd.

V. Jacea oleæ folio affinis.

Dorichyum Dioscoridis fortè, Ponnæ Ital.

Lagochimicæ nomine, semine ab Honorio

Belli ex Creta misso, in horto Anno 1600. crevit.

S T O E B E.

Σ Totæ vulgaris est notitia, Dioscoridi libr. 4. cap. 12. Plinio libr. 22. cap. 11. Stæbe quam aliqui Phleon. At libr. 21. cap. 15. quadam spinam in folio habet & in caule, ut Phleos quod aliqui Stæben appellaverunt: ob quam utriusque brevitatem quid statuendum sit, dubium sanè: nihilominus tamen recentiorum aliqui, subsequentibus plantis id nominis tribuunt, quod extrema folia utcumque aculeata sint, quas tamen alij ad Cyanos, alij ad Centauria propter amorem referunt, ad confusionem vitandam, Stæbes nomen servabimus.

Stæbe

Stœbe folijs laciniatis.

I. Stœbe major folijs Cichoraceis, mollibus, lanuginosis.

Stœbe Salmantica prima, Clus. hisp. & hist.

Stœbe Salmantica major, Lob.

Aphyllanthes prima, Dod.

Scabiosa, seu Stœbe Salmantica prior, Lugd.

Stœbe major, Tab.

Stœbe argentea minor, Ger.

Stœbe Hispanica, Cam.

II. Stœbe major folijs Erucae mollibus lanuginosis.

Stœbe Salmantica primæ altera species, Clus. hisp. Lugd.

Stœbe Salmantica secunda, Clus. hist.

an Stœbe argentea incana Aldroandi, Lob.

Aphyllanthes tertia, Dod.

III. Stœbe major calyculis non splendentibus.

Centaurium majus in muris, Gef. hor.

Stœbe Salmantica alterius altera species, Clus. hisp. Lugd.

Jacea, five Stœbe gallica, Clus. pan.

Stœbe Gallica & Austriaca elatior, Eid. hist.

Cyanus sylv. tenuifolius, Thal.

Jacea alba, Lugd.

IV. Stœbe viridis calyculis argenteis: in Prodomo.

V. Stœbe calyculis argenteis.

C Y A N U S.

Cyanus, à floribus cyaneo seu cæruleo colore, nomen accepit. Plinius libr. 21. cap. 8. de vestium amulatione cum floribus agens, ait, in nomine est & Cyani color: & cap. 11. Rosam Cyanus excipit. Cyanum Amarantus. At Hermolaus, Leucoium Dioscoridis censuit: & Casalpino, Struthium apud Theophrastum ex hoc genere videtur: verum Columna, Papaver Heracleum Theophrasti & Dioscoridis statuit: Lobelius num Chondrilla species sit dubitat.

I. Cyanus montanus latifolius: vel Verba-

sculum Cyanoides.

Verbasculum, Trag.

Cyanus major, Matth. Dod. ut: Lob. Lugd. Ca-

stor. Cam. Ger. Eyst.

Cyanus major hortensis, Ad.

Cyanus montanus, Gef. hor. Tab.

Cyanus sylv. Lon. flore grandi, Cæs.

Flore est magno cæruleo, aliquando umbilico purpureo: rarius flore albo est.

II. Cyanus segetum.

Lychnis agria, & Flos frumenti, Brunf.

Baptifecula, Trag.

Stœbe Salmantica altera, Clus. hisp. Lugd.

Stœbe Salmantica tertia, Clus. hist.

Stœbe argentea Salmantica minor, Lob.

Aphyllanthes quarta, Dod.

Stœbe minor, Tab.

Stœbe argentea major, Tab.

an Stœbe, Ang.

an Papaver spumeum, Cæs.

VI. Stœbe calyculis argenteis minor.

Jacea alba, Tab.

Jacea flore albo, Ger.

VII. Stœbe incana Cyano similis tenuifolia.

Centaurij majoris species minor, Gef. col.

Cyano minori similis, Clus. pan.

Stœbe Austriaca humilis, Eid. hist.

an Papaver spumeum aliud in saxosis, Cæs.

VIII. Stœbe rubra Monseliaca parvis Cyaniculis: vel Jacea rubra angustifolia laciniata.

Jacea rubra major laciniosa, Lugd.

IX. Stœbe squammis asperis.

Aphyllanthes secunda, Dod.

Stœbe non laciniata.

I. Stœbe spinosa maritima.

Stœbe ex Cod. Cæsareo, Dod.

Stœbe peregrina, Clus. hist. ap. alt. auct.

Cyanus spinosus Creticus, Ponæ Ital.

II. Sphæritis ex Codice Cæsareo, Dodon. quid?

Cyanus, Dod. gal. Turn. Gefn. hort. Lon. Cæs.

flos, Dod.

Cyanus major, Matth. Lugd. Cast. Cam.

Cyanus sylv. Fuch.

Cyanus vulgaris, Ad. Lob. Oer.

Cyanus cæruleus, Tab. arvensis cæruleus, Thal.

Eystett.

Papaver Heracleum. Col.

Flos communiter cæruleus, rarius albus.

III. Cyanus hortensis flore simplici.

Floris colore variat, cæruleo, purpureo, hicq;

aliàs dilutè rubro & incarnato, aliàs ad punice-

um inclinante, aliàs vario, violaceo, albo, & ex

M m

his

capitulis

a capitulis
qui voleta Stœbes
hiolo sub
mo sub 7.pini.
f. Lobel.

capitulis,

licibus.

hist. Dod.

post.
pactis.
Lob.Ital.
Honorio
o 1600.ui Phleon.
appellave-
centiorum
quas ta-
bes nomen

Stœbe

his coloribus mixto: hinc figuræ quatuor apud Tabernæmontanum & Gerardum.

1. Cyanus cæruleus sativus, Tab. sub Cyano variegato apud Ger.
2. Cyanus purpureus, Tab. Ger.
3. Cyanus albus, Tab. Ger.
4. Cyanus ex albo violaceus, Taber. Cyanus violaceus, Ger.

Sic apud Eyst. flore purpureo, incarnato, rubro, albo, albo fundo purpureo, variegato.

IV. Cyanus hortensis flore pleno.

Cyanus flore multiplici, Lob. ico.

Cyanus multiflorus, Tab. Ger.

Variat floribus colore purpureo, albo, medio purpureo: hinc duæ figuræ apud Lob. & Ger. tres apud Taber.

1. Cyanus fl. purpureo multiplici, Lob. ico.

Cyanus purpureus multiflorus, Tab. Ger.

2. Cyanus flore albo multiplici medio purpureus, Lob. ico.

Cyanus albus multiflorus medio purpureus, Tabern.

3. Cyanus cæruleus multiflorus, Tab. V. Cyanus repens latifolius.

Cyanus peramarus supinus capitulis squarosis Sesamoidis parvi, Ad. Lob.

Cyanus repens, Lob. ico. supinus, Lugd.

Cyanoides minor altera, Tab.

VI. Cyanus repens angustifolius.

Cyanus repens alter, Lob. repens, Lugd.

Cyanus minimus, Ad. repens, Lob. ico.

Cyanoides minor, Tab.

TRAGOPOGON

Tραγοπωγών ἢ τριφυλλώγων, ἡδὲ νόστος, à proluxa lanugine, quæ è summo erumpit, sibi nomen ascribit, Dioscorides libr. 2. cap. 173. Tragopogon Theophrasto 7. hist. 7. At Plinio libr. 21. cap. 15. Come, ab alijs Tragopogon, folijs Croco similibus. Et lib. 28. cap. 13. Est & Tragopogon quem alij Comen vocant, & c. Lattinus Barbula hirci.

Tragopogon luteo flore.

- I. Tragopogon pratense luteum majus. Barbula hirci, Trag. Matth. Lac. Cast. Tragopogon, Matth. Fuch. Ang. Gefn. hor. Tur. Dod. Lon. Cæf. flore luteo, Eyst. Tragopogon luteum, Lob. Tab. Ger. Tragopogon luteus communis, Thal. Barba hirci, Cord. in Diof. & hist. Dod. gal. Gef. hort. Lugd. flore luteo, Cam. Gerontopogon flore luteo, Gefn. col. & Barba fenis.

II. Tragopogon folio oblongo sinuato: primo loco in Prodromo descriptum.

III. Tragopogon spicatum luteum.

Tragopogon spicatus, Lugd.

IV. Tragopogon laciniatum luteum.

Acorus Theophrasti, Ang.

Tragopogon laciniatis folijs, Col.

Folia prima graminea sunt, integra nec laciniata.

V. Tragopogon tenuissimè laciniatum: quod 2. in Prodromo. an Chondrillæ τραγονπωγωνίδης alia species, Thallio.

VI. Tragopogon Coronopi folio.

Chondrilla τραγονπωγωνίδης major, Thal.

Duplex est: major, minor quæ sola magnitudine à priori differt.

VII. Tragopogon hirsutum.

Tragopogon Apulum hirsutum humile, Col.

VIII. Tragopogon hirsutum venenatum.

Tragopogon ex Sicilia venenatum, Cæf. quid?

IX. Tragopogon gramineo folio radice villosa.

Barbula hirci minor, Tab.

Tragopogon minus, Ger.

X. Tragopogon parvum ex luteo purpureo rascens.

Tragopogon parvum flore Chondrillæ purpureo cæruleæ, Lob. ob.

an Barbula hirci minor ex Ilva, Cam.

Tragopogon purpureo flore.

I. Tragopogon purpureo cæruleum porri folio, quod Artin vulgo.

Tragopogon alterum, Matth. Lugd.

Tragopogon, Dod. Lob. puniceum, Gefn. hort. purpureum, Ger. Eyst.

Tragopogon sylv. flore purpureo, Cæf.

Barbula hirci altera, Matth. Cast. purpureo cærulea, Taber.

Barba hirci flore purpureo, Cam.

Gerontopogon flore puniceo, Gef. col.

Gerontopogon sive Salsifica Italicorum, Lugd.

Flore est purpureo cæruleo, nigro purpureo, cæruleo: albo in Apennino Camerarius notavit.

II. Tra-

II. Tragopogon purpureoceruleum croci-
folium.

Tragopogon crocifolium montanum, flore ni-
gro purpureo, Col.

III. Tragopogon gramineis folijs hir-
sutis.

Tragopogon alter gramineo folio suaveru-
bente flore, Col.

S C O R Z O N E R A.

Scorzoneræ nomen est Hispanicum, à scorzo vipera, vel à serpente scorzone: quare idem est ac Viperina
aut Serpentaria, quod contra viperarum & serpentum venena efficax sit. Sunt qui ad Chondrillam
Dioscoridis referant, sed magis ad Tragopogonis genus reducenda.

Scorzoneræ latifolia.

I. Scorzoneræ latifolia sinuata.

Scorzoneræ Hispanica, Matth. Lugd. Cast. Tab.

Scorzoneræ, Dod. Lob. Lon. Cæs. Cam. latifolia,

Thal.

Scorzoneræ major Hispanica prima, Clus. hist.

Scorzoneræ Germanica, Tab.

Tragopogon peregrinus vel Hispanicus, Gesn.

hort.

Viperaria Hispanica humilis, Ger. ico.

Ratione saporis radices duplex: communi-
ter est subdulcis, ita ut à Tragopogone nihil
ferè distet: altera radice est amara Gentianæ
instar, & hoc *ῥιπορτωνόγωνα* veterum, Thalius
censet. Floribus simplicibus & plenis Came-
rarius notavit.

II. Scorzoneræ latifolia altera.

Scorzoneræ Boëmica, Matth. Lob. Lugd.

Scorzoneræ major, vel pannonica prima, Clus.

pan. & hist.

Scorzoneræ Germanica, Tab. latifolia German.

Eyftett.

III. Scorzoneræ folijs nervosis.

Scorzoneræ altera, Lob. ico.

Scorzoneræ Germanica angustifolia, Tab.

Viperaria humilis, Ger. ico.

IV. Scorzoneræ latifolia humilis nervosa.

Scorzoneræ humilis latifolia sive secunda, Clus.

pan. Pannonica 2. Eid. hist.

Scorzoneræ Pannonica, Tab.

Viperaria Hispanica, Ger. ico.

Scorzoneræ angustifolia.

I. Scorzoneræ angustifolia prima.

Scorzoneræ humilis angustifolia & Pannonica
tertia, Clus. pan. & hist.

Scorzoneræ Pannonica angustifolia, Tab.

Viperaria Pannonica angustifolia, Ger.

II. Scorzoneræ angustifolia altera.

Scorzoneræ Pannonica 4. vel Scorzoneræ humi-
lis fibrosa radice, Clus. pan.

Scorzoneræ tenuifolia prima, Thal.

Hieracium septimum Clus. hist.

Hæc radice est dulciuscula, aut amara.

III. Scorzoneræ angustifolia subcærulea.

Scorzoneræ Pannonica 5. vel major angustifo-
lia, Clus. pan.

Scorzoneræ tenuifolia altera, Thal.

Scorzoneræ angustifolia elatior Pannonica 4.
Clus. hist.

Variat folijs angustioribus, calyculis bre-
vioribus, semine crassiore & brevior.

C A L T H A.

Caltham Poëtarum hanc esse volunt, quam aliqui ab aureo colore floris, Chrysanthemum nominant, &
quidem Dioscoridis lib. 4. cap. 58. At Columna in Phytobas. Clymenum Dioscoridis lib. 4. cap. 13.
censet. Alij ad Caltham Plinij lib. 21. cap. 6. alij ad Gromphnam ejusdem, lib. 26. cap. 7. referunt. Dale-
champius à ceruo ipsius flore Cerinthen putat.

I. Caltha vulgaris.

Calendula, Brunf. Trag. Dod. ut: Ang. Gesn.

hort. Cæs. Cam. fativa, Tab.

Caltha, Matth. Fuch. Tur. Lon. Lugd. Cast.

Caltha Poëtarum & Chrysanthemon ocula-
tum verius Dioscoridis, Ad.

Chrysanthemum, Lob.

Calendula simpliciflora, Ger. Eyft.

Clymenon Dioscoridis, Col.

Flore est pallido, citrino, ruffo: quæ Calen-
dula lutea medioruffa, Eyft. aliquando reflore-
scit & fruticosa evadit.

II. Caltha polyanthos maxima.

Calendula multiflora maxima, Tab. Ger.

III. Caltha polyanthos major.

Calendula lutea, flore pleno, Eyft.

Mm 2

Variat

Variat flore majore, minore, ejusque colore aureo, vel melino: hinc tres figuræ apud Tab. & Ger.

Calendula major polyanthos flore aureo.

Calendula polyanthos flore aureo.

Calendula sativa polyanthos melina.

IV. Caltha floribus reflexis.

Chrysanthemum sive Caltha reflexis floribus, Lob. ico.

Calendula multiflora orbiculata, Tab. Ger.

V. Caltha prolifera majoribus floribus.

Chrysanthemum proliferum, Lob. ico.

Calendula prolifera, Cam. Tab. Ger. Eyft.

VI. Caltha prolifera minoribus floribus.

Chrysanthemum proliferum alterum, Lob. ico.

Calendula prolifera 2. Taber. major prolifera, Ger.

VII. Caltha arvensis.

Calendula circa Monspelium sponte, Gef. hor.

Calendula fylv. minor, Cæf.

Calendula arvensis, Tab. Ger.

Folijs crenatis circa Monspelium reperimus.

VIII. Caltha humilis & minima: in Phytopinece descripta.

IX. Caltha palustris flore simplici.

Caltha Virgilij, Trag.

Tussilago altera, Matth.

Dotterblumen/Dod. gal.

Chamæleuce, Ang. Tur.

Chelidonia palustris, Cord. hist.

Caltha palustris, Gefn. hort. (Ferraria quibusdam, forte à forma folij ferream soleam referentis,) Dod. Adv. Lob. Lugd. (& Malacocylus major) Cam. Ger.

Caltha palustris vulgaris, Clus. hist.

Chrysanthemum Lon.

Epimedium Dodonæi, Thal.

Amellus Virgilij putatus, Eid.

Farfugium, Cast.

Populago, Tab.

Est flore majore & minore: hinc apud Tab. & Ger. nomine

Populaginis majoris & minoris, Tab.

Calthæ palustris majoris & minoris, Ger.

Marem & fecminam facit Gef. I. de col. Stirp. illam ramulis rubentioribus, flore magis tincto: hanc minorem, albioribus ramulis, & flore minus tincto scribit.

X. Caltha palustris flore pleno: & Cam. & Clus. hist.

Caltha palustris floribus densis, Gefn. hort.

Populago multiflora, Tab.

Caltha palust. multiplex, Ger. fl. multip. Eyft.

In Anglia sponte & plenius & odoratis floribus reperitur, Camerario autore: nobis hortensis est.

HELENIUM ET FLOS SOLIS.

Est vero Dioscoridi lib. 1. cap. 27. Helenium Plinio lib. 21. cap. 10. quod è lacrymis Helena natum dicatur, & ideo in Insula Helena laudatissimum esse: quo loci Plinius Aegyptiacum Dioscoridis proponit. Panax Chironium Theophrasti hist. 10. quibusdam censetur.

Genera duo Dioscoridi: alterum solijs Verbasci, quod nostrum vulgatum est, ac à Plinio lib. 19. cap. 5. & lib. 20. c. 5. Inula dicitur: Alterum Aegyptiacum, quod Helianthe est flore albo, de quo inter Cisti genera.

I. Helenium vulgare.

Enula campana, Brunf. Cam.

Elenion, Trag.

Enula, Tur. Lon. Cæf.

Helenium, Brunf. Matth. Dod. ut: Cord. in

Diosc. Lac. Gefn. hort. Ad. Lob. Cast. Cam. Tab.

Ger. Eyft.

Helenium 1. Dioscoridis, Ang.

Inula, vulgo Enula campana, quod, quæ in campis provenit, hortensi præferatur, Gefn. hort.

Panax Chironium Theophrasti, Ang. Cord.

II. Helenio similis peregrina.

Faalim, Theveti: hujus iconem ex Theveti

Cosmag. Lugd. habet: quid est?

III. Helenium Indicum maximum.

Planta maxima, Cortuso in epist. ad Matt. edit.

Ital. præfixa, Cast. cui & Bellis Pliniana.

Solis flos Peruvianus, Lob.

Chrysanthemum Peruvianum, Dod. Lugd.

Helianthemum Peruvianum, Cam. ep.

Herba Solis, Monardi.

Sol Indianus, Lon.

Helenium Indicum, Cæf.

Corona Solis, Tab.

Flos Solis gigantea, corona regia, crater Jovis,

amoris tuba, rosa Hiexicontis, Frag.

Flos

Flos Solis major, Ger. Eyft.

Flos à Sole dictus: Joseph. Acosta l. 4. c. 27.

an Planta prægrandis flore Calendulæ forma, ex cuius semine panem & pulres in Virginia conficiunt: in desc. Virginiae.

Variat magnitudine foliorum & florum, caulis altitudine: adolefcit enim in Hispania ad 24. pedes. Flos (cujus folia in aliquibus longiora) aliquando tantæ magnitudinis, ut 2362. femina inventa fuerint: quem aliqui album videntur.

IV. Helenium Indicum ramosum.

Chrysanthemum Peruvianum alterum, Dod.

Helianthemum Peruvianum proliferum, Cam.

Flos Solis ramosus, Cam.

Corona Solis 2. Tab.

Flos Solis minor, Ger.

Flos Solis prolifer, Eyft.

In Italia viginti quatuor flores in una planta, plures in Hispania, sæpius conspiciuntur: in Germania etiam decem & plures observavimus.

V. Helenium Indicum medium laciniato folio.

Solis flos minor, Lob. Lugd. Cam.

VI. Helenium Indicum minus.

Corona Solis minor femina, Tab.

Flos Solis minor femina, Ger.

Ambo enim marem & femina exhibent.

VII. Helianthemum Indicum tuberosum.

Flos Solis Farnesianus, sive Alter Peruvianus tuberosus, Col.

Chrysanthemum latifolium Brasilianum, in Prodromo.

Chrysanthemum à Canada quibusdam.

Canada & Artischoki sub terra, alijs:

Gigantea, Burgundis.

SECTIO QUINTA.

PERFOLIATA; BUPLEURUM; CENTAURIUM MINUS;
GRATIOLA; HYPERICUM; CORIS; SYMPHYTUM PETRÆUM;
POLYGONUM; ANTHYLLIS; SEDUM; COTYLEDON; ALOE.

PERFOLIATA.

Perfoliata dicta, quod singula folia caulis penetret: quam alij Cacaliam Dioscoridis lib. 4. cap. 123, suspicantur: alij Coryledonem ejusdem lib. 4. cap. 92. pronunciarent, ni radix obstatet. Alij Sefeli Æthiopicum ejusdem lib. 4. cap. 61. censent.

I. Perfoliata vulgatissima, sive arvensis.

Perfoliata, Brunf. Matth. Fuch. Eric. Cord. Dod.

at: Ang. Gesn. hort. Lon. Cord. hist. Lugdun.

Tab. Eyft.

Perfoliata vera, Thal. vulgaris, Ger.

Perfoliata major, Trag.

Cacalia, Lac.

Perfoliatum vulgatus flore luteo folio umbi-

licato, Ad. Lob.

Sefeli Æthiopicum Dioscoridis, Cæs.

II. Perfoliata flore multiplici.

Perfoliata crispa ceu muscosa, Cam.

III. Perfoliata montana latifolia.

Perfoliata montana, Gesn. Lugd. Cam.

IV. Perfoliata montana flosculis parvis.

V. Perfoliata alpina latifolia minor: hæc

1. in Prodromo.

VI. Perfoliata alpina angustifolia major,

sive folio anguloso: hæc 2. in Prodromo.

VII. Perfoliata alpina angustifolia media: quæ 3. in Prodromo.

an Perfoliata largifolia Dalechampij, Lugd.

VIII. Perfoliata alpina angustifolia minor: quæ 4. in Prodromo.

IX. Perfoliata alpina gramineo folio, sive Bupleuron angustifolium alpinum.

Sedum petræum Bupleuri folio, vel Bupleuron petræum gramineo folio, Ponæ.

X. Perfoliata minor angustif. bupleuri folio. Odontitis lutea, Lugd.

Perfoliatum angustifolium montanum, Col.

XI. Perfoliata alpina angustifolia minima: vel Bupleuron angustifolium Pyrenaicum: 5. loco in Prodr. describitur.

an Sefeli Æthiopicum parvum folijs gramineis, Cæs.

XII. Perfoliata minor ramis inflexis: quæ 6. in Prodromo.

Mm 3

BU-

B U P L E U R O N.

Bούρα *veget* Hippocrati & Nicandro in Theriacis. Plinius lib. 8. cap. 22. Bupleurum meminit, ubi aliqui Ammi vulgaris intelligendum censent: licet Bupleuron Plinij, rectius Valeriana campestris, quæ etiam Lactuca agnina dicitur, tribui videatur. Quare alijs hoc nostrum Bupleuron, βοῦραγρις dicitur, cuius Theophrastus 7. hist. 8. inter olera mentionem facit: Et Buprestis Plinio lib. 8. cap. 22. Sunt qui ad Panaces Chironium Dioscoridis, alij ad Elaphoboscum referunt.

I. Bupleuron folio rigido.
Beupleurum, Ang. majus, Gefn. hort.
Elaphoboscum & Gracia Dei Gallis, Eid.
Bupleurum alterum latifolium, Ad. Lob. Dod.
Lugd.
Bupleurum latifolium, Tab. Monspeliensium,
Ger.
Panaces Chironium quorundam, Lugd.
II. Bupleuron folio subrotundo, sive vul-
gatissimum.
Herba vulneraria, Trag.
Isophyllon, Cord. hist.

Beupleurum, Dod. gal. Gefn. hort. Ad. Lugd.
Auricula leporis Monspeliensium, Gefn. histor.
anim.
Panax Chironium Dioscoridis, Lon.
Bupleurum angustifolium, Dod. Tab.
Bupleurum angustifol. Monspeliensium, Ger.
Bupleurum angustifolium herbariorum, Lob.
Sanamunda quibusdam.
Folia inferiora subrotunda, quæ in caule
longa & angusta sunt.
III. Bupleuron angustissimo folio.
Bupleuron minimum, Col.

C E N T A U R I U M M I N U S.

Centaurium duplex est: majus de quo supra capite de Lapatho: minus aliud, quod νοτίζουρον τὸ μικρόν
ή λυμνίον, quoniam loca rigua amer Dioscoridi lib. 3. cap. 9. At Theophrasto 9. hist. 4. πάλαι λεγόμενον
Panax tenuifolium dicitur. Plinio lib. 25. cap. 6. Centaurium alterum cognomine lepton, quod aliqui Liba-
dion vocant, quoniam secundum fontes nascatur: Fel terra propter amaritudinem summam dictum. Gallis
Exacon (ἀπὸ τῆς ἀναισθησίας ἀ medendo) quoniam omnia mala medicamenta potum è corpore exigat per alvum:
Tertia est Centauris cognomine triorchis, &c. hac Plinius.

I. Centaurium minus.
Centaurea, Brunf. Cæf. minor, Brunf.
Centaureum minus, Trag. Matth. Fuch. Ang.
Dod. ut: Tur. Cord. in Diosc. Gefn. Lac. Lon.
Cam. Thal. Lugd. Cast. Tab.
Centaureum minus flore rubro, Eyf. quod &
flore albo pingit.
Centaureum parvum, Ad. Lob. Ger.

Flos communiter è puniceo colore in pur-
pura rubet: aliquando albus est: rarius ferru-
ginei coloris. Variat etiam ratione foli, Theo-
phrasto 4. hist. 5. monente; in humidis enim,
altius excrefcit: in aridis, vix duas aut tres
uncias æquat.

II. Centaurium minus spicatum album: in
Phytop. Matth. & Prodromo descriptum.

III. Centaurium luteum perfoliatum,
Perfoliata Achillæa, Gefn. hort.
Centaureum luteum, Adv. Clus. hispan. prius,
Lugd. Eyf.

Centaurium floribus luteis sive citreis pallidis
Mesuæi, Lob.
Centaurium luteum perfoliatum, Cam. ep.
Achilleos, Cæf.
Centaurium parvum flavo flore, Clus. histor.
luteum, Ger.
Centaurium minus luteo fl. perfoliatum, Tab.
Hoc videtur Achilleon vera Plinij l. 25. c. 5.
quam scribit esse scapo cæruleo pedali, sine ra-
mis, ex omni parte singulis folijs rotundis ele-
ganter vestitam: vulneribusque mederi. Et
Mesuæo, lib. 2. purg. 10. Centaurium floribus
citreis pallidis.

Duplex est: alterum folijs angustioribus &
non perfoliatis: alterum latioribus & caulem
ambientibus: caule ramoso & non ramoso, &
hoc est

Centaurium luteum alterum, Lugd.
IV. Centaurium luteum pusillum.
Centaurium luteum novum, Col.

G R A T I O L A.

Gratiola sive Gratia Dei nomen, recentior ætas tribuit, propter singulares vires, tam per superiora, quam
per inferiora humores expurgandi, & recentia vulnera consolidandi: Hac veteribus indicta videtur,
quæ amvis

quámvis aliqui Papaver spumeum Dioscoridis l. 4. c. 67. alij Eupatorium Mesues esse velint. Centaurida alij faciunt, nec male cum Centaurij minoris species esse videatur: & inter spurias Centaurij minoris appellationes, Helleborines & Multiradicis appellationes exstant, quæ Gratiola competere videntur, cum Hellebori modo purget, & radicibus complurimis firmetur. Sunt qui Persicariam minorem apud Sylvaticum credant.

Gratiola centauroides.

Gratiola, Matth. Dod. ur: Gesn. hort. Ad. Lob. Lugd. Cast. Cam. Tab. Ger.

Gratia Dei, Lac. altera, Cæs.

Gratia Dei, cujus semen Gelbenech, papaver spumeum forte, Ang.

Limnesium sive Centauroides, Cord. hist.

Eupatorium Mesue, Cord. schol.

Gratiola sive Centaurium aquaticum, forte Polemonium palustre amarum Hippocrati veterinario, Ges. col.

Gratiola vulgo dicta, quæ quibusdam verius Hyssopum vulgare censetur, Col.

Gratiola flore albo & Gratia Dei, Eyft.

Flos communiter purpurascens, aliquando albus, rarius luteus: folia minus magisve crenata.

HYPERICUM.

Yπερίκον οἰ δὲ Ἀνδροσαύμων, οἰ δὲ νόγρον, οἰ δὲ χαμαίαντρον, quoniam semen odore pineam resinam imitetur, Dioscoridis l. 3. c. 171. Et Plinio l. 26. c. 8. Hypericon quod alij Chamapitryn, alij Corion appellant. Perforata vulgo, quod folia soli obiecta innumeris foraminibus scaterere videatur: hinc & porosa quibusdam.

Genera: Dioscorides, præter vulgatum Hypericum & alterum sequenti capite exhibet, quod Ἀνδροσαύμων, οἰ δὲ Ἀνδροσαύμων dicatur, hyperici genus esse magnitudine distans, cum majus & fruticosius sit: & Androsæmon dici, quod fructus, qui resinosi odoris est, attritu digiti veluti cruententur. Et sequenti capite Ἀνδροσαύμων, οἰ δὲ Ἀνδροσαύμων, ab Hyperico & Ascyro differt, &c. Plinio l. c. & l. 26. c. 15, duplex est Hypericum: aliud oleraceo frutice tenui, cultu ali, rubente, &c. Aliud quod Corin appellant folio Tamariuci, &c. Eid. l. 27. c. 5. Ascyrum sive Ascyroides Hyperici genus est, cujus comæ trita veluti cruentant: qua de causa quidam hanc Androsæmon vocavere, Idem c. 4.

I. Hypericum vulgare.

Hypericum, Brunf. Matth. Fuch. Ang. Tur. Lac. Lon. Dod. Ad. Lob. Cæs. Lugd. Cast. Cam. Tab.

Ger. Eyft.

Herba perforata, & Hypericum vulgare, Trag.

Ascyron, Dod. gal. Cord. in Diosc.

Androsæmon minus, Ges. col.

Apud Dioscoridem inter Rutas sylvestres (cum ipsius species credatur) hujus descriptio etiam legitur.

Folijs modo latioribus, modo angustis variat, quod Tragus duabus figuris expressit: caules quoque ejus, quod in humentibus provenit, quadrati sunt, alibi verò rotundi. Hujus etiam minor species caule quadrangulo, folijs non perforatis.

II. Hypericum numulariæ folio: quod in Prodromo describitur.

III. Hypericum folio brevior.

Hypericum Syriacum & Alexandrinum, Lob.

Hypericum Syriacum, Lugd. Ger.

Hypericum Alexandrinum, Tab.

IV. Hypericum minus erectum.

Hypericum pulchrum vel quartum, Trag.

Androsæmon, Lon.

an Hyperici minor species, Thal.

Hoc cum utriculis circa caulem reperitur.

V. Hypericum minus supinum, vel supinum glabrum.

Hypericum exiguum & primum, Trag.

Hypericum minus, Ges. col. Dod.

Hypericum minimum supinum Septentrionale, Lob.

Hypericum supinum 3. minimum, Claf. hist.

Ascyro adpinxit, Cam. ep.

Hoc interdum exiguum est, aliquando magno cespite serpit: hoc Lobelius in obser. illud in iconibus expressit.

VI. Hypericum supinum tomentosum majus, vel Hispanicum.

Hypericum supinum, Claf. hisp. tomentosum Hispanicum, Eid. hist.

Hypericum minimum supinum Septentrionale, Lob. obs. ico.

Hypericum humistratum, Lugd.

Ruta sylvestris Dioscoridis, Johanni Placæ, quæ à Ruellio inter notha rejecta.

VII. Hypericum supinum tomentosum minus, vel Monspeliacum.

Hypericum supinum, Dod.

Hyper-

Hypericum alterum tomentosum, Ad.

Hypericum tomentosum, Lob. Lugd. Tab. Ger.

Hypericum tomentosum secundum, Clus. hist.

Androsæmum album Dalechampij, Lugd.

Lobelius cum priore idem dicit: at Clusius negat idem esse.

Hypericum Ascyron dictum.

I. Ascyrum supinum villosum palustre.

Ascyrum supinum *ἐλωδύς*, Clus. histor. ap. alt. auctario.

II. Ascyrum, sive Hypericum bifolium glabrum non perforatum.

Hypericum in dumetis nascens primum, Trag.

Ascyrum, Matth. ep.

Androsæmon, Matth. fol. Fuch. Tur. Lac. Cord.

in Diosc. Cast. Gef. col. (& Ascyroides) Cast.

Hypericum aliud, Dod. gal.

Androsæmon Campoclarense, Col.

III. Ascyrum magno flore: in Prod. describitur.

IV. Androsæmon hirsutum.

Hypericum in dumetis nascens 2. Trag.

Androsæmon, Matth. ep.

Ascyrum, Matth. Fuch. Ang. Tur. Lac. Gef. col.

Dod. Ad. Lob. Lugd. Cast. Thal. Cam. Cæf.

Hypericum, Dod. gal.

Androsæmon alterum hirsutum, Col.

V. Androsæmon alterum folijs Hyperici, quod aliquibus Hypericoides.

Androsæmum magnum, Ad.

Androsæmon, Lob.

Ruta sylv. Hypericoides, Dod.

VI. Androsæm. perfoliatum & perforatum.

Androsæmon alterum Apulum, Col.

VII. Androsæmon maximum frutescens.

Androsæmum, Dod. ut: Gef. hort. Lugd. Cæf. majus, Cam.

Androsæmum aliud, Lugd.

Clymenum, Ang. Gef. hort. Cast. ico.

Clymenum Italorum, Ad. Lob. Ger.

Siciliana, Gef. hort. Col. Eyf.

Herba Siciliana, Tab.

Androsæmon Diosc. Galeni & Plin. & Cente-

ria Theophrasti, Cæsalpino.

Clymenon Plinij 1. 25. c. 7. Anguillaræ, quod po-

tius Periclymenum Dioscoridis est.

VIII. Androsæmum foetidum, capitulis lon-

gissimis filamentis donatis.

Tragium Creticum, Bellon.

Tragium, Belli ep. 3. ad Clus. legitimum, Ponæ.

Androsæmum minus, Cam.

Ascyrum legitimum, vulgo *ἀνθόλας*, Belli ep. 1.

ad Clusium.

Androsæmum foetidum seu tragodes, Eyf.

C O R I S.

Koriscus quod aliqui Hypericum vocant, Dioscoridi 1. 3. c. 17. 4. frutex est folio Ericæ: Et Plinio 1. 26. c. 8. est aliud Hypericum, quod alij Corin appellant, folio tamaricis.

I. Coris lutea.

Coris, Matth. Gef. hort. Lac. Lob. Lon. Cæf.

Lugd. Cast. Cam. Tab.

Coris Matthioli, Ad.

Coris legitima Ericæ similis, Belli ep. 1. ad Clus.

Coris legitima Dioscoridis, Ponæ.

II. Coris cærulea maritima.

Coris Monspelica, Ad. Lob. Cam. Tab.

Coris quorundam, Clus. hisp. & hist.

Flore est cæruleo, rarissime rubro.

S Y M P H Y T U M P E T R Æ U M.

Συμφύτον πετρεῖον in petris nascitur, ramulis Origano similibus, folijs Thymi, &c. Dioscoridi lib. 4. c. 9. Alim nos vocamus, Græci Symphytum petræum: nascitur in petris, ideo petræum cognominatum, &c. Plinius lib. 27. cap. 6.

Symphytum petræum folijs Thymi.

Symphytum petræum, Mat. Lac. Lon. Lug. Tab.

Symphytum petræum Matthiolo creditur, Ad.

Symphytum petræum Matthioli, ad Coridem

Gallicam plurimum accedere videtur, Cl. hist.

Hoc ex agro Goritensi, ubi & Matthiolus no-

tavit, à Doct. Agerio accepimus: quod à Coride

Monspelica diversum est.

P O L Y G O N U M.

Πολύγωνος Dioscoridi 1. 4. c. 4. à copiosis geniculis, quibus caules cinguntur, dictum. Plinio 1. 27. c. 12. Polygonon Græci vocant, quam nos Sanguinariam.

Genera

Genera duo Dioscoridi, mas & femina, de qua inter Equiseti species: mas, à seminibus sub singulis folijs
turgescens, flos ei candidus, aut puniceus, Plinius l.c. qui plura genera Polygoni faciunt, hanc marem intel-
ligi volunt, appellariq; à multitudine seminis, aut densitate fruticis Calligonon. Alij Polygonaton, à frequentia
geniculorum, &c. ubi quatuor genera recensentur: primum est Polygonum vulgare: alterum Herniaria: ter-
tium Polygonum femina Dioscoridis: quartum quibusdam Castia lignea Monspeliensium videtur: sed rectius
tribuitur ei plantæ, quam Polygoni nomine Clusius proposuit.

Polygonum majus.

- I. Polygonum latifolium.
Herba proserpinaca (à serpendo) Apulejo.
Centumnodia, Brunf.
Polygonon, sive Polygonaton & Corrigiola,
Eric. Cord.
Polygonum masculum, Trag. Lac.
Polygonum mas, Matt. Fuch. Dod. ut: Ang Cor.
in Diosc. & Sanguinalis mascula à cohibendo
sanguine) Gef. hor. Cæf. Thal. Lugd. Cast.
Polygonum primum, Tur. vulgare, Cam.
Polygonum mas vulgare (Sanguinaria, Cen-
tumnodia) Ad. Lob. Ger.
Polygonum majus, Lon. Tab.
Aliud flore est candido, aliud ex purpura can-
dicante, vel rubente.
- II. Polygonum oblongo angusto folio.
- Polygonum tertium, Tab.
- III. Polygonum brevi angustoque folio.
Polygonum secundum, Tab.
Polygonum mas minus, Ger.
an Polygonum masculum fruticosum, Thal.
- IV. Polygonum saxatile: quod primum in
Prodromo.
- V. Polygonum maritimum latifolium.
Polygonum marinum maximum, Ad. Lob. ico.
Polygonum marinum, Lob. ob. Cam. ep. & hor.
Polygonum marinum prius Dalechampij, Lugd.
Polygonum tertium in maritimis, Cæf.
Flosculis est purpurascens, est & albis.
- VI. Polygonum maritimum angustifolium.
Polygonum marinum alterum Dalech. Lugd.

Polygonum minus.

- I. Polygonum cocciferum: & Cam. ep.
Radicebus coccum adnascitur elegantissimo
colore commendatum.
- II. Polygonum angustissimo & acuto vel
gramineo folio minus repens.
Polygonum, Germanis Knawel/ Trag.
Polygonon 3. Dod. gal. exiguum, Eid. fol.
Saxifraga Anglica, Ad. Lob. ico. Lugd.
Polygonum minus seu femina, Lon.
Polycarpon à feminis copia, Lugd.

Polygonum minus polycarpon, Tab.

Polygonum felinoides sive Knawel, Ger.

Varietas magna in hac planta observatur.

III. Polygonum gramineo folio majus e-
rectum.

Polygonum minus alterum, Tab.

Anthyllis Valentina Clusij, Ger. ico.

IV. Polygonum angustissimo folio affinis.

Hæmorrhoidalis, quæ ad Caryophylleorum syl.
classem referri debet, Clus. hist. ap. alt. ad l. 6.

Hæmorrhoidalis Aldroandi nomine, quæ à san-
guine sistendo nomen habeat, ex Italia, circa Ra-
vennam natam (etiam ex Valesia) accepimus.

V. Polygonum minus candicans.

Polygonum montanum minimum niveum &
sericeum, Ad. Lugd.

Polygonum montan. niveum minimum, Lob.

Paronychia Hispanica, Clus. hisp. & hist.

Polygoni Hispanici genus, Lugd.

Polygonum montanum, Tab. Ger.

an Herba Turca montana, Cæf.

Variat ratione ætatis, nam adulta paleaceas
membranulas niveas habet, quemadmodum
Adv. & Lugdun. pingunt: planta novella non
item, sicut Clus. & Lob. proposuere: Sic in Bel-
gio nata multum de candore suo remittit.

VI. Polygonum montanum vermiculata
folijs.

Vermiculata montana nova, Col.

VII. Polygonum Creticum Thymi folio:
quod 2. in Prodromo.

VIII. Polygonum littoreum minus floscu-
lis spadiceo albicantibus: quod 3. in Prodr.

IX. Polygonum minus tenuifolium: quod
4. in Prodromo.

X. Polygonum maritimum minus foliolis
Serpilli.

Polygonum alterum pusillo vermiculato Ser-
pilli folio, Ad. Lob. ico.

Polygonum alterum Serpilli folio, Lugd.

XI. Polygon. minus, seu Millegrana major.
Empetrum, Trag. Lon.

Polygonum minus, Matth. Cast.

Nn

Epipa-

Epipactis, Ang.

Millegrana, Cord. hist.

Herba cancri minor, Cord. sch.

Herniaria, Gef. hor. col. Dod. Lugd. (cui & Lithontribon ab effectu) Thal. Cam. Tab. Ger.

Herniaria multigrana serpillifolia, Ad.

Herba Turca, Lob. Cæs.

Polygoni genus Herniaria appellata, Clus. hist.

Hoc duplex est: aliud glabrum, aliud hirsutum. Est etiam Herniaria fruticosa viticulis

lignosis, foliis oblongiusculis, brevis, densissima.

XII. Polygonum minus lentifolium: quod 4. in Prodromo.

XIII. Polygonum minimum, sive Millegrana minima.

Millegrana minima, Lob. ico.

Herniaria altera, Thal.

XIV. Herba ad rupturas utilis Monardis; & ex eo Lugdunensis historia, quid est?

ANTHYLLIS.

Anthyllis Dioscoridi lib. 3. cap. 153. duplex est: altera folijs lenti similibus, mollibus: altera folijs Ajuga, de qua inter Chamæpitydes actum. Plinius lib. 26. cap. 8. illam Anthyllon vocat.

I. Anthyllis maritima Chamæfycæ similis,

Anthyllis marina Narbonensium altera, Chamæfycæ facie, Ad. Lob. ico. Lugd.

Huic similis aut eadem est:

Anthyllis Valentina, Clus. hisp. & hist. Lob. Lugd.

Peplion sive Peplis, Dod.

Chamæfycæ Dalecampij, Lugd.

II. Anthyllis maritima lentifolia.

Anthyllis prior lentifolia maritima Peplios effigie, Ad. Lob. ico.

Anthyllis prima, Cast.

Anthyllis Portlandiæ lentifolia Penæ, Lugd.

III. Anthyllis maritima Alsinifolia.

Paronychia altera, Matth. Lugd.

Paronychia, Ang. Tab.

Gramen secundum Plinij, Ang.

Anthyllis marina incana alsinifolia Narbonensium, Ad. Lob. ico. Lugd.

Centumgrana, Cæs.

παρὰνυχτα Dioscoridis l. 4. c. 54. & Gramen secundum Plinij l. 24. c. 19. Anguillara credidit.

Variat folijs modò subrotundis, modò oblongis.

IV. Anthyllis Chamæpitydes frutescens.

Anthyllis altera Chamæpity similis, Cord. in Diosc.

an Chamæpity vermiculata, Ad. Lob. ico.

an Chamæpity prima Dioscoridis Penæ, Lugd.

an Anthylloides minor, Thal.

SEDUM.

Anthyllis Dioscoridi lib. 4. cap. 89. Sedum dicitur, quia folia perpetuò vireant: quare Anthyllon nomen apud Theophrastum i. hist. 16. Sempervivum Gaza vertit: cui hoc à natura ut semper humidum, virideq; durare valeat, eidem Theophrasto 7. hist. 14.

Genera Dioscoridi tria sunt: magnum, parvum, & tertium, quod aliqui Αἰζόων, ὀξύλεον, ἡ τριτάτον, Romani ἰλλεεβραν illecebram vocant: quorum priora duo refrigerant, tertio vis est ex calfactoria. Plinio l. 25. c. 13. Aizoi duo genera: majus, quod aliqui Buphrthalmum vocant, alij Zoophthalmum, alij Stergetbron, quod amatorijs conveniat: alij Hypogeson, quoniam in subgrundijs ferè nascitur. Italis Sedum magnum, aut oculus, aut digitellus. Alterum minusculum, quod Eritiales vocant, alij Trithales, quia ter floreat, alij Chrysotribales alij Isoetes: Sed alij Itali Sedum, alij Aizoon utrumque, quoniam semper vireat: alij Sempervivum, &c. Huic similis quam Græci Andrachnen agriam vocant: Itali illecebram: hætenus Plinius secutus Diosc. Sedum, inquit Festus, alij Sadum appellant, herbam quam Opilius Aurelius Sefuvium vocari ait, eamq; in tegulis feri: hoc fortè factum, quod nonnullis locis plebis animos invaserit opinio, non feriri fulmine donum, in cuius tegulis Sedum vireat.

Sedum majus.

I. Sedum majus arborescens flosculis candidis.

Aizoon magnum Dioscoridis, si caulis altitudo & foliorum longitudo spectetur.

Sempervivum arborescens, Matth. Cast.

Sedum majus verum, Gefn. hort.

Sempervivum majus, Ang.

Sempervivum sive Sedum arborescens majus, Dod.

Sedum arborescens Græcum, Illyricum & Anglicum, sive maritimum, Ad.

Sedum arborescens majus Græcū, Lob. ico. Eysf.

Sempervivi majoris alterum genus, Cæs.

Sedum majus, Clus. hisp. legitimum, Eid. hist.

Aizoon arborescens, Lugd. Cam.

II. Sem-

II. Sempervivum arborefcens alterum, Matth. Cast. Lugd. An diversum à priore?

III. Sedum majus vulgare.

Aizoon magnum Dioscoridis, quoad postrema Dioscoridis verba.

Sempervivum majus, Brunf. Matth. Ger.

Umbilici Veneris species altera, Ang.

Sedum majus, Fuch. Cord. in Diosc. (& Vitalis major) Lac. Tab. magnum, Tur.

Sedum seu Sempervivum vulgare majus, Gesl. h.

Sempervivum primum, Lon. majus primum, Cæsalp.

Sempervivum majus, Dod. gal. Lob. Cast.

Sempervivum majus alterum sive Jovis barba, Dodon.

Sempervivum, sive Sedum majus crenatum

Myrthifolium, Adv.

Aizoon majus, Lugd. Cam.

Cotyledon altera prima, sive Sedum majus vul-

gare, Clus. hist.

Sedum vulgare, Eyf.

IV. Sedum majus montanum dentatis folijs.

Cotyledon altera montana, Clus. pan.

Cotyledon altera secunda, Eid. hist.

Aizoon sive Sempervivum majus, Thal.

V. Sedum majus montanum dentatis folijs

alterum.

Cotyledon altera montana minor, Clus. pan.

Cotyledonis alterius altera species, Eid. hist.

VI. Sedum majus montanum folijs non

dentatis, floribus rubentibus.

Cotyledon altera Taurica, Clus. pan.

Cotyledon altera tertia, Eid. hist.

Sedum minus flore rubente, Eyf.

VII. Sedum Nicotianæ flore.

Sedum Malagascaricum, Clus. exot. quid?

Sedum minus.

I. Sedum minus teretifolium album.

Sempervivum minus album, Brunf.

Sempervivum fœmina, Eid.

Sedum minus primum, Trag. Clus. hist. alte-

rum, Gesl. hort.

Sempervivum minus, Matth. Ang. Cast. Cæs.

Sedum minus, Lac. offic. Ger. manus fœmina,

Fuch.

Sedum fœmina, Tur.

Crassula minor, Dod. gal.

Sempervivum quartum, Lon.

Tragus herba, Cord. in Diosc.

Vermicularis & Illecebra major, Ad. Lob. Lug.

Vermicularis flore albo, Cam.

Aizoon minus fœmina, Lugd.

Aizoi minoris species, Thal.

Sedum minus hæmatodes secundum, Tab.

II. Sedum minus teretifolium alterum.

Sempervivum tertium, Lon.

Aizoon minus Matthioli, Lugd.

Sedum medium teretifolium, Ad. Lob. ico.

Sempervivum parvum, Lob.

Sedum minus alterum, Clus. hist.

III. Sedum minus teretifolium lateum.

Sedi minoris 2. species, Trag.

Sempervivum minus æstivum, Lob. Lugd.

Aizoon medium, Thal.

IV. Sedum minus folio circinato.

Aizoon dasphyllum, id est densifolium, Lugd.

Sedum minimum frigidum, Clus. hisp.

Sedum minus septimum, Clus. hist.

V. Sedum minus lateum folio acuto.

Sedum minus, Turn. mas, Fuch. hæmatodes,

Tab. Ger.

Sempervivum minus, Dod. gal. primū, Eid. fol.

Aizoon hæmatoides, Lob. ico.

Aizoon minus, Lugd.

Sedum minus quintum, Clus. hist.

VI. Sedum minus lateum ramulis reflexis.

Aizoon Scopioides, Lob. ico.

Aizoon minus flore luteo inflexo, Cam.

Sedum minus quartum, vel Sedum minus Dio-

scoridis primum, Clus. hist.

VII. Sedum arvense flore rubente: quod 9.

in Prodomo.

VIII. Sempervivum minus vermiculatum

acre.

Aizoon tertium, Dioscoridis.

Portulaca tertia, Brunf.

Sedum minus tertium & Vermicularis, Trag.

Sempervivum minimum sive 3. Matth. Cast.

Gramen 3. Plinij & Sempervivum 3. Ang.

Illecebra sive Sempervivum 3. Dod. ur:

Sedi tertium genus, Fuch. Lac. Tur.

Aizoon minus, quod malè pro Vermiculari ac-

capitur, Cord. in Diosc.

Aizoon acre, Cord. hist.

Sedum tertium Dioscoridis, Gesl. hort.

Sempervivum tertium, desc. at 2. ico. Lon.

Sedum minimum, Illecebra, Sedi tertium ge-

nus non sempervirens, Adv.

Sempervivum minimum sive Illecebra, Lob.

Sempervivum tertium minimum alterum, Cæs.

Nn 2

Aizoon

Aizoon minus fervidi gustus, Thal.

Aizoon minimum repens, tertium Diosc. Lug.

Sedum minimum, Tab.

Vermicularis sive Illecebra, Ger.

Sedum minus octavum causticum, Clus. hist.

Sedum minus seu minimum causticum, Eyst.

Aizoi facie planta quæ Dactylon 2. vel 3. Col.

IX. Sempervivum minus vermiculatum insipidum.

Aizoon minimum, Cord. hist.

Sempervivum tertium minimum, Cæs.

Aizoon minus & Vermicularis insipida, Thal.

Sedum minus, seu Vermicularis insipida, Eyst.

A priore non solum gustu differt, sed etiam foliolis magis teretibus & tenuibus: floribus est utraque luteis, rarius albis.

X. Sedum minus fruticosum.

Sedum minimum arborecens vermiculatum, Lob. Lugd.

an Polygonum masculum fruticosum, Thal.

XI. Sedum minus fruticosum alterum.

Vermiculatæ fruticis varietas major, Lob.

Vermiculatus frutex major, Lugd.

Calsiæ lignæ similis frutex tertius, Cæs.

An sit Chamæpitys altera Diosc. dubitant,

Lob. & Lugd. hist. Selaginem Plinij Cæsalp. su-

spicatur, & quibusdam Sempervivum mariti-

um, aut Vermiculariam arborecentem dici.

XII. Sedum Portlandicum, Ad. Lob. ico. quid?

Sedum saxatile & alpinum.

I. Sedum alpinum Saxifragæ albæ flore, vel

grandiflorum.

Sedum minimum tertium, Lob. Lugd.

Sedum ferratum, Dod. quoad ico.

an Sedum alpinum quartum, Col. part. 2.

II. Sedum alpinum album foliolis compactis.

Sedi aut Phylli genus flosculis albis, Gesn. fra.

Sedum alpinum tertium, Clus. pan.

Sedum minus nonum, sive alpinum tertium,

Eid. hist.

III. Sedum alpinum hirsutum lacteo flore.

Sedum alpinum quartum, Clus. pan.

Sedum minus decimum, sive alpinum quartum,

Eid. hist.

Jasme montana, Lugd.

IV. Sedum alpinum gramineo folio lacteo fl.

Sedum alpinum quintum, Clus. pan.

Sedum minus undecimum, alpinum 5. Eid. hist.

V. Sedum alpinum flore pallido.

Sedum alpinum primum, Clus. pan.

Sedum minus sextum, sive alpinum primum, Eid. hist.

VI. Sedum alpinum angustifolium, flore carneo.

Sedum alpinum secundum, Col. part. 2.

VII. Sedum alpinum exiguis folijs.

Sedum alpinum primum, Col. part. 2.

VIII. Sedum saxatile hirsutum purpureum: quod 5. in Prodromo.

IX. Sedum saxatile atrorubentibus floribus: quod 6. in Prodromo.

X. Sedum saxatile variegato flore: quod 7. in Prodromo.

XI. Sedum alpinum hirsutum luteum.

Sedum saxatile folijs margine piloso, Gesn. hort.

Phyllon thelygonon, Dalech. in Diosc.

Phyllon arrhenogonon Dalechampi, Lugd.

Sedum petraeum montanum, Ad. Lob. ico.

Sedum alpinum sextum, Clus. pan.

Sedum minus duodecimum, alpinum 6. Cl. hist.

Leucoion luteum aizoides montanum, Col. p. 2.

XII. Sedum alpinum folijs crenatis asperis: quod 8. in Prodromo.

an Sedum. cujus folia marginibus asperis brachias piscium referunt, Gesn. hort. (folijs.)

XIII. Sedum alpinum floribus luteis maculosis, Gesn. fra.

XIV. Sedum alpinum rubro magno flore.

Aizoon montanum, Lugd.

XV. Sedum montanum tomentosum.

Sempervivum rubrum montanum *var. p. d. folijs.* Colum.

XVI. Sedum alpinum ericoides purpureum: quod 3. in Prodromo.

XVII. Sedum alpinum ericoides caeruleum: quod 4. in Prodromo.

Sedum folijs laciniatis.

I. Sedum alpinum trifido folio.

Sedum septimum, vel alpinum Ajugæ folio, Clus. pan.

Sedum minus decimum tertium, Eid. hist.

II. Sedum tridactylites alpinum majus albu.

Alpine tridactylites alpina, in Phytop. (teum.)

Saxifraga alba petraea, Ponæ.

III. Sedum tridactylites alpinum pallide lu-

IV. Sedum tridactylites alpinu caule folioso:

hæc tria in Prodromo sub Sedo 1. describuntur.

V. Sedum tridactylites alpinum minus: quod

2. in Prodromo.

Sedo

Sedo alpino tertio similis altera, Colum. part. 2.
VI. Sedum tridactylites tectorum.

Händelstraut/Trag.

Paronychia altera, Dod. rutaceo folio, Adv.

Lob. Lugd. Ger.

Umbilici species quibusdam, Cæs.

Dactyliobotanon alterum, Thal.

Alpine petraea rubra, & Paronychia tertia,

Tabern.

Paronychia laciniata, Ger.

Sedum palustre.

I. Sedum palustre subhirsutum purpureum.

Sedi minoris quarta species, Trag.

Sedum palustre secundum, Clus. pan.

Sedum minus tertium, sive palustre, Eid. hist.

Aizoon palustre, Cam.

Sedum palustre flore incarnato, Eyst.

Hujus species est altera major & candidior:
altera minor & rubicundior, seu mas & femina:
flos purpurascens aut carnei coloris.

COTYLEDON SEU UMBILICUS VENERIS.

K Ojod. Aler Dioscorides lib. 4. cap. 92. Sedo subjungit, quod ipsi & ονυχάριον & ομφαλίδιον dicitur:
quod a figura folij Acetabulo simili nomen accepit: hinc Latinis, Acetabulum & Umbilicus Veneris.
Plin. lib. 25. cap. 13. Cotyledon.

Genera duo sunt Dioscoridi: alterum folio acetabuli instar orbiculato & concavo, ita tamen ut
cavum id aciem prope fugiat: alterum latioribus folijs, ijsq; pinguibus, ac ceu lingulas referentibus,
densis & confertis circa radicem, & velut oculum in medio constituentibus, &c. Et Plinio, alterum
folio est pingui & concavo, ut coxendices: aliud sordidis folijs, latioribus, densioribusq; circa radicem,
velut oculum cingentibus, &c.

I. Cotyledon major.

Umbilicus Veneris, Matth. Lac. Tur. Lob. ico.

Cæs. Cast. Lugd. Tab. Ger. major, Lon.

Umbilici Veneris species prima, Ang.

Cotyledon, Dod. ut: Ad. Lob.

Cotyledon sive Umbilicus Veneris, Clus. hisp.

& hist.

II. Cotyledon media folijs subrotundis.

Umbilicus Veneris alter, Matth. Lac.

Cotyledon altera, Dod. ut: Clus. pan. Lugd.

Cotyledon altera quarta, Clus. hist.

Phyllum thelegonum Dalechampi, Lugd. sive

Lichen primum Plinij & sempervivum mon-

tanum.

III. Cotyledon media folijs oblongis fer-

ratis.

O. oblerum Hippocratis, Ang.

Aizoon ferratum, Cord. histor. Thal. cui &

Crassula serrata.

Cotyledon minus sedi folio, Ad. Lob.

Umbilicus Veneris, Lob. ico. minor, Lon. Tab.

Ger.

Phyllon primum, Cæs.

Palmaria, Tabern. talis antequam caulem pro-

ducat.

Cotyledon minus, Eyst.

IV. Cotyledon media subhirsuta floribus

punctatis.

Sedum folijs minoribus albicantibus serratis,

Gesh. hort.

Cotyledon minus montanum alterum, Lob. ico.

Cotyledon altera Etcheriana, Clus. pan.

Cotyledon altera quinta, Clus. hist.

V. Cotyledon minor folijs subrotundis fer-

ratis: in Prodomo describitur.

VI. Cotyledon stellata.

Aizoon peregrinum, Cam.

Sempervivum tertium, Col.

A L O E.

A loen Græci, Latini & officina pariter, Aloën tum herbam ipsam, tum & ejus succum densatum
appellant, dicitur & stirps ἀλφίβιον quod non modò in terra, sed & extra eam vivat. Aloë
autem dicta videretur, quia maritimis gaudet. A recentioribus Sempervivum & Sempervivum marinum,
quod Sempervivi modo diu dureret, appellatur: Sedum amarum Columella: & quia ejus succus amarus est,
idcirco & Gentianam, quæ amarissima est, Aloën Gallicam Apulejus nominavit. De Aloë Dioscorides lib. 3.
cap. 25. quod folium habeat Scille similitudine, crassum, pingue, in rotunditate modicè latum, retrorsum
pandum: utrinque spinulis rarè & brevibus, &c. & Plinius lib. 27. cap. 4.

Nu 3

I. Aloë

I. Aloë vulgaris.

Aloë, Trag. Matth. Fuch. Ang. Dod. ut: Cord.
Lac. Tur. Gefn. hort. Lon. Ranvvolff. (quæ in
Rama Judææ copiosa) Ad. Lob. Cæf. Cast. Garz.
Cluf. hift. Eyft.

Aloë communis, Cam.

Aloë Dioscoridis, Col.

Aloë in insula Socotra, part. 2. Ind. Or. c. 6.

Aloë five Sempervivum, Arab. Sebar, Area, Ca-
tecomor, Linc. part. 4. Ind. Or. c. 38. & fig. 19.

Azauar five Sempervivum, quo campi pleni,
part. 4. Ind. Or.

II. Aloë folio in oblongum aculeum abe-
unte.

Aloë Americana, Dod. Cluf. hisp. & hift. Cast.
Cam. Lugd. Tab. Eyft.

Aloë in Pisano vireto, Ad.

Aloë folio mucronato, Lob. Ger.

Aloë, Acoftæ.

Aloë alterum genus, Cæf.

Allagucy Indis, Fil y agulla, id est filum & acus
Hispanis, cujus spinæ venenatæ, Frag.

Aloë spinosa five Americana, Cam.

America planta Aloës facie, Col.

Manguey Mexiocanum, alio nomine Metl,
Linc. part. 4. Ind. Or. fig. 19.

Manguey arbor, ex qua parantur aquæ, vina,
oleum, acetum, mel, fyrupi, fila, acus, & res
aliæ infinitæ, in nova Hispania, quarum ple-
rumque unam domibus suis, ad vitæ sustenta-
tionem confitam, colunt, &c. part. 9. Ind. Or.
lib. 4. cap. 23.

Ex folijs succus dulcis elicitur: & ijsdem
contufis & maceratis linum extrahitur, ex quo
Indi lintea candidiffima texunt.

III. Aloë monstrosa Avinioni nata: de qua
in Prodomo, & ad Cluf. cur. post.

IV. Aloë palustris.

Stratiotes potamios, Dod. gal.

Planta folijs Aloës, quæ Stratiotes non est, An-
guil.

Sedum aquatile, Dod. fol.

Stratiotes five Militaris aizoides, Ad. Lob.

Stratiotes aquatica, Lugd.



SECTIO SEXTA.

RADIX RHODIA; TELEPHIUM; SCORPIOIDES;

PORTULACA; CEPÆA; CRITHMUM; KALI; TRA-

gum; Tithymalus; Pityusa five Esula; Apios five Tithyma-

lus tuberosus; Peplus five Esula rotunda; Pe-

plis; Chamaeſyce; Lathyrus;

Hippophaës.

RADIX RHODIA.

Podia ῥῖζα Dioscoridi lib. 4. caput. 45. sic dicta, quod contrita rosas redoleat: hinc quibusdam
Rosea radix.

Rhodia radix, Trag. Matth. Ang. Dod. ut: Rhodia five rosea radix, Fuch. Adv. Lob.

Cord. hift. Gefn. hort. Lac. Cluf. pan. & hiftor. Rosea radix, Lon. Tab.

Lugd. Cast. Cam. Ger.

Flos nūc pallefcētis, nunc rubefcentis coloris

TELEPHIUM.

Tελεφῖον Dioscoridi lib. 2. cap. 217. Portulacæ simile, alas binas in singulis foliorum geniculis habens,
folijs caruleis crassis, lentis atque carnosiss refertum, flore luteo aut candido, &c. Et Plinio lib. 27. cap. 13.
Telephion & caule & folijs Portulacæ simile. Sic dictum volunt, quod ulceribus malignis ac deploratis, quibus
Telephus Mysia rex ab Achille vulneratus consenuit, (quæ eam ob rem etiam Telephia vocantur) auxiliatur.
Vulgo Fabaria, à foliorum cum faba similitudine: officinis Crassula major. Verum Coryledonis alterius
descriptio Fabaria potius quam Telephio convenire, Casalpino videtur: & sanè Telephium Dioscoridis non
esse, cum ad folia ala non sint, censemus.

I. Tele-

I. Telephium vulgare.

Scrophularia media, vel terria, Brunf.

Fabaria, Matth. Guil. Lugd.

Telephium, Matt. Gef. hor. Lob. Tab. Cast. Cam.

Telephium album, Fuch.

Acetabulum alterum, Cord. in Dioscor. album, Fuch. ico.

Crassula major, Dod. gal. Cæs. Thal.

Anacamperos, Gef. hor.

Faba inversa, Eid. Ad. Lob. ico.

Telephium alterum, five Crassula, Dod.

Telephium vulgare, five secundum, Clus. hist.

Crassula five Faba inversa, Ger.

Coryledon alterum Dioscoridis, Col.

Alij folijs crenatis & subrotundis, ut apud nos provenit, pingunt: alij oblongis & integris, ut Lob. Dod. & Clusius. Flore est communiter albo, est & luteo: reperitur etiam flore purpurascens & folijs rarioribus, & est Telephium tertium purpurascens flore, Clus. histor.

Huc referendum id quod solo folio glauco cæruleo ve à vulgato differt, quod Telephium glaucum verius, Lob. ob.

II. Telephium purpureum majus.

Scrophularia seu Portulaca major, Trag.

Telephium purpurascens, Fuch. Lugd.

Acetabulum purpureum alterum, Eid. ico.

Telephium floribus purpureis, Lob. ico. Lugd.

Cam. ep. Tab. Ger.

Telephium quintum purpureo flore, Clus. hist.

Fabaria, Lon.

Crassula montana, Cæs.

Rapuntium umbellatum, Colum. part. 2.

Hoc folijs est longioribus & profundius cre-

natis: naps aliquando paucioribus, aliquando pluribus, quod posterius

Telephium quartum est, Clus. hist.

III. Telephium purpureum minus: in Prodromo descriptum.

IV. Telephium latifolium peregrinum.

Telephium Hispanicum, Clus. hisp. Lug. Tab.

Telephium primum, Dod. r. five Hispanicum, Clus. hist.

Telephium seu Crassula major Hispanica, Lob. Crassula major Hispanica, Ger.

Floribus est albis, etiam rubris.

Huic simile, modo idem non sit,

Telephium Austriacum, Clus. hisp. & hist.

V. Telephium repens folio deciduo.

Telephium minus repens sempervirens, Lob. Lugd. Cam.

Cepæa Pancij, Clus. hist. & hist. Cam.

Telephium tertium, Dod. sextum, Clus. histor. fortè Dioscoridis.

Telephium minus, Tab.

Telephium sempervirens, Ger.

VI. Telephium repens folio non deciduo.

Telephium Imperati in sua hist. Cam.

Telephium septimum five legitimum Imperati Clus. hist.

VII. Telephium Dioscoridis, seu Scorpioides, ob siliquarum similitudinem.

Scorpioides, Matt. Ang. Lac. Cast. Ad. Lob. Lon.

Scorpioides Matthioli, Dod. ut: Gef. hor. Lugd. Camer.

Lunaria burissa aliquibus, Ang. Gef. hor.

Telephyllon Cratevæ, Ang.

Telephium veterum verum, Guil.

Telephium, herba amoris, Cæs.

SCORPIOIDES.

Σ *Reponit* Dioscoridi l. 4. c. 195. quod semen habeat ad similitudinem cauda Scorpionis, & quod Scorpioides in istis presentaneo sit auxilio: & Plinio l. 22. c. 15. cui Scorpius dicitur: quod Clymenum Dioscoridis esse, Casalpini & Columna volunt.

I. Scorpioides Bupleuri folio.

Scorpioides, Dodon. gal. Gef. hort. Lugd. prior, Dod. fol.

Scorpioides repens bupleuri folio, Ad. Lob.

Scorpioides bupleuri folio, Cam. Tab. Ger.

Leporis auricula vulgo, Cæs.

Catanancæ quorundam, Cam.

Clymenos Dioscoridis, Colum.

II. Scorpioides Portulacæ folio.

III. Scorpioides montanum, Lugd. quid?

PORTULACA.

Α *Νότα* dicitur ipsa Portulaca Dioscoridi lib. 2. cap. 150. cui genera duo, Andrachne, & Andrachne sylvestris, qua folijs est priori crassioribus atque densis, in petrosis nascitur: aliquando in hortis folijs

folijs olea, sed minoribus multo, verum pluribus & teneris: cauliculis rubicundis, frequentibus, in terram inclinatis, &c. At Theophrastus *Ἀδελφύων* herbam 1. caus. plant. 10. & 4. ejusdem 3. exhibet: dein *Ἀδελφύων* arborem 1. hist. 8. & 15. 4. hist. 4. Portulacam *Γαζα* reddit. Verum Plinius lib. 8. cap. 20. scribit, Portulacam quam Peplion vocant, non multum sativa efficacior esse: ubi Portulacam cum Peplio herba diversissima confundit: causa erroris quod aliqui Peplion, portulacam agrestem vocarint: confundit quin etiam vires sylvestris cum sativa Portulacae viribus.

- | | |
|---|---|
| I. Portulaca latifolia, seu sativa. | Portulaca sylvestris, Trag. Matth. Ang. Fuch. |
| Portulaca hortenſis, Brunf. def. Trag. Fuch. Dodon. gal. | Dod. ut: Ad. Lob. Lugd. Caſt. Ger. |
| Portulaca domestica, Matth. Ad. Lob. Caſt. Taber. Ger. | Portulaca, Lac. arvenſis, Tab. |
| Portulaca, Tur. Cord. in Dioſc. Lon. sativa, Ang. (<i>ῥαγίδιον</i> in Græcia) Cord. hist. Dod. gal. Lugd. Eyſtett. | Portulaca spontè naſcens, Cord. hist. |
| Portulaca major, Cam. hortenſis, Gef. hort. | Portulaca minor, Gef. hort. Cam. |
| Portulaca latioribus folijs, Cæſ. | Portulaca angustioribus folijs, Cæſ. |
| II. Portulaca angustifolia five sylvestris. | Cepæa, Cord. in Dioſc. Lon. desc. |
| | III. Portulaca arvenſis. |
| | Portulaca exigua, Cam. |
| | IV. Portulaca aquatica, Thaliij, quid? |
| | V. Portulaca marina, Tab. Ger. quid? |

C E P Æ A.

Κηπόα Dioscoridi lib. 3. cap. 168. Portulacæ similis est.

Cepæa, Matth. Ang. Lac. Lon. ico. Ad. Lob. Matth. Flosculis est albis, ex purpureo candicantibus, vel luteis.

C R I T H M U M.

Κρίθμον five *ῥαγίδιον* Dioscoridi lib. 2. cap. 157. folijs pinguibus, albicantibus, portulacam referentibus, sed crassioribus, longioribus, saſſis, gustu, floribus candidis, &c. in muria servatur, cruda & cocta eduntur. Plinius lib. 21. cap. 15. Batin appellasse videtur, Batin marinam, & Batin hortensianam, quam aliqui Asparagum Gallicum vocant, sine ullis notis proponens: Batis etiam lib. 21. cap. 27. meminit, quæ alvum moliat, nec plura habet.

- | | |
|--|--|
| I. Crithmum, five Fœniculum maricimum majus, odore Apij. | III. Crithmum maritim. flore Asteris Attici. |
| Baticulæ alterum genus ex Sicilia, Cæſ. | Crithmum tertium, Matth. Lugd. Cam. |
| II. Crithmum, five Fœniculum maritimum minus. | an Anthillis major, Cord. ob. sylv. |
| Crithmum primum, Matth. | Anthillis prima, Dioscoridis, Cæſ. |
| Crithmum, Ang. (& herba S. Petri) Dodon. gal. | Crithmum Chrysanthemum, Dod. (Aster Atticus marinus quibusdam) Lugd. Tab. Ger. |
| Cord. in Dioſc. Lac. Tur. Lugd. Caſt. Tab. | Chrysanthemum littoreum, Ad. Lob. |
| Crithmus, vulgo Creta seu Salsa marina, Gef. ap. | IV. Crithmum maritimum spinosum. |
| Crethamum marinum, Cord. hist. | Crithmum secundum, Matth. Caſt. |
| Crithmum marinum, Gef. hor. Dod. Ger. | Secacul, Ang. |
| Fœniculum marinum, videtur verum Empe- | Crithmum spinosum, Dod. Tab. Ger. |
| tron, Rond. cap. de mem. læsa. | Crithmum syl. Eryngium folijs Apij Plinij, Cæſ. |
| Fœniculum marinum, five Empetrum, Ad. aut | Pastinaca marina, Ad. Lob. Lugd. |
| Calcifraga, Lob. | Tribulus marinus quorundam, Lugd. |
| Batis, Gef. hort. | Cachry marinum, Cam. |
| Baticula quasi parva Batis, Cæſ. | Corymbi alij colore candido, alij subrubente, aut violaceo: in hortis cultum, lætius ac minus spinosum redditur. |
| Creta marina, Lon. | |

KALI.

K A L I

Kali Mauritanorum, aliqui ad Anthillidem alterum Dioscoridis: alij ad ejusdem Tragon (cum tamen sapore non sit acerbo, nec acinis confert) referunt. Plinius lib. 8. cap. 22. ad Halymum retulisse videtur, dum inquit, alij olum maritimum falsum, & inde nomen, &c.

I. Kali majus cochleato semine.

Kali, Matth. (qui & hoc & Salicorniam unâ figurâ expressit) Dod. Cast.

Kali magnum, Sedi medij folijs semine cochleato, Ad.

Kali magnum, Lob. Lugd. & Kali Dalechamp. Soda, Lob. ico.

Kali cocheatum majus, Cam.

Anthillis altera falsa, Cam.

Salsolæ genus in hortis, Isgarum vulgo, Cæf.

II. Kali minus album semine splendente.

Anthillis altera, Borda quibusdam, Dod. gal. Lugdun.

Alcali minus, Cef. hort.

Kali album, Dod.

Kali minus, Ad. Lob. ico. Lugd. Eyf.

Kali alterum seu minus, Cam.

Salsola quædam in maritimis, Cæf.

III. Kali minus alterum.

Kali parvum folijs oblongis, Cam.

Anthilloides, Thal.

Est majus & minus.

Huc referri debent,

Anthillis minor tertia, quinta & sexta, apud Cord. in obs. sylv.

IV. Kali minus villosum: quod primum in Prodromo.

V. Kali gramineo folio: quod 2. in Prod.

Salsolæ congener semine Polygoni, Cæf.

VI. Kali Arabum primum genus, Rauvvolf. Lugd. ap.

VII. Kali Crassulæ minoris folijs.

Kalli 2. species, Anthillis quibusdam, Alp.

Kali floridum repens, Aizoides Neapolitarum, Col. part. 2.

VIII. Kali Ægyptiacum folijs valde longis hirsutis.

Kalli tertia species, Alp.

IX. Kali geniculatum majus.

Kali, Matthiol. Ang. geniculatum, Lugd. Cam. Tabern.

Salicornia, Dod. ut: Lugd.

Anthillis constans veluti tritici granis, Cord. ob. sylv.

Alcali, Gefn. hort. Lon.

Kali geniculatum vermiculatum, Ad.

Kali five Sedum marinum, Lemnio.

Kali tertium, Cam. ep.

Kalli primum, Kellu Ægyptijs, Alp.

Salsolæ genus aliud, Cæf.

Differentiæ duæ, unum simplicius & brevius, dodrantali altitudine, rectum & annuum: alterum multis ramulis fruticâs, lignosum & grandius, perpetuum. Habetur & rubrum & viride.

X. Kali geniculatum alterum, vel minus.

Kali Arabum 2. genus, Rauvvolf. Lugd. ap.

T R A G U M.

Trago, five Ξυπρίον, aut Τραγύον à Dioscoride l. 4. c. 51. & à Plinio l. 28. c. 13. Tragi & Scorpij nomine proponitur: folijs carere scribunt: & l. 22. c. 15. Scorpius alter.

I. Kali spinosum cochleatum.

Drypis Theopr. Tab.

Kali five Alkali, Dod. belg.

an Hippophæstion Dalechampi, Lugd.

Sunt qui Tragos esse velint.

II. Kali spinoso affinis.

Tragum, Matth. Lac. Cast. def. Lon. Tab.

Tragus & Kali secundum genus, Dod. gal.

Tragon non est sed Drypis, Guil.

Tragon improbus, Matth. Ad.

Tragon Matthioli, Lob. Lugd. Ger.

an Tragos, Cæf.

Cum Dioscorides Trago folia non tribuat, idcirco videntur Matthiolus & Tabernæmontanus sine folijs pinxisse: at Lobel⁹ & ex eo Lugdunensis historia, folia adpinxere, & quidem rectè, ut in Lio Venetorum observavimus. Non defunt qui utramq; hic propositam plantam eandem faciant, & forsan non ita male: quàm vis posterior longioribus & latioribus sit folijs.

Oo

TITHY.

TITHYMALUS.

Tιθυμαλ. Dioscoridis l. 4. c. 165. τιθυμαλ. Theophrasto 9. hist. 12. Lactariam Gaza vertit. Plinio lib. 26. cap. 8. Tithymalus, quem nostri herbam lactariam vocant, alij Lactucam caprinam. Sic etiam Columella: at Celsus marinam vocavit: officina Esulam dicunt. Lactaria nominata, ob lac omnibus commune, cum hac leviter secta, vel folio abrupto, lac effluit.

Genera Dioscorides septem recenset: 1. μαχαρηντας, quibusdam ἀμυγδαλοειδὲς dictus: alterum semina angustiora, quem νεφελίω ἢ μωρολάρω cognominat: 3. παρὰλ. quem τριθυμαλὸς appellavit: 4. ἀνδρο-
νι. 5. νεφελίος: 6. δονδελώδης: 7. παρὰλ. Theophrasto 9. hist. 1. Tithymallorum plura sunt genera, maritimus: masculus olea folio: myrtarius candidus, Myrti folio. Plinio l. c. genera ejus multa: 1. Characias, qui & masculus existimatur: 2. Myrsinitem vocant, alij Caryiten folijs myrti: 3. Paralius vocatur, sive Tithymalus folio rotundo: 4. Heliotropium appellant, folijs Portulacae, sic dictum, quoniam caput cum Sole circumagit: 5. Cyparissium vocant, propter foliorum similitudinem: 6. platyphyllon, alij corymbiten, alij amygdaliten à similitudine: 7. dendroides, alij cobion, alij leptophyllon.

Tithymalus Characias, id est, vellaris, sive amygdaloides, à foliorum aliqua forma.

I. Tithymalus Characias amygdaloides. Tithymallus masculus, Theoph.

Afcebra magnum, Mesuæo.

Tithymalus characias, Ang. 1. five mas, Dod. ut: Lugd. Cæs.

Tithymalus characias 2. Clus. hisp. Cam.

Tithymalus characias amygdaloides, Lob.

Tithymali characiæ species, Thal.

Tithymalus amygdaloides, & amygdaloides latifolius, Tab.

II. Tithymalus characias rubens peregrinus.

Tithymalus characias, Matth. Lac. Lon. Lugd. Cast. Tab.

Tithymalus characias legitimus i. Clus. hisp. & histor.

Tithymalus characias alter, Dod. Cæs.

Tithymalus platyphyllon, Ad.

Tithymalus characias Monspeliensium, Lob.

III. Tithymalus characias folio lanuginoso.

Tithymalo characiæ primo similis, Clus. hisp.

Tithymalus characias alter, Eid. hist.

IV. Tithymalus characias rubens Germanicus.

Tithymalus pentactonon, Cord. hist.

Tithymalus characias quartus, Dod.

Tithymalus characias Pannonicus, Clus. pan.

Tithymalus characias tertius Austriacus, Eid. histor.

Tithymalus fruticosus alius stipitibus rubris, Camer.

an Tithymalus latifolius alter, Cæs.

V. Tithymalus characias angustifolius.

Tithymalus myrsinites altera, Lob. Lugd.

Tithymalus myrsinites angustioribus folijs, Cæs. alp.

Tithymalus myrsinites tertius angustifolius, Taber.

VI. Tithymalus characias folio serrato.

Tithymalus characias quintus, Dod.

Tithymalus ferratus Monspeliensium, Ad. Lob.

ico. Dalech. Lugd. cui & myrsinites ferratus.

Tithymalus myrtites Valentinus, Clus. hist.

VII. Tithymalus sylvaticus lunato flore.

Tithymalus platyphyllon, Ang.

an Tithymalus dendroides, Cord. in Diosc.

Tithymalus in montibus, Cæs.

Tithymalus lunato flore, Colum.

Tithymalus myrsinites, sive myrsifolius.

I. Tithymalus myrsifolius arboreus.

Tithymalus dendroides, Matth. Ges. hor. Lac.

Ad. Lob. Lugd. Cast.

Tithymalus characias tertius, Dod.

Tithymalus arboreus myrsifolius, Lob. ico.

Tithymalus arboreus, Cæs.

an Tithymalus petraeus, Ang. Cam.

II. Tithymalus dendroides ex Cod. Cæsareo, Dod. Lugd.

III. Tithymalus myrsinites latifolius.

Tithymalus myrsinites, Matth. Ang. Dod. ut:

Ges. ap. Lac. Lon. Lob. Cæs. Lugd. Cast. Cam.

Tithymalus myrsinites, myrsifolius, foemina repens Diosc. Ad.

Tithymalus myrsinites legitimus, Clus. hist.

Tithymalus myrsinites primus, Tab.

IV. Tithymalus myrsinites angustifolius.

Tithymalus myrsinites Dioscoridis, Ad. Lob.

icon.

Tithymalus myrsinites alter, Tab.

Tithymalus myrsinites in montibus, Cæs.

V. Tithy-

V. *Tithymalus myrsinites* fructu verrucæ simili.
Esula multicaulis & quarta, Trag.
Tithymalus helioscopius, Dodonæi in ico. & Lugd.
Tithymalus verrucosus Dalechampij Lugd.
Alypum Guilandinus vocare solebat.

Tithymalus maritimus.

I. *Tithymalus maritimus*.
Tithymalus paralius, Matth. Ang. Dod. ut: Lac. Gefn. hort. Ad. Clus. hisp. Lob. Lon. Cast. Lugd. qui tres figuras habet, Cam. Tab.
Tithymalus maritimus, Cæf.
 Variat, is qui in maritimis natus, ab hortenfi, hinc duæ figuræ apud Dodonæum, ejus qui in maritimis & ejus qui in hortis crescit.

II. *Tithymalo maritimo* affinis *linariae* folio.
Esula altera in humidis, Cæf.
Tithymalus linifolius, Cam.
Tithymalus amygdaloides angustifolius, Tab. Hic antequam floreat, à *Linaria* solo lacteo succo distinguitur.

III. *Tithymalus maritimus spinosus*.
Glaftivida altera, Belli ep. 4. ad Clus.
Glaftivida 2. Cretica, Ponæ Bald. Ital.

IV. *Tithymalus maritimus purpurascens* floribus.
Esula rara è Lio Venetorum infula, Adv. Lob. Lugd.
 an *Alypum*, Ang.
 Cum *Efulis* nihil præter lac commune habet;
Pityufa species Venetis, alijs *Turbith* nigrum.

Tithymalus latifolius.

I. *Tithymalus latifolius* Hispanicus.
Tithymalus platyphyllos, Clus. hisp. & hist. Dod. Lugd.
Platyphyllum Hispanicum, Lob.
Tithymalus latifolius, Cæfalp. Hispanicus, Tabern.

II. *Tithymalus arvensis latifolius* Germanicus.
Tithymalus platyphyllos, Fuch. Tur. Lon.
Pityufa major, Dod. Gal. ico. Thal.

Pityufa five *Esula* minor, Dodonæi, Lugd.
 Major est, & minor, & hæc folijs leviter hirsutis.

Tithymalus helioscopius.

Tithymalus helioscopius.
Esula, Brunf. vulgaris & tertia, Trag.
Tithymalus helioscopius, Matth. Ang. Fuch. Dod. ut: Cord. in Diosc. Tur. Gefn. hort. Lac. Lon. Adv. Lob. Cæf. Lugd. cum icone Matth. & Dod. Thal. Cam. Tab.

Tithymalus dendroides, Dod. in ico. Thal.
 Alia est folijs crenatis, sed non usque ad caulem: alia non crenatis & rotundioribus: caule leviter hirsuto.

Tithymalus cyparissias.

I. *Tithymalus cyparissias* folijs punctis croceis notatis.
Esula scabiosa, Gefn. col.
Tithymalus cyparissias, Thal.
Tithymalus arvensis, Cam.

Duplex est, major & minor.
 II. *Tithymalus cyparissias*.
Tithymalus cyparissias, Matthiol. Fuch. Ang. Dod. ut: (& *Pityufa* minor) Tur. Lac. Gefn. hort. Lon. Ad. Lob. ob. Cast. Thal. Lugd. (qui Matthioli & Dodonæi figuram habet) Taber. Cam.

Tithymalus cupressinus, five *humipinus*, Lob. bel. icon.
Esula officinarum, Cæf.

Variat: 1. folijs lini virentibus, comâ flavâ, aliquando subrubente: 2. in montibus candidior, foliolis angustis, *Esula* candidior, Cæfalpino: 3. vix palmam altus, capitulo rubante.

III. *Tithymalus* five *Esula* exigua.
Esula exigua, Trag. Lob. minima, Lugd.
Tithymalus leptophyllos, Matthiol. Lugdun. Cam. Thal.

Tithymalus minimus, Tab.
Papaver spumeum, Gefn. hort.
Peplis minor Dalechampij, Lugd.

IV. *Tithymalus* five *Esula* exigua folijs obtusis: 2. loco in Prodomo describitur.

V. *Tithymalus* exiguus *saxatilis*: 3. in Prod.

PITYUSA SIVE ESULA.

Πιτυύσα, à *Cyparissia* *Tithymalo* specie differre existimatur, ideòque etiam in *Tithymali* genere connumeratur: caule est cubito altiore, geniculato, foliolis acutis & renuibus. pini folia imitantibus: floribus

exiguus pene purpureis : semine instar lenticula lato : radice candida, crassa, lacteo succo referta : quibusdam in locis frutex hic pregrandis invenitur, &c. Dioscorides lib. 4. cap. 166. At Plinius lib. 24. cap. 6. cum honore & Pityusa simili de causa dicitur, quum quidam in Tithymali genera numerant : frutex similis est picea flore parvo purpureo. At Pityusa videtur esse Esula sive Ezula, Arabum Alsebra aut Alsebra & Scebra. Ezula etiam nomen à πικρὸν luxatum esse potest : duabus enim prioribus syllabis sublati, remanet σεα, cujus diminutivum Usula, & vocali prima mutata, Esula.

I. Tithymalus folijs pini, fortè Dioscoridis
Pityusa.
Esula vulgaris major & quinta, Trag.
Pityusa Esula vulgo dicta, Gesn. hort.
Pityusa sive pinea, Esula minus offic. Ad. Lob.
Tithymalus pinea, Eid. ico. (ob.
Esula minor, Dod. Lugd.
Esula major, Cæs.
Tithymalus cupressinus 2. Tab.
II. Tithymalus palustris fruticosus.
Esula major & secunda, Trag.
Pityusa major, Dod. gal. desc. Cord. in Diosc.
Pityusa grandis, Thal.
Esula major, Dod. Lugd.
Esula major Germanica, Ad. Lob. Lugd.
Tithymalus palustris, Cæs.
Tithymalus fruticosus Germanicus palustris,
an Tithymalus maximus, Tab. (Cam.
II. Tithymalus montanus non acris.
Esula dulcis (vel 7.) Trag. Gesn. hort. Lon. Lob.
ob. Lugd.
Erino cognata herba, Gesn. hort. Ad.
Pityusa sive Esula minor altera floribus rubris,
Lob. Lugd.
Flos colore variat, est viridis, est rubri.
IV. Tithymalus incanus hirsutus : qui r. in
Prodromo.
an Pityusa Anglicana, Cam.
V. Tithymalus folijs brevibus aculeatis.
Pityusa, Matth. Ang. Lac. Lon. Cast. Lugd.

APIOS SIVE TITHYMALUS TUBEROSUS.

Απιος, οἱ ἂν ἰοχάδα, radice est ad pyri formam accedente, rotundiore tamen, lactei succi plena, &c. Dioscoridis lib. 4. cap. 177. At Theophrasto 9. hist. 10. ἰοχάς ἢ ἀπῖος (Gaza reddit carica seu pyrus) folijs est rutaceo, brevi, caulibus ternis aut quaternis humi stratis : radice quæ albugum, verum spumosa : ἰοχάς dicitur, quod ἰοχάδα, id est, caricam seu ficum aridam radix referat, Dodonæo monente.

I. Tithymalus tuberosa pyriformi radice.
Apios, Matt. Ang. Dod. gal. Lac. Lug. Cast. Tab.
Apios vera, Ad. Lob.
Tithymalus tuberosus. Diosc. Lugd. tuberosa
radice, Clus. hist.
Duplex est : 1. est radice crassiore & majore,
folijs & ramulis minoribus : 2. radice minore,
ramulis longioribus & folijs majoribus.
II. Tithymalus tuberosa oblonga radice.
Ischas alter, Clus. hist.
III. Tithymalus tuberosus Germanicus.
Tithymalus tuberosus alter, Cam.

PEPLUS, SIVE ESULA ROTUNDA.

Πεύλος, οἱ ἂν εὐρόν, οἱ ἂν μόνον ἀπερόδον, exiguus frutex lactei succi plenus folio parvo ceu ruta, at latiore : universa coma ferè dodrantali, rotunda, humi sparsa : semine sub folijs parvo, rotundo, minore quam candidi papaveris, radicem habet unicam, &c. Dioscoridis lib. 4. cap. 168. Peplos, quem aliqui Sycen, alij meconion aphrodes vocant, Plinio lib. 27. cap. 12.

I. Peplus sive Esula rotunda.
Peplus, Matth. Fuch. Ang. Dod. ut : Cord. in
Diosc. & hist. Turn. Lac. Lon. Adv. Lob. Lugd.
Cast. desc. Thal. Tab. Ger.
Peplus, Cast. ico.
Esula rotunda, Gesn. collect.
II. Peplus altera species.
Tithymalus Epithymi fructu, Coll.

P E P L I S.

Πεύλις, οἱ ἂν ἀνδράκων ἀγκύρα, Hippocrati πένλιον, frutex est ramulos quoquo versum expandens & candidi succi plenus, folijs hortensis portulacæ rotundis, inferne rubentibus : semine sub folijs rotundo, ceu peplo, fervente gustu : radice tenui, singulari ac supervacua : in maritimis maximè nascitur, &c. Dioscoridis lib. 4. cap. 169. At Plinius lib. 22. Peplij meminit, ubi Portulacam sylvestrem ejusdem generis ac naturæ cum

cum Portula sattivra, cum Peplio herba diversissima confundit, ideo quod nonnulli Peplion, agresem Portulacam vocarint,

I. Peplis maritima folio obtuso.

Peplis, Matthiol. Turn. Advers. Clus. hispan. & Peplium, Cæs.

histor. Lobel. Lugdun. Cast. descript. Camer. Variat caule rubro, albo.

Tab. ico. Ger.

Peplus, Cast. ico. minor, Tab. II. Peplis montana folio Numulariæ.

Peplis altera, Ang.

CHAMÆSYCE.

X *Αμαχύν* ἢ *ενὺν* ramos emittit quaternum digitorum, per terram stratos, teretes, lactei succi plenos: folia lentis figura peplo similia, parva, tenuia ac terra inbarentia, semen sub folijs rotundum ceu pepli, radicem tenuem ac superraciam: sed neque florem neque caulem promit, Dioscoridi lib. 4. cap. 170. Chamæsyce lentis folia habet, in aridis petrosissq; nascent, Plinio lib. 24. cap. 15.

Chamæsyce, Matth. Ang. Gesn. hort. Dod. (duplicem figuram habet) Camerar. Tabernæ-Adv. Lob. Clus. hisp. & hist. Cæsalp. Lugd. (qui) mont. Ger.

LATHYRIS.

Λ *Αβύς* quam aliqui *Τριβύακον* vocant, & Tithymalorum numero ascribunt, caule est cubitali digiti crassitudine, inani: in cacumine sunt alæ & folia, in caule oblonga amygdalinis proxima, & c. fructum gerit triplici loculamento distinctum, rotundum ceu capparum, in quo tria sunt minuta semina, incurvantibus tuniculis inter se discretis, exvis majora, quæ decorticata candida sunt, & c. totus frutex lacteo succo turget, Dioscorides lib. 4. cap. 167. Lathyrus folia habet multa, lactuca similia, tenuiora, germina multa, in quibus semen tuniculis continetur ut capparis: quæ cum inarvère, eximuntur grana piperis magnitudine, candida, dulcia, facilia purgati, Plinius lib. 27. cap. 11. Granum regium minus, Mesueo.

I. Lathyrus major.

Catapucia, Brunf. Cæs. minor, Lob. Tab.

Lathyrus, Brunf. Matth. Fuch. Dod. ut: Cord. in

Diosc. Ges. h. Tur. Lac. Ad. Lon. Lug. Cam. Cast.

Lathyrus five Catapucia minor 2. Trag.

Catapucia vulgaris, Tartago Hispanorū, Eyft.

Ratione ætatis, latiora vel angustiora folia

habet: hinc apud Tab.

Lathyrus latif. & angustifolij, apud Gerardū.

Lathyridis five Cataputiae majoris & minoris nomine, figuræ exhibentur.

II. Lathyrus minor conglomerato flore.

Lathyrus minor Dalechampi, Lugd.

III. Lathyrus minima.

Catapucia pusilla, Cæs.

IV. Lathyrus affinis.

Semen Vise dicta ex Bengala, Lathyrus grano simile, Acoftæ Clusij cap. de Manna, quid?

HIPPOPHÆS.

H *Ιπποφάης* cum sit ex ijs, quæ lacteum succum fundunt, de eo, licet nobis incognitum in præsens, ἵπποφάης frutex est densus, furculosus, folijs longis oleagineis proximis, angustioribus, mollioribus, inter quæ spinæ candidantes, sicca angulose, floribus hederæ corymbos referentibus, racemarum cobarentibus, sed minoribus mollibusq; & ex albidis partim rubentibus: radice crassa, molli, lactei succi plena, amara, ex qua velutè Thapsia liquor excipitur, ad biliosa, aquosa & pituitosa detrahenda & c. Dioscorides lib. 4. cap. 162. Hippophyes in sabulosis maritimisq; nascitur, spinis albis, hederæ modo racemosa est, candidis & ex parte rubentibus actinis, radix succo mader, qui aut per se conditur aut pastillis farina, Plinius lib. 22. cap. 12.

I. Hippophæes quibusdam *ἀνὰ νύκτα* purgatrix, Ang.

Hippophæes, ex Codice Cæsareo, Dodon.

Lugdun.

II. Planta lactaria, Xabra & Camarrorum Rhasis, Rauvvol. & Lugd. quid?

III. Danre radix quædam candida lacticina, Acoftæ Clusij cap. de Manna, quid?

CASPARI BAVHINI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER OCTAVVS. SECTIO PRIMA.

DE CONVULVULIS.
SCAMMONEA; CONVULVULUS SEU SMILAX LÆVIS; SOL-
DANELLA; SMILAX ASPERA ET SALSAPARILLA; CHINA;
BRYONIA; MECOACHA; LUPULUS; VITIS VINIFERA.
SCAMMONEA.

Σκαμμωνία Dioscoridi lib. 4. cap. 171. & Theophrasto 4. hist. 6 & 9. hist. 1. & 10. Latinis Scammonia, ex cuius radice succus elicitur, ut lib. 12. sect. 6. ostendimus. Dioscoridis descriptio nostra plantæ conveniret, nisi suæ ramus quadantenus hirsutos, folia item hirsuta tribueret: quam hirsutiem (nescio an loci ratione) hæc ænus non observavimus: & Matthioli in Dioscorideæ descriptione omisit.

I. Scammonia Syriaca.

Scammonia, Matt. Gef. hor. Lon. Lug. Cast. Cæf.

Scammonia, Dod. gal. Cord. in Diosc. Antio-
chena, Cam.

Scammoniū, Cord. hist. Dod. Syriacū, Ad. Lob.

II. Scammonia Monspeliaca folijs rotun- dioribus.

Scammonia Monspel. Gefn. hort. Eyf.

Scammonium Monspeliense, Ad. Lob. ico.

Scammonia Valentina, Clus. hisp. Tab. Ger.

Scammonia maritima Monspeliaca, Lug. Cam.

Apocynum 4. latifolium, Clus. hist.

III. Scammonij Monsp. affinis, folijs acutiori-
(bus).

Periploca prior, Dod.

Scammonij Monspeliaci varietas, Lob.

Apocynum 3. Clus. hisp. 3. latifolium, Eid. hist.

Scammonij quoddam genus, Cæf.

Volubilis marina, Tab.

CONVOLVULUS SEU SMILAX.

Smilacem duplicem Dioscorides habet: alteram lib. 2. cap. 176. ubi Phascolum intelligere oportet. Alteram lib. 4. cap. 144. & 145. quam in asperam & levem distinguit: illa, οὐλᾶξ ἰσχυρὰ, hæc οὐλᾶξ δεινὰ dicitur: Utriusque & Plinius lib. 24. cap. 10. meminit. At Theophrastus 3. hist. 16. Smilacem arborem, quæ illici sit similis describit, quam Plinius lib. 16. cap. 6. Illici genus facit: qui lib. 16. cap. 10. & Taxum à quibusdam Smilacem vocari scribit. Smilax lævis, Convolvulus à Plinio lib. 21. cap. 5. dictus videtur: quod arbores scandat & eis se convolvat: quibusdam fassione ejusdem lib. & cap. 22. censetur.

Smilax lævis,

I. Convolvulus major albus.

Volubilis, Brunf. latifolia, Fallop. de decor.

Volubilis major, Trag. Lon. Thal. Tab.

Smilax lævis, Matt. Fuch. Gef. h. Lac. Cast. Lug.

Smilax lævis major, Dod. ut: vel lenis major,

Helxine cissampelos, Cord. in Diosc. (Lob. Ger.

Malacocissus Damocratis, Ang.

Convolvulus major, Gefn. hort. Ad. Cæf.

Campanula alba sylv. Svvert.

Convolvulus major flore albo, Eyf.

Semen nigrum est, aliquando rufescens.

II. Convolvulus ramifolius piloselle.

Helxine cissampelos ramosa Cretica, Ponç Ital.

III. Convolvulus minor arvensis.

Volubilis minor, Trag. Lon. Thal.

Helxine cissampelos, Matth. Fuch. Ang. Gefn.
hort. Lugd. Cast.

Helxine hederacea, Lac.

Helxine in fegetibus nascens, Cord. in Diosc.

Smilax lævis minor, Dod. ut: Ger.

Scammonia parva, Ang. Cam.

Orobanchæ Theophrasti, Ang.

Convolvulus, Tur. minor, Gef. hor. Cæf. Cl. hist.

Convolvulus minor purpureus, Ad. Lob.

Volubilis arvensis, Tab.

Dioscoridi l. 4. c. 39. ἐν ἑλμν dicitur, quod folijs est hederæ, sed minoribus, &c. interpret Helxine cissampelon reddidit: quibusdam Orobanchæ Theophrasti (Ervanga Gaza) 8. hist. 8. alijs Scammonia tenuis Plinij l. 24. c. 15.

Variat flos colore, qui vel candidus, vel roseus,

feus, vel albus cum purpureo umbilico, vel pun-
nicantibus lineis aspersis, vel purpureus radijs
albis pictus.

IV. Convolvulus minor femine triangulo.
Orbanche seu Cuffus altera Serapionis, Trag.
Orobanche Ruellij, Gef. hort.
Helxine cissampelos, Dod. gal. Lugd.
Helxine cissampelos altera attriplicis effigie,
Ad. Lobel.

Centunculus Plinij, Anguil.
Elatine, Cord. in Diosc.
Convolvulo similis herba, Gef. hort.
Convolvulus niger, Dod.
Volubilis media sive nigra, Thal.
Volubilis nigra, Tab. Ger.
Fromentone alterum genus, Cæsalp.
Polygonum hederaceum, Colum.

Alijs Malacocissos Constantini Imperatoris:
alijs Orobanche: alijs Helxine cissampelos: a-
lijs Elatine: alijs Centunculus Plinij l. 24. c. 15.
qui Græcis Clematis dicatur.

V. Convolvulus cæruleus hederaceo angu-
loso folio.
Smilax cærulea, Dod. gal.
Scammonia similis flore cæruleo, Anguil.
Convolvulus peregrinus vel flos noctis, Gef. ho.
Nil Arabum, Gef. hort. Eyst.

Convolvulus asureus sive cæruleus hederace-
us, Ad. Lob.
Campana cærulea, Dod. Bry.
Volvulus cæruleus, sive campana azura, Lugd.
Convolvulus cæruleus, Cam. Cast. Tab. Ger.

Convolvuli alterum genus, quod pro Scammo-
nio ostenditur, Cæf.
Campanula cærulea hederaceo folio, Svvert.
Quibusdam Granum, nil Serapionis & Ara-
bum: Ligustrum nigrum Columellæ alijs: alijs

Pothos cæruleus Theophrasti: quibusdam Vo-
lubilis lanuginosa, Mesuæi.

VI. Convolvulus purpureus folio subrotun-
do: qui 1. in Prod.
Convolvuli species altera, quæ ad Nil Avicen-
næ referri potest, Dod.
Campanula azura, Svvert.
Campanula Indica purpureo violacea, Bry.
Convolvulus Indicus flore violaceo, Eyst.

VII. Convolvulus peregrinus cæruleus, fo-
lio oblongo: qui 2. in Prod.
Convolvulus cæruleus minor Bauhini, Bry.
Campanula incognita cæruleo alba, Eid.

VIII. Convolvulus folijs laciniatis, vel
quinquefolius: qui 3. in Prodr.
Convolvulus Ægyptiacus Bauhini, Bry.

IX. Convolvulus argenteus Altheæ folio.
Convolvulus folio Altheæ, Clus. hisp. & hist.
Lugdun.

Convolvulus peregrinus, Lob. Cast.
Scammonium minus Plinij 2. Tab.
sub Papavere cornuto luteo minore, apud Ger.

Alijs Helxine cissampelos Dioscoridis: qui-
busdam Scammonium minus Plin. Flores pur-
pura candicat: interdum omnino purpurascit.

X. Convolvulus Linariæ folio.
Cantabrica quorundam, Clus. hisp. & hist.
Cantabrica Plinij, Cast.

Convolvulus minimus spicæfolius, Ad. Lob.
Lugd. Ger.

Volubilis terrestris Dalechampi, Lugd.
Scammonium minus Plinij, Taber.
Helxine stans Guilandino, Scammonea Pata-
vina Cortuso dicebatur.

Variat magnitudine, reperitur enim vix duas
trésve uncias altus: flore est communiter pur-
pureo, rarius albo.

SOLDANELLA.

Smilacis levis generibus Soldanella ascribenda venit, quare & Belgis Convolvulus marinus dicitur: quæ du-
plex est, maritima & alpina: alpinam, huic ob foliorum similitudinem junximus. Soldanella maritima,
quæ in officinis habetur, Dioscoridis l. 2. c. 14. 8. est καλαμὴ θαλασσίη, Brassica marina: si textus corrigatur.

I. Soldanella vel Brassica maritima major.
Brassicæ maritimæ genus, Rauwolf. Lugd. ap.
Convolvulus marianus noster, Imperato.

Huius folia quædam sunt laciniata, quædam
non, omnia tamen parte superiore sinuata.

II. Soldanella maritima minor.
Brassica marin. Matt. Dod. gal. Ang. Cor. in Diosc.

& hist. Gef. hor. Lac. Tur. Lon. Lugd. Cast. Cam.
Soldanella, Gef. h. Dod. Lon. Ad. Lob. Cæf. Tab.
Soldanella marina, Ger. Eyst.

III. Soldanella alpina rotundifolia.

Soldanella montana, Ad. Lob. ico.

Soldanella alpina, Cam. ep. Clus. pan.

Soldanella alpina minor, Eid. hist.

Variat

Variat folijs & floribus: folijs, alijs supernè viridib. internè dilutiorè virore splendentibus: alijs folijs infernè ut Cyclamini rubentibus, quæ tertia species est Clusio. Flore est purpureo, nunc

saturatione, nunc dilutiorè: reperitur & niveo. IV. Soldanella alpina folio minus rotundo. Soldanellæ alpinae aliud genus, Clus. pan. Soldanella alpina major, Eid. hist.

S M I L A X A S P E R A.

Smilax ἀσπερά, Smilax aspera Dioscoridi l. 4. c. 144. propter sarmenta rubi modo aculeata: *quæque simpliciter Theophrasto 3. hist. 18. ubi Gaza Hedera Ciliciam interpretatur, quia Plinius l. 16. c. 35. scribit Smilacem hedera similem, primum è Cilicia profectam, sed in Græcia frequentiorè, &c. Et l. 24. c. 10. Smilax qui nicophoros cognominatur, similitudinem hederae habet.*

I. Smilax aspera fructu rubente.

Smilax aspera vera, Träg.

Smilax aspera, Matth. Fuch. Dod. ut: Tur. Lac.

Cord. in Diosc. Gefn. hort. Ad. Lob. Lugd. Cast.

Cæsalp. Cam.

Smilax aspera fructu rutilo, Clus. hisp. & hist.

Smilax aspera prima & tertia, Tab. Ger.

Volubilis aspera, Lonice.

Folia maculis candidis quandoque notantur.

II. Smilax aspera minus spinosa, fructu nigro.

Smilax aspera fructu nigro, Clus. hisp. & hist.

Smilax aspera altera facie Salsaparillæ, aut congener, Lob. ico.

Smilax aspera Lusitanica, Tab. Ger.

A priorè differt & fructus colore, & folijs, in hac mollioribus minusque spinosis, quandoque etiam spinis carentibus: folijs quoque angustissimis in Galloprovincia observatur.

III. Smilax aspera Indiæ Occidentalis.

Buenas noches, fructus exoticus tertius, Clus. exot. l. 2. c. 18.

Salsaparilla.

IV. Smilax aspera Peruvian. sive Salsaparilla.

Zarzaparilla, Matth. Lac. Monar. Garz. Lugd.

Zarzaparilla Peruviana, Dod.

Zarza seu Salsaparilla, Castor.

Sarsaparilla, Lon. Frag. Cæsalp.

Salsaparilla, Ad. Lob. & par. 6. Ind. Or. cap. 41.

Smilax aspera in Zazyntho, Alpino.

Smilax Peruviana, Tab. Gerard.

C H I N A.

Cum China suis sarmentis Smilaci asperæ absimilis non sit, Acosta monente. & suis cauliculis tenuibus, raris, hedera modo arborescendere, in historia Lugdunensi referatur, idcirco in hanc classem retulimus. Dicitur China & Chinæ radix, à China Indiæ regione, in qua copiosè nascitur. Est autem duplex: alba enim ex Indiæ occidentali, Hispania nimirum nova & Peru, quæ colore magis rufus est: alia ex Indiæ orientali ex regione Sinarum (ubi ab indigenis Lampatam vocatur) adfertur. Verum Grazias & Acosta (qui integram plantam depingit, & ex eo Lugd. hist.) Chinam orientalem aliter describunt, quàm Monardes suam occidentalem. At radix hac Indiæ primum Anno Christi 1535. innotuit.

I. China radix: & Lugd. Fragofo.

Cina, alias China, Matthioli.

China, Lac. Lob. ico. Cast. Taber.

Chinna sive Cinna, Cæsalp.

Radix

Radix China, Garz. Acost. Lugd. in Florida: part. 2. Amer.

Chinae radix fruticis more excrescit, folijs paucis Aurantiorum forma: in China arbor Lampaton dicitur: & radix quo nigrior eo melior: Linscor. par. 4. Ind. Or. c. 33.

Orientalis exterius est colore rubente aut subnigro, interius candicante aut subrubente: Occidentalis colore est interius magis rubro.

Amatus inter Arundines recensuit: at Cæsalpino, China orientalis potius ex genere Iridis, quam Calami videtur. De hujus usu Vesalius librum scripsit.

II. China spuria pyriformis.

China spuria pyriformis, seu turbinata, Lob. icon.

III. China spuria nodosa.

Pseudochina radix ex Virginea, Clus. exot.

B R Y O N I A.

Bryonia, Dioscoridi l. 4. c. 184. ἀμπύλη, Vitis alba, καὶ βρωνία ἢ ἀπὸ σταφυλῶν ἢ ἀπὸ ἀμπελῶν. Plinio l. 22. c. 1. Vitis alba, quæ Græci Ampeloleuce, alijs Ophiostaphylon, alijs Melothron, alijs Psilothrum, &c.

Genera duo Dioscoridi l. 4. c. 184. & 185. Vitis alba quæ aliquibus Bryonia, & Vitis nigra, alijs Bryonia nigra, alijs Chironia vitis. Sic & Plinio, qui nigram proprie Bryoniam vocari scribit.

I. Bryonia aspera five alba baccis rubris.

Bryonia, Trag. Gef. hor. Lon. Tab.

Bryonia alba, Dod. ut: Lugd. Thal. Cæf. Ger.

Vitis alba, Matth. Fuch. Ang. Tur. Lac. Cord. in Diosc. Ad. Lob. Cast.

Vitis alba sylvestris, Gef. hort.

Bryonia baccis rubris, Camer.

II. Bryonia alba baccis nigris.

Bryonia nigra, Dod. ut: Cord. hist.

Vitis nigra, Cord. in Diosc.

Vitis alba baccis nigris, Castor.

Bryonia baccis nigris, Camer.

Differt à priore radicibus & baccarum colore: hujus radix interius buxæ colore pallens: illius, ex albido sublatei coloris est: hujus baccæ maturæ nigricant, illius rubent.

III. Bryonia Cretica maculata: in Phytopyrace & Prodromo pro r. descripta.

Bryonia dicoccos, Hon. Belli, ep. i. ad Clus.

Bryonia Cretica, Pon. Italico.

IV. Bryonia lævis, five nigra racemosa.

Vitis nigra, Matth. Ang. Lac. Cast. Lugd. prima, Tabern.

Vitis sylv. five Sigillum Mariæ, Dod. utroq.

Vitis nigra sylv. Gef. hort.

Malacocissum Damocrati, & Tamus, Eidem.

Vitis vel Bryonia nigra, Ad. sylv. Lob.

Tamarum vulgo, Cæf.

Bryonia nigra, Gerard.

Quibusdam Vitis syl. Dioscoridi l. 4. c. 183. (sed florem capillaceum, muscosum ei tribuit, qui in nostra non observatur) & Theophrasti 9. hist. 14. & 22. Alijs Cyclaminus cissanthemos Dioscoridi l. 2. c. 195. de quo vide in Periclymeno.

Alijs Uva taminia Plinij l. 23. c. 1. alijs ejusdem

Salicæstrum, quod potius Amare dulci convenit.

Baccæ maturæ aliquando rufescunt, aliquando nigrescunt.

V. Bryonia lævis, five nigra baccifera: quæ sub Bryonia syl. baccifera in Prod. describitur.

VI. Bryonia Mechoacana alba.

Mechoacan, Monardi, Dod. Lon. Frag. 1. & 2.

Tab. Ger.

Bryoniæ similis planta Peruviana Mechoacæ

provincia, Lob. ob.

Mechoaca Peruviana, Lob. ico. Ger.

Mechoacan, Lugd. hist.

Rhabarbarum Indicum, Castor.

Radix Mechoacan: par. 9. Ind. Occid.

Mechoacan, à provincia novæ Hispaniæ in qua reperitur, nomen obtinuit. Alij Rheo assimilant, unde Rhabarbarum Indic. & Rhabarbarum Mechoacanum, Monardi: Germanis Rhabarbarum album. Dodonæus Rheo simile non esse, & cum Bryonia parum convenire, sed Scammonium quoddam Americanum scribit. Sanè cum Bryonia syl. magnam affinitatem habet.

Duplex habetur ratione loci: prima annis supra septuaginta ex Mechoaca novæ Hispaniæ Insula allata: altera verò ex Continente circa Nicaragua nata, quæ priore longè præstantior est. Refert Fragosus etiam in Aquacathan novæ Galitiæ nasci. Et Clusius in notis in Monardem, Mechoacan duo seminis genera ex Hispanica accepit: unum lævi cauliculo sine filiqua, semine nigro, quale est Scammonij aut Convolvuli majoris: alterum oblongiore aliquantulum cauliculo & semine rufo, superiore longiore & tenuio-

P p

tenuio-

Radix

tenuiore utriusque filiqua parte interiore lanuginosa: ex utriusque semine plantula Scammonij aut Convolvuli modo prodire, &c. De hac quemadmodum & de Nicotiana, Jacobus Gorraeus Lutetianus, & Aegidius Everhardus Belga, libellum, ille Gallicè, hic Latine, scripsit.

VII. Bryonia Mechiocana nigricans, quæ ex India Chelapæ sive Celapæ nomine ante an-

nos duodecim allata: & à Massiliensibus Jalapium, vel Gelapo vocatur: quæ sub Bryonia 3. in Prodomo exhibetur.

VIII. Bryonia Mechiocana sylvestris. Mechoaca ex promontorio D. Helenæ Monard. Mechoaca sylv. genus, Lugd. hist.

Hæc priore minor est per omnia, cujus radix gravia symptomata excitat, quare Scammonæa, Monarde auctore, nuncupatur.

RADIX QUIMBAYA.

Radix Quimbaya: in provincia Quimbaya, cujus metropolis Carthago, radices tennes, digiti crassitudine, inter arbores nascuntur, quarum fragmentum per noctem in aqua maceratum, aquæ partem majorem absorbit, ex residua unica tres sumpta, benigne instar Rhubarbari purgant. Monardes ex Petri Cieca Peruviana historia refert, & ex eo Lugdunensis historia: meminit etiam Fragosus, sed succinctius.

LUPULUS.

Lupulus à Plinio l. 21 c. 15. Lupulus salictarius nominatum volunt: qui Mesueo 2. purg. 24. Volubilis folijs asperis dicitur: hodie in Græcia Epovix nominatur.

Sativus est & sylvestris, magnitudine differens: sic sylv. florum conos minores, rariores, pauciores habet: alijs Lupulus florens, fructu caret: & contra, fructum ferens, non floret.

I. Lupulus mas.

Lupulus, Brunf. Matth. Tur. Dodon. Clus. hist. Tabern.

Lupulus sativus, & sylv. Trag. Lon. Cast. Lugd.

Lupus salictarius, Fuch. Dodon. gal. Gefn. hort.

Lacun. Lobel. (cui & Vitis septentrionalium)

Cæsalp.

Lupulus salictarius spontanea, Ad.

II. Lupulus femina: & Cam. ep. & hor.

Folijs est rotundioribus, circa radicem sine incisuris tantum serratis: flosculis subpallidis, qui sine fructu pereuntes, in pollinem lu-

teum abeunt.

III. Lupulus Mechiocanus.

Radix Carlo sancto, Monard. Lugd. Fragosus.

Indica radix, Monardi, part. alt.

Carolus Sanctus, Castori.

Radix hujus plantæ, quæ Lupulo similis est, ex provincia Mechiocan adfertur, cujus decoctum & pulvis in Catharro, Epilepsia & lue Venerea commendatur.

IV. Sippo, sarmenta longa, Lupuli sarmentis non ablimilia, quibus ad religandum Brasiliiani utuntur: par. 3. Americ.

VITIS VINIFERA.

De vitis oivopos historia Dioscorides l. 5. sedecim capitibus egit, Vitem, Labruscam, Uvam, Oenanthen, Omphacium, Vini naturam, differentias & facultates, ex sapore, mixtione, loco natali desumptas, exponens: quemadmodum de Lora, Mulso & similibus. Et Theophrastus sparsim in suis libris de Vite copiose egit: ut de Vino 9. hist. 20. & 8. caus. pluribus capitibus. Et Plinius l. 14. capitibus novendecim.

Vitem dividimus in sativam & sylvestrem: sativa major est, cujus plurimæ species, alia minor. Majoris uvæ & colore & magnitudine differunt: alterius namq. acini aut virides albicant esve, aut sulvi, aut saturato rubore nigricant, aut cerulei, aut subrubentis coloris: alia acinis oblongis magnitudine & forma prunorum, quæ Pergulana dici potest: alia rotundis, isq. vel magnis vel parvis: alia acinis sunt frequentioribus, alia rarioribus. Sunt quæ granis aut vinaceis carent, interdum unicum vel alterum granum habent: Rarius uvæ barbæ reperitur. Minor verd est acinis nigris, rarissime albidis, aut sulvis, nucleo minimo ac molli. Sapore etiam differunt: ut dulci, acerbato, muscato, quæ Vitis Apiana Plinio.

In folijs quoq. differentia, alia majora profundius incisa, ut Italica folijs ad pediculum usq. in lacinias acutæ divisis: alia minoræ sunt: Sic alia tenuiora, alia crassiora: alia viridia, alia rubentia, alia maculata: alia ad tactum duriora, molliora, alia levia: alia deniq. subirsuta.

Ratione loci, Vina plurimum variant: apud nos commendantur, ex Germanicis quidem Brisgoica, Alsatica, Rhenensis, quæ ex ditione Bernitum habent, Rhœnana, & Secarina, quæ à posteriori rarius habet.

habemus : ex Gallicis, Burgundiaca, & inter ea potissimum Arbutiaca, Muscatellina, Frontiniana, qua Lugduno advebuntur : ex Italicis, Rhetica, qua ex Vallerelina asportantur : ex Hispanicis, Cimenens : ex Grecis, Malvaticum.

Sic in Aegypto, vinum tenue atque aquosum existit, licet calidissima regio sit : cujus rei causam Aphrodisias lib. 2. prob. inquit. Et hoc vinum videtur Hesiodus *οἶνον βιβλινον* vinum Biblinum vocasse : forte quia in eadem cum biblo, id est papyro, regione proveniat : licet ipsius interpres Tzetius velit à Biblo civitate Libano monti proxima, nomen accepisse, siquidem constet ejus loci incolas ferè hydropotas esse. Suidas verò tum à Byblos civitate, tum à Biblia vitis genere, dictum putat. Monet Guil. Hippianum Reginum vitem qua illeus vocatur Bibliam vocare. Sed hac alterius sunt loci.

In India insula Baly, Vites bis in anno uvas promunt : Linsc. part. 3. Ind. Orient. cap. 40. & in insulis Azores, super meras rupes crescunt, quæ radices in medios hiatus seu saxorum rimas immittunt, quibus succum sibi necessarium proliciunt : & in istis petris recessibus, Vites multo latius se proferunt, quam quæ in planitie sunt, quæ ad frugem pervenire nequeunt : Idem cap. 6. Sed in Hispaniola plantata exiguas uvas fundunt, nec admodum jucundi saporis & ferè Februario & Martio vindemiarum solent, autore Benzone sive America lib. 4. cap. ult. & ut Josephus Acosta lib. 3. cap. 22. & lib. 4. cap. 32. nec in insulis, nec in firma terra Uva aut vinum nascitur : in nova Hispania, vineæ uvas proferunt, sed nunquam probè maturescunt, ut vinum confici possit : nisi in Peru & Chile approbium vinum nascitur : nam jam vites colere didicere : & vinea perumque in convallibus Peruanis nascuntur, juxta quas fossas ad aquam colligendam excavant, quæ vites subinde irrigant.

I. Vitis vinifera, ex cujus Uvis acerbis immaturis succus exprimitur, quem *οἶνον ἀγρῖνον* Omphacium Dioscorides lib. 5. cap. 6. vocat : ex quo Syrupus de Agresta in officinis paratur.

II. Uva passæ major *βοβυαγ* & Græcis. Uvæ passæ majores, Trag. Gesn. hort. Cast. Uva passæ, Tur. Lon. Zibebas ferens, Cam. Uvæ Zibebæ Tab. Ger.

Non solum Uvæ, sed etiam acini præter modum ampli, crassi & oblongi sunt, ut non nisi passæ ad nos deferantur : Arabibus, uva Zibibi, Latinis passæ, Germanis, Zibeben/Meertreubel/ id est, uva marina.

III. Uvæ passæ Indicæ gigantis carentes. Uvæ sine vinaceis seu apyrenos, ad Clus. cur. post.

IV. Uvæ passæ minores, vel Passulæ Corinthiæ. Passulæ, Trag. Uvæ passæ minores, Gesn. hort. vel Corinthiæ, Cast.

Folij est rotundis, crassis, subtrus incanis, in pauciores lacinias obtusas divisas : Uvis partim fulvis, partim subnigris, dulcibus & vinosis.

V. Vitis sylvestris, Labrusca. Labrusca, Trag. Lugd. & alijs.

Labrusca dicta, quod in marginibus terræ, seu labris quibusdam oriatur. Dioscoridi lib. 5.

cap. 2. *ἀγρῖνον* & *ἀγρῖνον*, qui genera duo fecit : alterius enim Uva non maturescit, sed florem tantum profert *ἐναιβλιν* nominatum : altera fructum perficit, ex parvis acinis nigris subalstringentibus. Plinius Labruscam vocat & Oenanthen, ex alba Labrusca præstantiorem, quam è nigra scribit. Et Gesnerus libr. de hort. racemiferam tum albis, tum nigris acinis refert. Vocatur autem propriè Oenante, fructus Vitis sylvestris cum floret, Dioscoridi lib. 5. cap. 5. seu ut Plinius loquitur, Vitis labruscæ uva, quæ cum floret colligitur, quando optimè olet.

Apud Floridenses Labrusca in magna copia crescere, author part. 6. Ind. Occid. scribit.

VI. Vitis sylvestris Americana.

Vitis sylvestres vicinas arbores scandentes & uvæ edules proferentes in nova Francia habentur : part. 2. Amer.

VII. Vitis sylvestris Virginea.

Vitis duum generum spontè nascuntur : alterum uvis tenuibus acerbis : alterum majoribus & dulcibus : Hariot. desc. Virgin.

VIII. Vitis sylvestris Indica acinis pruni sylvestris.

Arbores multæ in India, quæ uvas quasdam agrestes ferunt, quarum Acini prunorum sylv. speciem referunt, & nigro folliculo vestiuntur, sed quia illis multum ligni, parum pulpæ, ex ijs vinum non faciunt : Benzo l. 1. c. 28.

SECTIO SECUNDA.

CLEMATITIS; LIGNUM COLUBRINUM; CLEMATIS; PERICLYMENUM; APOCYNUM; ASCLEPIAS; POLYGONATUM;
Lilium Convallium; Monophyllum; Laurus Alexandrina,
quibusdam Hippoglossum.

CLEMATITIS.

K *Apartitis* Dioscoridi lib. 4. cap. 182. idem est ac *Sarmentaria*: sic dicta, quoniam ad quas flagella, vitigenis flagellis similia emittit, ac ut illa arbores scandat. Plinio lib. 24. cap. 10. *Clematida* Smilacis similem, per arbores repentem geniculatam & ipsam appellaverunt. A Theophrasto 5. hist. 10. *Atragyn* dicitur, & esse arborem quae *Vitis* & *Labrusca* modo surgat.

I. Clematidis sylv. latifolia.
Vitis sylvestris, Trag. Lugd.
Vitis nigra, Fuch. Tur. Lon. 2. Tab.
Vitalba, Dod. ut: Guiland. the. (& Vitis sylv.
Dioscoridis) Cæf.
Viburnum Gallorum, Bellon.
Atragene Theophrasti, Ang. Clus. hist.
Vitis sylv. caustica, Cefn. hort.
Clematis 3. Matth. Cast. Thal. 2. Lac.
Clematis altera prima, Cord. in Diosc.
Viorna vulgi, Ad. Lob. Ger.
Clematis five Viorna vulgi, Lobelij, Eyf.

Clematidis est Dioscoridis, Atragene Theophrasti: quibusdam Vitis sylv. Plinij.

In foliorum divisuris mirè ludit & sarmenta aliquando brachiorum crassitudinis sunt.

II. Clematidis Peruviana.
Bexugo del Peru, ad Atragene sarmenta proximè accedentia, cortice cinereo obducta, gustus lenti, dein acris, denique fauces urentis: drachma purgat & Mechoacæ præfertur, Clusius in notis ad Monardem.

III. Clematidis peregrina folijs pyri incis. Clematis altera Boetica, Clus. hisp. & hist.
Clematis Boetica, Clusij, Lob. Lugd. Tab. Ger.

IV. Clematis five Flammula repens.
Clematis altera, Dod. gal. flore albo, Cast. Cam.
Clematis flammula quibusdam, Cefn. hort.
Clematis altera urens, Ad. Lob.
Flammula, Dod. Lugd. hist.
Viticella, Cæf.
Clematis urens, Tab. Ger.

Flammula dicitur, quod contusa applicata, vesicas flammæ instar excitet, cujus folia aliquando Apij modo dividuntur: est etiam simplex vulgaris, alia multiflora, quæ

Clematis urens 2. Tab.
Clematis urens multiflora, Ger.
V. Clematidis maritima repens: quæ 1. in Pr.
Clematites, Ang.
VI. Flammula recta.
Flammula, Matth. Lugd. Clus. pan. & hist. Tab.
Flammula frutex, Cord. in Diosc.
Clematis altera, Turn.
Flammula altera, Dod. altera surrecta, Lob.
Flammula recta, Cam. Eyf.
Flammula Jovis surrecta, Ger.

Duplex est: alterius sarmenta & foliorum pediculi virescunt & serius floret: alterius rubent & maturius floret.

Centella herba, quæ trita tumoribus impostis pustulas excitat, in epist. ad Monardem huc referri potest.

VII. Clematidis alpina Geranifolia: quæ 2. in Prodomo.

Clematis cruciata alpina, Ponæ.

VIII. Clematidis cærulea erecta.
Clematis altera minor longifolia, Clymenum quorundam, Lob. Lugd.

Clematis cærulea Pannonica 2. Clus. pan.

Clematis cærulea 2. Tab.

Clematis major Pannonica, Ger.

Magnitudine variat: hinc duæ figuræ apud

Clusium hist. pan. & Tab. sub

Clematide cærulea pan. 1. quæ Clematis cærulea

pannonica, Eyf.) & 2. Et Ger. sub

Clematis pan. & Clemat. majore pannonica.

Flore est cæruleo, rarius albo.

IX. Clematidis cærulea vel purpurea repens.

Clematis altera, Matth. Dod. Cast. ap. Clus. hist.

flore purpureo, Cam.

Clematidis alterius altera species, Dod. gal.

Clema-

Clematis peregrina cærulea & purpurea, Lob. Tab. qui duas figuras habet, & Ger. sub cærulea & rubra.

Clematis 3 quæ Flammula, Cæf. Pothos cæruleus, Lugd.

Clematis peregr. incarnato simpl. flore, & Clematis peregr. purpurea simpl. flore, Eyst.

Alijs Clematidis Dioscoridis: quidam *πρό* (Desiderium Gaza vertit) Theophrasti 6. hist. ult. faciunt.

X. Clematidis cærulea flore pleno.

Clematis altera fl. pleno, Cam. ep. Clus. cur. post.

Clematis peregr. purpur. flore pleno, &

Clematis peregr. incarnata plena, Eyst.

Flore est cæruleo, purpureo cæruleo, incarna-

to, ad purpureum colorem sed admodum dilutum accedente.

XI. Clematidis trifolia flore roseo clavato. Granadilla, Monardi, Petro de Cieca in hist. Peruana, Lugd. Vide in Americæ par. 9. l. 4. c. 27. at c. 30. Granadilla inter ligna recensetur.

Flos passionalis sive Granadille ex India, du Bry.

Granadilla dicitur propter semen, quod ut in malis granatis inclusum continetur: Flos passionalis, quod in flore aliquæ veluti passionis Christi figuræ delineatæ conspiciantur, Monardes.

Hujus folia & flores à Doctis. Simplicista Joh. Pona Veronâ anno 1621. accepi.

CLEMATITIS INDICA, QUÆ LIGNUM.

Colubrinum.

Clematitidem vocamus, quia pleræque sarmentaria sunt & per arbores repunt: Pao da Cobra, id est Lignum Colubrinum, Lusitani nominant, quia adversus animalium virus ejaculantium morsus & itus efficax sit.

I. Clematidis Indica folijs Lentiscinis candidis maculis aspersis.

Ligni colubriini tertium genus, Garz. Frag.

II. Clematidis Indica spinosa folijs luteis.

Ligni colubriini alterum genus, Garz. Frag.

& Clusio, qui ligni frustum pingit, & Lugd. cui

malè titulus Ligni colubriini Acoftæ inscriptus

Lignum colubrinum, Tab. (est.)

III. Clematidis Indica folijs persicæ, fructu

Periclymeni.

Ligni Colubriini primum genus, Garz. Frag.

Palo del Cebra, id est, Lignum serpentinum seu

Colubrinum, Linscot. 4. par. Ind. Or. c. 31.

Pao de Cebra lignum seu radix Lusitanis dicta,

omnium venenorum antidotus, in Insula S.

Laurentij, Ind. Or. part. 4. c. 7.

Et hæc tria ligni genera in insula Zeilan reperuntur.

IV. Clematidis Malabarensis folijs Vitis, colore dracunculi.

Lignū colubrinum primum, Acoftæ, Cast. Lug.

V. Clematidis Malabarensis altera radice

serpente.

Lignum colubrinum alterum, Acoftæ, Lugd.

Palo della Culebra, Cast. ap.

VI. Colubriini ligni tertium genus in eadem

provincia, vastæ arboris magnitudine, Acoftæ.

an Lignum colubrinum quod pingitur à Clu-

sio notis ad Acoftam.

VII. Radix quædam in Malaca, quæ ad-

versus vulnera sagittis toxico illicitis facta, præ-

sentaneum remedium est, Garzias.

CLEMATIS DAPHNOIDES.

Quæ Dioscoridi l. 4. c. 7. *Κληματίς*, aut *δαφνοειδής*, aut *ουνοειδής*, aut *πολυγωνοειδής* dicitur, ipsi Plinio l. 24. c. 15. Clematis Aegyptia, quæ ab alijs Daphnoides, ab alijs Polygonoides vocatur. Alijs tamen ejusdem l. 21. c. 11. Vinca pervinca censetur: alijs, an ejusdem l. 24. c. 15. Centunculus sit, dubitantibus.

I. Clematis daphnoides minor.

Vinca pervinca, Brunf. Gefn. hort. Lon. Adv.

Lugd.

Chamædaphne altera Dioscoridis, Brunf. 4.

Pervinca (quod semper vireat) Trag.

Clematis, Matth. Lac. Cord. in Diosc. Tur.

Clematis prima Dioscoridis, Ang.

Clematis daphnoides, Dodon. ut: Fuch. Lob.

Thal. Cam. Tab. Clus. hist.

Clematis Aegyptia sylv. Gefn. hort.

Provinca vulgo. Cæf.

Clematis daphnoides minor flore cæruleo:

flore albo: flore purpureo: tres fig. Eyst.

Flores cærulei sunt: quandoque candidi:

rarius rubentes, vel subpurpurascens: inter-

dum flos alium florem medium continet.

Pp 3

II. Cle-

- II. Clematis daphnoides major.
Clematis Ægyptia hortensis flore purpureo, Gesn. hort.
Pervinca major, Adv. Eyft.
Clematis five Pervinca major, Lob.
Clematis daphnoides major, Dod. Cam.
Pervinca altera major, Cæf.
Clematis major, Lugd. prima major, Caft.
Clematis daphnoides latifolia, Cluf. hift.
Hanc Clematidem Ægyptiam Plinij : il-
lam ejusdem Vincam pervincam, Cæfalpinus statuit.
III. Clematis flore pleno.
Daphnoides polyflora, Lob.
Clematis flore multiplici, Cam. epit.
Clematis purpurea Auftriaca, flore pleno, Camer. hort.
Clematis major flore duplicato, Lugd.
Clematis altera flore pleno, Cluf. hift. ap. alt.
Clematis daphnoides fl. purpureo pleno, Eyft.

PERICLYMENUM.

Περικλυσμὸν à Dioscoride lib. 4. cap. 14. describitur, quod sit frutex simplex, habens ex intervallu foliola caulem amplectentia, subcandida, hederacea, & inter folia germina nascentia, super qua fructus hedera similis : florem candidum faba similem subrotundum & quasi in folium procumbentem : semen durum & avulsa difficile : radicem crassam ac rotundam : Nisi Diosc. radicem rotundam diceret, cum nostra conveniret : at Plinius lib. 27. cap. 12. radicem præterijt. Quare an nostrum Periclymenum, potius sit *κωνόδενρον* & *έρειρα*, quam *μοσώθενρον* aut *μοσώφυλλον* vocitent, Dioscoridis lib. 2. cap. 195. & Cyclamenos Plinij lib. 25. cap. 7. ambigitur, quod Diosc. scribente, folia fert hedera, sed minora : caules crassos, geniculatos, quig, circa vicinas arbores capreolorum modo se volvunt : flores candidi, odorati : fructus vero instar acinorum uva. similis hedera, mollis, aliquantulum acrisaporis & lentus : radix inutilis. Et si sint qui velint, Cyclaminum alteram, Vitem sylvestrem & Periclymenum tribus distinctis locis à Dioscoride descriptum, unius plantæ nomina esse. Periclymenum dictum volunt, quod se adminiculis convolvat.

- I. Periclymenum non perfoliatum Germanicum.
Caprifolium, Brunf. Gesn. hort. Lon. Germanicum, Dod.
Periclymenum, Trag. Fuch. Dodon. gal. Turn.
Cord. in Diosc. Gesn. hort. Cam. Thal. Tab. Ger.
Germanicum, Eyft.
Periclymenum non perfoliatum Septentrionalium, Ad. Lob.
Periclymenum vulgare Septentrionalium, Cluf. hift.
Flos candidus, subluteus.
II. Periclymenum perfoliatum.
Periclymenum, Matth. Ang. Lac. Adv. Caft.
Periclymenum alterum, Dod. gal.
Periclymeni species cujus folia unita, Gesnæ hort.
Periclymenum perfoliatum, Lobel. Lugd. (& grandius) Tab. Ger. Eyft.
Periclymenum vulgare alterum, Cluf. hift.
Vinciboscum vulgo, Cæf.
Flores ex purpura niveo candore nitent, alibi luteo asperfi : aut albi, aut subruffi.
III. Periclymenum humile.
Periclymenum 2. & Chamæpericlymenum
Prutenicum, Cluf. pan.
Periclymenum minus, Tab.
Chamæpericlymenum, Ger. Cluf. hift.
IV. Periclymenum humile Norvegicum.
Chamæpericlymenum tenerius aliud, Cl. hift.

APOCYNUM.

Απόκυνον ἢ κυνέκχορ, *παρακλυσχέρ*, *κυνόμορον* Dioscoridi lib. 4. cap. 81. Apocynum, Plinio lib. 25. cap. 11. quod canes, lupos, vulpes & pantheras, Dioscoride auctore, vel ut Plinius, canes & omnes quadrupedes, necet. Dicitur alias *αἰγινδον* quasi circumplectens, eo quod proxima amplexetur.

- I. Apocynum folio subrotundo.
Apocynum, Matth. Ang. Gesn. hort. Lac. Adv.
Lob. (cui & Periploca Græca folijs latioribus hederateis) Lugd. Caft.
Apocynum primum latifolium, Cluf. hift.
Cynocrambe, Lon.
Apocyni alterum genus, Cam.
Periploca repens, Cæf.

II. Apoc.

II. Apocynum folio oblongo.

Apocynum repens, Matth. Lugd. Camer.

Apocynum folijs Oleandri, Anguil.

Apocynum 2. angustifolium, Clus. hisp. & hist.

Periploca, Cæs. altera, Dod.

Periploca serpens angustiore folio, A. d. Lob.

III. Apocynum angusto folio.

Secamonæ, Scammonij species Egyptijs, Alpin.

Apocini secundi species altera, Clus. his. & hist.

IV. Apocynum Egyptiacum lactescens siliqua Asclepiadis. Beidel-sar Alpini.

Ossar vulgo in Ægypto: fructus vero Beid el ossar, hoc est, ovum ex Ossar: Arabibus Saccharum Alhusar: forte Arbor lanigera, Bellonij l. 2. obs. Hon. Belli ep. 4. & 5. ad Clus.

Apocynum Syriacum, seu Palæstinum, sive Ægyptiacum, Clus. hist.

Elula Indica, quibusdam.

A S C L E P I A S.

Eτς α' σκληρὸς Dioscoridi lib. 3. cap. 106. & Plinij lib. 27. cap. 6. Asclepias, à quibusdam nostrum censetur (dubitat Anguillara, negat Matthioli) at Apocyno cognata herb. a videtur.

I. Asclepias albo flore: & Gerard.

Hirundinaria, Brunf. Trag. Gef. hor. Lonic.

Hederalis, Ruellio.

Vincetoxicum, Matth. Dod. Thal. Cast. Lugd.

qui Fuchsj & Matthioli figuram exhibet.

Asclepias, Fuch. Dod. gal. Cord. hist. Turn. Lac.

Gef. hor. Ad. Lob. Cæs. Tab. duplici figura, Cam.

Asclepias vulgi, Apocynum Dioscoridis, Col.

II. Asclepias nigro flore.

Vincetoxici altera species, Dod.

Asclep. altera fl. nigro, Lob. sive Periploca min.

Asclepias nigra, Lugd. flore nigro, Cam. Taber, Clus. hist.

Vincetoxicum flore nigro, Cam. epit.

Apocynum, Colum.

III. Asclepias siliqua bifido mucrone.

Asclepias Cretica, Clus. hist. append. 1.

IV. Asclepias ex Virginea.

Wisauck sive Vincetoxicum Indicum, Gerard.

V. Fructus Asclepiadis siliquæ similis, seminibus planis nigris.

Fructus 3. è navigation. Batau. Clus. ex l. 2. c. 15.

P O L Y G O N A T U M.

Πολυγόνατον Dioscoridi lib. 4. cap. 6. quod radix crebro geniculata sit: vulgo Sigillum Salomonis, haud dubie à vestigijs pluribus, radici sigilli instar impressu.

I. Polygonatum latifolium vulgare.

Sigillum Salomonis, Brunf. Gesn. hor. latifolium, Trag.

Polygonatum, Matth. Lac. Cast. vulgare, Cam.

vulgatius, Eyst.

Polygonatum latifolium, Fuch. Dod. ut: Cord.

in Dioscor. & hist. Gef. hor. Lob. Tab. primum, Gerard.

Polygonatum majus, Lon. Ad. Thal.

Polygonatum latifolium vulgare, Clus. hist.

Fraisinella, Ang. Cæs.

Vulgares herbarij Germ. cum Dictamno albo & Elleboro albo confundunt: alij malè Secacul Arabum faciunt. Variat baccis rubèrib' purpureis. quandoq; nigris, ut Cam. in epit. monet.

II. Polygonatum latifolium maximum.

Polygonatum majus, Clus. pan. Eyst.

Polygonatum latifolium primum, Eid. hist.

Polygonatum Pannonicum, Cam.

I. I. Polygonatum latifol. Elebori albi folijs.

Polygonatum πικρὸν, vel 2. Clus. pan.

Polygonatum 3. latiore folio, Eid. hist.

Polygonatum latifolium, Dod. post.

IV. Polygonatum latifol. flore majore odore.

Polygonatum flore odore, vel 1. Clus. pan.

Polygonatum secundum latiore folio, Eid. hist.

Polygonatum, Ger. latifolium minus, Tab.

an Polygonatum angulosum, Cord. hist.

V. Polygonatum latifolium minus flore majore: 1. in Prodomo.

VI. Polygonatum latifolium perfoliatum Brasilianum: 2. in Prodomo.

VII. Polygonatum latifolium ramosum.

Laurus Alexandrina, Matth. Dod. gal. Cam.

Hippoglossum, Lugd.

Rusco affinis tertia, Cæs.

Polygonat. 3. Clus. pan. latif. 4. ramosum, Eid. hist.

Polygonato affinis planta, Lob. ob.

Polygonatum latifolium 3. & 4. Tab.

Polygonatum ramosum & acutum, Ger.

VI I. Polygonatum angustif. non ramosum.

Sigillum Salomonis angustifolium, Trag.

Polygonatum angustifol. Fuch. Dod. gal. Tur.

Eyst. Lugd. Clus. pan. vel 5. hist. primum, Tab.

Poly-

Polygonatum tenuifolium, Cord. in hist. Cam. c. 14. x. alijs Ephemerum ejusdem l. 4. c. 85. & Plinij lib. 25. c. 13. qui florem cæruleum tribuit.
 Polygonatum erectum, Gef. hort. IX. Polygonatum angustifolium ramofum.
 Polygonatum minus, Lon. Ger. folijs rubiæ, Polygon. 4. angustifolium ramofum, Cluf. pan.
 Ad. Lob. Polygonatum angustifolium secundum, Tab.
 Polygonatum alterum, Dod. angustifolium, Ger.
 Polygonato similis in albis, Cæf. Polygonatum 6. five angustifolium 2. Cluf. hist.
 Quibusdam Chamædaphne Dioscoridis l. 4. Polygonatum tenuifolium minus, Thal.

LILIIUM CONVALLIUM.

Lilium, quod à loco natali convallium appellatur, à quibusdam Lilium vernum Theophrasti 6. hist. 7. censeatur: alijs Oenanthem ejusdem l. 6. c. 7. & Oenanthem Athenæi volunt.

I. Lilium convallium latifolium: in Prodromo describitur.

II. Lilium convallium album.
 Lilium convallis, vel sylv. Brunf.
 Lilium convallium, Trag. Matth. Gef. hor. Dod.
 Cæf. Cast. Lugd. Cam. Tab. Ger. Cluf. hist.
 Lilium Theophrasti, Dod. gal.
 Ephemerum non lethale, Fuch.
 Callyonimus vel Chamæcitinus, Gef. hor.
 Cacalia, Lonic.
 Lilium convall. vel vernum Theophr. Ad. Lob.

III. Lilium convallium alpinum.

Lilium convallium alterum alpinum flore majore, & odoratiore, Cam.

Lilium convallium flore albo, Eyf.

IV. Lilium convallium flore rubente.

Lilium convallium floribus suaverubentibus, Lob. icon.

Lilium convall. rubrum, Tab. fl. subrubro, Cam.

Lilium convallium flore incarnato, Eyf.

Flore est minore, candore & rubore confusè mixto, & odore minus valet.

MONOPHYLLUM.

Monophyllum, unifolium dictum, quod cum prodit unico fit folio, nam cum cauliculum acquirit, folia bina habet, rarius tria, & quidem in albis: propter similitudinem cum Lilio convallium, minus appellare lubet: sunt qui Cyclaminum tertium Plinij l. 25. c. 9. velint.

Lilium convallium minus.

Unifolium, Brunf. Dod. ut: Lug. Cam. Tab. Eyf.

Cotyledon syl. & Unifolium, Trag.

Gram. Parnassi, Mat. Lug. Cast. Tab. majus, Ger.

Henophyllum vel Monophyllum, Gef. hor.

Cyclaminum unico folio, Dalech. in Diosc.

Monophyllum, Ad. Lob. Thal. Gerard.

Bifolium primum, Lonic.

LAURUS ALEXANDRINA QUIBUS-
dam Hippoglossum.

Laurus Alexandrina, Dioscoridis l. 4. c. 132. & Hippoglottion Plinij l. 15. c. 30. ubi Laurum Alexandrinam vocat, ab alijs Idæam dictam, sunt qui idem censeant cum Lauro Alexandrina Theophrasti 3. hist. 17. Alijs Idæa pisse, Idæa radix Dioscoridis l. 4. c. 44. Alijs δάφνη ἀλεξάνδρεια, aut idæia, aut τσάλαρτζορ, Laurus Alexandrina Dioscoridis l. 4. c. 147. Alijs χαμαϊδάφνη, qua & ἀλεξάνδρεια Dioscoridis l. 4. c. 149. & Laurus taxa Plinij l. 15. cap. ult. & Chamædaphne ejusdem l. 24. c. 15. Denig. sunt qui radicem Idæam, Hippoglossum, Laurum Alexandrinam & Chamædaphnen apud Dioscoridem idem esse velint.

I. Laurus Alexandrina fructu pediculo infidente.

Uvularia, Brunf. (qui marem & foeminam pingit, sicut & Tabernæmontanus & Gerard.) Lon.

Laurus Alexandrina, Brunf. Trag. Fuch. Ang.

Gef. hort. Eyf.

Hippoglossum, Matth. Dod. ut: Turn. Lac. Ad.

Lob. Cast.

Hippoglossum mas & foemina, Ger.

Uvularia mas, five Laurus Alexandrina, Tab.

icon.

Uvularia foemina, five Hippoglossum, Tab. ico.

Hippoglossum, quod à Lauro Alexandrina differt, Guil.

Hippoglossus, Gef. hort.

Daphne Alexandrina, Fuch.

Boni

Bonifacia & Bislingua, Anguil.

Laurus taxa Plinij, Lugd.

Rusco affinis prima, Cæs.

Bislingua, Clus. panon.

Radix Idæa Dioscoridis, Colum.

Laurus Alexandrina Theophrasti, 2. Clus. hist.

II. Laurus Alexandr. fructu folio infidente.

Laurus Alexandrina altera, Matth. Taber.

Laurus Alexandrina & Chamædaphne, Guil.

Laurus Alexandrina, Lac. Lob. ad part. alt. Col. cui & Chamædaphne.

Laurus Alexandrina vera, Lugd. Clus. hist.

Rusco affinis altera, Cæs.

Hippoglossum Matthioli, Ger.

Hæc folio est rotundiore, baccis in medio foliorum impressis, nec ulla epiglottide testis: illa folio est longiore, glossarijs sive ligulis donata, baccis ex oblongis petiolis dependentib.

S E C T I O T E R T I A.

HEDERA; HEDERA TERRESTRIS; CYMBALARIA; NASTURTIUM INDICUM; BALSAMINA; NOLI ME TANGERE; ARI-STOLOCHIA; Cyclamen; Gramen Parnassi; Saxifraga; Chelidonia minor; Numularia.

H E D E R A.

Hedera κισσός Dioscoridi lib. 2. cap. 210. uῆρις Theophrasto 3. hist. 18.

Differentias multas in specie sortitur, summas autem genere tres: nam quadam candida est, altera nigra, tertia helix: candida fructum fert candidum: nigra nigrum, aut croci amulum, quam vulgus Dionysiam vocat: Helix fructum non gignit, &c. Dioscorides. Sic Theophr. l. c. multigena hedera est, quadam enim humi repens: quadam in excelsum se attollens: & excelsarum genera plura, sed tria summa patescunt, candida, nigra, tertiaq; clavicula, &c. Plinius l. 16. c. 34. Hedera duo prima genera fecit, marem & feminam (per marem Cistum intelligere oportet, confundit enim Cistum cum Cisso, id est Hedera) subjungit: species tres esse, candidam, nigram, helicem: quæ species in alias etiam dividuntur, &c. quæ ex Theophrasto sumpsit.

I. Hedera arborea.

Hedera, Brunf. Trag. Ang. Cord. in Diosc. Dod.

Cæsalp.

Hedera arborea, Matth. Ges. hort. Lugd.

Hedera nigra, Fuch. Dod. gal. Lac. Lonic.

Hedera corymbosa communis, Ad. Lob. Taber.

Gerard.

Hedera major, Castor.

Variat cultu enim arborefcit, & cum ad eam ætatem pervenit, in qua fructum ferre potest, totam faciem mutat, nam per se erigitur, nullum adminiculum quærens, & hanc Orthocissum antiqui dicunt, quæ Hedera arborea recta, Ad.

Folia mutat, ut quæ prius in plures angulos desinebant, angulis oblitteratis, excepto eo qui in summo est, rotundantur, maculis albis, aliquando sub rubentibus, infernè distinguuntur. Baccæ maturitate nigra, raro flavæ.

II. Hedera poetica.

Hedera Dionysias, & Chrysocarpos, Dalech.

Lugd.

Dionysias aut Bacchica, quod ex ea poetarum coronæ confuerentur: Chrysocarpos, à fructus colore aureo: hinc folium minimè angulosum est.

III. Hedera major sterilis.

Hedera Helix, Brunf. Matth. (& minor) Fuch.

Dod. ut: Lac. Lon. Lugd. Cæs. Cam. Tab. Ger.

Hedera sterilis, Anguil.

Hedera arborea sylvestre genus, Ges. hort.

Helix sive provoluta sterilis hedera, Ad. Lob.

Hedera minor, quæ Helix, Castor.

Hedera species tertia helix vocata, Thal.

Hæc diversa ne sit ab arborea, Theophrastus ambigit: Plinius concedit: at recentiorum aliqui negant, fieri enim utalibet non arborefcit, ob imperfectionem quandam Individui non speciei.

IV. Hedera humi repens.

Hederula, Trag.

Hedera minor in iysa & uas, Dodon.

V. Hederaceis folijs planta.

Cyclaminos altera hederaceis folijs, Lob. Lug.

HEDERA TERRESTRIS.

Hedera terrestris, & minor & Dioscoridi lib. 4. cap. 126. si in descriptione pro *μαργόρινα*, *μυρτίνα* legatur: à Plinio videtur intelligi, sub Hedera à terra se non attollente: quibusdam Malacocissos, quasi mollis hedera, in Geoponicis: alijs Chamaclena, quasi Clematis humilis repens.

- | | |
|---|---|
| I. Hedera terrestris vulgaris. | & folijs: floribus magis cæruleis, quæ locis humidioribus circa arbores antiquas reperitur. |
| Hedera terrestris, Brunf. Matth. Dod. Lug. Cæf. | II. Hedera terrestris montana. |
| Thal. Tab. Gerard. | Hedera terrestris species montana, Cam. epit. |
| Elatine, Brunf. 4. | Priore hirsutior est, folijs majoribus & floribus, qui purpurascunt. |
| Chamæcissos, Trag. Fuch. Dod. gal. Lac. Cam. | III. Hedera faxatilis magno flore. |
| Chamaclena, Cord. hist. | Afarina sterilis, Lob. ob. |
| Humilis hedera, Ad. corona terræ, Lob. | Afarina five faxatilis hederula, Ad. Lob. icon. |
| Malacocissos, Lugd. | Afarina Lobelij, Lugd. |
| Duplex est: major, quæ vulgata: minor elegantior, cauliculis erectioribus, brevioribus ut | |

CYMBALARIA.

Cymbalaria, à cymbalo nomen duxisse videtur: quibusdam Umbilicus Veneris alter censetur: at Hermolai, Barbarus, Capnon primam Plinij lib. 25. cap. 13. esse credidit.

- | | |
|--|---|
| Cymbalaria, Matth. Lugd. Cæf. Cast. vulgaris, Lac. | Umbilicus Veneris officinarum, Lonic. |
| Cymbalaria Italica hederaceo folio, Ad. Lob. | Linaria hederæ folio, Col. |
| | Cymbalaria folijs hederaceis fl. cæruleo, Eyst. |

NASTURTII INDICUM.

Nasturtium dictum ob saporem, Indicum à loco natali.

- | | |
|---|--|
| I. Nasturtium Indicum majus. | Flos sanguineus Monardi, Lugd. |
| Nasturtium Indicum, Dodon. Lob. Lugd. Cam. | II. Nasturtium Indicum minus. |
| Cast. Eyst. | Nasturtium Peruanum, Monardi. |
| Nasturtium peregrinum, quod Peruvian. Lugd. | Folia habet rotunda, Lenticulæ paulo majora. |

BALSAMINA.

Balsamina dicuntur, quod ex pomis ipsius maris immaturis oleo injectis, insolatione oleum seu Balsamum, ut Chirurghi vocant, ad vulnera consolidanda præstantissimum conficiatur.

- | | |
|---|---|
| I. Balsamina rotundifolia repens, five mas. | Momordica fructu luteo rubescente, Eyst. |
| Balsamina, five pomum mirabile, Trag. | II. Balsamina femina. |
| Balsamina, Matth. Lac. Lugd. Cæf. alba, Gesn. hort. | Balsamine altera, Trag. Matth. Fuch. Ang. Gesn. hort. Cast. |
| Balsamine prima, Fuch. Anguil. | Balsaminum, Dod. gal. Lon. & Charancia femina. |
| Balsamina pomifera, Gesn. collect. | Balsamina, Dod. Lugdun. cum Matth. & Fuch. figura. |
| Charantia, Dod. ut: Lonic. | Balsamella, Cord. hist. |
| Cucumis puniceus, Cord. hist. | Balsamina amygdaloides, Gesn. ad Cordum. |
| Balsamina cucumerina punicea, Ad. Lob. Tab. | Balsamina femina, Cam. Tab. Ger. Eyst. |
| Balsamina mas, Cam. Gerard. | Balsamina femina persicifolia, Ad. Lob. |
| Momordica, Castor. | Catanance, Cæsalp. |
| Quibusdam Plinij l. 20. c. 2. Cucurbita Somphos à Græcis appellata. | III. Balsamina lutea, five Noli me tangere. |
| Fructus maturus colore variat, modò puniceo, modò luteo rubescente. | Mercurialis sylv. altera, Trag. |
| Balsamina mas fructu puniceo, &c. | |

Efula,

Efula, Eid. & Lugd.

Tithymalus sylv. Lon.

Noli me tangere, Gefn. hort. & frac. (cui & Mi-
lium caprearum) Cam. Tab. Eyst.

Perficaria filiquosa, Ad. Lob. Lugd. Cam. Thal.

Impatiens herba, Dod.

Catantance altera, Cæf.

Chrysea, Lugd.

Ballamita altera, Col.

Noli me tangere & Impatiens herba dicta,
propter filiquas, quæ ubi maturæ levissimæ
contactu dissiliunt: aliqui Æschinomen Plinij
suspiciantur: quibusdam Pseudoapocynon.
Flore est luteo, est & pallido.

ARISTOLOCHIA.

Aristolochia Dioscoridi l. 3. c. 4. quod existimetur optimè puerperis, seu partus doloribus opitulari: hinc
forte Nicandri scholiastes refert, Aristotelem herba hujus inventionem mulieri tribuere. Et Plinio l. 25.
c. 8. Aristolochia nomen graviora dedisse videntur, quoniam esset ἀριστὸν λήξαις: nostri Malum terre vocant.

Genera tria Dioscorides agnovit, ὀγγυρῶν, μακρά, καὶ μικρὰ. Plinio genera quatuor: unum tube-
ribus radicum rotundis: alterum radice longa: tertium longissima tenuitatis, quæ Clematis, ab alijs Cretica
vocata: quarta quæ Pistolochia, tenuiori proxima, quam quidam Polyrrhizon cognominant, &c.

I. Aristolochia rotunda, flore ex purpura
nigro.

Aristolochia rotunda vera, Trag. Lon. Cam.

Aristolochia rotunda, Matth. Dod. ut: Anguil.

Cord. in Diosc. Gefn. hort. Tur. Lac. Adv. Lob.

Cast. Lugd. Eyst.

Aristolochia rotunda i. Clus. hisp. & hist.

Aristolochia femina, Lugd.

Aristolochia prima, Cæf.

II. Aristolochia rotunda flore ex albo pur-
purascens.

Aristolochia rotunda altera, Clus. hisp. & hist.

Anguillaria plures species inveniri scribit:
verum hæc non solum colore floris, sed & fo-
lijs & fructu à prioribus differt.

III. Aristolochia longa vera: & Ang. Cam.

Aristolochia longa, Dod. ut: Cord. in Diosc.

Gefn. hort. Ad. Lob. ico. Clus. hisp. & hist. Lugd.

cum Clusij & Fuchij figura.

Aristolochia altera radice pollicis crassitudi-
ne, Cæf.

IV. Aristolochia longa Hispanica.

Aristolochia longa altera, Clus. hisp. & hist.

V. Aristolochia Clematis recta.

Aristolochia, Brunf. longa, Trag. Matth. Fuch.

Tur. Lac. Lon. Cast. Lugd.

Aristolochia longa altera, quæ Clematis ve-

teribus, Cord. in Diosc.

Aristolochia longa vulgaris, Ang. Cam. epit. &

hort. Eyst.

Aristolochia Clematis, Dod. gal. Ang. Gefn.
hort. Adv. Lob. Tab. Ger.

Aristolochia Sarracenica, Dod. Lugd.

Aristolochia Clematis i. Clus. hisp. clematis
vulgatior, Eid. hist.

Aristolochia altera radice tenui, Cæf.

VI. Aristolochia Clematis serpens.

Aristolochia clematis, Dod. Lugd. Cast. desc.

Belli epist. i. ad Clus. vel

Aristolochia Cretica.

Aristolochia clematis altera, Clus. hisp. vel

Beotica, Eid. hist.

Aristolochia Clematis altera Hispanica, Lob.

Flos luteus, aut ex purpura nigricans.

VII. Aristolochia Pistolochia dicta.

Pistolochia, Dod. ut: Gefn. hort. Clus. hisp. &

hist. Cam. epit. Cast. Lugd. cum Clus. & Dodon.

figura.

Aristolochia polyrrhizon, sive Pistolochia Plinij, Ad. Lob.

Aristolochia altera plures radices spargens,

Cæf. alp.

Flos aliquando niger, aliquando ex herbido

luteus.

VIII. Pistolochia Cretica.

Pistolochia altera sempervirens, Clus. hist. ap. i.

IX. Aristolochia Maurorum.

Rhafut & Rumigi à Mauris nominata, Rau-

vvolf. Lugd. append.

Aristolochia peregrina Rauvvolfij, Clus. hist.

CYCLAMEN.

Kυλάμινος Dioscoridi lib. 2. cap. 194. folijs est hederae purpureis, varijs, supra infraq. albicantibus
maculis, &c. Theophrasto 9. hist. 10. GAZA tuber terra reddidit, imitatus Plinium, cui lib. 25.
cap. 9. Cyclaminus, nostris Tuber terre dicitur.

Differentia: alius vere, alius autumnus floret: quibusdam flos odoratus, alijs inodorus: & flore rubro, albo, luteo, tum qui autumnus floret & odoratus est. Pettrillium Plinij l. 21. c. 8. Anzullara cenfer: sic æstivum, Epharitin Aëtij Bononienses, Camerario notante, credunt.

I. Cyclamen orbiculato folio infernè purpurascens.

Cyclaminus minor & Umbilicus terræ, Trag.
Cyclaminus, Matthiol. Dodon. gal. Cord. in
Dioscor. & hiftor. Gefn. hort. Lac. Turn. Lon.
Tabern.

Cyclaminus major, Cast.

Cyclaminus rotunda, Fuch.

Cyclaminus orbicularis rotundifolius, Dod.

Cyclamen vulgare, Eystett. officinarum orbiculato folio, Panis porcinus, & Arthanita, Lobel. ico.

Cyclaminus flore odorato, Clus. pan. & hift.

Cyclaminus vulgaris, & Cyclam. prior, cum
icone Matth. & Lobelij, Lugd.

Cyclaminus æstivus vulgaris, Cam.

Cyclamen orbiculato folio, Ger.

Flos nunc dilutius, nunc saturatius purpurascit: albo flore rarius reperitur. Radice est aliquando maxima, & ejus species quædam, radice instar capitis arietis, Gefn. hort.

II. Cyclamen orbiculato folio infernè ex viridi pallente.

Cyclamini odorati altera species, Clus. pan.

Cyclamen odorato flore 2. Eid. hift.

III. Cyclamen radice maxima folijs infernè rubentibus.

Cyclamen Romanum, Eyst.

an Cyclamen à Muro, Clus. hift.

IV. Cyclamen folio anguloso.

Cyclamen folijs angulosis, Gefn. hort.

Cyclamen vernum, Lob. ico. Cam.

Cyclamini orbiculati tertia species, Dod.

Cyclaminus verno tempore florens, Clus. pan. & hiftor.

Cyclamen vernum, Eyst.

Folio est rotundiore rarius oblongiore, floribus intensius quam in vulgari rubentibus, vel omnino albescens.

V. Cyclamen odoratum æstivo solstitio florens folio maculato.

Cyclamini odorati duplex varietas, Clus. hift.

Prima folijs aliquantum angulosis, albis maculis obscure averfa parte notatis: flos saturatè purpurascens. Alterius folia averfa parte viridia, ad verfa maculis albis manifestis, flos dilutius purpurascit, vel omnino albescit.

VI. Cyclamen hederæ folio: & Adv. Lob. Clus. pan.

Cyclamini alia species, Dod. gal.

Cyclaminus orbicularis, Dod. alter orbicularis, Lugd.

Cyclaminus inodoro purpurascens flore, Clus. hift.

Cyclaminus æstivus folio hederaceo, Cam.

Cyclamen serotinum folijs hederaceis, Eyst.

VII. Cyclamen folio hederaceo polyanthes. Cyclaminus Byzantinus alter, tubere palmaris latitudinis *πολλανθες*: tulit flores 20. 50. 100. Clus. hift.

VIII. Cyclamen radice castaneæ magnitudinis.

Cyclaminum Constantinopolitanum, vel byzantinum, Clus. pan. & hift.

Folia prona purpurascens supina candidantibus maculis notantur.

IX. Cyclamen radice exigua.

Hermodactylus quorundam, Trag.

Cyclaminus exigua, Eidem.

Cyclaminus montis Juliani, cujus Mesues meminit, Ang.

Cyclamini exigua veræ species, Lugd.

Cyclaminus radice avellaneæ, Clus. pan.

Cyclaminus æstivus, Eid. hift.

Cyclaminus minor, Cast.

X. Cyclamen oblonga radice.

Cyclaminus radice oblonga malo in fine adnexo, Gefn. hort.

Cyclaminus oblongam, Eid. append.

Cyclaminus *μακρόβου*, Cam. epit. longius radicans, Eyst.

Cyclaminus cujus radix digitalem crassitiem non superat, & cubitalis est longitudinis, Clus. pan.

Cyclamen odoratum *μακρόβου*, Clus. hift.

XI. Cyclamen vernum luteum.

Cyclamen luteo flore, Ang. Ad. Lugd.

XII. Cyclamen vernum album.

Cyclamen vernum flore albo, Lob. adv. part. 2. Clus. hift. ap. alt. auct. quod folijs circinatæ rotunditatis, Eid. cur. post.

XIII. Cyclamen folijs Violarie radice cordis effigie.

Cyclamen vernum spurium, Cl. hift. ap. alt. auct.

GRA-

GRAMEN PARNASSI.

Gramini quod in Parnasso monte provenit, folium hederaceum, florem candidum, &c. Dioscorides lib. 4. c. 32. tribuit: ubi & alterius in Cilicia nati meminit, quod incolae Kivay appellant, cujus virentis esu boves inflammantur: quid velit non assequimur.

I. Gramen Parnassi albo simplici flore.

Gramen Parnassi, Dod. ut: Gefn. hort. Lobel.

icon. Eyfett.

Hepatica alba, Cord. hist.

Enneadynamis Polonorum, Gefn. hort.

Unifolium palustre, Gefn. collect.

Gramen Parnassi hederaceum recentiorum, Adv. Lob. ob.

Gramen hederaceum, flos hepaticus, Tab.

Gramen Parnassi minus, Ger.

II. Gramen Parnassi albo pleno flore.

Gramen Parnassi duplicato flore, Lob. Lugd.

SAXIFRAGA.

Saxifraga ab effectu dicta, cum ejus stillatitia, ut & decoctum, lapides renales & frangere & pellere dicatur: ut & farina granorum ad radicem, ex decocto sumpta.

I. Saxifraga rotundifolia alba.

Saxifraga, Brunf. major, Eid. 4. Fuch. Lac.

Saxifraga alba, Trag. Dod. ut: Fuch. icon. Gefn.

hort. Lugd. Thal. Cam. Tab.

Saxifraga quarta, Matth. Cast.

Saxifraga, Lon. alba chelidonides, Ad. Lob.

Theligono affinis herba, Cæf.

Saxifraga alba tuberosa radice, Cluf. hist.

Hæc nonnullis locis folijs est majoribus, al-

tiusque exurgit: frequentius tamen minoribus

est & humilior.

II. Saxifraga ad folia bulbos gerens.

Saxifraga bulbosa altera bulbifera montana, Colum.

III. Saxifraga rotundifolia aurea.

Saxifraga aurea, Dod. ut: Gefn. hor. Thal. Cam.

Ger. Lugd. cum. Dod. & Lobelij figura.

Saxifraga aurea lichenis facie, & natalitij, Ad. Lobel.

Chrysofplenium, Tab.

Hepatica palustris, Eyf.

Erysimi species Aldroando dicebatur: In hi-

storia Lugd. Saxifragæ alpinæ figura jungitur,

quam cum priore eandem suspicor.

CHELIDONIA MINOR.

Chelidonia duplex habetur, major de qua supra: minor, de qua nunc, quam Dioscorides lib. 2. cap. 212. *Χελιδώνιον το μικρόν, aut μικρόν & γίγναι* nominat, cujus descriptio, præter vires, nostra convenit: an forsitan ratione soli diversitas obvenit? Plin. lib. 25. cap. 13. *Strumæa* censetur, quo loci de Ranunculo agit.

I. Chelidonia rotundifolia major: in Pro-

dromo descripta.

II. Chelidonia rotundifolia minor.

Testiculus sacerdotis, Sylvatico.

Ficaria & scrophularia minor, vel 2. Brunf.

Hæmorrhoidum herba, Hier. Brunf. vic.

Chelidonium minus, Trag. Matth. Fuch. Dod.

ut: Ang. Cord. in Diosc. & hist. Gefn. hort. Tur.

Lac. Lon. Guil. (an Amellus sit dubitat) Adv.

Lob. Lugd. Cast. Thal. Tab. Ger. Eyf.

Malacocissus minor, Fuch. ico.

an Ranunculus latifolius, Lugd.

Favagello, Cæf.

Hujus folia aliquando macula purpurea no-

tantur: flore est luteo simplici: rarius pleno,

Camerario monente.

NUMULARIA.

Numularia à folijs nummi speciem referentibus dicta: alijs Centummorbia, à mirifica in vulne-ribus medendis facultate: alijs Hirudinaria, quod hirudinis instar passim terra affixa hæreat. Sunt qui Numulum Plinij lib. 18. cap. 28. censeant, ubi falsò Mimmulus legatur: an fortè apud Theophras-tum lib. 9. cap. 14. *ἰερὸν ὄλεον*, Rubiam Gaza vertit.

I. Nummularia major lutea.

Serpentaria 3, & Centummorbiolum, Brunf.

Nummularia, Trag. Matth. (& Lunaria minor)

Fuch. Dod. ut: Gefn. hort. Lon. Adv. Lob. Lugd.

Cast. Cæf. Cam. Tab. Ger. Eyf.

Centimorbia, Gefn. Turn.

Hirudinaria minor, Tab.

Ratione soli variat: hortensis per omnia ma-

jor, sylvestris contra: hinc duæ icones apud Tab.

Hirudinariæ majoris & minoris: & apud Ger.

Numulariæ, & Numulariæ minoris, nomine.

II. Nummularia minor purpurascens flore: quæ in Prodro mo describitur.



SECTIO QUARTA.

CUCUMIS; MELO; PEPO; MELOPEPO; AN-
GURIA; CUCURBITA; COLOCYNTHIS;
CUCUMIS ASININUS.

CUCUMIS.

Eti *Σκῦρος* nomen apud Græcos, (quemadmodum Cucumeris apud Latinos) generale sit omnium horariorum fructuum, videlicet Peponum, Melonum, Cucumerum, Anguriarum & ceterorum ejusdem generis, ut Guilandinus quoque notavit: attamen *Σκῦρος* & *κῦρος* Dioscoridis l. 2. c. 163. Theophrasti i. hist. 18. alijs *οἰνός*, & *νῆδος*, Cucumer Plinio l. 19. c. 5. Cucumis Varroni à curvure, quasi Curvimer, dicitur.

Genera duo Dioscoridi & Theophrasto, sativa & sylvestris: sativa, inquit Theophrastus, partim genera esse existimant, ut & Cucurbita, partim negant: sed in uno eodemque genere, alias meliores, alias deteriores affirmant. Cucumeris tria genera notant, Laconicum, Scythicum, Boeticum. Plinius l. c. de Cucumere agens, Melones, Cucumeres & Angurias complectitur: admonens, ea forma qua cogantur crescere: sic flore in fistulam demisso, mira longitudine nasci: subjungens, Græcos Cucumerum tria genera secisse Laconicum, Scythicum & Boeticum: sic de sylvestri l. 20. c. 1. & de anguino sive erratico l. 20. c. 2. egit.

I. Cucumis sativus vulgaris.

Cucumis sativus, Brunf. Matth. Fuch. Dod. gal. Lon. Cast.

Cucumis, Trag. Ang. Tur. Lac. Fracast. Tab.

Cucumis vulgaris, Dod. Ger.

Cucumer sativum, Cord. in Diosc.

Cucumis sativus & esculentus, Ad. Lob. Lugd.

Citreolus vulgo, Cæf.

Cucumeres virides, albi, longi, recurvi: læves, asperi: Alijs Syrios Galeni, alijs ejusdem Melopepon. Fructus maturus subluteus est: habetur & totus albus.

V. Cucumis sativus major.

Cucumis Turcicus, Fuch. Tab. Ger.

Cucumis ex Hispanico semine natus, Tab. Ger.

III. Cucumis flexuosus.

Cucumis longus, Matth. Lugd. oblongus, Dod.

Cucumis anguinus & tortilis, Lac.

Cucumis anguinus, Ang. Gefn. col. Lugd. anguina, Tab. Ger.

Cucumis flexuosus, sive anguinus, Adv. Lob.

Cucumis sativus 2. Cast.

Citreolus alter forma anguis, Cæf.

Hujus species habetur fructu cubitali.

Sic in regno Congiano insignis magnitudinis & suavitatis habentur: part. i. Ind. Or. l. 2. c. 1.

IV. Cucumis pyriformis.

Cucumer minor pyriformis, Tab. Ger.

V. Cucumis Ægyptius rotundifolius.

Chate Ægyptijs, cucumerum genus, Alpin.

M E L O.

Cucumerum genera censentur Pepones & Melopepones, potissimum figura & quantitate differentes: majores enim & oblongi, Pepones: mali effigiem referentes, Melopepones, nomine ex Melone & Pepone composito dicuntur. Hoc genus Palladius Melones, quasi *μῆλον*, id est pomeos, à malorum figura appellavit, quod nomen adhuc in usu est. Sicq; tria Cucumeris genera statui possunt, Cucumer, Melo & Pepo. At Melon Theophrasto Sycion; Plinio, Cucumis mali cotonei effigie, Melopepo Galeni: forte Cucumis antiquorum.

I. Melo vulgaris.

Melo, Brunf. Trag. (& Melopepo) Lac. Tab.

Gerard.

Pepo, Matth. ico. Fuch. Lugd. Cast.

Pepo, grandis Melo, Cord. hist.

Cucumis Galeni & antiquorum, Dod. gal.

Melo vulgaris, Melopepo in Græcia, Guil.

Melo sive Melopepo vulgi, Cucumis Gal. Dod.

Melo vulgi, sive Cucumis antiquorum, Melopepo Dioscoridis, Ad. Lob.

Melon vulgo & Pepon, Sycion Theophrasti,

Melopepon Galeni, Cæf.

Melopepo, Gefn. hort. Lon. Lugd.

Variat fructu, nunc oblongo, alias contra-

ctiore rotundioris figure, aliàs modicè depresso

& sessili: Subinde majore, scilicet.

Melo

Melo Hispanie. Tab. & Ger. quandoq; minore.
Cortex alijs asper, rugosus & tuberosus: & hic est
Pepo strumosus, Ad.

Alijs lævis: nunc viridis, nunc cinereus, nunc
pallidus, nunc varius. Pulpa, alijs rufa, alijs can-
dida & vires: eaque quibusdam suavior, qui-
busdam moschi odore, qualium Cordus & Do-
donæus meminere. Aliqui æstivi, aliqui hyber-
ni ad hyemem perdurantes. Habentur, Came-
rario monente, Americi & alij Italici, Patavini,
item Zatti dicti: tum Neapolitani, quorum se-
mina adeo tenui crustula teguntur, ut excorti-
cata videantur, Gymnospermi appellati: deni-
que pilosi.

II. Melo rotundus parvus.

Melo succaratus, Lob. ic. saccharinus, Tab. Ger.
Dentur aurei, parvi, in modum pomorum A-
rantiorum, Cam. vel ut Cæs. mali rosei magni-
tudine. Meminit & Garzias Melonis genus in
Hispania, quod Budiecas vocent.

III. Melo pyriformis moschatus.

Melo Saccharinus variegatus, Eyst.

IV. Melo pyriformis.

P E P O.

P *Pepon* Dioscoridi l. 2. c. 16. 4. Theophrastus l. hist. 22. & Plinius l. 2. c. 2. de Peponibus, quæ Dioscorides re-
fert: qui l. 19. c. 5. scribit, Cucumeres cum magnitudine exceperunt, Pepones vocari. Dictum volunt à πόν-
τος, quod dicitur maturefcere, eo quod maturitate flavescent.

I. Pepo oblongus.

Pepo, Brunf. Lon. Cæst. Camer.

Pepo magnus, Dod. gal. Gæst. hort.

Pepo major oblong. Dod. max. oblong. Tab. Ger.

Cucumis Pepo oblongus, five ovalis vulga-
rissimus, Ad.

Pepo oblongus, Lob.

Melo seu Pepo oblongus, Cæs.

Variat magnitudine: hinc apud Tab. duæ fi-
gurae, Peponis maximi oblongi, & Peponis In-
dici minoris oblongi: & apud Ger. qui poste-
riorem Peponem minorem sylv. vocat.

II. Pepo compressus major.

Pepo maximus Indicus compressus, Lob.

Pepo rotundus major, Dodon.

Melon five Pep. modicè depressa & sessilis, Cæs.
Corticis colore & substantia variat: qui e-
nim albido est colore, substantia est molliore:
qui obscure virente duriore.

III. Pepo compressus minor.

Cucumis seu Zucco marinus, Trag.

Cucumer marinus, Fuch. Tur. Lonic.

Pepo rotund. Dod. gal. Gæst. h. rotund. min. Dod.

Pyromelo, Tab. Gerard.

V. Melo Ægyptius.

Abdellavi Ægyptiorum, Melones à nostratibus
diversi, Alpin.

VI. Melonis Ægyptij alterum genus.

Chajar, Melonum genus apud Ægyptios, Alp.

VII. Melo Indicus fructu oblongo.

Batie Indi, five Indicus Melo, Garzia.

Patecas, Anguria, five Melo Indicus, Linsc. par.
4. Ind. Or. c. 10.

Melones aquarici in Java, Batiec in univerfa
India: par. 4. Ind. Or. c. 6. & fig. 20.

an Comolanga, Lud. Romani, Clus. in Garz.
Scalig. Lugd.

VIII. Melones Peruviani.

Melones in valle Peruana tanta felicitate pro-
veniunt, ut radix caudicis celsitudinem asse-
quatur & viva aliquot annis in solo vigeat, quæ
quotannis Melones profert, cujus luxuries non
secus ac cæterarum arborum amputatur: Jo-
seph. Acosta l. 4. c. 19.

IX. Fructus Melonum similis, cortice duro
vestitus, in Java, Linsc. par. 3. Ind. Or. c. 10.

an Cucurbita rotunda Italica, Lugd.

Corticis colore variat, qui est croceus, luteus,
citrinus, niger.

IV. Pepo rotundus Melonis effigie.

Pepo oblongus, rotundus, luteus, viridis, Trag.

Pepo sylv. Dodon.

Pepo rotundus compressus Melonis effigie, Ad.
Lob. Lugd.

Pepo Indicus minor rotundus, Tab. Gerard.

V. Pepo rotundus Arantij forma.

Cucurbita Arantij forma, Eyst.

VI. Pepo minor clypeatus.

Pepo Indicus minor clypeatus, Taber.

Pepo Indicus fungiformis, Ger.

VII. Pepo minor angulosus.

Pepo Indicus minor angulosus, Tab. Ger.

Huc & Pepo minor Indicus 4. Tab. referendus.

VIII. Pepo Virginianus.

Macôcqvver, peponib. melonibus & cucurbitis

valde similis: cujus unum genus menstrui: alter-

rum bimestri spatio maturefcit: descr. Virgin.

Macaqvver Virginensium, Clus. ex. l. 2. c. 2. &

part. 1. Ind. Occid.

MELO

MELOPEPO.

I. Melopepo clypeiformis.

Pepo latus, Dod. gal. latioris fructus, Eid. Gef. h.
 Cucumis Pepove latior clypeiformis, Ad.
 Melopepo latior clypeiformis, Lob. icon.
 Cucurbita laciniata Dalech. Lugd.
 Cucurbita sessilis, Gef. append.
 Melopepo clypeatus, Taber.

Pepo maximus clypeatus, Gerar.

II. Melopepo compressus.

Melopepo, Anguil.
 Melopepo compressus alter, Lob. ico. compres-
 sus, Tabern.

Pepo maximus compressus, Gerard.

III. Melopepo teres: & Lob. & Tab.

Pepo maximus rotundus, Gerard.

ANGURIA.

Anguria voce, primum Aëtium usum esse volunt: aliàs Citrullus, à citreo colore dicitur. Peponem Dioscoridis, Galeni & Plinij, & Arabum Battacha esse volunt.

I. Anguria Citrullus dicta.

Citrullus, Trag. Gef. hor. Lon. Tab. officinarum,
 Ad. Lob. Ger.

Anguria, Matth. Ang. Lac. Gef. col. Dod. Lugd.

Calt. Camer.

Cucumer vel Cucumis citrullus, Fuch. Dod. ut:
 Gef. hor. Turn.

Cucumer vulgò, Cæs.

Corticis colore variat, qui alijs viret, alijs sub-
 candidis masculis aspersus: caro alijs, rubens &
 dulcior, alijs candida. Semina colore nigro, ru-
 bro, fulvo: rarius semine caret, ut Cæs. notavit.

II. Anguria carne lignosa.

Cucumeris vulgò dicti genus quoddam sylve-
 stre, carne intus lignosa, atq; adeo dura, ut pilæ
 modo resiliat, nec frangatur projectum, Cæs.

III. Anguria Ægyptiaca.

Anguriæ nostratibus majores, cortice flaviore,
 quæ intus semina tantum & aquam dulcissi-
 mam continent, Alpin.

an Dullaha Arabum, Cæs.

IV. Anguria Brasiliiana.

Citrullæ rotundæ, Maurongaus nomine: Le-
 rio cap. 12.

CUCURBITA.

Kολοκυμβα ἐλάδιον Dioscoridi l. 2. c. 162. dicitur, ad differentiam κολοκυμβιδος, de qua l. 4. c. 178. me-
 minit: & Theophrastus l. hist. 18. Latinis, Cucurbita à concurvatu, quod facile siquid obstitit, quo minus
 extendatur, incurvescat.

Genera duo prima Cucurbita Plinio l. 19. c. 5. Camerarium & Plebeium quod humi repit: crescit qua co-
 gitur forma, libertate vero pensili concessa, jam visa est novem pedum longitudinis. Semina quæ proxima collo
 fuerint, proceras pariunt: quæ in medio, rotundas: quæ in lateribus, crassas brevioresq;.

Calabassi seu Cucurbita in India ad miraculum usq; augeantur, quæ in hac sola provincia Cbile nascun-
 tur & Capallos nuncupantur: Cucurbitarum species propè infinita sunt, quædam immensa mole monstrofa
 sunt, quæ dissecca & resiccata excavantur & ex ijs varia vasa effinguntur: ex minoribus pocula, aut parvas
 ingeniose calatas concinnant: Joseph. Acosta l. 4. c. 9.

Sic Brasiliiani ex Cucurbitis liquidam pulsem, Mingau vocatum sorbent: Stad. def. Brasil. l. 2. c. 12.

I. Cucurbica major sessilis, flore albo.

Cucurbita cujus fructus in orbem collectus in-
 tumescit, Trag.

Cucurbita sessilis, Matth. epit.

Cucurbita major, Fuch. Tur. latior, Dod.

Zucca rotunda, Anguil.

Cucurbita Cameraria major, Dod. gal. Lugd.

Cucurbita sessili fructu, Cord. in Diosc.

Variat magnitudine, colore corticis, viridi,
 flavo, candido, maculoso: aliquando fulcis di-
 stinguitur: quædam tuberosa est.

II. Cucur. major rotunda fl. luteo folio aspero.

Cucurbita Indica, Matth. Calt.

Zucca major rotunda, Cord. hist.

Cucurb. quam Zucca marin. Itali vocant; Gef. h.

Cucurbita rotunda, Cæs. alp.

Cucurbita Indica rotunda, Lugd.

Cucurbita Indica major & minor, Tab.

Citrullus major, & Pepo major syl. Ger. icon.

Varia hujus genera, magnitudine, facie, & co-
 lore differentia: earum namq; quoddam genus
 est, quod utrisq; ulnis vix amplecti potest, & in
 insula S. Laurentij, ejusmodi colore rubro, fla-
 vo, albo & saporis longè gratioris atq; nostra-
 tes, ubertim proveniunt. Palud. in notis ad Lin-

scot, sive par. 2, Ind. Or. c. 5.

III. Cu-

III. Cucurbita lagenaria fl. albo, folio molli.

Cucurbita, Brunf. prior, Dodon.
Cucurbita minor, Fuch. Dod. gal. Turn.
Cucurbita plebeja, Gef. hort.
Cucurbita lagenaria, Lob. Cast. Gerard.
Cucurbita lagenaria major & minor, Ad. Tab.
Cucurbita Cameraria minor, Lugd.

Variat fructus, quandoq; lagenarum forma, aliquando ventricosa absque collo pyriturbinati figura.

IV. Cucurbita lagenaria Americana.

Cucurbitularum ex quibus Americani lagenulas conficiunt, Americus Vesputius navig. 2. meminit, quas viri de collo suspendunt, quarum una herbâ plena est quam mandunt: altera farinâ, quam bacillo madefacto, herbæ aspergunt.

an Lagenulæ Americanæ è fructu è mari Australi, Cluf. ex. l. 2. c. 8.

Sic in regno Congo, in Cucurbitis aquam adferunt: par. 1. Ind. Or. l. 2. c. 1.

V. Cucurbita oblonga flore albo, folio molli.

Cucurbita fructu oblongo, Trag. Cord. in Dios.
Cucurbita oblonga, Fuch. longa, Tur. Lon. Cast. Tab. Cam. longior, Dodon.

Cucurbita anguina, Dod. gal. Gerard.

Zuccha longa, Anguil.

Cucurbita, Gef. hort. sativa longa, Cæf.

Cucurbita five Zuccha, Ad. omnium maxima anguina, Lob.

Cucurbita Cameraria longa, Lugd.

Falcata figura sæpe crescit, quædam cervicem tantum recurvam habent: quædam rectitudine servata bicubitalem, etiam tricubitalem longitudinem acquirunt.

VI. Cucurbita capitata.

Cucurbita quædam sessilis alba lata, ab altera parte compressa, Gef. hort.

Cucurbita capitata, Taber.

Cucurbita fungiformis, Gerard.

Cucurbita stellata five sessilis, Camer.

VII. Cucurbita verrucosa: & Lugd.

VIII. Cucurbitæ parvum genus, fructu pugni magnitudine, cortice rubro, maculis asperso, & semine rubro, Joh. Bauhino.

IX. Cucurbitacei generis semen spadiceum.

Fructus alicujus sem. 19. Gareti, Cluf. ex. l. 2. c. 16.

X. Cucurbitis non abfimilis fructus Brasilianus.

Fructus in sylvis cucurbitæ forma non abfimilis, sed longè amplior, quos frustatim concidunt, in aquam conjiciunt, baculo spumam excitant, qua pro sapone utuntur, Lerio desc. Brasilis five par. 3. Ind. Occid. c. 17.

COLOCYNTHIS.

Κολοκύνθης αὐτὸν πολεμωθεὶς αἰγὸς, αὐτὸν πολεμωθεὶς ἀλεξάνδριν, Dioscoridi l. 4. c. 178. Cucurbita sylvestris, Colocynthis dicta, quæ minor sativa, Plinio l. 20. c. 3.

Genera varia habentur: alia minor fungosa & levis, quæ officinarum est: alia major, oblonga ac flavas alia candida: alia rotunda varia: alia sessilis, nigra, maculata, magna instar Cucurbitæ: & alia ab hac differens etiam sessilis, sed minor, alia deniq; turbinata.

I. Colocynthis fructu rotundo major.

Cucurbita agrestis, Brunf.

Colocynthis vera, Trag.

Colocynthis, Matth. Ang. Cord. in Dios. (& Cucurbita sylv.)

Cucurbita deserti, Gef. hort. (& Cucurbita sylv.)

Lac. Lon. Ad. Lob. (& Cucurbitula amara) Lugd.

Cast. Gam. Gerard.

Colocynthis prima, Dod. gal. mas, Taber.

Colore est viridi, magnitudine utramq; manum replente.

II. Colocynthis fructu rotundo minor.

Colocynthis fungosa & levis, Cord. hist.

Colocynthis minor, Gef. append.

Cucurbita sylv. fructu rotundo minor, Cæf.

Colore est flavo, hujusq; medullâ aridâ officinæ utuntur.

III. Colocynthis oblonga.

Colocynthis grandis oblonga, Cord. hist.

Colocynthis grandis candida solo colore ab oblonga differens, Eid.

Variat colore: alia enim primum viridem colorem in cortice ostendit, postea maculis candidantibus conspergitur, postremo totus in luteo pallet, fitq; durus & lignosus: alia principio viret quidem, sed mox albicantibus maculis aspergitur, at in maturitate totus albicat. Cordus in sua historia differentias sex proposuit, & ex eo Lugd. histor.

IV. Colocynthis pyriformis, seu Pepo amarus.

Colocynthis Germanica, Trag.

Colocynthis 2. Dod. gal. femina, Taber.

Colocynthis turbinata, Cord. hist.

Rt

Colo-

Colocynthis pyriformis, Ad. Lob. Lugd. Ger.
Colocynthis nigra pyriformis, Cam.
Cucurbita fylv. Dod. figura pyri, Cæf.
Pseudocolocynthis pyriforma, Eyft.

Cucurbita fyl. Somphos Plin. dicta, quibusdam.
V. Colocynthis pomiformis cortice macula-
Colocynthis exacte sphaerica, Ad. (to.
Pseudocolocynthis pomiformis, Eyft.

CUCUMIS ASININUS.

Sinus ægypti & Dioscoridi l. 4. c. 154. Theophrasto 7. hist. 6. & 9. hist. 10. Cucumis sylvestris Plinio l. 20. c. 11.

Cucumis sylvestris asininus dictus.
Cucumis agrestis, Brunf. Cord. in Diosc. Lugd.
Cucumis fylv. Trag. Matth. Ang. Fuch. Dod. ut:
Lac. Lon. Cæf. Cast.
Cucumis anguinus, Tur. Cord. hist.
Cucumis erraticus vel asininus, Gef. hort.

Cucumer Elaterij fylv. Ad. Lob.
Cucumis asininus, Tab. Ger. Eyft.
Ex hujus succo exiccato & in pastillos con-
formato fit *δακτυλιον* dictum Dioscoridi l. 4. c. 155.
& Theophrasti 9. hist. 10. Gaza agitatorium ver-
tit, ut infra lib. 12. sect. 6. ostenditur.



SECTIO QUINTA.

MALVA; ALTHÆA; ALCEA; CORCHORUS; GERANIUM;
[SANICULA; PES LEONIS; CANNABIS; EUPATORIUM; POTEN-
tilla; Herba Molucana; Caryophyllata; Dentaria; Epimedium, Pæo-
nia; Leontopetalon; Chrysogonum; Sta-
phis agria.

M A L V A.

Malva *μαλάχη* Dioscoridi l. 2. c. 144. & Theophrasto 1. hist. 5. à *μαλάσσω* ab emolliendo ventre, nomen habet, etiam Plinio l. 20. c. 21. monente: idq; propter naturalem lentorem suum, ut Paulus asserit: unde a Martiali l. 16. Mollis vocatur. Latinus Malva & Varroni quasi *Molva*, quod alvum molliat, quæ antiqui in acetarijs cum Lactuca ad alvum subducendam utebantur.

Duplex est Dioscoridi & Plinio, sativa & sylvestris: subjungit Plinius, duo esse genera, quæ folij amplitu-
dine discernantur, majorem Græcos Malopen vocare in sativis: alteram Malachen: è sylvestribus cui grande
folium & radices alba. Althæa vocatur, & c. Theophrastus duplicem exprimere videtur, dum 1. hist. 5. & 14. Mal-
vam in arborem transire scribit, Malvam roseam intelligens: dum verò 7. hist. 7. ait, Malvam coqui & cibo ido-
neam esse, vulgatam Malvam innuit. Antiquitus in Malvarum folijs scripturatum, Cinna antiquus poeta in-
dicat, cujus ve sus ab Isidoro referuntur: quare suspicari licet huc respexisse Pythagoram, qui ut Aelianus au-
ctor est, *μαλάχης*, id est, malva folium sanctissimum esse dicebat.

I. Malva fylv. foliorotundo.

Malva, Brunf. Matth. Lac. Cast.
Malva vulgaris, Lugd. vulgarissima, Trag.
Malva fylv. pumila, Fuch. Dod. ut: Tur. Thal.
Malva fylv. repens pumila, Lob. Lugd. Ger.
Malva fylv. Ang. Ad. fylv. supina, Cord. hist.
Malva agrestis minor, Gef. hort.
Malva minor, Lon. fylv. minor, Tab. vulgaris
minor, Cam.
Malva flore candido, Cæf.

Variat folijs rotundioribus & latioribus.

II. Malva sylvestris folio sinuato.

Malva erratica 2. vel Malva equina, Brunf.
Malva vulgaris altera species, Trag.
Malva fylv. elatior, Fuch. Dod. gal.
Malva fylv. Tur. Ger. fylv. recta, Cord. hist.
Malva fylv. vulgaris, Cord. in Diosc. fylv. pro-
cerior, Dod. Ad.
Malva fylv. major, Gef. hort. Lugd. Tab. Thal.
Malva vulgaris procerior, Lob. major, Lon.
Malva vulgaris major, Cam.
Malva flore subrubente, Cæf.

Apud vereres in genere domesticarum fuit.
III. Malva Americana: quæ 3. in Prodomo.

IV. Mal-

IV. Malva hederaceo folio.

Malva quarta, Matth.

Malva hederacea sive montana, Eid. ep. Cast.

Malva major tertia, Lugd.

V. Malva folijs crispis.

Malva species sinuosa, Cord. in Diosc.

Malva sativa laciniosa, Eid. hist.

Althæa crispa & major, Gefn. hort.

Malva crispa, Gefn. hort. Dodon. Camer. Taber.

Ger. Eyst.

Malva crispatis oris, Lob.

Flos est albicans, modò roseus.

VI. Malva folio vario.

Malva trimestris vel pumila, Clus. hist.

VII. Malva rosea folio subrotundo.

Malva sativa antiquorum: quæ cultu arbore-

scit, Theoph. Malope, Plinij.

an Anadendromalache, Galeni.

Malva hortulana, Brunf.

Malva sativa major, Eid. 4.

Malva hortensis, Trag. Fuch. Tur. Dodon. Lon.

Gerard.

Malva sativa, Dod. gal. Ang.

Malva major Matth. arborea, Eid. 4. sive hor-

tensis, Tab.

Malva Romana, Gefn. hort.

Hastula regia, Eid.

Malva major unicaulis, Matth. Cast.

Malva rosea fruticosa, Adv. Lob. rosea simplici

flore, Lugd.

Malvæ alterum genus, Cæs.

Flores candidi, rubentes, modò saturatiùs,

modò dilutiùs, aliàs purpuræ modo relucen-

tes: & ex rubro nigricantes: quare

Malva hortensis flore simplici albo: flore

simplici incarnato: flore simplici rubro, pingi-

tur ab Eyst.

VIII. Malva rosea folio subrotundo, flore

pleno.

Malva Romana multiplex, Trag. Gefn. hort.

Malva rosea multiplex, Lob. Lugd. Tab.

Malva hortensis multiplici flore, Dod.

Malva major unicaulis multiplex, Cast.

Flos colore variat, albo, incarnato, rubro,

puniceo, nigricante, hinc tres figuræ apud Tab.

& Gerardum, & in horto Eyst. quatuor.

Malva arborea multiflora, Tab.

Malva hortensis multiplici flore, Gerard.

Malva arborea flore nigro multiplici, Tab. &

Gerard.

Malva rosea multiplex, Tab.

Malva purpurea multiplex, Ger.

Malva rosea multiplex flore albo: flore incar-

nato: flore pleno atrorubente: flore pleno

rubro, Eyst.

IX. Malva rosea folio ficus.

Malva rosea simplex peregrina, Tab. Ger.

X. Malva folio ficus altera: quæ prima in

Prodromo.

XI. Malva arborea Veneta dicta parvo flore.

Malva major altera, Matth. Lugd.

Malva arborea, Matth. epit. icon. Cast. & major

unicaulis, Matth. epit. desc.

Malva arborefcens, Gefn. hort. Dodon. Camer.

Cæs. Eyst.

an Malva arborea sylv. Adv.

Flos est cæruleus, nec multo major quàm

Malvæ equinæ flos sit: Malva arbor Plinio.

XII. Malva Syriaca.

Cobes Malvæ species, Cam.

A L T H Œ A.

Althæa, alij ibisus, quæ in sylvestrium malvarum genere est: Dioscoridi lib. 3. cap. 163. sic dicta ab
 ἄλθω quod remedium, vel ἄλθωμεν medendo, quod hujus multiplex usus sit: hinc Dioscoridi, quod
 inter primas utilis sit. & πῶς ἴσται, pluribus remedijs polleat: & Plinio lib. 20. cap. 21. ab effectus excellentia
 nominata, quæ à quibusdam Aristalthea dicatur.

Genera: unius solum meminere, ut & Theophrastus 9. hist. 15. ubi Gaza Hibiscum reddidit: at 9. hist. 19.
 florem melinum tribuit.

I. Althæa Dioscoridis & Plinij.

Althæa, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dodon. ur:

Turn. Lac. Cord. in Diosc. & hist. (& Malva pa-

lustris) Gefn. hort. Lon. Adv. Lob. (& Ibiscus)

Lugd. Cast. Tab. (& Bifmalva) Ger.

Althæa sive Malvaviscus, Ang.

Malvæ agrestis genus, Gefn. hort.

Malva sylv. prima, Cæs.

Althæa vulgaris, Camerar. Thal. Clus. histor.

Eystett.

Rr 2

Flores

Flores candidi, aut ex albido dilute purpureascentes.

II. Althæa flore majore.

Althæa pannonica secunda, Clus. pan. & tertia, in hist.

Althæa Thuringiaca, Cam. Eyst.

III. Althæa laciniato folio.

Althæa tertia, Clus. pan. Pannonica quarta, Eide. hist.

IV. Althæa frutescens folio rotundiore incano.

Althæa frutex, Clus. hisp. Lob. Gerard. prima, Clus. hist.

Althæa arborecens Clusij, Tab.

Althæa lignosa Dalechampi, Lugd.

Malva altera ad Malopen accedens, Cæs.

Althæa fruticans Hispanica, Eyst.

Gallica majore est quam Hispanica flore.

V. Althæa frutescens folio acuto parvo flore.

Althæa arborea Olbia in Galloprovincia, Ad.

Lob. ico.

Althæa arborecens, Cam. Tab. Ger.

Hæc cum quarta eadem non est, licet Lobelius prius luteus.

velit, sed distinguenda, ut rectè Clusius fecit.

VI. Althæa frutescens Bryoniae folio: in Prodromo describitur.

VII. Althæa palustris: & Lugd. Tab. Ger.

Althæa palustris cytini flore, Ad. Lob.

Althæa hortensis sive peregrina, Dod.

Sida vulgo, Camer. & Theophrasti 4. hist. u. cenferur.

Flore est albo & subruceo.

VIII. Althæa Theophrasti flore luteo.

Althæa altera, sive Abutilon Avicennæ, Matth.

Ibiscus Theophrasti, Dod. gal.

Althæa Theophrasti, Gesn. hort. Cæs. Lugd. &

Althæa altera, Eid.

Althæa peregrina, Gesn. hort.

Althæa luteis floribus, Ad. Lob. Ger.

Abutilon, Ang. Dod. Castor. Camer. Avicennæ,

Eystert.

Malva Theophrasti, Tab.

IX. Althæa Theophrasti similis.

Abutilon Indicum, Cam.

Flos magnitudine rosæ sylv. albicans, inter luteus.

A L C E A.

Antæ Dioscoridi lib. 3. cap. 164. fortè sic dicta ab ἀλῆ, auxilio vel remedio, cum ejus radices Dysentericis & ruptis auxilio sint. Plinio lib. 27. cap. 4. Alcea. Generi sylvestrium Malvarum Dioscorides, qui unius meminit, adscripsit.

I. Alcea vulgaris major.

Alcea & herba Simeonis, Brunf.

Alcea, malvæ rosæ sylv. genus, Trag.

Alcea, Matth. Fuch. Dod. gal. Cord. in Dioscor.

Gesn. hort. Lac. Lon. Lugd. qui duas figuras habet, Cæs. Tab.

Cannabis sylv. & Herba Ungarica, Ang.

Alcea vulgaris, Dod. Adv. Lob. Lugdun. Cam.

Clus. hist. Eyst.

Malvæ agrestis genus, Gesn. hort.

Malva verbenaca, Ger.

Alcea est Dioscoridis & Plinij: quibusdam

Cannabis sylv. Dioscoridis lib. 3. cap. 166. alijs

Malva Theophrasti.

Folij variat, acutioribus, rotundioribus, hirsutioribus, lævioribus: flore est ex rubro roseo, vel candidiore.

II. Alcea vulgaris minor.

Dens leonis & Malva querna, Lon.

Alcea minor Dalechampi.

Folij est in longas lacinias divisus.

III. Alcea folio rotundo laciniato.

Alcea peregrina, Clus. hist.

Malva montana, sive Alcea rotundifolia laciniata, Col.

an Alcea tenuifolia Cordi, Thal.

IV. Alcea Pannonica & Alcea tenuifolia,

Cam. quid?

V. Alcea cannabina.

Alcea, Ang.

Alcea fruticosior, Adv. Lob. pentaphylla folio

cannabis sylv. Dioscoridis, Eid. ico.

Alcea fruticosa cannabino folio, Clus. hist.

Alcea altera, Cæs.

Alcea cannabina, Cam.

Alcea fruticans, Eyst.

Hæc nomenclaturæ causa, Cannabis sylv. Dioscoridis lib. 3. cap. 166. videtur.

VI. Alcea arborecens Syriaca.

Alcea arborecens, Rauv. Cam.

Althæa frutex 2. Clus. hist.

Ketmia Syrorum quibusdam.

Alcea

Alcea Syriaca, Eyft.

Hujus flores è rubro purpurascunt, at vetustate ad cæruleum colorem vergunt: habetur etiam flore candido, quæ

Alcea Syriaca flore candido, Eyft.

Hujus & altera species minore flore, quæ

Althæa frutex tertia, Clus. hist.

VII. Alcea vesicaria.

Alcea Veneta, Trag. Dod. gal. Lugd. Eyft.

Alcea Bononiensis, Gesn. hort.

Hypecolum, Matth. (male sic dicitur Guil. monente) Lac. Lugd. Cæs. Cast.

Hypecolum alterum spurium, Gesn. hort.

Alcea peregrina, Gesn. hort. Tab. Ger. foliis equa, Adv. Lob.

Alcea vesicaria, Dod.

Malva Veneta, Gesn. hort. Lon.

Herba Ungarica, Lon.

VIII. Alcea hirsuta.

Alcea villosa Dalechamp. Lugd.

an Alcea minor in sylvis folijs Geranij, Cæs.

IX. Alcea Indica magno flore.

Sabdariffa, Lob. Dod. Lugd. Camer. Tab. Ger. Eyftett.

Alcea Americana, Clus. hist.

Foliis ludit, prima aliquando integra, communiter in tres lacinias divisa: aliquando instar foliorum Elleborastri in septenas profundas lacinias secta observavimus.

X. Alcea Indica parvo flore.

Exotica malvacea, Bamia Eben quibusdam, Advers.

Trionum Theophrasti, Rauv. Lugd. ap.

Sabdariffa alia, Lugd.

Bamia, Alp. Cam. Belli ep. 4. ad Clus.

Bamia Alexandrina, Cæs. Cast. ap.

Alcea Ægyptiaca, Clus. hist.

XI. Alcea Ægyptiaca affinis.

Fructus 18. è navigat. Batav. Clus. ex l. 2. c. 15.

XII. Alcea Indica parvo flore altera.

Bamia Ægyptiaca siliqua decagona, cum in alijs pentagona duntaxat, Clus. hist. ap. alt. ad lib. 4.

XIII. Alcea Ægyptiaca villosa.

Abelmosch Ægyptiorum, sive Abutilon Avicennæ, Ponæ ital.

Belmuscus Ægyptiorum nomine ex Creta ab Honorio Belli accepimus.

CORCHORUS.

Corchori duplicis Plinius meminit: alterius lib. 25. cap. 13. Anagallidem intelligens: alterius lib. 21. cap. 15. inter herbas sponte nascentes & in cibis ustratas: & lib. 21. cap. 32. Alexandrinorum cibis, convolutis folijs ad similitudinem mori, &c. Et Alpino, facultate similis est Althea & ægyptijs in cibo nil familiarius, aut gratius. Et Judæi cocta folia cum carne edunt, quæ sapore acetosa prætita sunt, amotante Rauvolfio in suo Hodeporico.

Corcoros Plinij, Lob. Lugd.

Olus Judaicum Avicennæ, quibusdam & Moluchi Arabum, Rauvolfii.

Corcorus sive Melochia, Cam.

Melochia, Alpini.

GERANIUM.

Epithymum Dioscoridi lib. 3. cap. 131. à gruini capitis imagine, in summo ejus cacumine visenda, nomen habet: at recentiores, à ciconia rostri effigie, Rostrum ciconia nominant. Geranium, & aliquibus Myrrhis, alijs Merthyrida (rectius Myrrhida) Plinio lib. 26. cap. 11.

Genera duo Dioscoridi: alterum folijs Anemones, alterum folijs Malva. Plinio tria sunt: primum similis cicuta, folijs minoribus, saporis & odoris jucundi: subjungit ex Græcorum sententia, alterum folijs Malva, & tertium Anemones.

Geranium Anemones folio rotundo.

I. Geranium batrachoides folio Aconiti.

Geranij species tertia, Gesn. hort.

Geranij majoris species prima, Eid. ap.

Geranium 2. vel batrachoides alterum, Clus. pan. & hist.

Geranium sive batrachium cæruleum, Tab.

Geranium batrachoides, Ger.

Variat flore cæruleo, albo, albo lineis cæruleis variegato: est & flore cæruleo duplici, sed duplo majore, & dicitur

Geranium batrachoides cæruleum, &

Geranium batrachoides flore albo, Eyft.

Rr 3

II. Gera-

II. Geranium batrachiodes hirsutum, flore atrorubente.

an Geranij majoris species 2. Gesn. ap.
Geranium primum pullo flore, Clus. pan. & histor.

III. Geranium batrachiodes odoratum.

Geranium montanum, Gesn. col.

Geranium batrachioides alterum, Dod.

Geranium batrachioides longius radiculatum, Lob. Lugd.

Geranium macrorhizon, Cam. Eyf.

Pes columbinus in sylvis nascens alter, Cæs.

IV. Geranium sanguineum maximo flore.

Sanguinaria radix, & Geranium 3. Trag.

Geranium alterum majus, Gesn. hort.

Geranium hæmatodes, Dod. gal. Lugd. Clus. pan. Thal. Cam.

Geranium sextum, Fuch. Tur. Lac. Lon.

Geranium gruinum sanguinale hæmatodes

fupinum radice reptice, Lob. ico.

Geranium 7. hæmatodes, Clus. hist.

Geranium sanguinarium, Eyf.

V. Geranium batrachiodes, Gratia Dei Germanorum, Lob.

Geranium quartum (sanguinariæ radices species) Matth. Lugd. Cast.

Geranium 5. Fuch. Lac. Lon. sextum, Tur.

Geranium batrachiodes, Dodon. Camer. Thal. Lugdun.

Geranium batrachiodes sive magnum cæruleum, Adv.

Geranium batrachiodes primum, Clus. pan.

Geranium sanguinarium, Tab. majus, Eyf.

Geranium tertium batrachiodes majus, Clus. histor.

Duplex est: grandius floribus cæruleis aut albis, & quidem eodem loco: minus, rubris.

VI. Geranium batrachiodes flore variegato.

Geranium Anglicum variegatum, Eyf.

XII. Geranium batrachiodes, Collum gruis Germanorum.

Geranium quartum, Fuch.

Gruinalis, Dod. Lugd.

VIII. Geranium montanum fuscum.

Geranium montanum, Dod.

Geranium fuscum, Lob. Lugd. Eyf.

Geranium maculatum, Tab. sive fuscum, Ger.

IX. Geranium tuberosum majus.

Geranium primum, Matth. Ang. Lugd. Cast.

Geranium bulbosum Matthioli, Tab.

Geranium subrotunda radice Dioscoridis, Gesn. hort.

Geranium tuberosum, Dod. Lugd. vel 10. Tab.

Geranium tuberosum majus, Cam.

Geranium bulbosum, Dioscoridis primum, Adv. Lob.

X. Geranium tuberosum minus.

Geranium tuberosum minimum, Cam.

XI. Geranium radice grumosa.

Geranium tertium, vel bulbosum Pennæ, Clus. pan.

Geranium 4. vel bulbosum, Eid. hist.

XII. Geranium nodosum.

Geranium quintum nodosum Plateau, Cl. hist.

Geranium sextum tuberosum Plateau, Idem.

an Geranium sive batrachium cæruleum, Tab.

an Geranium batrachioides, Ger.

XIII. Geranium parvum folijs ranunculi. Geranium 8. vel Salmaticense rostratum, Clus. histor.

XIV. Geranium argenteum alpinum.

Geranium alpinum longius radiculatum, Ponæ.

XV. Geranium lucidum saxatile.

Geranium saxatile ὕψος ὁ πτελόν, Thal.

Geranium saxatile, Cam. Eyf.

Geranium alterum montanum saxatile rotundifolium, Colum.

Geranium Malva folio.

I. Geranium folio Malvæ rotundo.

Geranium alterum, Hermolai, Brunf. Trag.

Matth. Fuch. Dodon. gal. Turn. Lac. Lon. Cast.

Thal.

Geranij vulgaris species, Gesn. hort.

Pes columbinus, Dodon. Adv. (seu Geranium alterum Dioscoridis) Lob. Cæs.

Geranium aliud, Lugd.

Geranium columbinum, Tab. Ger.

Geranium malvaceum sive Balsaminum, Cam.

Duplex est majus & minus: majori caules majores & folia paulo molliora: minori omnia minora & folia asperiora. Sic folia modo in profundiores, modo breviores & latas lacinias divisa sunt: floris magnitudine etiam differunt: flore triplo majore & cærulei elegantioris coloris ex horto Dei habemus.

II. Geranium columbinum tenuis laciniatum: quod 2. in Prodromo.

III. Geranium folio Althææ.

Geranium sextum, Matth. Lugd. Cast.

Geranium à calceolario missum, Dod.

Gera-

Geranium malacoides, Ad. Lob. Ger.

Geranium altheodes, Cam.

Geranium Monspeliacum, Tab.

Pescolumbinus tertius, Cæf.

Sub Geranio 2. etiam hoc intelligit Dioscorides, dum gruum rostra tribuit, Geranium folijs candidioribus malvæ, Plinio.

IV. Geranium malacoides minus: quod 1. in Prodomo.

Geranium folio Cicutæ vel Myrrhidis.

I. Geranium Cicutæ folio acutissimo: quod 3. in Prodomo.

II. Geranium Cicutæ folio moschatum: & inodorum.

Acus moschata, Eric. Cord. Cæf. Col.

Herba moschata, Ang.

Geranium, Trag.

Geranium 1. Matth. edit. 1. Fuch. Dod. gal. Tur.

Lac. Lon. Cast.

Geranium tertium, Matth. edit. post. Lugd.

Geranium supinum, Dod. majus, Cord. hist.

Geranium *maculatum* Dod. or. Thal.

Myrrhida Plinij, rostrum Ciconiæ, Ad. Lob.

Geranium moschatum, Cam. Ger. Eyst.

Geranium myrrhinum, Tab.

Hoc vel odoratum moschum redolens, vel inodorum est.

III. Geranium Coriandri folio odorum.

Geranium Apulum Coriandri folio alterum odorum, Colum.

IV. Geranium cicutæ folio minus, & supinum.

Herba Roperti & Geranium quartum, Brunf.

Geranium minus & primum, Trag.

Myrrhida Plinij & Rostrum ciconiæ inodorum vulgatum, Lob. ico.

Geranium 7. five Geranium gruinum, Dod.

Geranium minus vel arvense, Tab.

Geranium moschatum inodorum, Ger. Eyst.

Flos communiter brevis coloris: aliquando albus est: hinc duæ figuræ,

1. Geranium minus, Tab.

Geranium moschatum inodorum, Ger.

2. Geranium arvense album, Tab.

Geranium inodorum album, Ger.

V. Geranium Robertianum primum.

Geranium tertium, Brunf. Matth. Fuch. Tur. Lac. Lon. Thal.

Gratia Dei, vel Geranium quibusdam, Trag.

Sideritis tertia, Dod. gal. Ang. Gefn. col. Lac.

Lonic.

Panax Herculeum, Ang.

Geranium Robertianum, Ad. (Sideritis Achilleadon, aut congener) Lob. Dod. Cam. Tab.

Rupertiana vulgo, Cæf.

Herba Ruperti & Geranium secundum Dioscoridis, Lugd.

Duplex est: alia omnino viridis, quam feminam faciunt: alia rubens, quæ præfertur: triplex differentia in Advers.

VI. Geranium Robertianum alterum.

Geranium quartum, Fuch. Tur. Lac. Lon. quintum, Matth.

Geranium gruinale, Dod. gal. Lugd.

Geranei Robertiani altera species, Ad.

Geranium violaceum (vel 12.) Tab. Ger.

VII. Geranium latifolium longissima acutissimum, Geranium Creticum annuum hæmatodes, Lobelio.

Geranium Creticum, Camer. Tabern. Gerard. Clus. hist.

S A N I C U L A.

Sanicula à sanandis vulneribus romen traxisse videtur: Doctissimus Columna sub Sideritide tertia Dioscoridis pingit & describit.

Sanicula officinarum.

Diapensia, Brunf. Matth. Cast. cui & Pentaphyl.

li quinta species.

Sanicula, Brunf. Trag. Dodon. ut: Anguil. Gefn. hort. Lac. Lon. Cæf. Camer. Thal. Tabern. (cui

& Consolida quinquefolia) Eystett.

Sanicula mas, Fuch. Lugd.

Sanicula & Diapensia, Ad. Lob. Ger.

Sideritis tertia Dioscoridis, Col.

P E S L E O N I S.

Pes Leonis à forma foliorum: vulgo Alchimilla, quod Alchimistarum præconijs celebrata sit.

I. Alchimilla vulgaris.

Pes leonis Brunf. Brunf. Fuch. Lon.

Leontopodium, Brunf.

Alchimilla, Trag. Dodon. ut: Lac. Anguil. Adv.

Lob. Cæf. Thal. Tabern. Gerard. Eystett. vulga-

ris, Clus. hist. Cam.

Stella-

Stellaria, Matth. Cast. Lugd.

Drosera & Drosium, sive *Ψαδίων*, à rore folijs

insidente, Cord. in hist.

Stella herba Italis, Gesn. hort.

Flosculi communiter colore pallidi ac herbacei: rarius albi.

II. Alchimilla alpina quinquefolia, in Prodromo descripta.

CANNABIS.

K *Ἀνὰβις* Dioscoridi lib. 3. cap. 165. & Plinio lib. 20. cap. 23. Cannabis quæ in sylvis primum nata est. Est autem sativa & sylvestris: Sativa, mas & femina. Sic quæ floret fructum non fert, quæ fructum fert, non floret.

I. Cannabis sativa.

Cannabis, Brunf. Matth. Ang. Lac. Tur. Lon. Ad. Lob. Cæs. Cast. Tab. Ger.

Cannabis major, Trag.

Cannabis sativa, Fuch. Cord. in Diosc. fecunda, Dodon.

Cannabis mas, Dod. gal.

II. Cannabis Virginiana.

Cannabis in Virginea sponte prodit à nostra caule & folijs diversa, materia tamen perinde bona: in def. Virgin.

III. Cannabis erratica.

Cannabis femina, Trag. Dod. gal. Lugd.

Cannabis erratica paludosa sylvestris, Ad. Lob.

Cannabis sterilis, Dod. Cam. sylv. Cast.

IV. Cannabi similis exotica.

Bangue, Garziæ, Acoftæ, Monard. Frag. Cast. Lugdun.

Bangue cum Maslac Turcorum affinitatem habet, Clus. in Acoft.

Bangue arbor cannabi similis ad omnia ferè utilis ceu Amfion (sive Opium) Linscot. part. 4. Ind. Or. c. 35.

Bangue crebri apud Ægyptios & Turcas usus, quod triplici modo parant, & primum Afsis: alterum, Bofa: tertium, Bernavi, quod verum & genuinum Bangue est, Palud. notis in Linsc.

Cum folia cum cannabi similitudinem habeant, & cortex in fila diduci possit, huc retulimus.

Herba exotica quæ in fila instar Cannabi diducuntur.

I. Herba de Bengala.

In Bengala ex herba quam ad colum instar lini nent, telam texunt, quæ subtilitate sericum antecellit: ex folijs linteamina elaborant acupingentes nunc flosculos, nunc historias vario colore, quæ lectulis insternuntur: Linsc. par. 2. Ind. Oriental. 18. & in Madagascar & in Baya: part. 3. c. 11.

II. Tokaun folia oblonga & acuta ex quibus fila detrahunt, & reticula piscatoria inde contexunt: Stad. in Brasil. l. 2. c. 8.

III. Herba in cuius folijs sericum instar tenuis pellicula nascitur, cuius folia duos pedes longa, unum lata, & ad binos pedes cum semise in Virginia & Persia adolescit: def. Virgin.

IV. Radix filamentosa sericea.

Tit planta in sylvis nascens sine fructu: radice geminorum compressorum pugnorum magnitudine, coma flavescente mollissimum sericum referente, quo pro plumis utuntur ad lectisternia: Linscot. par. 3. Ind. Or. 6.

EUPATORIUM.

E *Ἐνὰτόριον* Dioscoridi lib. 4. cap. 41. ἡ *ἐνὰτόριον* Oribasio in collect. & ἡ *ἐνὰτόριον*, id est, Hepatica, quod hepatici medeatur. Plinio lib. 25. c. 6. Eupatoria regiam auctoritatem habet. Sunt qui velint nomen ab inventore Mithridate cognomento Eupatore habere.

I. Eupatorium cannabinum.

Salvia, Brunf. ico.

Herba S. Kunigundis, Trag. prima, Tab.

Eupatorium vulgare, Matth. Tur. Dodon. Lugdun. Cast.

Eupatorium adulterinum, Fuch.

Pseudohepatorium mas, Dod. gal. Thal.

Eupatorium Avicennæ creditum, Ang. Gesn. hort. Lac. Lon. Cam.

Eupatorium aquaticum, Gesn. col.

Trifolium cervinum aquaticum, Gesn. hort.

Cannabina aquatica mas, Ad. Lob. (sive Eupatorium mas) Colum.

Eupatorium, Cæs.

II. Can.

II. Cannabina aquatica folio tripartito diviso.

Verbena supina vel tertia, Trag.

Verbena recta, Cord. in Diosc.

Verbesina, Gesn. ap.

Forbesina Bononiensium, Gesn. hor.

Pseudohepatorium femina, Dod. gal. Thal.

Hepatorium aquatile, Dod.

Hydropiper, Lugd.

Bidens folio tripartito diviso, Cæs.

Folia communiter in tres partes, aliquando quinque & sex digitorum instar divisa sunt.

III. Cannabina aquatica folio non diviso.

Eupatorium cannabinum femina Septentrionalium, Ad. Lob. ico.

Hydropiper aliud Dalechampi, Lugd.

Bidens folio non dissecto, Cæs.

Eupatorium cannabinum chrysanthemum, Tab. Ger.

Conyza palustris, Eyst.

Cannabina aquatica similis capitulis nutantibus: in Prodromo.

IV. Eupatorium veterum sive Agrimonia.

Agrimonia, Brunf. Dod. Lon. Cæs.

Eupatorium vulgare, Trag.

Eupatorium, Matth. Fuch. Dod. gal. Cord. in Diosc. & hist. Lac. Tur. Cast. Tab. verum, Lugd.

Eupatorium Græcorum, Ad.

Eupatorium Dioscoridis & aliorum Græcorum, Gesn. hort. Lob. Thal.

Eupatorium Dioscoridis & Avicennæ, Anguil. Colum.

Hoc Eupatorium est Græcorum & Avicennæ, & Eupatoria Plinij: quibusdam ejusdem Plinij Agrimonia in arvis nascens.

V. Eupatorium odoratum.

Agrimonia odorata, Cam.

Eupatorium Dioscoridis odoratum, Cast.

Eupatorium alterum odoratum & aromaticum, Colum.

VI. Agrimonie similis.

Agrimonoides, Colum. à quo accepimus: & postmodum etiam ex Italia semine, nomine Pimpinellæ folio Agrimonie missum fuit.

P O T E N T I L L A.

Potentilla ab eximijis viribus nomen obtinuit: alijs Argentina, à foliorum argenteo splendore. Sunt qui Stephanomelidem Plinij l. 26. c. 13. cenferant: alij ad Argemonem referunt.

Potentilla, Brunf. Matth. Fuch. Lon. Cæs. Lugd.

(& Argentina sylvestris) Cast. Thal.

Tanacetum agreste, Brunf. 4.

Anserina, Trag. Tab.

Argentina, Dod. ut: Ad. Lob. Ger.

Argemone altera, Fuch. ico. Gesn. hort.

H E R B A M O L U C A N A.

Herba Molucana, Acofta, & ex eo Lugd. vulgo remedium pauperum & destructio Chirurgorum, quia insignis vulneraria est: in Maluco abunde nascitur.

C A R Y O P H Y L L A T A.

Caryophyllata, ab odore radices sic dicta, quod vernali tempore eruta, Caryophyllum aromaticum odore referat: vulgus ab insigni ejus efficacia Herbam Benedictam & Sanamundam appellat. Sunt qui ad Lagopum Dioscoridis lib. 4. cap. 17. referant: alij rectius ad Geum Plinij lib. 26. cap. 7. alij ad ejusdem lib. 25. c. 9. Argemoniam cujus radix thus redoleat.

I. Caryophyllata vulgaris.

Geryophyllata, Brunf. Trag. Dod. gal. Gesn. hor.

Lonic.

Geryophyllata a ltera, Ang.

Herba benedicta, Brunf. 4.

Benedicta, Gesn. hort.

Caryophyllata, Matth. Lac. Lugd. Thal. Cast.

Tab. Ger. vulgaris, Ad. Lob. Cam. Clus. hist.

Caryophyllata hortensis, Fuch.

Geum, Tur. urbanum, Gesn. hort.

Gariofilata vulgo, Cæs.

II. Caryophyllata vulgaris majore flore.

Caryophyllata sylvestris, Fuch.

Caryophyllata montana vulgari similis, Cam.

III. Caryophyllata folijs hederæ terrestris.

Caryophyllata sylv. vel quarta, Tab.

IV. Caryophyllata aquatica nutante flore.

Benedicta sylv. Trag.

Ss

Geum

Geum rivale, Gef. hor.

Caryophyllata Septentrionalium rotundifolia papposo flore, Ad. Lob.

Caryophyllata montana Dalechampi, Lugd. Eyfett.

Caryophyllata montana 1. Clus. pan. & hist.

Caryophyllata major seu purpurea, Thal.

Caryophyllata aquatica, Cam. ep. palustris, Camer. Tabern.

V. Caryophyllata aquatica altera.

Caryophyllata montana tercia, Clu. pan. & hist.

Variat flore simplici & multiplici.

VI. Caryophyllata alpina lutea.

Caryophyllata montana, Matth. Lugd. 1. montana, Anguil.

Geum alpinum & quartum, Gef. hort.

Caryophyllata major rotundifolia, Lob.

Caryophyllata montana, Dod. Tab. Ger.

Caryophyll. montana secunda, Clus. pan. & hist.

Caryophyllata alpina, Cam.

Gariohilatæ alterum genus montanum flore luteo, Cæf.

Flore est luteo: rarius purpureo vel albo.

VII. Caryophyllata alpina minor: in Phytopinace & Prodomo descripta.

Caryophyllata alpina omnium minima, Ponæ.

Caryophyllatæ alpinæ minimæ prima species, Eid. Ital.

VIII. Caryophyllata alpina Apij folio.

Caryophyllata alpina minima altera, Ponæ Italic.

IX. Caryophyllata alpina quinquefolia.

Caryophyllata alpina pentaphyllæ, Ad. Lob. ico. Gerard.

Caryophyllata montana, Cast.

Caryophyllata alpina quinquefolia, Tab.

an Polyrhizos latifolia, Lugd.

Variat folijs latioribus, angustioribus.

DENTARIA.

Dentaria à radici forma & colore nominatur, quæ candidissima ex pluribus squamis, quasi dentibus componitur: quibusdam à colore Coralloides & Alabastrites. Sunt qui ad violas referant: alij inter Solidagines & Symphyta: alij inter Saxifragias: alij inter Saniculas recensent: an Ceratia Plinij l. 26. c. 8?

I. Dentaria heptaphyllos.

Saxifragæ montanæ alia species, Gef. hor.

Coralloides altera, Cord. hist.

Viola dentaria altera, Dod.

Alabastrites altera, Lob.

Dentellaria altera, Lugd.

Aconiti lycoctoni genus alterum Dalech. Lugd.

Dentaria major, Cæf. altera, Tab.

Dentaria *πεντάφυλλον*, Clus. pan. & hist. Ger.

II. Dentaria pentaphyllos: & Cam. & Ger.

Dentaria minor, Matth. Lugd. altera, Cæf. Tab.

Coralloides, Cord. hist. ico.

Pulmonaria quibusdam, sive Sanicula alba, Gef. hort.

Saxifraga montana quinis folijs, Eid.

Viola dentaria prima, Dod.

Nemorialis alpina herbariorum alabastrites, Ad. Lob. ico.

Dentellaria rubra Dalech. Lugd.

Coralloides Cordi, Th. cui & Rhizocorallium.

Dentaria sexta pentaphyllos prima, Clus. hist.

Dentaria corallina altera, Tab.

Variat folijs, in altera scabris & tactu asperis

sature virentibus: in altera mollioribus, neque

adeo satura viriditate præditis: radice item, hujus enim magis est dentata, sive inæqualis &

plurimis crassis squamis exasperata: illa

Dentaria sexta *πεντάφυλλον* 1. hæc

Dentaria septima *πεντάφυλλον* 2. Clus. in histor.

nominatur.

III. Dentaria heptaphyllos baccifera.

Coralloides, Cord. hist. descr.

Coralloidis alia species, Cord. histor. icone vitiolissima.

Dentaria bulbifera, Lob. Cam. Ger.

Dentaria baccifera, Clus. pan. & hist.

Dentaria minor, Cæf.

Dentaria septifolia, Ger.

Hæc heptaphyllos, rarissimè pentaphyllos:

flos albus, aut ex candido leviter purpureus.

IV. Dentaria baccifera folijs ptarmicæ.

Dentaria angustifol. baccifera peculiaris, Eyf.

V. Dentaria triphyllos.

Dentaria coralloide radice 2. Clus. pan. Ger.

Dentaria enneaphyllos, Lob.

Dentaria, Cast. trifolia, Tab.

Dentaria quinta *τεντάφυλλον*, Clus. hist.

Ceratia Plinij, Col.

EPIME-

Eπιμεδιον Dioscoridi lib. 4. cap. 19. caulis est non magnus, hederae folijs demis aut duodenis, neque semen, neque flores proferens: radicibus tenuibus, nigris, gravis odoris, gustu insipido. Idem habet Plinius lib. 27. cap. 9. ubi aliqui Epimedium, alij Epimenidium legunt: Quibusdam Epipetron ejusdem lib. 21. cap. 15. de qua nil nisi quod nunquam floreant, imitatus Theoph. 7. hist. 8. cui Epimetrum penitus flore caret.

Epimedium Anguil. (cui & Lunaria quo- | Camerar.
runda) Adv. Dodon. Lobel. Lugdun. Tabern. | Planta altera in montibus Liguria, Cæs.

P Æ O N I A

Pαωνία ἢ γλυκυσιδή, quibusdam πεντοβόρον cuius radicem aliqui ἰσχυρὸς δακτύλος vocant. Dioscoridi lib. 3. cap. 157. πᾶωνία ἢ γλυκυσιδή (casta, alijs dulcisida Gaza reddente) Theophrasto 9. hist. 9. Et Plinio lib. 27. cap. 10. Glycyside, quam aliqui Paoniam aut Pentorobon appellant. Eidem lib. 25. cap. 4. Paonia recensissima inventu est, nomenq; aut horis retinet, quam quidam Pentorobon appellant, alij Glycysiden. Dicta Paonia, a Medico Paone, qui ea Plutodem ab Hercule vulneratum, Homero Odys. 5. figente, curasse perhibetur.

Genera duo Dioscoridi: mas, folia juglandis habet, in femina Smyrni modo dividuntur: maris radix digitali crassitudine, alba: feminae radicibus ceu glandes circiter septem aut octo adherent, ut in Asphodelo. Plinio lib. cit. duo genera: femina, cuius radicibus balani longiores circiter octo aut sex adherent: mas plures habet, quoniam non una radice mixtus est, palmi altitudine & candida: addit semen in filiquis, aliud grano rubente, aliud nigro.

I. Paonia folio nigricante splendido, quæ Paonia altera vel femina Dioscoridis, Cæs.

mas.
Paonia nobilior, vel 2. Trag.

Paonia mas, Matth. Ang. Cord. in Diosc. Adv.

Lob. Dod. Cæs. Lugd. cum duplici figura, Ta-
bern. Ger. Eyst.

Paonia mas folijs nucis, Gefn. hort.

Variat floribus colore purpureo, incarnato: &
hujus herbae folia latiora segmenta habet, quæ

subtus exalbida; hinc Eyst.

Paonia mas flore purpureo.

Paonia mas flore incarnato.

Paonia mas major.

Paonia mas major flore incarnato, Eyst.

Floris amplitudine reliquas superat: & her-
bae folia in latiores & pauciores virentes
particulas dividuntur.

II. Paonia communis vel femina.

Paonia, Trag. Turn. Lon.

Paonia femina, Brunf. Fuch. Anguil. Dodon.

gal. Cord. in Diosc. & histor. Gefn. hort. Adv.

Lob. Cam.

Paonia femina altera, Dod. Lugd.

Paonia vulgaris femina, Clus. hist.

Paonia rubra flore simplici, Eyst.

Aglaophotis Æliani censetur.

III. Paonia femina altera.

Paonia femina, Matth. Lac. Cast. Cam.

Paonia femina prior, Dod.

Paonia promiscua seu neutra, Adv. Lob.

IV. Paonia tenuis laciniata subtus pube-
scens flore purpureo.

Paonia Hispanico semine nata, sive secunda,
Clus. hist.

Paonia Hispanica sive pumila, Cam.

Paonia pumila femina, Lob. ico.

Paonia pumilis, Eyst.

an Paonia minor, Gefn. hort.

V. Paonia folio subtus incano, flore albo
vel pallido.

Paonia albo flore, Lob.

Paonia leucanthemos, Psiphedila Bellonij,
Camarar.

Paonia Cretica, Clus. hist.

Paonia alba quæ promiscua est, & *Vigania* vo-
catur, Hon. Belli epist. 1.

Huc referri potest ea, quæ flore est pallescente.

Paonia ochranthemmos Chamerarij: quamvis
& illa, flore non solum sit albo, &

Paonia simplex niveo flore, Cl. hist. sed etiam
flore candicante aliquid rubri dilutioris asper-
sum habente.

Paonia mas flore albo, Eyst.

VI. Paonia aquilinæ folijs.

Paonia quarta folijs superne virentibus, infer-
ne pubescentibus, Clus. hist.

VII. Paonia pomi arantij colore.

Paonia tertia folijs per ora crispis, inferne ci-
nericei coloris, flore carnei dilutioris, Cl. hist.

Pæonia peregrina flore coccineo, Eyst.

VIII. *Pæonia* flore variegato.

Pæonia quinta, Clus. hist.

Flos interdum carneus, aut ruber, aliquando media ex parte ruber, alijs carneus, vel utroque colore radiatim distinctus.

IX. *Pæonia peregrina* flore saturè rubente.

Pæonia Byzantina prior, Clus. hist.

Pæonia Byzantina major, Eyst.

X. *Pæonia peregrina* flore dilutè rubente.

Pæonia Byzantina altera, Clus. hist.

an *Pæonia* Byzantina minor, Eyst.

Flos illo paulo major, dilutioris coloris, filiquæ breviores, semina rotundiora minusque nigra sunt.

Pæonia flore pleno.

I. *Pæonia* femina flore pleno rubro majore.

Pæonia femina multiplici flore, Gefn. hort. Dod. Tab. Ger.

Pæonia femina polyanthos, Lob. Lugd.

Pæonia πολυανθος, Clus. hist.

Pæonia polyanthos flore rubro, Eyst.

Flos hujus aliquando folijs quingentis donatur: ex hujus semine tres differentiae natae. 1. flore simplici sex foliorum. 2. flore simplici octo foliorum serie, colore magis saturo rubro. 3. flore pleno matri concolor & etiam major.

II. *Pæonia* flore pleno rubro minore.

Pæonia pleno rubro flore minor, Clus. hist.

Pæonia altera flore pleno dilutior & minore, Camer.

III. *Pæonia* femina flore albo pleno.

Pæonia femina polianthos flore albo, Taber. Gerard.

IV. *Pæonia* flore ex albido pleno major & minor.

Pæonia sexta, sive exalbida plena, Clus. hist.

Pæonia flore pleno incarnato, Eyst.

LEONTOPETALON.

Λ *Leontopetalon* Dioscoridi lib. 3. cap. 110. *Leontopetalon*, quod alij *Rhapejon*, Plinio lib. 27. cap. 11. Dioscoridi flos puniceo coloris *Anemone* similis: cujus Plinius non meminit: at luteum solum observavimus.

Leontopetalon (id est, leoninum folium) | *Leontopetalum*, Matth. Ang. Gefn. hort. Lac. Advers. | Lob. Dod. Lon. Lugd. Cæs. Cast. Eyst.

CHRYSOGONUM.

Χ *Chrysogonum* Dioscorides lib. 4. cap. 56. meminit, quod aliqui *Jacobaam maritimam*, alij *Tormentillam* censent, cum tamen sui generis planta sit.

Leontopetalum affinis folijs quernis.

Chrysogonum Dioscoridis, Rauwolf. & Lugd.

append. Castor. Ponæ Ital.

STAPHIS AGRIA.

Σ *Staphis agria* Dioscoridi lib. 4. cap. 156. *Staphis agria*, sive *Staphis*, Plinio lib. 23. cap. 1. Latine, herba pedicularis, ab effectu, unde & *Phitroctonon* dici potest, cum nunc in Græcia *phaggonum*, granum pedicularium nominetur.

Staphis agria, Trag. Matth. Fuch. Dod. ut: | Lugd. Cæs. Castor. Camer. Gefn. hort. Turn. Adv. Lob. (sive *Vitifolia*) | Pedicularis, Cord. in Diosc.

SECTIO

SECTIO SEXTA

QUINQUEFOLIUM; HEPTAPHYLLON SIVE
TORMENTILLA; FRAGARIA; TRIFOLIUM;
MEDICA; LOTUS; MELILOTUS.

QUINQUEFOLIUM.

Πεντάφυλλον (quod nomen à numero foliorum habet) Dioscorides lib. 4. cap. 42. proposuit, cui folia sint Mentha, quina singulis pediculis, raro plura, in ambitu serrata, flores ex candido pallescentes, auriculatos: radice subrubra, oblonga, &c. Sic & Theophrasto 9. hist. 14. πεντάφυλλον, ubi Gaza Quinquefolium & Quinquepetam vertit. Et Plinius lib. 25. cap. 9. Quinquefolium nulli ignotum est, Græci vocant Pentapetes, sive Chamaelon, sive Pentaphyllon.

Quinquefolium flore albo.

I. Quinquefolium album majus caulescens: quod 1. in Prodomo.

II. Quinquefolium album majus alterum. Pentaphyllum verum ac nobile, Trag.

Quinquefolium majus candidum, Fuch.

Pentaphyllum albi, Matr. Ad. majus fl. albo, Eyst.

Quinquefolium 1. Tur. album, Dod. gal. Gesn.

ap. Lugd.

Quinquefol. sive Pentaphyllum. 1. Clus. pan. & hist.

Quinquefolium sylvaticum, Tab. Ger.

III. Quinquefolium album minus: quod 2. in Prodomo.

IV. Quinquefolium album minus alterum.

Quinquefolij albi species quædam, Gesn. ap.

Quinquefolium 2. minus albo flore, Clus. pan.

& hist.

Quinquefolium flore luteo.

I. Quinquefolium majus repens.

Pentaphyllum minus, Brunf. vulgare, Trag.

Pentaphyllum, Gesn. hor. Cast. Dioscoridis, Tab.

Pentaphyllum majus, Thal. luteum majus, Dod.

don. gal. Lugd.

Pentaphyllum 1. & 2. Lon. repens, Cam.

Quinquefolium, Matth. Ang. Cord. in Diosc.

Lac. Adv. Lob. (sive Pentaphyllum vulgare)

Cæs. secundum, Turn. (jus, Fuch.

Quinquefolium majus, Dod. Ger. luteum ma-

II. Quinquefolium minus repens aureum.

Quinquefolij quarti secunda species, Clus. pan.

& hist.

III. Quinquefolium minus repens luteum.

Quinquefolij minimum genus, vel 1. Trag.

Pentaphyllum minus luteum, Adv.

IV. Quinquefolium minus repens lanuginosum luteum.

(hist. III. Quinquefolium montanum erectum

Quinquefolij quarti prima species, Clus. pan. &

hirsutum, luteum: quod 3. in Prodomo.

Pentaphyllum sive Quinquefolium minus, Tab.

Incana pentaphyllæa, Ger.

an Pentaphyllum Bavaricum, Cam.

V. Quinquefolium minus repens alpinum aureum.

Quinquefolium tertium, Clus. pan. & hist.

VI. Quinquefolio similis Enneaphyllos:

4. in Prodomo.

Quinquefolium erectum.

I. Quinquefolium folio argenteo.

Pentaphyllum exiguum alterum, Trag.

Pentaphyllum album, Matth. canum, Thal.

Pentaphyllum luteum minus, Dod. gal. rectum

minus, Cam.

Pentaphyllum tertium, Lon.

Quinquefolium luteum minus, Fuch. Tur. Lug.

Quinquefolium petræum majus, Tab.

Quinquefolium Tormentillæ facie, Ger.

II. Quinquefolium rectum luteum.

Pentaphyllum majus, Brunf. Lob. obs. Eystett.

rectum majus, Cam.

Pentaphyllum aliud album, Adv.

Quinquefolium luteum rectum, Gesn. ap.

Quinquefolium vulgare, Lob. ico. Ger. alterum

vulgare, Dod.

Quinquefolium Theophrasti majus, Tab.

Heptaphyllum Hermolai, Cæs.

Pentaphyllum flore albo, Lugd.

Folia terna, quina, sena, ut plurimum septena, in eadem planta observantur: flores sublatei, albi, rubri. Hinc figuræ duæ

Quinquefolij & Pentaphylli albi, & rubri, Lob.

Quinquefolij Theophrasti majoris & albi, vel

majoris 1. & 2. Tab. (rei, Ger.

Quinquefolij vulgaris & Pentaphylli purpu-

nosum luteum. III. Quinquefolium montanum erectum

hirsutum, luteum: quod 3. in Prodomo.

St 3

IV. Quin-

IV. Quinefolium fragiferum.

Fragaria quarta, Trag.

Quinefolium 5. Clus. pan. quintum fragiferum, Eid. hist.

Quinefolium fragiferum sextum, Tab.

V. Quinefolio fragifero affinis.

Pentaphyllum supinum Tormentillæ facie, Lob. Lugd.

Pentaphyllum supinum Potentillæ facie, Clus. pan. & hist.

Quinefolium tertium serpens, Lob.

Quinefolium fragiferum repens, Tab.

Fragaria vesca, Ger.

VI. Quinefolium palustre rubrum.

Pentaphyllum rubrum, Dod. gal. Adv. Lugd. palustre, Lob. ico. Thal. Ger.

Pentaphyllum palustre, Cord. hist. Cam.

Quinefolium quartum, Dod.

Quinefolium palustre, Gesn. h. Cam. ep. Tab. (Eyst.

Folij quinq; & sex variat, unde quibusdam heptaphyllum dicitur.

VII. Quinefolium lupini folio.

Pentaphyllum *heptaphyllum*, Thal.

VIII. Quinefolium tuberosum Indicum. Pentaphyllum Indicum, Clus. exot. l. 4. c. 18.

HEPTAPHYLLON SIVE TORMENTILLA.

Tormentilla, quod radicis pulvis cum aluminis & pyrethri momento, cavis dentium inditus, dentium tormentum sive cruciatum sedet: quam alij Pentaphyllis: alij Bistortis adnumerant: sunt qui Chrysogonum Dioscoridis suspicantur: Heptaphyllum, id est, Seprifolium à quibusdam, à foliorum numero nominatur.

I. Tormentilla sylvestris.

Tormentilla, Brunf. Trag. Matth. Dod. ut: Cord. in Diosc. & hist. Ang. Lac. Lon. Ad. Lob. Cef. Lugd. Thal. Cast. Tab. (& Consolida rubra) Ger. Eyst.

Heptaphyllum, Fuch. Turn. Gesn. hort.

Hujus folia aliquando averfa parte candida sunt: aliquando quina, sapissimè septena.

II. Tormentilla alpina vulgaris major.

Tormentilla alpina, Cam.

Radix odoratior, rubicundior ac major vulgari.

III. Tormentilla alpina folio sericeo.

Argentaria petræa, Gesn. hort. alpina, Eid. col.

Pentaphyllum argenteum, Ang.

Pentaphyllum alpinum petrosum & minimum, Adv. Lob. ico. Ger.

Heptaphyllum, Clus. hisp. & hist.

Stellaria argentea, Cam. ep.

Alchimillæ alterum genus, Cæf.

Tormentilla candida Dalechampi, Lugd.

Argentea heptaphyllos montana, Cam.

Quinefolium alpinum, Tab.

Pentaphyllum petræum minus, Eid. quod supinum, Ger.

IV. Herba Wiapassa in Guajava abundans radicem habet Gingiberi, quoad saporem, non dissimilem, & ad diarrheam sedandam utilis: part. 8. Ind. Occid.

F R A G A R I A.

Fragaria à fragro, id est odorem reddo, dicta videtur: *Κόμαρον* Apulei censetur: inter Pentaphylla flore albo, Dioscoridem intellexisse volunt: & quia Mora terrestria Servio dicta fuisse, sunt qui ad Chamæbatum referant. Plinio lib. 25. cap. 9. Fraga. Rubus Idæus nam spinosus quibusdam.

Genera: alia montana & sylvestria in montibus & sylvis nata: alia sativa, quæ in hortis. Fructus magnitudine, figura oblonga, rotunda, & colore variat.

I. Fragaria vulgaris.

Fragaria, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dod. ut:

Gesn. hort. Lon. Adv. Lob. Lugd. Cast. Ger.

Trifolium alijs Fragaria, Brunf.

Fragula, Cord. hist.

Rubus idæa minor, Lac.

Fragum & Trifolium fragiferum, Tab.

Fragaria major, Thal.

Fraga fructu rubro, Eyst.

Fructus magnitudine & colore variat: quæ-

dam rubra, quædam inter album & rubrum medijs, quædam sanguinei coloris: habentur fructu duplo majore vulgari, herbaceo, luteo, pallore & candore confusis: imò & subalba, quæ Fraga major subalba, Lob. fructu albo, Eyst.

Fraga alba, Dod.

Fraga æquæ magna ac in Anglia in Virginea crescut.

II. Fragaria fructu albo,

Fraga candida, Trag.

Fraga-

Fragaria minor seu nigra, Thal.

Fragum album, Tab.

Fragaria, Ger.

Fructu est aliquando toto candido, minus grumoso, dulciore: aliquando parte superiore rubicundiore, at inferiore candidiore.

III. Fragaria fructu parvi Pruni magnitudine.

Fraga fructu magno, Eyst.

IV. Fragaria folijs hispidis.

Fragariæ tertium genus, Trag.

Fragariæ species minor, Haarbær/ Gef. hort.

Fragum tertium, Tab.

Partim rubra, partim candida sunt, vel sub-purpurea.

V. Fragaria bis fructum ferens.

Fragariæ genus in alpidibus, Cæf.

Fructus forma compressa, striata, Rubidæi

sapores: vere & autumnno maturat.

VI. Fragaria flore luteo.

Fragaria parva luteo flore, Gef. hort.

VII. Fragaria sterilis.

Fragaria sterilis, Gef. hort. marem dixeris, Eid. col.

Fragaria syl. minimè vesca sive sterilis, Lob. ico.

VIII. Fragariæ affinis sericea incana, in Prodromo descripta.

Incana Pentaphylli effigie, an Leucas Dioscoridis, Ad.

TRIFOLIUM.

Tριφύλλον Trifolium Dioscoridi l. 3. c. 123. sic dictum, quod singulis germinationibus terna exeant folia.

Genera: Dioscorides solum bituminosum proposuit, quod τριφύλλον, ulcinosum uel αραβικόν: quod bitumen oleat, dicitur. At Plinius l. 21. c. 9. Trifolij tria genera enumerat: Minyanthes aut, vocant Græci, alij asphaltion, majore folio: alterum acuto, oxytriphylon: tertium ex omnibus odoratissimum.

I. Trifolium bitumen redolens.

Trifolium asphaltæum, Matth. Gef. hort. Fracast. Ad. Lob. Lugd.

Trifolium, Dod. gal. Cord. in Diosc. Gef. h. Lon.

Trifolium bituminosum, Ang. Dod. Cæf. Cast.

Cam. Tab. Ger.

Oxytriphylon, Gef. hort.

Folia inferiora, antequam caulem proferat,

rotunda sunt, cum verò caulescit, acuta: hinc due

figuræ in hist. Lugd. altera rotundis, altera lon-

gioribus folijs. Semen Italicum in Germania

terreæ mandatum, profert plantam odore bitu-

minoso: at semen plantæ in Germania educatæ,

rursus satum, plantam sapore & odore deficien-

tem producit: hinc due figuræ in horto Eyst.

Trifolium bituminosum odoratum, &

Trifolium bituminosum inodorum, Eyst.

II. Trifolium palustre.

Limonium, Cord. in Diosc. pratense, Trag.

Hopyrum, Dod. gal. Gef. hort.

Trifolium palustre, Cord. hist. Dod. Thal. Eyst.

Lotus palustris, Gef. hort.

Trifol. paludosum, Ad. Lob. majus & min. Ger.

Menianthes palustre, Lugd. duplici figura.

Trifolium majus & fibrinum, Tab.

Varia ratione loci, majus datur & minus, ro-

tundiore & acutiore folio: quare Taber. & Ger.

figuras duas exhibent.

III. Trifolium Americum.

Trifolium Americ. Lob. Dod. Lugd. Tab. Cam.

Loti syl. genus latifolium ex Armenia, Cæf.

I. Trifolium pratense purpureum.

Trifolium majus, Brunf. def.

Trifolium pratense purpureum, Trag. Fuch. Ad.

Trifolium pratense rubrum, Cam. Thal.

Trifolium pratense, Matth. Dod. ut: Tur. Lac.

Lob. Lugd. Cæf. Tab. Ger. alterum, Cast.

Hujus differentiæ multæ sunt ratione magni-

tudinis, tam foliorum, quàm caulium & fru-

ctus: folia communissimè rotunda, quibusdam

oblonga, rarius in extremo sinuata: nonnun-

quam unum alterumve folium in binas, ternas,

etiam quaternas lacinias dividitur: rarius cau-

liculo, foliorum minimorum velut fasciculus

in umbellæ modum insidet: quibusdam in fol-

lio macula est, vel nigra, vel alba, lunæ falcatae

figuræ: floris color alijs purpureus, & modò sa-

turarior, modò pallidior.

III. Trifolium pratense album.

Trifolium pratense alterum, Trag. Matth. Lac.

Trifolium pratense primum, Cast.

Trifolium pratense album, Fuch. Dod. gal. Tur.

Ad. Cam.

Trifolium acutum, Lon.

Trifolium majus primum, Clus. pan. & hist.

Trifolium pratense vulgare fl. candido, Thal.

III. Quadrifolium hortense album.

Quadrifolium phæum fuscum, Ad. Lob. Lugd.

Lotus quadrifolia, Tab.

Folij quaternis, quinis, aliquando septenis

donatur.

IV. Tri-

I V. *Trifolium pratense luteum capitulo brevior.*

Melilotus minus, Brunf. 4.

Meliloti exigua species, vel 6. vel minor, Trag.

Trifolium pratense luteum, Fuch. Tur. Lugd.

Cam. pratense tertium, Cast.

Lorus sylvestris, Lon. syl. minor, Dod. gal. Lug.

Trifolij genus medicæ simile, Ges. hort.

Trifolium luteum 1. capitulo brevior, Thal.

an *Trifolium luteum minimum*, Ad.

Trifolium arvense, Tab.

Trifolium Burgundiacum, Ger.

V. *Trifolium pratense luteum capitulo lupuli*, vel agrarium.

Melilotus 8. vel *Lotus campestris*, Trag.

Trifolium agrarium, Dod.

Trifolium luteum minimum, Lob. Lugd.

Trifolium luteum alterum lupulinum, vulgo

lupulus sylvaticus, Thal.

Illud flore est minore, semen fert, & quibusdam mas: hoc verò flore est majore & speciosiore, sterile & fœmina dicitur.

VI. *Trifolium pratense minus flosculis purpureis*.

Lotus pratensis purpurea, Lugd.

Folia modò terna, modò quaternaria habet.

Trifolium montanum.

I. *Trifolium montanum purpureum majus*.

Trifolij altera species & major, Ges. hort.

Trifolium majus 2. Clus. pan. & hist.

Trifolium aliud montanum majus, Thal.

II. *Trifolium montanum purpureum folio acuto crenato*: quod 1. in Prodr.

III. *Trifolium montanum purpurascens folio obtuso crenato*: quod 2. in Prodr.

IV. *Trifolium montan. purpureum minus*.

Trifolium montanum aliud minus, Thal.

Variat flore, qui purpureus, reperitur & albus.

V. *Trifolium montanum album*.

Trifolium majus albo flore, Clus. pan. majus, primum, Eid. hist.

VI. *Trifolium montanum lupulinum*: quod 3. in Prodr.

Trifolium alpinum.

I. *Trifolium alpinum flore magno, radice dulci*: quod 42. in Phytopinace: 20. in Prod.

Trifolium angustifolium alpinum, Ponæ.

Glyzyrrhiza astragaloides quibusdam.

II. *Trifolium alpin. argenteum Persici flore*.

Trifolium argenteum alpinum, Ponæ Ital.

III. *Trifolium saxatile hirsutissimum*: quod 41. in Phytopinace: 19. in Prodr.

Trifolium spicatum.

I. *Trifolium spica subrotunda rubra*.

Lagopus maximus folio & facie Trifolij pratensis, Ad. Lob.

Lagopus major folio trifolij, Dod. major flore rubro, Cam.

Lagopus maximus Lobel. Clus. pan. & hist. Lug.

Lagopus peregrina, Eyft.

II. *Trifolium spica oblonga rubra*.

Trifolium majus tertium, Clus. pan. & hist.

III. *Trifolium montanum spica longissima rubente*.

Cytisus, Trag. Lugd. (& *Pes milvi Pand.*) Cam.

Cytisus Columellæ, Lon.

Lagopus altera folio pinnato, Lob. Lugd.

Lagopus major, Eyft. alter, Dod.

Trifolij majoris tertij, altera species, Clus. pan. & hist.

Trifolium spicatum, Thal.

Folia in calidioribus regionibus marcescentia, nitore, lævora ac strijs elegantissimis avium pennas imitantur.

IV. *Trifolium mont. angustissim. spicatum*.

Lagopus altera angustifolia, Ad. Lob. ico. Lug.

an *Lagopus minor*, Cæs.

Folijs latoribus in montibus Eganæis, & angustioribus circa Montspelim collegimus: aliquando etiam omnibus partibus minor & semipalmaris est, &

Alopecurus graminea Dalech. Lugd dicitur.

V. *Trifolium Hispanicum angustifolium*, spica dilute rubente.

Lagopus angustifolius Hispanicus, Clus. hist.

VI. *Trifolium arvense humile spicatum*, si ve *Lagopus*.

Lagopus & Lotus campestris, Trag.

Lagopus sive pes leporinus, Matth. Fuch. Dod.

ut: Lac. Lon.

Lagopus & Lagopyron, Ad.

Leporinus pes, Cord. in Dioscor.

Lagopus major, Cæs. minor, Cam.

Lagopus vulgaris, Lug. cum duplici figur. Thal.

Lagopodium, Tab. Ger.

λαγώπος Dioscorid. l. 4. c. 17. *λαγόπυρον*, Hippoc.

Lagopus, Plinio lib. 26. cap. 8.

Spica colore variat, lutea, aliquando cineritia, aut albescente, ijsq; majoribus, minoribus, rotundioribus, longioribus: folijs latoribus, angustioribus.

angustioribus. Cretici Lagopi nomine habemus folijs latoribus & brevioribus, spicaque brevior & flavescente.

Trifolium capitulo stellat. folliculato, globoso. I. Trifolium stellatum: quod 16. in Prodr.

II. Trifolium pratense folliculatum. Trifolium pratense Salmanticum, Clus. hisp. & hist. Lob. Lugd.

Trifolium Hispanicum, Tab. Salmanticum, Ger. III. Trifolium globosum, sive capitulo Lagopi rotundiore: quod 17. in Prodr.

IV. Trifolium globosum repens: quod 18. in Prodr.

V. Trifolium capitulo spumoso laevi: quod 4. in Prodr.

VI. Trifolium capitulo spumoso aspero majus: quod 5. in Prodr.

VII. Trifolium capitulo spumoso asperius: quod 6. in Prodr.

VIII. Trifolium fragiferum Friscum, Clus. cur. post.

Aliud floribus dilute rubentibus in globulis, rubi idæi fructum forma & colore æmulantibus. collectis: alia species capitulo saturati violacei coloris, ad Rubi vulgaris fructum accedente.

IX. Trifolium capitulis Thymi: quod 7. in Prodr.

X. Trifolium album angustifolium, floribus velut in capitulo congestis.

Dorycnium falso dictum, Ges. hort.

Dorycnium Montpellierium, Ad. Lugd. Cam.

Dorycnium, Lob. Hispanicum, Clus. hisp. & hist. Tab. Ger.

Folia terna, quaterina, aliquando quina junguntur: quæ modò latiora, modò angustiora.

XI. Trifolium capitulo oblongo aspero: quod 8. in Prodr.

Trifolium peltatum, scutellatum, cochleatum & turbinatum.

I. Trifolium peltatum Creticum: quod 14. in Prodr.

II. Trifol. cochleatum vel scutellatum fructu latiore, folio minuto obtuso: quod 9. in Prod.

III. Trifolium cochleatum fructu latiore. Medica minor, Trifolium tortuosum, Ges. hort.

Trifolium cochleatum primum, Dod. Ger.

Medicæ species 3. filiqua glomerata, Ad. species 3. Lobel.

Medica, Tur. Anglica, Tab.

Trifolium filiquam habens cochlea modo implexam, Cæs.

Medica platycarpus, Cam.

Medica sylv. prior, Lugd.

IV. Trifolium cochleatum fructu magis tortili: quod *maxima* Cydoniæ, *negindis* Retimi nomine, ex Creta Honor. Belli misit.

V. Trifolium cochleatum turbinatum, sive fructu compresso oblongo.

Medicæ species secunda, Ad.

Medica sylv. altera, Lugd.

Medica rotundo semine, Cam.

Hoc, sed fructu minore, Loti aut Trifolij nomine, ex Creta ab Honorio Belli accepimus.

VI. Trifolium cochleatum polycarpon: quod 10. in Prodr.

Duplex est: aliud folio obtuso non crenato: aliud folio acuto crenato: illud Italicum, hoc Gallicum est.

VII. Trifolium cochleatum maritimum tomentosum.

Trifolium maritimum, Ges. hort.

Medica marina, Ad. Lobel. ico. Clus. hisp. & hist. Tab. Cam.

Trifolij quoddam genus in maritimis, Cæs.

Anthyllis altera, Lugd. ico.

Trifolium cochleatum marinum, Ger.

Trifolium cochleatum hispidum, echinatum & spinosum.

I. Trifolium cochleatum fructu nigro hispido.

Trifolium cochleatum alterum, Dod.

Medica folliculo spinoso, Lob. Lugd.

Medica semine minuto hirsuto, Cam.

Medica, Cast. ico.

II. Trifol. cochleatum folio cordato maculato.

an Trifolij species nigris maculis, quod hemoroidum cognominant, Ges. hort.

Medica Arabica, Cam.

III. Trifolium folio obtuso folliculis cordatis: quod 13. in Prodr.

IV. Trifol. fructu compresso spinis horrido.

Medica filiqua spinosa, Ad.

Medicæ species, Lob. ico.

V. Trifolium cochleatum echinatum minus: quod 12. in Prodr.

VI. Trifolium echinatum arvense.

Tribulus terrestris minor repens, Lugd.

Medica pusilla, Cam.

Pilulas habet quaternas, quinas simul junctas; subsequens verò binas, ad summum ternas.

VII. *Trifolium echinatum arvense fructu minore.*

Tribulus minor rectus, Dalech. Lugd.

VIII. *Trifolium spinosum Creticum*: in *Phytopinace* Matthiolo, & *Prodromo* sub 5. descriptum.

Trifolium spinosum Creticum, ἐφ' ἑρ' ἐξ ἑστὸ *Belli*, Clus. hist.

Trifolium siliqua cornuta & falcata.

Dioscorides *μυδνύλις*, lib. 2. cap. 177. folijs & caule *Trifolij pratensis*, siliquis corniculorum modo intortis descriptis: *Mandrag.*, Theophrasto 8. hist. 8 & 2. caus. 20. Et *Plinio* lib. 18 cap. 16. *Medica* à *Medis* adveſta per bella *Perſarum*, &c.

I. *Trifolium siliqua cornuta*, sive *Medica*. *Medica*, Dod. ut: *Cord.* in *Dioſc.* *Lac.* *Cæſ.* *Cam.* *Caſt.* *deſcr.*

Medica vera, *Gef.* *hor.* *fativa*, *Lugd.*

Medica flore purpureo, *Ang.* *herba*, *Lon.* *deſ.*

Medica legitima, *Clus.* *hiſt.*

Fœnum Burgundiacum, *Ad.* *Lob.*

Medicam veterum & *Alfaſar* *Avicennæ* volunt: quæ floris colore variat, communiter cæruleo, violaceo, luteo: ex utriſq; mixto.

II. *Trifolium ſyl.* luteum *siliqua cornuto*, vel *Medica frutescens*.

Meliloti majoris species tertia, *Trag.*

Trifolij genus Medicæ ſimilis, *Gef.*

Medica flavo flore, *Clus.* *pan.* & *hiſt.*

Lens major repens, *Tab.*

Apud nos flore est luteo: at circa *Nemaſum* in *Gallia Narbonenſi*, in arvis reperitur flore luteo albo, viridi, cæruleo, purpureo, nigro, vario, ex cæruleo viridi composito.

III. *Trifolium siliqua falcata.*

Lunaria radiata Italorum, *Lob.*

Medica ſyl. altera *lunata*, *Lugd.* cum duplici figura.

Trifolij genus siliqua lata & falcata, *Cæſ.*

Medica lunata, *Caſt.* *ap.*

IV. *Trifolium siliqua falcata alterum.*

Trifolium falcatum, *Clus.* *hiſt.* *append.* *alt.* & *cur.* *poſt.*

Trifolium acetosum.

οξυτρίφυλλον quibusdam, ab acido ſapore, & forma trifolij: *Oxys* *Plinio* l. 27. cap. 12. folia ter-na habet.

I. *Trifolium acetosum vulgare.*

Trifolium acetosum, *Brunf.* *Matth.* *Dod.* *Lugd.*

Thal. *Caſt.* *flore albo*, *Eyſt.*

Panicuculi, *Brunf.* 4.

Oxytriphylon, *Trag.* *Lac.*

Oxys, *Fuch.* *Dod.* *gal.* *Tur.* *Cord.* *hiſt.* *Cam.* *alba*,

Ger. *Tab.*

Oxys quorundam, *Ang.* *Pliniana*, *Gefn.* *hort.* *Ad.* *Lob.*

Alleluja, *Lac.* *Lon.*

Lujula, *Fracaſt.*

Trifolium acetosum, *Calabris* *Juliola*, *ridiculè barbari* corrupere in *Alleluja*, *Scalig.* in *Thoph.* *de cauſ.*

Floris colore variat: communiter laeteus est: rarius purpureus, vel subcæruleus & luteus.

II. *Trifolium acetosum corniculatum.*

Oxys flore luteo vel flavo, *Clus.* *hiſpan.* & *hiſt.* *Dod.* *Tab.*

Oxys, *Cæſ.* *Ger.* *lutea corniculata repens*, *Lob.* *Lugdun.*

Lotus urbana, *Tur.* *ico.*

Trifolium acetosum flore luteo, *Caſt.* *Eyſt.*

Trifolium hepaticum.

I. *Trifolium hepaticum flore ſimplici.* *Hepatica*, *Brunf.* *Dod.* *gal.* *aurea*, *Brunf.* 4. *Gef.* *hor.* *Tab.* *Thal.* quibusdam *Anthera*.

Trifolium magnum seu aureum, *Trag.*

Triada & *Taura*, *Hermolao.*

Trinitas, *Matth.* *Ang.* *Cord.* *hiſt.* (ſive *Epimedium*) *Gef.* *ap.* *Cæſ.* *Caſt.*

Herba Tripitatis, *Gef.* *hort.* *Lugd.*

Trifolium aureum, *Dodon.* *Lon.* *aureum magnum*, *Caſt.*

Hepaticum trifolium *Ad.* *Lob.* *Cam.* *Ger.*

Hepatica terreſtris, *Gefn.* *col.* *Hepatica trifolia*, *Clus.* *hiſt.*

Folijſ ludit, aliquando majoribus & maculis vatiegatis: floribus communiter cæruleis, vel violaceis, ſubpurpureis, rubris albis, etiam maculis purpureis aſperſis: hinc figuræ duæ apud *Lobel.* & *Gerard.*

Hepatici trifolij & rubri:

Hepaticæ aureæ flore cæruleo & rubro, *Tab.*

Hepatici trifolij cærulei & rubri, apud *Clus.* & apud *Eyſt.* fl. albo, rubro, & cæruleo.

II. *Trifolium hepaticum flore pleno.*

Hepatica trifolia polyanthos, *Lob.* *Lugd.*

Hepatica trifolia cæruleo pleno flore, *Clus.* *hiſt.* *ap.* *alt.*

Hepatica multiflora, *Gerard.* *aurea multiflora*, *Tabern.*

Hepatica aurea flore pleno & cæruleo, *Eyſt.*

LOTUS

LIB. VIII. SECT. VI.
LOTUS ET MELILOTUS.

331

Aloris Lotus herba (de arbore enim hic sermo non est) Dioscoridi l. 4. c. 111. triplex est: sativa, quam aliqui *τριφύλλον* vocant, quæ in hortis nascitur: sylvestris, quam aliqui *Αίβορ*, Libum à loco natali appellant, caule bicubitali, aut etiam majore, aliis multis, folijs Loti trifolia præcens, semine sænuæ, at multo minore, gustu medicato: tertia est Lotus Aegyptia, de qua supra. Theophrasto 7. hist. 9. Lotus herba in caule tantum foliata est: & c. 14. licet, inquit, nomen unum habeat, tamen plura ejus genera sunt, ut ferme equivoca sint, folio, caule, flore, fructuq; discreta: Sic de Loto Aegyptia egit 4. hist. 10. Plin. l. 13. c. 17. de Loto arbore differens, subjungit: est autem eodem nomine & herba (Lotum urbanam Dioscoridis intelligens) & in Aegypto caulis in palustrinum genere: de hac posteriori egit l. 22. c. 21. Lotometram vocans. Idem l. 22. c. 21. ait, Homerum inter herbas subnascentes Deorum voluptati Lotum primam nominasse: haud dubie Lotum sativam Dioscoridis intellexit.

De Meliloto autem Plinius lib. 21. cap. 9. inquit, in coronamentis venit Melilotum, quod Sertulam Campanam vocamus: est enim in Campania Italia laudatissima: coronas ex hac antiquitus factitatas, indicio est nomen Sertula, quod occupavit: odor ejus croco vicinus est, & flos, ipsa cana: placet maxime folijs brevissimis atque pinguisimis. Et c. 11. Melilotos ubique nascitur, laudatissima tamen in Attica: ubicunque verò recens nec candidans & croco quam similima: quanquam in Italia odoratior & candida.

I. Melilotus officinarum Germaniæ.

Melilotum majus, Brunf. Melilotus, Lac. Lon.

Melilotus vera, Gefn. hort.

Melilotus major vulgaris, Trag.

Melilotus vulgaris, Lugd. (Lugd.

Lotus urbana, Matth. sativa, Cast. sativa altera,

Saxifraga lutea, Fuch. Sax. altera, Lac.

Lotus sylvestris, Fuch. ico. Cæs. Tab.

Loti five Trifolij species, Cord. in Diosc.

Melilotus Germanica, Dod. gal. Ad. Lob. Cam.

Gerard. flore luteo, Eyft.

Trifolium odoratum 1. & 2. Dod. Tab.

Flore est communiter luteo, aliquando albo,

quæ Melilotus major candida, Trag. hinc duæ

apud Tab. figuræ:

Loti sylvestris: & fl. albo. Et apud Gerardum:

Meliloti Germanicæ, & Meliloti coronatæ

nomine.

Dodonæus hujus differentias quinque re-

cenfuit: 1. flore luteo: 2. flore candido: 3. pere-

grina flore purpureo cæruleo inodoro: 4. flore

luteo longioribus filiquis: 5. flore luteo folijs

per circumferentiam non crenatis.

II. Melilotus corniculis reflexis major.

Melilotus major, vel 3. species, Trag.

Melilotus Italica, Fuch. Dod. gal. Gef. h. Ad. Lob.

Meliloti quartum genus, Fuch. ico.

Melilotus five Sertula campana, Matt. Cord. in

Lotus sylvestris, Gefn. hort. (Diosc.

Trifolium corniculatum 2. Dod. Thal.

Melilotus alia, Cæs.

Sertula campana, Cast.

Aliam figuram habet Lobelius, nomine

Meliloti Syriacæ odoræ & Sertulæ campanæ.

Melilotus Syriaca, Adv.

Hæc Patavij sata, corniculis exit minus fal-

catis & ignaviore odore. Huc referatur

Melilotus altera pusilla Londinensis, Adv.

III. Melilotus corniculis reflexis minor,

vel repens.

Melilotus Aegyptia, Alchimelech, Alpino.

IV. Melilotus Italica folliculis rotundis.

Melilotus, Ang. Italica, Cam.

In quibusdam folliculis duo, in reliquis u-

num granum continetur.

V. Melilotus angustifolia repens, folliculis

rotundis: quod sub Trifolio 23. in Pr. describ.

VI. Lotus hortensis odora.

Trifolium Dioscoridis, Trag.

Lotus sylvestris, Matth. Ang. Cast. altera, Lugd.

Lotus sativa, Fuch. ico. Dod. gal. Cord. in Diosc.

& hist. Gefn. hort. Cam.

Lotus urbana, Lac. Tur. desc. Eyft.

Trifolium odoratum, Fuch. Tur. Lon.

Trifolium odoratum alterum, Dod. Lugd.

Trifolium caballinum, Gefn. hort.

Lotus hortorum odora, Ad. Lob.

Melilotus vera, Tab. singularis Alpini, Ponæ.

Quibusdam *μελί οίταν* Theophrasti 7. hist. 14.

Mel frugum Gaza vertit: Lotus urbana five

sativa Dioscoridis: Septies in die odorem mu-

tare fertur, unde nomen Germanicum *Eiben-*

zeit: nostris *Schabzugerfraut* / quia Helvetij

suus peculiaribus caseis, quos *Schabzuger* vo-

cant, miscere solent.

VII. Lotus sativa Græca maculato folio.

Lotus sativa, & cum folium modo macula rufa

modo nigra notatum sit, & caligini oculorum

medeatur, à quibusdam *τριφύλλον οὐκ ὀφθαλμοῦ*, id est,

Trifolium oculatum vocatur, Ang.

Lotus pentaphyllos filiquis rectis.

- I. Lotus sive Melilotus pentaphyllos minor
Lagopus primus, Trag. (glabra.
Meliloti exigui species altera, vel 7. & nobilis,
Melilotus Germanica, Fuch. Lon. (Eid.
Meliloti tertium genus, Fuch. ico.
Lotus sylvestris, Dod. gal.
Trifolij species, Cord. in Diofc.
Lotus pentaphyllos, Gesn. hort.
Trifolium corniculatum primum, Dod. Thal.
Melilotus coronata, Ad Lob.
Lotus sativa Matthioli edit. prima, Lugd.
Melilotum vulgo, Cæf.
Pseudomelilotus, Cam.
Trifolium filiquosum minus, Tab. Ger.
Flos lutei coloris, aliquando ad aureum ver-
gens, nonnunquam subviridis.
II. Lotus pentaphyllos minor hirsutus, fili-
qua angustissima: sub Trifolio 21. sive cornicu-
lato minore piloso, in Prodomo descriptus.
III. Lotus pentaphyllos flore majore luteo
splendente.
Meliloti majoris quarta species, Trag.
Trifolium corniculatum tertium, Dod.
IV. Lotus pentaphyllos major hirsutus
candicans.
Melilotus vulgaris alter sylv. Cæf.
V. Lotus pentaphyllos major alter.
Lotus pentaphyllos major & erectus, Gesn. hor.
Hic & glaber & leviter hirsutus apud nos
reperitur.
VI. Lotus pentaphyllos frutescens tenuif-
simis glabris folijs: sub Trifolio 22. vel Corni-
culato frutescente in Prodomo descriptus.
VII. Lotus Hispanica folijs maculatis: sub
Trifolio 24. vel Meliloto Hispanico maculato
describitur.
VIII. Lotus pentaphyllos incanus.
Glaux, Ang. quo nomine & Alpinus donabat.
Cytisus Columellæ, Cam. Eyst.
Dorycnium 2. & non descriptum, alijs.
an Idem cum
Dorycnio congenere planta, Cl. hisp. & hift. &
Dorycnij species, Tab. (Lugd.
Dorycnium Monspelienfe, Ger.
Clafius enim flores colore viridi & Anguil. &
Camer. purpureos, vel ex albo purpurascens
adferibit.
IX. Lotus pentaphyllos filiquosus villosus.
Oxytriphyllo alterum Scribonij, Ad Lob. ic.

Oxytriphyllo Scribonij, Lotus syl. Cluf. hift.
an Trifolium alterum folio acuto oxytriphyl-
lum Plinij?

an Lotus sylvestris ex Cod. Cæsareo, Dod. Lug.
Flos est albo, est & purpureo.

X. Lotus filiquosus glaber flore rotundo.
Lotus Lybica Dalechampij, Lugd.

an Oxytriphyllo genus, Cluf. hisp.
Hoc duplex Clusio: unum candidioribus

ramis & albo radice: alterum caule & ramis
ex albo purpurascens, in quibusdam ru-
bentibus.

XI. Lotus fruticosus incanus filiquosus.
Lotus asperior fruticosa, vel Narbonensis inca-
na, Lob. Lugd.

XII. Lotus pratensis filiquosus luteus.
Lotus trifolia pratensis filiquosa Monspelien-
lium, Adv. Lob. ico.

Lotus filiquosus luteo flore, Cluf. pan.

Lotus pratensis filiquosus, Eid. hift.

Lotus trifolia filiquosa, Tab.

Lotus trifolia corniculata, Cær.

Duplex est major & durior: minor & mollior.

XIII. Lotus ruber filiqua angulosa.

Lotus filiquosus rubro flore, Cluf. pan. & hift.

Lotus pulcherrima tetragonolobus, Cam. Eyst.

Scandalida Cretica Italorum.

Lotus pentaphyllos filiqua convexa.

I. Lotus pentaphyllos filiqua cornuta.

Lotopifos sive Hieranzuni Candia, Ponæ.

Lotus *heavifon*, quo nomine Bellus ex Creta ad

nos misit: & in epist. 5. ad Cluf.

II. Lotus filiquis ornithopodij.

Lotus peculiaris filiquosa, Cam.

Lotus sylvestris Dioscoridis, Ponæ.

III. Lotus pentaphyllos filiquis recurvis

pedes corvinos referentibus.

Coronopus ex Cod. Cæsareo, Dod. quid?

IV. Lotus pentaphyllos vesicaria.

Dorycnio similis, Ang.

Trifolium vesicarium, Cluf. pan.

Trifolium Halicacabum sive vesicarium, Cam.

Lotus affinis.

I. Loto affinis Ægyptiaca.

Abfus, Alpini.

II. Loto affinis Vulneraria pratensis.

Anthyllis prior, Dod. gal. Lac. Lugd.

Anthyll. leguminosa, Lob. Cl. pan. & hift. Cam.

Anthyllis lenti similis, Dod.

Vulneraria rustica, Gesn. hort.

Lago-

Lagopodium, Tab.

Arthetica Saxorum, Thal.

Flore communiter est luteo, rarius albo:

hinc duæ figuræ apud Tab. & Ger.

1. Lagopodium flore albo, Tab.

Lagopum maximum, Ger.

2. Lagopodium flore luteo, Tab.

Anthyllis leguminosa, Ger.

III. Loro affinis hirsuta flore subrubente.

Anthyllis leguminosa purpurascens flore,

Clus. pan. & hist.

Lotus latifolia Dalechampij, Lugd.

Aliquando tota incana est, qualem ex Hispania habemus.

IV. Loro affinis filiquis hirsutis circinatis:

Auricula muris, Cam.

CASPARI BAVHINI
PINACIS THEATRIBOTANICI
LIBER NONVS.
SECTIO PRIMA.

RUBIA; APARINE; ASPERGULA; MOLLUGO;
GALLION; CRUCIATA.

RUBIA.

Erythrodanum (ab erythro, id est ruber) & erythrodanum, aliquibus erythrodanum, radix est rubra tingendo idonea, Dioscoridi l. 3. c. 160. & erythrodanum, Theophr. 6. hist. 1. Rubia (aradicis colore) Plinio l. 19. c. 3. ac l. 24. c. 11. Erythrodanum, aliqui Erythrodanum vocant; nos Rubiam, qualis tinguntur.

Genera: duplex est, una sylvestris, sativa altera, cui caules quadranguli, longi, asperi, quales Aparine, folijs in orbem per intervalla, circa singula genicula stelle modo decussatim radiatis, &c. Dioscorides l. c. At Theophr. l. c. plura sunt genera (Dodonæo Rubia proprie species nulla sunt) & 7. hist. 9. radices rubicundæ: verum 9. hist. 14. folia hedera sed rotundiora tribuit. Plinio l. 19. c. 3. Rubia spinosus, caulis geniculatus, quinque circa articulos in orbem folijs. Hic Plin. licenter asperum caulem spinosum vocat, cum Theophr. 6. hist. 1. spinis Erythrodanum carere aperte scribat. Laudatissimum, ait Plinius, Italica & maxime suburbana & omnes pene provincie sciant, &c.

I. Rubia tinctorum sativa.

Rubia sativa, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dod.

gal. Gesn. hort. Lac. Tur. Lon. Frac. Lugd. Cast.

Rubia, Cord. in Diosc. Ang. Dod. Cæs. major,

Adv. Lob. Clus. hist.

Thapsia Asclepiadis, Ang.

Seritur non paucis Germaniæ, præsertim apud Silesios, Belgij, Galliæ, Italiæ & Hispaniæ locis, in usum enim tinctorum agri conferuntur: quemadmodum apud Dioscoridem, in Thebana Galliæ, & Ravenna Italiæ, nec non in Caria inter oleas ferebatur.

II. Rubia syl. aspera, quæ sylvestris Dioscoridi.

Rubia erratica, Trag.

Rubia syl. vera, Cord. ob.

Rubia maxima, Lob. ob.

Rubia sylvestris, Cæs.

Quibusdam locis sponte in sepibus provenit, sativæ per omnia similis, radice tamen multo majore, & folijs atrovirentibus.

III. Rubia sylvestris lævis.

Rubia sylvestris, Brunf. Matth. Fuch. Dod. gal.

Gesn. hort. Lac. Tur. Lon. Lob. Lugd. Cam. Cast.

Thal. Tab. Ger.

Rubia syl. minor, Adv. Lob. ob.

Lappago Plinij, Cæs.

Alyssum Plinij l. 24. c. 11. (quod folijs tantum & ramis minoribus, ab Erythrodano distare scribit) quibusdam alijs Lappago ejusdem l. 26. c. 10.

IV. Rubia pratensis lævis acuto folio: quæ Rubia 2. in Prodromo. (Prod.

V. Rubia montana angustifolia: quæ 1. in Rubia sylvestica longioribus & angustioribus folijs, Gesn. hort.

VI. Rubia cynanchica.

Aspergula herba repens, Gesn. col.

Synanchica, quod ad anginas sumpta & admodum valeat, Lugd.

Saxifraga altera, Cæs.

Galiū tetraphyllō montanum cruciatum, Col.

VII. Rubia cynanchica saxatilis: quæ 8. in

VIII. Rubia linifolia aspera. (Prod.

Tr 3

Jun-

Juncaria Salmaticensis, Clus. hisp. & hist. Lob.
Juncaria, Tab.

Synanchicæ species, Lugd.

IX. Rubia maritima.

Rubia marina Norbonensium, Adv. Lob. Dod.
Clus. hisp. & hist. Tab.

Erythrodanum marinum, Lugd.

Crucialis maritima, Cæf.

X. Rubia quadrifolia vel latifolia lævis.

Rubia lævis Taurinensium, Lob. Lugd.

XI. Rubia quadrifolia, vel rotundifolia lævis: sub Rubia 3. in Prodomo.

XII. Rubia latifolia spicata.

Rubia spicata, Imperato: Cretica, Clus. hist.

XIII. Rubia angustifolia spicata: quæ 4. in Prodomo.

XIV. Rubia Virginea.

Chappavvr, radices tenues quibus ad tinturas utuntur: in desc. Virgin.

Rubeola.

I. Rubeola arvensis repens cærulea: quæ 5. in Prodomo.

Rubeola arvensis, Cam.

II. Rubeola repens lutea folijs spinosis.

Rubia minima, Lob. Lugd.

III. Rubeola laxatilis: quæ 6. in Prodomo.

an Rubia saxatilis, Cam.

IV. Rubeola echinata saxatilis.

Cruciata muralis, Col.

an Crucialis minima in maritimis, Cæf.

V. Rubeola maritima aspera: quæ 7. in Prodomo.

APARINE SIVE ASPERUGO.

Aπapiv, ἀσπερίδων, ἀσπερίδων, ἀσπερίδων ramis quadrangulis, asperis, folia, ceu & rubia, ramulos in orbem per intervalla cingunt, &c. Dioscoridi lib. 3. cap. 104. Lappam Gaza apud Theophrastum 7. hist. 8. & 14. vertit: Aparinem (scribit Plinius lib. 27. cap. 5.) aliqui Omphalocarpon, alij Philanthron vocant, ab asperitate vestium tenaci, &c. Eadem lib. 26. cap. 10. Asperugo inter Lappaginei, dicitur ab asperioribus folijs, ad quod nomen vulgare alludit.

I. Aparine vulgaris.

Aparine, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Ang. Dod.
ut: Cord. in Dioscor. Lac. Turn. Lon. Adv. Lob.

Lugd. Cæf. Castor.

Aparine aspera, Thal.

II. Aparine purpureis floribus.

ASPERULA.

I. Asperula, sive Rubeola montana odora.

Caprifolium vel Stellaria, Brunf.

Hepatica tertia, Eid. 4.

Matrifylva, Trag. Cord. in Dioscor. Lon. Thal.

Asperula, Dod. gal. Frac. Lob. Lugd. Ger.

Asperula odorata, Dod. Cast. Clus. hist.

Aspergula odora nostras, Adv.

Aparine sylvestris quædam, Cord. in Dioscor.

Alyssos, Gefn. hort. Lac.

Alyssum Plinij minus, Gefn. collect.

Rubia sylv. alia minor, Gefn. append.

Hepatica stellata, Tab.

II. Asperula cærulea arvensis.

Alifon, Turn.

Asperula cærulea, Dod. Lob. Cam. Lugd.

Alyssum Galeni quibusdam, sed perperam.

III. Asperula hexaphyllos purpurea.

Myagrum alterum minus Dalechampi, Lugd.

IV. Asperula verticillata luteola.

Asperula verticillata muralis minima, Col.

MOLLUGO.

Molluginis Plinius lib. 26. cap. 10. his verbis meminit: Et Lappago similis anagallidi (fortè legendum Gahio) nisi esset ramosior, ac pluribus folijs aspera, rugosa, asperioris succi, gravis odoris: quæ talis (fortè mollis legendum) est, Mollugo vocatur: similis sed asperioribus folijs, Asperugo.

I. Mollugo montana latifolia ramosa.

Matrifylva secunda, Trago.

Rubia sylvarica altera, Gefn. hor. major, Eid. ap.

Alyssum Plinij majus, Gefn. col.

Mollugo montana, Dod. Lugd. Thal. Tab.

Mollugo, Clus. pan. & hist. Belgarum, Lob.

Gallium sive Mollugo montana, Ger.

II. Mollugo montana angustifolia, vel

Gallium album latifolium.

Gallion tertium, Trag. album, Adv. Cam. Thal.

Gallion candido flore, Cord. in Dioscorid. Cæ-

salpin.

Mollugo prima, Dod. Lugd. Tab.

Mollugo vulgarior herbariorum, Lob.

GAL.

G A L L I U M.

Gαλλιον, γαλλεγιον, γαλλατιον, nomen ex eo traxit, quod coaguli vice γαλλε lac cogat & coagulet: ramulum foliumq; habet Aparina similimum, rectum: florem in cacumine luteum, &c. sic Dioscorid. l. 4. c. 96.

- | | |
|--|---|
| <p>I. Gallium luteum.
Gallij primum genus, Trag.
Galium, Matth. Lac. Cast. luteum, Cord. in Diosc.
Lob. Lugd. Cam. Ger.
Gallium, Fuch. Dod. ut: Ang. Lon.
Gallium luteum, Ad. Thal. primum, Tab.
II. Gallium rubrum.
Gallium rubro flore, Clus. hist.
III. Gallium nigropurpureum montanum tenuifolium, Colum.</p> | <p>IV. Gallium palustre album.
Gallion palustre, Dodon.
Gallion flore candido in palustribus, Cæsalp.
Castor.
Aparine lævis palustris, Thallio.
Gallium album, Lon. Tab. Ger.
V. Gallium album minus.
Gallium album minus, Tab. rubrum, Ger. ico.
Folia bina plerunque, nonnunquam terna habet.</p> |
|--|---|

C R U C I A T A.

Cruciatæ ac Crucialis, à foliorum in crucis formam situ nominatur, licet ad Rubia & Aparines similitudinem aliquomodo accedat.

- | | |
|--|---|
| <p>I. Cruciatæ hirsuta.
Gallij secundum genus, Trago.
Gallion, Turner.
Crucialis, Hermol. Cæf.
Cruciatæ, Dod. ut: Ges. hor. quæ Gallio cognata, Cam. Cast. ico.
Cruciatæ minor, Ad. Lobel. (& Asperula aurea) Lugdun.
Cruciatæ herniaria, Thallio.</p> | <p>Alysson Plinij, Cæsalp. Inguinaria Plinij lib. 26. cap. 9. quibusdam (Inguinaria passim in vepribus nascens, ut prolit inguinibus in manu tantum habenda est: plura non habet) fortè quia in herniosis, rupturis solidandis, admodum præstans habetur.
Eadem in montibus longè exilior.
II. Cruciatæ glabra: hæc sub Gallio latifolij glabro in Prodomo describitur.</p> |
|--|---|

S E C T I O S E C U N D A.
R U T A: T H A L I C T R V M.

R U T A.

Rutæ Dioscoridi lib. 3. cap. 52. Theophrasto 1. hist. 10. ita dicitur quod caliditate sua πύρον τήν γούλιν (semen coagmentet) ut Nicandri schol. tradit. Ruta Plinio lib. 19. cap. 8. ubi ferendi modum recenset. Ruta fortè dicta à Græcῶν: Scribit enim Jolau in rebus Peloponesiacis, ῥόταν in Peloponessῶ ποταμῷ vocari.

Genera: Dioscoridi l. c. alia sativa & hortensis: alia montana & sylvestris: & hæc eidem duplex: sic ait, Ruta montana & sylvestris, sativæ & hortensis acrior est, & in cibis damnata: est autem in hortensi genere esui aptior, quæ juxta ficus provenit: sylvestris sativæ quodammodo similis est: & c. 33. Vocant etiamnum sylvestrem rutam, quod in Cappadocia & Galatia Asiatica, Moly dicitur. Frutex folijs longioribus flore candido, &c. Sunt qui rutam hanc Harmala vocent, Syri Besafa, Cappadoces Moly, &c. Theophrasto, Ruta caudice uno constat & arboris quasi naturam adipiscitur: & 2. hist. 1. ex palmitre exit & avulsione: & 7. hist. 4. plura sunt ejus genera: & 7. hist. 6. sylvestris aspectu vicina urbana est, præterquam folijs minoribus, &c. & 1. hist. 16. Rutula folia carnosâ habet, sed caro in latitudinem dissenditur, non in rotunditatem crassatur. Plin. l. 20. c. 13. Sativæ folia latiora, rami fruticosiores: sylvestris horrida ad effictum est & ad omnia acrior, &c. addit Pythagoram, in hac matrem, minoribus herbaceis, coloris folijs, à semina discrevisse: eam latioribus folijs & colore.

I. Ruta

I. Ruta hortensis latifolia.

Ruta, Brunf. Matth. Ang. Frac. Tur. Lac. Cæs. Castor.

Ruta domestica, Trag. hortensis, Fuch. Dod. gal. Ges. hor. Lob. Cam. Gerard.

Ruta sativa, Cord. in Dioscorid. Lugd. major, Gein. hort.

Ruta major & hortensis, Ad.

Ruta graveolens hortensis, Dod.

Ruta latifolia, Tab.

Hæc in hortis ita colitur, ut sæpè tres, etiam quatuor cubitos superet: hanc arbutulæ similem cultura evasisse in horto Sturgardiano observavimus.

II. Ruta hortensis altera.

Ruta hortensis minor, Trago.

Ruta sativa tenuifolia, Cord. in hist.

Ruta hortensis nobilitate præstans, Ges. hor.

Ruta tenuifolia, Tab.

Ruta sylvestris graveolens, Ger. ico.

Illa vulgarior est & per omnia major & cæsi coloris: hæc verò minor, præstantior & nigricantior.

III. Ruta sylvestris major.

Ruta sylv. Matth. Dod. gal. Ad. Lon. Lugd.

Ruta sylv. prima, Lac. Cast. graveolens, Dod.

Ruta sylvestris majribus folijs, Ges. hort.

Ruta montana, Tab. Ger. sylv. montana, Lob.

IV. Ruta sylvestris minor.

Ruta sylvestris minoribus folijs, Ges. hort.

Peganion Narbonensium sive Rutula, Ad.

Ruta sylvestris, Dalechampia in Dioscor. Lob.

Lugd. Cam. epit. qui priori adjungit.

Ruta sylvestris minima, Dod. Ger.

Ruta montana & sylvestris, Clus. hisp. & hist.

Ruta sylv. tenuifolia, Cam. sylv. minor, Tab.

Ruta montana legitima, Clus. ap. alt. lib. 2. figuram exhibet, priorem minus elegantem & spuriam dicens.

Huc referenda

Ruta sylv. Cretica, Clus. hist. quæ priore vegetior & magis luxurians, quia in culto loco nata, folijs valde leniter incisis, & gravis odoris.

V. Ruta sylvestris flore magno albo.

Ruta sylvestris, Ang. Cord. in Diosc. Ges. hort.

Ruta sylvestris Harmala, Matth. Clus. hist. Lugd.

Ruta sylvestris secunda, Cast. Camer.

Harmel, Ges. hor. Constantinopolitanum, Cæs.

Harmala, Dod. Clus. hisp. Tab. Cæs.

Harmala Syriaca, Ad. Lobel.

Huc referri debet

Ruta triangulo pericarpio, Ad.

THALICTRUM SIVE RUTA

Pratenfis.

Admiror folia Coriandri habet at pinguiora: cauliculus ruta crassitudine, in quo folia, Dioscoridi 1. 4. cap. 98. Sic dictum fortè a βαρυον vireo, eo quod dum germina protrudit eleganter vireat. Phellandrium Plinij aliqui suspicantur.

I. Thalictrum majus filiqua angulosa aut striata.

Thalictrum, Cord. in Dioscor. nigrum, Eid. hist. flor. Thal.

Piganum, Dod. gal. Lugd.

Ruta pratenfis, Gein. hort. herbariorum, Ad. Lobel.

Saxifraga lutea, Ges. hort.

Barba caprina minor, Ges. hort.

Thalictrum quorundam, Ges. hort.

Thalictrum secundum sive Germanicum latifolium, Cam.

Thaliectrum magnum, nonnullis Pseudothabarbarum, ob radicis luteum colorem, Dod.

Thalictrum pratenfis 1. vel 5. Clus. pan. & hist.

Ruta sylvestris, Cæs.

Florum muscosa stamina è pallido candicant, rarius purpurascunt: hinc

Thalictrum flore incarnato, &

Thalictrum flore albo, Eyst.

II. Thalictrum majus non striatum.

Thaliectrum magnum secundum, Dod.

Ruta pratenfis major secunda, Tab.

III. Thalictrum majus flavum staminibus

luteis, vel glauco folio.

an Pes Milvi, Anguil.

Thaliectrum majus tertium, Dod.

Thaliectrum primum vel Hispanicum, Clus.

pan. & hist.

Thalictrum primum Italicum, Cam.

Thaliectrum in Hetruria vulgo Verdemarcum,

Cæs. alp.

Ruta

Ruta pratensis major quarta, Tab.

Thaliætrum sive Thaliætrum majus, Ger.

IV. Thaliætrum majus florum staminibus purpurascens.

Thaliætrum majus quartum, Dod.

Thaliætrum quartum vel montanum tertium, Clus. pan. & hist.

Thaliætrum quintum flore purpureo, Cam.

Ruta pratensis major tertia, Tab.

Florum stamina dilutam violæ nigræ purpuram referunt.

V. Thaliætrum montanum album.

Thaliætrum 2. & 3. vel montanum 1. & 2. Clus. pan. & hist.

Thaliætrum sextum flore albo, Camer.

Duplex est, unum altius excrevit, flore candido admodum gravis odoris: alterum flore albo etiam, sed paulo humilior, minus ingrati odoris.

VI. Thaliætrum pratense angustifolium.

Thaliætrum pratense 2. vel 6. Clus. pan. & hist.

Thaliætrum tertium angustifolium, Cam.

Ruta pratensis major quinta, Tab.

VII. Thaliætrum pratense angustissimo folio: quod i. in Prodromo.

VIII. Thaliætrum minus.

Hypocum forte, Dod. gal. Lugd.

Ruta pratensis tenuifolia, Ad.

Thaliætrum tenuifolium, Cord. hist. Lob.

Thaliætrum minus, Dodon. Gerard. parvum, Camer.

Thaliætrum septimum, Clus. pan. & hist.

Ruta sylvestris altera, Cæs.

Ruta pratensis minor, Tab.

Stamina florum quandoque pallidi coloris sunt, quandoque ex luteo languescunt, & è violaceo purpurascunt.

IX. Thaliætrum minimum foetidissimum: quod 2. in Prodromo.

Simile, sed caule ex puniceo colore purpurascens Thaliætri maritimi nomine, D. Gillenius misit.



SECTIO TERTIA

DE LEGUMINIBUS CAPREOLIS

Donatis.

Legumina dicta putat Varro à legendo, quoniam ea non secantur, sed velleudo leguntur. Græci τάρρα vocant, at Theophrastus χείρονα.

FABA; SMILAX HORTENSIS, SIVE DOLICHUS, SIVE PHASEOLUS; PISUM; OCHRUS, SIVE ERVILIA; LATHYRUS sive Cicercula; Vicia & Aphaca; Arachus sive Cracca; Arachidna, & Lentesc.

F A B A.

Acturi de Leguminibus, primo de Faba sermo erit, quia inter legumina maximus honos faba: quippe ex qua tentatus etiam sit panis, cuius farina Lomentum appellatur, ut Plinius l. 18. c. 12. loquitur: ita hodie ejus farinam quidam Secale miscent, & panem conficiunt solidum ac multi nutrimenti: Sic & Phrisij etiam hodie magna ex parte fabarum farinâ, border farinæ aut avenæ admixta, panes faciunt.

Græci νίαν & à feracitate dicta: vel παρὰ τὸ νέον αὐτὰς, ut Eustachius vult: quemadmodum νύμφαν loci fabis confitus, seu fabetum apud Theophrastum 4. hist. 10. Fabulum Gellio & Festo.

Duplex Dioscoridi lib. 2. cap. 127. & 128. altera νίαν & ἰσχυρὴν, altera αἰγυπτίαν: illa Græca, quæ eadem cum vulgari videtur & ad differentiam Aegyptiacæ Græca dicta: hac Aegyptia nominata. At Theophrastus 7. hist. 3. de communi faba egit, quemadmodum de Græca 4. hist. 2. & de Aegyptia, 4. ejusdem 10. Plinius Faba communis descriptionem sparsim, lib. 18. cap. 7. exhibuit, eam seri, ait folia habere multiplicia rotunda, ut & magna leguminum pars, solam ex leguminibus unicalem esse (inter legumina sola potissimum erecto caule constat Theophr. 8. hist. 3.) quadraginta diebus florere & alterius lateribus siliquari: at lib. 18. cap. 12. nasci tamen & sua sponte plerumque, in locis sicut Septentrionalis Oceani Insulis, quas ob id Fabarias (idem Plin. 4. hist. 13.) appel-

V u

appellari: item in Mauritania passim sylvestrem esse: meminit & Aegyptia spinoso caule, folio amplo, capite papaveri simile, colore roseo, &c.

I. Faba, Brunf. Matth. Ang. Fuch. Tur. Cord. in Dioscor. Gesn. hort. Lac. Lon. Cast. Cam. fativa, Lugd.
Faba vulgaris, Trag. Fuch. Cord. hist.
Phaselus sativus, Dod. gal. qui secutus Ericium Cordum, Fabam esse negat.
Bona five Phaselus major, Dod.
Faba major vulgaris, Ad.
Faba major recentiorum, Lob. hortensis, Ger.

Variat flore & fructu: floris colore, qui vel ex purpura nigrescit: vel candidus, lituris nigris conspicuus, quas literas lugubres dicunt, ideo aliqui ijs non vescuntur: & harum efus a Pythagora prohibitus, vel quia animæ mortuorum in ea sint: vel quia existimant sensus habere & insomnia facere. Fructus magnitudinis, figura & colore differunt: sunt magnæ & inter legumina maximæ censentur, & quo majores eo magis in longitudinem depressæ: sunt minores quæ rotundiores: in qualibet filiqua ut plurimum ternæ, ad summum quina. Colore plurimum candidæ, vel in candido pallentes, ex rubicundo colore purpurascens, nigræ aut in nigro purpurascens: & has Fabas nigras vocat, majores & minores facit, Cord. hist.

Fabæ duorum aut trium generum in Insula Madagascar reperiuntur: part. 4. Ind. Orient. cap. 1. Sic in Guinea varij generis, in primis aliquæ delicatulae & molles: part. 6. Ind. Orient. cap. 12. varia quoque genera in Anabonæ: part. 8. Ind. Orient.

II. Faba minor five equina.
Bona five Phaselus minor, Dod.
Faba minor, Ad. Lugd.

Fructus est teretis quodammodo figuræ, ac in rotunditate oblongus, colore subalbicans aut subflavus, alias nigro, umbilicum supernè parvum ac nigrum habens: medium quoddam genus inter majorem ac sylvestrem fabam: majoribus enim, minor & rotundior, sylvestribus verò major ac longior. Ex hac apud zelandos & finitimos panes fabaceos veterinis dant, & hæc in equorum (hinc Bonam equinam vocant) jumentorumq; pabulum seritur, Dodon. At Sebastiani rustici non alio pane vescuntur, quam confecto ex paululo tritici, secale & rotunda minuta; faba, Lugdun.

III. Faba sylvestris fructu rotundo atro.
Faba sylvestris, Matth. Ad. Castor. Lugd. Taber. Camer.
Phaselus sylv. & niger, Dod. gal. (quæ forte Faba est) Gesn. hort. (cui Phaselus forte veterum,) Lugdun.
Bona sylvestris, Dod.
Faba Græcorum sylvestris, Lob.
Pisa nigra, Camer.

Aracus, Fuch. s. j. vulgo Vitia Romana, Cam. Cucophicos Cretensium nomine semen ex Creta, ab Honorio Belli accepimus, quod ex decido semine facile regerminat.

IV. Faba Indica purgatrix.
Faba purgatrix, Monardi, Frag. Lugd. quoad descriptionem.

Phaselus Peruanus, Petri de Osma ad Monard. Fructus peregrinus undecimus, five Phaeolus colore Macounæ similis, Clus. exot. l. 2. c. 30.

V. Faba purgatrix latissima, ex Insula D. Thomæ.

Phaeolus major, Clus. ad Monard.

Cor Divi Thomæ, a forma & quod in Insula D.

Thomæ nascatur, Eid.

Lobus crassus ex Insula S. Thom. Clus. ex. l. 3. c. 8.

Phaeolus novi orbis, Lob.

Phaeolus Americanus purgans, Tab. Ger.

Faba purgatrix, Lugd. ico.

VI. Faba Indica prælonga.

Fructus 11. peregrinus, vel Phaeolus ex spadicæo nigricans, Clus. exot. l. 2. c. 30.

Fructus peregrinus 11. tab. 3. Lugd. Tab. Ger.

VII. Faba arborecens: hujus differentias 6. in Prodomo proposuimus, quas Fabæ arborecens Anglicæ nomine Amstelrodami à D. Jacobo Guilhelmi Hooft accepimus.

1. Faba arborecens rufa, sinu ad basin semicirculari uncias quatuor longa, tres lata.

2. Faba arborecens media, umbilico semicirculari, cortice nigro striato.

3. Faba arborecens minor umbilico oblongo, cortice nigro.

an Faba arborecens Tilemanni, Clus. exot. lib. 3. cap. 6.

4. Faba arborecens umbilico oblongo spadicæo cortice.

an Phaeolus peregrinus primus, Clus. exot. lib. 3.

lib. 3. cap. 7. qui & secundum priore minorem an Phaseolus peregrinus quintus, Clus. exhibet.

5. Faba arborefcens scapulæ os referens, spadiceo cortice.

6. Faba arborefcens unguis magnitudine nigro cortice.

VIII. Fabæ Brasiliænæ.
Fabæ genus pollicis crassitudine à Barbaris Commanda-ouafou appellata: Lerio descript. Brasil. c. 12. Habent & alias fabas crassas & minutas: par. 3. Amer. ep. alt. de Brasil.

SMILAX HORTENSIS SIVE DOLICHUS, five Phasiolus.

Smilax nuda folijs est hederæ sed mollioribus, canticulis claviculæ instar propinquis fruticibus sese implicans, ut operi topiario inferviat, cujus fructus æbiæ (quasi siliquulas dicas) semina continet renibus similia, non aquali colore, sed ex parte rufescentia, &c. Dioscoridi lib. 2. cap. 176. Hæc ab Hippocrate, Diole, Theoph. & plerisque alijs ἀνὰ ρόδον vocatur: à nonnullis à siliquarum magnitudine ῥόβος & ῥόβιον: ab alijs πασιον & (à πασιον ut aliqui volunt differens) Galeno 1. aliment. scribente. Dolichus Theoph. 8. hist. 3. Et Aëtius Smilacem hortensem Dolichos esse & Phaseoli genus, & ab omnibus Lobos nominari, apertè docet. & apud Dioscoridem lib. 2. cap. 130. sed sine ullis notis habetur. Sunt tamen qui Smilacem hortensem à Phasiolis, solum siliquis & semine differre censeant, quæ in Smilace majora sunt, ut Matthiolus voluit, qui pro Phasiolo & pro Smilace hortensi eandem pingere videtur, nisi quod pictura una recta, altera inflexa est: At Anguillara, phasiolum & phaselum non distinguit: auctor hist. Lugd. asserit Galeno vocem Phasiolum quatuor syllabis prolatam, à Phaselo tribus syllabis pronunciato, diversam esse, & de hoc cum Ervilijs simul tractasse. Plinius lib. 18. cap. 7. Phaseolis folia venosa tribuit.

Duplicem facimus, vulgarem alium, alium peregrinum: vulgarem, alium majorem, fructu longiore & renis formam melius referente, qui communiter candidus: alium minorem siliqua angustiore: distant etiam crassitie & tenuitate. Hic variat floris & seminis colore: flores plerunque candidi, pallidi, flavescentes, purpurascens five amethystini. & ut Cordus in sua historia censuit, floris colorem fructus sequuntur. Verum in semine fructive major est coloris varietas, sunt nivei, flavi, ex flavo obsoleti, purpurei, rubri, latericei fere coloris, amethystini, violacei, atroviolacci, nigri, initio purpurei deinde atrii: vel albi nigris venis & lituris distincti: Item carnei & cinerei similibus venis insignes: Item albi purpurascens, orbibus albis variegati, vel spadicei nigri maculis aspersi: nonnulli incani, atro colore, vel ab una parte, vel utrinque notati.

Smilax hortensis five Phaseolus
vulgaris.

I. Smilax hortensis five Phasiolus major.

Phaselus, Brunf.

Phaseolus, Dod. gal. Camer. vulgaris (vel Faba Turcica multicolor) Adv. Lob. Clus. pan. & hist. albus, Ger.

Smilax hortensis, Brunf. quoad descript. Trag. (cui & Siliqua Theoph.) Matth. (& Phaseolus hortensis) Fuch. Tur. Lac. Cord. in Diosc. Gesn.

hort. Lugd. Tab. (qui, ut & Gerardus, fructus duodecim generum pingit) Cam.

Smilax sativa five lenis, vel Dolichus, Cord. histor.

Dolichos Theophrasti, Ang.

Dolichus (five Phaseolus) Dod. Lon.

Phaseoli genus peregrinum, quos Phaseolos Turcicos vocant, Cæf.

II. Smilax hortensis minor.

Dolichus alter, an Phaseolus minor five Alexandrinus Tralliani, Dod.

an Phaseolus, Tur.

Sola magnitudine à priori differt.

III. Smilax siliqua sursum rigente: vel

Phaseolus parvus Italicus.

Phaseolus, Matth. albus, Lugd.

Phaseolus, Phaselus, Ang. Cord. in Dioscorid. & histor.

Phasilus, Cæf.

Flore est majore candido papilioni simili, foris in viridi colore pallescente: folijs nullam asperitatem habentibus: sunt majores & minores: sunt albi, subnigri, illi macula nigra, hi alba notati: est & minor albidus, cum orbita rubente aut nigricante.

Phaseolus peregrinus.

Non minor sanè varietas est in Phasiolis ex America, Africa atque alijs regionibus, procul

Vu 2

cul

cul ab orbe nostro remotis, quàm in his quæ in Europa nascuntur: Sunt enim majores, minores, mira colorum varietate inter se discreti. Illorum nonnulli, aut prorsus candidi, aut flavi, aut cinericei, aut fuscii, aut atrii, aut rubri, aut amethystini, aut varijs coloribus non uno modo distincti: interdum albo & nigro, rubro & nigro, flavo & nigro: sic alius ex flavo & spadiceo simul mixti coloris, at circa hilum candidus: alius roseus, in quo rubri nonnihil elucet, &c.

I. Phaseolus peregrinus hortensi affinis, semine lato albo, multis nigris venis striato. Phaseolus 1. sive Africanus, Clus. pan. Phaseoli peregrini primi genus alterum, Clus. hist.

Phaseoli magni lati albi, Lob. ico.

Phaseolus Africanus, Cam.

an Okindiger in Virginea, fabis Anglicanis similes, planiores tamen & diversorum colorum, nitidæ & maculosæ: in desc. Virgin.

Okindiger in Virginea, par. 1. Ind. Occid.

Ex Africa primum allatus.

Variat: ex nigro varius, prorsus niger, coloris regularum, strijs per longitudinem nigris.

II. Phaseolus peregrinus primo similis, fructu lato, albo striato.

Phaseolus peregrinus 9. Clus. hist.

III. Phaseolus peregrinus hortensi affinis, fructu tumidiore minore niveo.

Phaseolus peregrinus 2. sive Phaseolus de Guatimela, Clus. pan. (at icon habetur sub Phaseolo Purkircheriano 2.) & hist.

an Phaseoli parvi pallido albi ex America delati, Lob. ico.

IV. Phaseolus peregrinus Anagyridis fructui similis, ex nigro subvirescens.

Phaseolus Ægyptiacus 5. Clus. pan. desc. at figura habetur sub 3.

Phaseolus peregrinus 5. Clus. hist.

Phaseolus Ægyptiacus, Tab. Ger. desc.

an Dolichus, Bellonio.

V. Phaseolus peregrinus Anagyridis fructui similis colore rubescens.

Phaseolus peregrinus 3. qui cum sequenti Lobi Indici nomine ex Hispania missus, Clus. pan. quoad descriptionem: & hist.

VI. Phaseolus peregrinus minore fructu, albo nigra macula insignito.

Phaseolus peregrinus 4. Alubias de Indias, Clus. pan. quoad descriptionem: & hist.

Phaseolus albus, Lugd.

Phaseoli pumiliones, albi & nigri, Cam.

Variat colore: est alius niveus nigra macula notatus: alius in lateribus nigris maculis signatus.

VII. Phaseolus peregrinus angustifolius: an idem cum Smilace hortensi minore.

Phaseolus peregrinus, Dod. sextus, Clus. hist.

Fructu est vulgari minore & planiore, coloris subrubri: ex Hispania Frizoles Guatelinomine missus.

VIII. Phaseolus peregrinus angustifolius alter, fructu ex albo & nigro vario.

Phaseolus peregrinus septimus, Clus. hist.

Variat: nam in fructu striæ, nunc in longitudinem extenduntur: nunc maculæ nigræ majores vel minores, confuso ordine, aspersæ: vel exiguæ albæ maculæ in lobo, vel solum in parte media conspiciuntur.

IX. Phaseolus peregrinus folijs minoribus, fructu exalbido, nonnunquam variegato.

Phaseolus peregrinus octavus, Clus. hist.

Fructus, colore est ex albido: aliquando nigricantibus virgulis secundum longitudinem, vel confusè notatur: interdum totus penè nigricat.

X. Phaseolus peregrinus lobo & fructu nigro.

Phaseolus peregrinus 10. Clus. hist.

XI. Phaseolus peregrinus fructu variegato.

Phaseolus peregrinus 11. Clus. hist.

Fructus planus dilutè rubens, nigris venis per longitudinem excurrentibus: aliquando maculæ magnæ vel exiguæ confusè asperguntur: interdum altera solum parte nigricat, parvis rubris maculis variegatus.

XII. Phaseolus peregrinus fructu subrubente nigris strijs variegato alter.

Phaseolus peregrinus 12. Clus. hist.

Aliquando plurimæ striæ totum ferè atrum reddunt.

XIII. Phaseolus peregrinus exalbidus cui columbini ferè figura, fuliginosa macula insignitus.

Phaseolus tertius peregrinus, Clus. exot. l. 3. c. 7.

XIV. Phaseolus peregrinus niger macula subalba notatus.

Phaseolus quartus peregrinus, Clus. exot. l. c.

Phaseolus Æthiopicus vel niger.

I. Phaseolus Æthiopicus lobis nigris venis aspersis, fructu atro splendente.

Phaseo-

Phaeol. peregrinus 13. vel Æthiopicus, Cl. hist.

II. Phaeolus Æthiopicus lobis flavescen-
tibus fructu nigro.

Phaeolus peregrinus 14. Cl. hist.

III. Phaeolus Æthiopicus lobo saturo pur-
pureo, fructu atro.

Phaeolus peregrinus 15. Cl. hist.

Phaeolus Guinensis.

I. Phaeolus Guinensis fructu fusco spadiceo.

Phaeolus peregrinus 16. Cl. hist.

Sunt majores, sunt & minores.

II. Phaeolus Guinensis lobo cortice nigro
tecto & in cuspidem longam & acuminatam
desinente.

Phaeolus peregrinus Nigritarum, Cl. exot.
lib. 2. cap. 11.

III. Phaeolus Guinensis lobo ex fusco ci-
neraceo fructu nigro.

Phaeolus Nigritarum 2. Cl. lib. cit.

IV. Phaeolus Guinensis lobo ex fusco cine-
raceo, fructu spadiceo superiore majore.

Phaeolus Nigritarum 3. Cl. exot. lib. cit.

V. Phaeol. Guinensis filiqua unq̄ lōgitudine.

Fabæ magnę in filiquis, quarum alię ex arbo-
ribus pendent ad ulnā unius longitudinem &

palmi latitudinē, partim versicolores ex rubro
& nigro, quales Turcicæ vocatæ, sed majores:

partim albæ & rotundæ, quarum singulæ suis
filiquis insunt, veluti Ciceres: par. 2. Ind. or. c. 4.

Phaeolus Aegyptiacus sive Lablab.

I. Phaeolus Aegyptiacus nigro semine.

Phaeoli genus Leplap sive Lablab, Cl. pan.

Phaeolus peregrinus Leplab, Cl. hist.

Phaeolus niger Lablab vocatus, Alpin.

Est & niger & spadiceus, hilo albo.

II. Phaeolus Aegyptiacus semine rufo.

Lablab alterum rufum Alpini, Cl. hist.

Phaeolus Indicus.

I. Phaeolus Indicus major bicolor.

Phaeolus peregrinus Indicus, Cl. pan. & hist.

Phaeolus s. sive Aegyptiacus, Cl. pan. ico.

Phaeolus Aegyptiacus, Tab. Ger. ico.

Fructus est nuce pontica paulo minor, parte
superiore niger, inferiore aureus.

II. Phaeolus Indicus minor: est rubens,
variegatus, fuscus, maculatus.

III. Phaeolus Indicus minor alter.

Mates, Cl. in Garz. & pan.

Phaeolus Indicus alter, Mates, Cl. hist.

Fructus peregrinus 10. Cl. exot. lib. 2. cap. 30.

Fructu est purpureo, aut albis purpureisque
maculis distincto.

IV. Phaeolus Indicus ruber.

Phaeoli rubri Indiani durissimi, Lob. ico.

Est ruber, ex phæniceo croceus, ex rubro spa-
diceus splendens.

V. Phaeolus Peruvianus ruber subrotundus.

Phaeoli peregrini variorum generum, Cl. exot. lib. 2. cap. 13.

Hujus differentię aliquot: alius major, colo-
ris ex atro rubentis, qua parte lobo adhæserat
longiore vestigio nigro præditus: alter minor,
satis crassius, coloris rubri corallij æmuli: vel
alter forma similis, coloris magis saturo & ad
puniceum quodammodo vergente: tertius ele-
gantissimus magis orbicularis, qui major &
minor, color in utroque bifariam divisus, me-
dia ex parte corallij instar rubet, altera ater, læ-
vis & splendens est: & hic Anacok dicitur.

VI Phaeol. pereg. ex rubro & nigro distinctus.
Anacok, Cl. exot. lib. 2. cap. 11. & lib. 3. cap. 13.

VII. Phaeolus peregrinus bifidus duplex:
alter orbicularis cineracei coloris, tenui atra
membrana: alter durus nigricans, tenui mem-
brana alba tectus.

Phaeoli alij peregrini, Cl. exot. l. 3. c. 14. qui &
tertium addit, lævem, spadiceum, durum & so-
lidum, Capotillo del Aldana nomine missum.

VIII. Phaeolus Indicus ovatus: hic varius est
colore: est niger, spadiceus umbilico albo eoq;
majore vel brevior: sanguineus, hilo nigro.

IX. Phaeolus orbicularis niger Americanus.
Parapar, Cl. exot. lib. 2. cap. 21.

Phaeolus Americanus, vel Brasilianus.

I. Phaeolus Brasilianus folijs molli lanu-
gine obsitis, fructu magno.

Phaeolus Brasilianus Macouna dictus, Cl. ad Monard.

Phaeol. Brasilian. Lob. Cam. Ger. tertius, Tab.

Phaeolo Nigritarum similis ex Pernambuco
Americæ, spadiceæ coloris Macouna appella-
tione insignitus, Cl. exot. lib. 2. cap. 6.

Et hic variat colore fructus: alius rufescit,
alius dilutioris coloris, alius totus niger, alius
punctatus.

Similes ex cinereo candicantes ex Africæ Mau-
ritania adferuntur: quo solo à Brasiliano diffe-
runt, Cl. Lugd. (magnitudine.

II. Phaeolus Brasilian. alter fructu nigro pifi
Phaeol. Brasilian. alter, Cl. ad Monard. Lob. Tab.

Phaeolus alter Indicus, Lugd.

III. Phaeolus Brasilianus vulgari similis, sed major & latior.

Phaeoli genus è Brasilia, novi orbis provincia, Clus. ad Monardem.

Hic modo flavus, modo omnino niveus, modo dilutior colore, modo ater, aut purpureus, aut albis purpureisque maculis distinctus.

IV. Phaeolus Brasilianus spadicei coloris & circa hilum fulci candicantis.

Phaeolus Brasilianus, Clus. exor. l. 3. c. 12.

V. Phaeolus Brasilianus minor.

Phaeoli parvi ex America, Lob. Lugd.

Phaeolus Brasilianus primus, Tab.

Hujus magna varietas, quare fructus duodecim genera, Tab. & Gerardus pingunt.

VI. Siliquulam angustam, vix uncialem, cui grana aliquot exigua, subviridia, cum hilo albo in medio, ut in Phaeolis, ex India cum quibusdam alijs, Reverendus D. Terentius cum sequenti inscriptione misit: Siliquula, ut & semen huic chartulæ involuta, est herbæ Anil, nec est species Glasti, sed legumen.

P I S U M.

Pisum, Græcis ὀπλός & τὸ πύρον vocatur, quod ἀπὸ πύρου derivatum videtur, quod decorricare significat: plerique etiam πύρον dici putant, sed improprie: nam ex farina leguminum pulmentarium, πύρον dici à Græcis, Galenus in lib. de cibis boni & mali succi testatur. Pisum vero, à Pifa, loco in quo olim copiosissime nascebatur, nominatum dicunt. Hujus Dioscorides non meminit, nisi forte cum Phaeolis comprehenderit: at Hippocrates, Theophrastus, Galenus, Aegineta. Nam Theophr. 8. hist. 3. leguminum alia solium habent rotundum, ut Faba: alia oblongius ut Pisum, & hoc caulem humi procumbentem habet: & 8. hist. 5. semina siliquis inclusa, non intersepta, sed quasi invicem contingentia, consistunt: & 3. caus. 27. vermes in ipso generantur, ob alimenti caligine, intemperiem, cum plus minusve alimenti prabetur, aut aer immodice humidus siccusve est, vel etiam cum non tempestive humescit. Plinius lib. 18. cap. 7. & 12. Pisi obiter meminit.

Genera duo sunt: est majus & minus: majoris semina resicata angulosa sunt, inaequales angulos habentia, colore alias candido, alias sordido: Minus similiter duplex, aliud quod in hortis feritur, quod si pedamentis sustentetur, majus est, alias exiguum fructum eumque serius reddit: & illud est quod in agris feritur: flores habet ut plurimum candidos, aliquando tamen ex purpura obscuros fructus colore ut plurimum luteo (unde & Græcis, à luteo ochra colore, quem ipsius fructus medulla interior refert, dicitur) subinde virenti.

I. Pisum majus quadratum.

Phaeoli primum genus, Trago.

Pisum prima species, Dod. gal.

Pisum majus, Dod. Gerard.

Pisum angulosum hortorum quadratum Plinij, Ad.

Pisum quadratum Plinij, Lob. ico. Tab.

Pisa Italica grandia, Cam.

Pisum magnum peregrinum, Eysf.

Fructus dum virent, rotundi sunt: exsiccati angulosi & cinerei fiunt: imò & candida & subflava, Lugd.

II. Pisum umbellatum: & Ger.

Pisum primum genus, Trag.

Pisum proliferum, Tab.

III. Pisum hortenfe majus.

Cicer arietinum & Pisum alterum genus, Trag. Dod. gal.

Pisum majus, Matth. Fuch. Ang. Lon. Cast.

Pisum minus, Dod.

Pisum vulgarius majus, Ad. Lob. ico.

Pisum ramulare, Lugd.

Piseolus vulgo, qui & Piseoli viridis meminit, Cæf.

Flore est purpureo, aliquando albo & vario, partim albo & partim ex purpura obscuro, Fructu est rotundo albo: est & rufo, aliquando rubro variegato.

Pisa quoque alba in Brasilia habentur, quæ Commanda. miri nuncupant: Ler. descript. Brasil. cap. 12.

IV. Pisa Virginiana.

Wikonzóvr, nos Pisa appellamus, sapore & bonitate Anglicana superant: desc. Virgin.

V. Pisa Virginiana sylvestria.

Pisa syl. Anglicanis minora, eui apta: desc. Virg.

VI. Pisum arvense.

Pisum, Brunf. Dod. gal. Tur.

Pisum agreste, seu 3. genus, Trago.

Pisum 3. species & minor quæ & Ervilia, Dod. gal.

Pisum minus, Matth. Lon. Dod. Cast.

Pisum minus ex luteo virens, Ad. Lob.

Pisum in arvis humi serpens, Lugd.

Ervilia sive Ochrus, Eid.

Pisa vulgaris, Cam.

Pisum minus 1. & 2. Tab.

Flore

Flore est candido, vel diluti rosei coloris: fructu rotundo, albo, viridi, ex luteo virente, cinereo, caeruleo: nigra habet Gesnerus, quæ sapore, odore à communibus nil differunt, quæ

Pisa nigra Tabern. nominat.

VII. Pisa sine cortice duriore.

Pisa leptolaba, quæ simul cum folliculis comeduntur, Camer.

VIII. Pisum exoticum ochræ colore.

Pisum ochræ colore, Clus. exor. l. 3. c. 15.

IX. Pisum sylvestre perenne.

Pisum sylvestre, Adv. Cl. pan. & hist. Thal. Tab.

(qui majus & minus pingit,) Ger.

Pisum sylvestre Pannonicum, Cam.

Phaseolus sylvestris, Lugd.

X. Pisum vesicarium fructu nigro, alba macula notato.

Vesicaria nigra sive peregrina, Trag. Dod. gal.

Vesicaria sive Halicacabum repens, Matth.

Halicacabum peregrinum, Fuch. Dod. Gef. hor.

Lugd. qui & Fuchij & Matthioli figuram exhibet, Tab. (& Cardipermon) Cam. Ger.

Doryenium & granum cordis, Cord. in Diosc.

& histor.

Solanum peregrinum, Lac.

Caput monachi, Gef. hor. & collect.

Pisum cordatum, Ad. & corindum, Lob. Eyf.

Faba inversa recentiorum, Cæs.

Vesicaria altera, Cast.

Pisum Indicum.

I. Pisum Indicum majus.

Variat fructus colore nigro, subfusco, variegato, umbilico eminente.

II. Pisum Indicum minus coccineum.

Pisa rubra ex novo orbe, Gef. hor.

Pisum coccineum Americum, Lob.

Pisum Americanum, Lugd.

Phaseolus ruber Abrus vocatus, Alpin.

Phaseolus ex seme, Hon. Belli epist. 5. ad Clus.

Phaseolus Indicus, vulgò falsò Pæonia Indica:

nomine Ginge & Abrus mittitur, Cam.

an Sandali rubri semina, Cæs.

Vicia Africana, Clus. exor. l. 4. c. 15.

Fabarum genus quod Ægyptijs Abrus, part. 2.

Ind. Or. cap. 4.

Et hic major coccineus compressus: & minor

coccineus nigra macula notatus, reperitur.

III. Pisum virulentum Chinenle.

Fabarum genus quod Abrus Latinis, Conduri

Malays, Saga Javanis, quibus pro solis ponderibus utuntur, Linscot. par. 4. Ind. Or. cap. 8. &

par. 3. cap. 29.

Sic Fabis rubris & nigris pro ponderibus in

Guinea utuntur: par. 2. Ind. Or. c. 18.

OCCHRUS SIVE ERVILIA.

Quia Theophrasto 4. caus. plant. 2. s. 28. à luteo Ochra colore quem medulla referat nominatur, & Gaza Cicera reddit, Plinio l. 18. c. 7. & alijs Latinis Ervilia dicitur.

Duplex est, Sativa, quæ Pisum est minus, & Sylvestris, de qua nunc.

Ochrus folio integro capreolos emittente.

Aracus, Matth. (cui & Aracus niger) Cast. (ad-

dica Aphace figura) Cam.

Ervilia, Ang. sylvestris, Dod. ut:

Ochrus syl. sive Ervilia, Ad. Lob.

Cicer ervinum quorundam, Lugd.

Isopyron, Cæs. alp.

Papules Creticæ nomine, semen ab Honorio

Belli missum: facile germinat. Semina colore

sunt subluteo, alij pullo, etiam atro observantur.

LATHYRUS SIVE CICERCULA.

Legumen quod Graci Λάβρον appellant, à Columella & Palladio Cicercula dicitur, de quo Theophr. 8. hist.

Plat. arch. in probl. Rom. scribit Pythagoricos averfatos esse fabas, & τὸν λάβρον, & τὸν ἐγερνόν, & τὸν περὶ τὸν

πυθῶνα ἐγερνόν, & τὸν ἀδύον, ad erymon alludens. Verum λάβρος herba ab hac diversa est, de qua inter Tit. bimalos.

Duplex est: nam vel seritur vel sponte provenit: Et in sylvestri differentia magna est, in foliorum lati-

tudine & angustia: florum colore rubro, purpurascete, albo, flavescente: siliquarum longitudine, brevitate,

hirsutie, & levitate.

I. Lathyrus sativus flore fructuq; albo.

Pisum Græcorum sativum, Trago.

Ervum album Sativum, Fuch.

Lathyrus, Cicercula, Dod. gal.

Phaseolus minor, aliquibus Ervum angulo-

sum, Cord. in Diosc.

Ervum, Lacun.

Cicercula, Ang. Lon. Cæs. Castor.

Aracus

Aracus alter sive Lathyrus minor, Dod.
Lathyrus angustiore gramineo folio, Ad. Lob.
Lathyrus leguminosa angustifolia, Tab.
Lathyrus sativus angustifolius, Lugd.
Lathyrus alter flore albo, Camer.

II. Lathyrus sativus flore purpureo.
Aracus sive Cicera, Dodon.
Lathyrus flore purpureo, Cam.

Flores habet ex rubra purpura in puniceum
inclinantes: grana angulosa, alia obsoleta, ni-
groque proxima.

III. Lathyrus sylvestris major.

Pisum Græcorum sylv. Trag.

Ervum sylvestre, Fuch.

Cicercula, Turner.

Lathyrus sylvestris, Dod. ut: Clus. hist. Lug. ico.

Mochi in Hetruria, Cæs.

Lathyrus sylvestris, Eyf.

Variat flore albo: nonnihil ex luteo pal-
lescente: est & rubente.

IV. Lathyrus major sylvestris alter.

V. Lathyrus sylvestris minor.

Catanance, Dod. gal. Gef. hort. Lugd.

Ervum sylvestre, Dod. herbariorum, Ad. Lob.

VI. Lathyrus latifolius.

Clymenum, Matth. Cast. descr. Clus. pan.

Ervum sativum, Cord.

Lathyrus sylvestris latifolius, Cam.

Lathyrus Narbonensis latiore folio, Ad. Lobel.

Eyftett.

Lathyrus sylv. major, sive purpureus, Thal.

Ervilium, Cæs.

Cicercula sylvestris, Taber.

VII. Lathyrus angustifolius filiqua hirsuta.

Flore est cæruleo penè violaceo.

VIII. Lathyrus angustifol. semine maculoso.
Aracus Hispanicus sive Lathyrus Ægyptiacus,
Camer.

Cicercula Ægyptiaca, Clus. hist.

an Aracus, Ad. Lob. & Cicera, Lugd.

IX. Lathyrus angustissimo folio Am-
ricanus variegatus.

Orobi Americani nomine in horto meo crevit.

Lathyrus peregrinus è cæruleo purpurascen-
te flore: & suaviter rubescens, Eyf.

X. Lathyrus angustifolius humilior.

Ervum Monspeliensium.

XI. Lathyrus sylvestris major angustissimo
folio: in Prodomo descriptus.

XII. Lathyrus peregrinus folijs Viciæ: flo-
re subcæruleo, pallidè purpurascen-
te: in horto meo crevit.

XIII. Lathyrus sylvest. luteus folijs Viciæ.

an Aracus flore luteo, Adver.

Legumen terræ glandibus simile, Dod.

Glandibus terrestribus congener flore luteo,
Clus. pan.

Eathyrus sylvestris floribus luteis, Thal.

Vicia, Taber.

XIV. Lathyrus arvensis repens tuberosus.

Apios, Trag. Fuch. Lugd.

Pseudoapios, Matthiol.

Chamæbalanus, Dod. gal. Taber.

Ornithogalum purpureum, Cord. in Diosc.

Astragalus, Tur. Penæ, Lugd.

Panis porcinus, Lonic.

Astragalus arvensis, Thal.

Terræ glandes, Dod. Ad. Lob. Gerard.

Glandes terrestres, Clus. pan. & hist.

Arachidna, Theophrasti, Colum.

VICIA ET APHACA.

Galenus 2. aliment. scribit ab Asianis huius dici legamen, eoq, solo nomine id vocari: Atticis vero οἰ-
νοῦν αὐτὸν ὀνόμαζον. Latins Vicia nominatur à vinciendo, ut Varroni placet, quod item capreolas habeat ut
vitis, quibus sursum versus serpit ad scapum Lupini, aliūve calamum, ad quem ut adhereat, eum vincere so-
let. Et hæc duplex est. Sativa & sylvestris.

Aphacam legumen Dioscorides l. 2. c. 178. ἀφάκην nominat, quæ in arvis nascatur, lente altior, filiquis len-
tium majoribus; in quibus semina terna, quaternave, nigra lente minora. Theophrasto Aphaca duplex, altera
olus est, de qua inter Intubacea: altera legumen, quod cum Lente & Piso in leguminum genere 8. hist. 5. possit,
& Plinius l. 27. c. 5. Theophrastum secutus est: Galenus cum Vicia conjunxit.

I. Vicia sativa vulgaris semine nigro.

Ervum, Brunfels.

Orobis sativus & Vicia major & l. Trag.

Vicia, Anguil. Lonic.

Vicia, Græcorum Aphace, Cord. in Diosc.

Semina alia nigricant, alia cinereum colorem
obtinent.

II. Vicia sativa alba.

Ervum candidum, vel Faba veterum, Trago.

Vicia alba, Anguil.

Vulgari

Vulgari pīso minus compressum & coloris pallidi.

III. Vicia maxima dumetorum.

Vicia sylvestris altera, vel 5. Aphace Dioscorid.

Osmunda Latinorum, Trag.

Cracca major, Taber.

IV. Vicia sepium folio rotundiore acuto.

Orobis sylvestr. five Vicia major syl. & 2. Trag.

Aphaca, Matth. Ang. Gef. hort. Cast.

Aphace, Fuchf.

Vicia, Dod. ut: Ad. Lob. Clus. hist. Cæf.

Vicia sylvestris, Lonic.

Semen nigrum aut maculatum, crassitie, rotunditate & amaritudine differt.

V. Vicia vulgaris acutior folio, semine parvo nigro.

Vicia, Matthioli, Lac. Cast.

Aphaca vera, Lugd.

VI. Vicia multiflora.

Galega altera, vel sylvestris, aut German. Dod.

Galega sylvestris Dodonæi, Thal.

Aracus, Tabet.

VII. Vicia Onobrychidis flore in Prodro-mo descripta.

VIII. Vicia sylvestris spicata.

Vicia sylvestris spicato flore, Clus. pan.

Vicia sylvestris secunda, Clus. hist.

IX. Vicia sylvestris hirsuta incana.

Vicia sylvestris flore albo, Clus. pan. & hist.

X. Vicia sylvestris lutea siliqua hirsuta non-dum descripta Monspelij collecta, & Norim-berga à Doct. Doldio Ciceris aut Pisi nomine missa.

XI. Vicia lutea folijs convolvuli minoris.

Aphace Dioscoridis, Gal. Plinij, non Theophr.

Dod. ut:

Pitine Theophrasti, Ang. Cam.

Aphaca, Ad. Lob. Cæf. Camer.

Orobanche leguminum, Lugd.

Elatine tertia, Taber.

ARACHUS SIVE CRACCA.

Frumentorum vitium quoque, est, quod Græci Ἀράχης Theophr. 8. hist. 10. (rem scabram & duram dicit, qua in lente nascatur) nominant. Ruellius Craccam appellari refert. Differt ab Aphaca & Vicia potissimum se-mine: nam Cracca semina exquisitè rotunda, nigra: & ut Galenus inquit, 1. alim. facult. c. xxvj. Ervo mi-nora. Aphaces verò & Vicia semina, non rotunda, sed aliquanto latiora, veluti Lentium, teste Gaïeno 1. alim. facult. c. xxxvj.

I. Vicia semine rotundo nigro.

Vicia minor vel 3. Trag.

Arachus, Dod. gal. Gef. hort.

Craccæ primum genus, Dodon.

Aracus, Araca & Cracca major, Ad. Lob.

Arachi primum genus Dodonæi, Thal.

Flores parvi & purpurei.

II. Vicia segetum cum siliquis plurimis

hirsutis.

Vicia minima vel quarta, Trago.

Arachus altera, Dod. gal. Thal.

Aracus sive Cracca minima, Ad. Lob.

Craccæ alterum genus, Arachis potius, quam

Arachus, Dodon.

Arachus, Lugdun.

Cracca minor, Taber.

Flosculi in parvis spicis candiduli, semina incana ac subalbida.

III. Vicia segetum singularibus siliquis glabris.

Flosculi parvi candiduli, singuli singulis pe-dicillis insidentes.

IV. Viciola flore luteo semine nigro.

Aracus, Cæsalp.

ARACHYDNA.

Quædam scribit Theophrastus 1. hist. 11. ex radicibus plures differentias præter prædictas sortiuntur (οἷον τὴν ἀραχιδνῆν καὶ τὴν ἀραχιδνῆν) h. e. cen Arachidna radix, ejusq; quod simile est Araco: amba namq; fructum non minorem superno asserunt, & c. neutrum aut solium, aut folio simile quicquam gignit, utrumq; po-tius velut ἀραχιδνῆν est, h. e. infra suprag; terram fructum edit. Plinio 1. 21. c. 15. Aracidna & Arachos (potius Arachoides) & c. Vox hæc Ἀραχιδνῆν composita videtur: ἀράχης enim Cicercula species est, quam hæc folijs & fructu refert; ἄραχον verò tuber significat, cujusmodi similitudinem quandam radices habent.

I. Viciæ similis supra infraque terram fru-ctum edens.

Arachidna Cretica, Belli: quo nomine totam

plantam transmisit.

Arachidna Cretica an potius Aracoydes Theo-phrasti, Ponæ.

Xx

Araco

Araco? *junior* Theophrasti an? Clus. ex. l. 4. c. 16.

Variat semen in filiquis ad radicem, in alijs nigerrimum, in alijs Orobo simile, in alijs variegatum.

II. Junfa, planta quæ in Angra instar frumenti feritur, ad cujus radices grana rotunda pisi magnitudine, pistaciorum sapore: Linsc. part. 8. Ind. Orient. c. 6.

L E N S.

Lens & Lenticula, *panis* Dioscor. l. 2. c. 129. Theoph. & *panis* dicitur, et si aliquibus *panis* lentem crudam: *panis* vero & lentem. & lentem coctam, & ipsum ex lente pulmentum significet. Dicitur autem Etymologico quasi *panem*, ut sit *α τὰ φάνησεν*: oculorum enim aciem hebetare Dioscorides asserit. Alijs *panis* ab utre qui fuit *panis*, metathesi & mutatione unius elementi. Latinus Lens quasi lenis dicta: nam ut Plinius l. 18. c. 12. ea vescentibus, equanimitatem fieri apud auctores se invenisse scribit.

Genera: duplex est, arvensis & palustris: hic de arvensi tantum, cujus plura genera Theoph. l. 6. Plinio l. c. duo sunt lentis genera in Aegypto alterum rotundius nigriusq., alterum sua figura, unde vario usu translatum sit in lenticulas nomen. Recentioribus colore & magnitudine differunt: sunt enim albæ majores & gratiores: ex luteo pallida, cinerea, ruffa, minores & deteriores: sic flores albi, candidi: cinereis, purpurascens.

I. Lens vulgaris.

Lens, Brunf. Fuch. Dod. gal. Cord. in Diosc. Lon. Ad. Taber.

Lens vulgaris sive agrestis, & Lenticulæ primum genus, Trago.

Lens minor, Lob. Dod. Lugd. Cam. epit. Ger.

Flos in candido purpurascit: grana alia sub-ruffa, alia ex luteo pallida, nonnulla ex cano albôve fusca & nigricantia.

II. Lens major.

Lens sativus & Lenticulæ alterum genus, Trag.

Lens, Matth. Ang. Lob. Cæs. Cast.

Lens major, Gef. hor. Tab. Ger.

Lens Italica, Camer.

Hoc candidius & majus priore: Matthiolo tamen album minus est; & quod cinereo colore, orbe paulo majore est.

III. Frisoles & Palaros peculiare herbarum genus nuncupant, quas eo fere loco habent, quoniam Pifa, Lentis & Fabas: Josef. Acofta l. 4. c. 19.

S E C T I O Q U A R T A.

DE LEGUMINIBUS CAPREOLIS CARENTIBUS.
OROBUS SIVE ERVUM; CICER; LUPINUS;
Foenumgræcum.

OROBUS SIVE ERVUM.

Orobos & Græcis, Ervum Latinis: Græcorum vocem quidam deducunt *αροβ* τὸ ἐπὶ τῆς ἀροβῆς, quod lobes eo vescantur & saginentur. Dioscoridi l. 2. c. 131. frutex est exiguus, folio angusto, tenuis, in filiquis parva gerens semina: & ut Theophrastus 9. hist. 22. fructu rotundo modo piperis. Plinius l. 18. c. 15. Ervum vocat & cum Vicia conjunxit.

Genera duo, sativum & sylvestre: illud duum generum, candidum & rufum: Galenus tertium addit, nempe pallidum, inter priora medium: est & quartum Creticum, quod semine minore est.

I. Orobos filiquis articulatis semine majore.

Orobos sive Ervum, Matth. Gef. hor. Ang. Cord. in Diosc. Lugd.

Cicer sativum, Dod. gal.

Ervum, Gef. hor. Guil. (sive Mochus) Cast. Tab. verum, Camer.

Mochus sive Cicer sativum, Dodon.

Orobos receptus herbariorum, Advers. Lobel. Gerard.

Flores subpurpurascens, aliquando candidi.

II. Orobos semine minore.

Orobos Creticus, Matth. Lugd.

III. Orobos semine obtulo triangulo.

Cicer orobæum Theophrasti, Ad. Lob. Lugd.

Semen est Orobo duplo majore, albido, pal-lente aut subfulvo, & ab Orobo nigredine potissimum distans.

CICER.

C I C E R.

Ciceris, qui ἐπίκυρος & Græcis, genera duo Dioscoridi lib. 2. cap. 126. sativum & sylvestre: sativi genus alterum νεῖον (arietinum reddunt, quia νεῖον arietem significat) appellatur Theophrasto 8. hist. 5. Cicer & magnitudine & sapore, & colore, & forma plerasque differentias ostendit, οἷον νεῖον ἐποχύσιον, ὃ οἱ ἀνὰ μέσον: ἐπὶ παλαιῇ δὲ τὰ λευκὰ καλεῖσθαι: h. e. veluti Arietinum, Orobaum sive ervinum, & inter hæc medium: præter hæc omnia sunt alba dulcissima. Galeno 6. simpl. duplex, Arietinum & Orobaum. Plinio lib. 18. cap. 12. est arietinum, quod album est & nigrum (in arietino candidum esse, Dalechampsius in Plinium negat:) est columbinum, quod & venereum dicitur, & est candidum: est & dulcissimum quod Ervo similimum est. At Matthiolo, est Columbinum, quod candidum: est Venereum, quod rubrum: est Arietinum, quod nigrum & ceteris majus est. Anguillara tres sunt species, albi, rufi, arietini: albi duplices sunt arietini & ervini: arietini capiti arietino similes, ervini leves ervi semini similes: ex Galeno 9. de compos. medic. secundum loca. Rubri similiter duplices, arietini & ervini. Nigri simplices sunt solo colore ab alijs differentes.

I. Cicer sativum.

Cicer, Brunf. Matth. (cui & domesticum) Tur.

Cord. in Diosc. Lac. Cæf. Cast. Tab.

Ciceris altera species, Trago.

Cicer nigrum, Fuch. seu arietinum, Cord. hist.

Cicer arietinum, Dod. ut:

Cicer rubrum & album, Lon.

Cicer sativum, Lugd. Ger. sive arietinum, Gefn. hort. Adv. Lob.

Flores candidi, aut ex purpura rubescentes: femina alba, vel ex candido pallescens: purpurea vel rubra, rufave: nigra vel ex saturo rubente purpura nigra.

II. Cicer exoticum.

Cicer Nigritarum, Clus. exot. l. 3. c. 16.

Semen vel album, vel nigrum, vel rubens, vel ex albo & rubro variè distinctum.

Cicer sylvestre.

I. Cicer sylvestre, folijs oblongis hispids

majus.

Cicer sylvestre, Matth. Ang. Dod. gal. Lugdun.

Cast. Cam. Ger.

Cicer sylv. herbariorum, Adv. Lob.

Cicer sylv. primum, Dod. Lugd. Tab.

Cicer sylv. majus, Thal. qui & medium habet.

Semen parvum flavescens: at in hist. Lugd. parvum nigrum compressum.

II. Cicer folijs oblongis hispids minus.

Cicer sylv. minus, Thal.

III. Ciceri sylv. minoris affinis si non idem.

Glaux, Clus. hisp. Lob. Lugd. Tab. Dioscoridis, Gerard.

Glaux Hispanica, Clus. hist.

Anthyllis altera lutei similis, Dod.

Illius flores lutei, hujus purpurascens vel cærulei.

IV. Cicer montanum lanuginosum erectum.

V. Cicer montanum ἀναιδὲς: utrumque in Prodomo describitur.

VI. Cicer sylv. latifolium triphyllon.

Cicer sylvestre, Gefn. hort. Penæ, Lugd. latifolium, Ger.

Cicer sylv. alterum, Dod. Tab. Lugd.

Cicer sylv. verius, Adv. Lob.

Et Ciceris sylvestris tertij ramosi meminit Dodonæus, quod cum priore si non idem, certè ab eo parum differt.

L U P I N U S.

Lupinus λέγεται Dioscoridi lib. 2. cap. 132. Theophrasto pluribus in locis & Græcis ceteris. Lupinorum appellatio non aliunde ducta videtur, quam quod sicut lupus terram appetit, & in same terra vescitur: ita Lupinus tellurem, ut Plinius lib. 18. cap. 14. ait, adeo amat, ut quânvīs fructuoso solo conjectum, inter folia vepresq., ad terram tamen radice perveniat. Vel ita dictus videri potest, velut lupis expositus & relictus, ex eo quod (ut idem Plinius) impunè jaceat, vel derelictus, si non protinus imbres secuti obruant, ab omnibus animalibus amaritudine sua tutus.

Genera duo Dioscoridi, Galeno & Plinio: sativus & sylvestris.

I. Lupinus sativus flore albo.

Lupinus, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Lac. Cord.

in Diosc. Lon. Cæf. Tab. communis, Gefn. hort.

Lupinus albus, Fuch. Turn. Camer. albo flore,

Clus. hist. vulgaris, Eyf.

Lupinus sativus, Ang. Dod. ut: Cord. hist. Adv.

Lob. (cui & Faba ficulnea Germanis à folio)

Cast. Lugd. Ger.

Xx 2

II. Lu-

II. Lupinus sylv. flore cæruleo.

Lupinus sylv. Matth. Ang. Dod. ut: Lugd.

Lupinus sylv. fegetum flore purpureo, Ad. Lob.

Lupinum flore cæruleo, Clus. hist. Ger. sylvestris flore cæruleo, Gefn. hort. Cam.

Lupinus sylv. flosculis è cæruleo purpureis, Cam. epit.

Lupinus minor, Tab.

Lupinus sylv. angustifolius flore cæruleo, Eyst.

Flos ex purpura cæruleus, aut subrubens, vel roseo colore rufescens.

III. Lupinus sylvestris flore luteo.

Lupinus sylv. luteus. Dod. gal. odoratus, Eyst.

Lupinus Hispanicus flore luteo, Gefn. hort.

Lupinus flore luteo, Lob. Cam. in Matth. Ger.

Lupinus luteus, Tab. Cam.

Lupinus flavo flore, Clus. hist.

IV. Lupinus peregrinus major vel villosus

cæruleus major, in Prodomo describitur.

Lupini Indici, etiam Cretici nomine accepimus.

an Lupin. albus maximus, cujus flos antequam aperiat subcæruleus, intus verò albus, Cam.

an Lupini genus quartum, Clus. hist.

Lupinus sativus major, & Lupinus Æthiopicus quorundam, Eyst.

Huc referatur

Lupinus exoticus flore albo, colore floris tantum ab illo varians, Eyst.

V. Lupinus peregrinus pentaphyllos.

Lupinus Arabicus sive pentaphyllon peregrinum, Ponæ ital.

VI. Lupinus peregrinus minor sive angustissimo folio.

Lupini Africani nomine accepimus, & sub Lupino minimo in Prodomo descripsimus.

F O E N U M G R A E C U M.

Foenumgræcum, τῆδος Dioscoridi l. 2. c. 124. Theophr. 3. hist. 17. cui & βήμας 8. hist. 8. νεπαῖρος & ἀγόνος Græcis, quarum appellationum major pars à siliquarum similitudine desumpta est, quæ corniculis similes sunt: ut ceraites, à cornu: agoceros, à caprinis: bouceros à bubuli cornu similitudine: quare Columella l. 2. c. 11. simpliciter siliquam, Varro Siliculam, Plinius l. 18. c. 16. Siliciam, & l. 25. c. ult. Foenugracum vocavit.

Genera: unius veteres meminere, recentiores sativum & sylvestre faciunt.

I. Foenumgræcum sativum.

Foenumgræcam, Trag. Matth. Lac. Turn. Lon.

Adv. Lob. Dod. Cast. Cæf. Cam Alpin.

Foenumgræcum sativum, Ang. Lugd.

Foenogracum, Dod. gal. Fuch. Cord. in Diosc. & histor.

Siliqua vel Foenogracum ex quo farinam, item vinum mulsi sapore conficiunt: par. 7. Ind. Oc. cap. 8. & 11.

II. Foenumgræcum sylvestre.

an Foenumgræcum alterum, quod spontè nascitur, Ang.

Foenumgræcum sylv. Dalechampij, Lugd.

III. Foenumgræcum sylv. alterum polyceration.

Foenumgræcum sylvestre, Lob. Cam.

Foenumgræcum sylv. alterum, Dod. Lugd.

Hedyfarum minimum, Lugd.

SECTIO QUINTA.

HEDYSARUM SIVE SECURIDACA; FERRUM EQUINUM; POLYGALA; ORNITHOPODIUM; ET TRIBULUS TERRESTRIS.

HEDYSARUM SIVE SECURIDACA.

H'Ἠδύσαρον & πιδίνιον Græci vocant, quam Latini Securidacam (vel ut Turnebus legendum censet Securidacam) à seminis figura, πιδίνιον enim securim significat: Sic enim Dioscorides l. 3. c. 146 Hedyfarum, quod unguentarii Pelecinum, semen rufum in siliquis corniculorum modo aduncis, quod ancipitem securim emulatur, unde nomen accepit. Apud Theophrastum 8. hist. 10. Gaza Securinam (securi similem) reddidit: & Plinius l. 18. c. 17. Securidaca, quam Græci a similitudine Pelecinum vocant.

Genera: Dioscorides unius meminit: at recentioribus aliquot differentia sunt.

I. Securidaca lutea major.

Securidaca major, Matth. Castor.

Securidaca, Ang. Cæf. vera, Clus. hist.

Securidaca secunda, Dod. gal.

Peleci-

Pelecinus, Gefn. hort.

Hedysarum, Gefn. hort. Lac. Lon. five Securidaca major, Adv. Lob.

Hedysarum majus, Lugd. (qui sub 1. & 3. Dodonæi quoque exhibet) Cam.

Hedysarum 1. Dod legitimum, Clus. pan.

Floribus est luteis: Matthiolo flores dilute purpurascunt.

II. Securidaca lutea minor corniculis recurvis.

Securidaca minor, Matth. Adv. Lob. Cast. Cam.

Hedysarum alterum, Dod. Lugd.

Hedysarum minus, Lugd.

Securidacæ similis quædam, Cæf.

Astragalus Monspeliacus, Clus. hisp. & hist. ico.

III. Securidaca siliquis planis utrinque dentatis.

Securidaca peregrina, Clus. hist.

Scolopendria leguminosa, Cortuso.

IV. Securidaca dumetorum major flore

vario siliquis articulatis.

Melilotus quinta, Trag.

Bogelwicken/ Lonicer.

Ornithopodium 2. vel quoddam majus, Dod.

Securidaca altera, vel alterius prima species, Clus. pan. & hist.

Hedysarum purpureum, Tab.

Loto enneaphyllo non dissimilis, Lugd.

Hedysarum scorpiuron, Cam.

Securidacæ alterum genus, Cæf.

Hedysarum majus, Ger.

Variat flore: aliquando floris folia superiora

dilute rubent, laterum alæ niveæ sunt, rostrum

purpureum: aliquando totus candidus est, vel

exalbescit, vel intensius purpurascit.

V. Securidaca dumetorum minor pallide cærulea.

Securidacæ secundæ altera species, Clus. pan.

& hist.

Securidaca Dioscoridis Penæ, Eidem.

FERRUM EQUINUM.

A Siliquarum figura, planta hæc Solæa vel Ferrum equinum nominatur: aliquibus verò ab effectu, quod equi qui diu plantam hanc viventem calcaverint, ferreus soleis exuantur: Sunt qui ad Securidacam, alij ad Lunariam, alij ad Medicam referant.

I. Ferrum equinum siliqua singulari.

Ferrum equinum, Matth. (cui & Securidaca montana) Gefn. hort. Lob. Ger.

Medicæ species, Gefn. hort.

Sferro cavallo, Adv. Cæf. Cam.

Lunaria minor, Cast.

Solea equinea, Lugd. cum duplici figura.

Hedysarum five ferrum equinum, Tab.

Ferrum equinum vulgare ἀπιδνεύρατον, Col.

II. Ferrum equinum siliqua multiplici.

Ferrum equinum alterum ποδονεύρατον, Col.

III. Ferrum equinum Germanicum, siliquis in summitate.

Sferra cavallo sylv. Germanicum, Cam.

Hedysarum minus, Tab.

Hedysarum glyzyrrhizata, Ger.

Ferrum equinum capitatum five comosum, Col.

IV. Ferrum equinum Gallicum, siliquis in summitate.

Loto enneaphyllos, Lugd.

Hoc priore per omnia minus est, siliquis est paucioribus & minoribus.

V. Ferro equino Gallico affinis.

Astragalo persimilis palmaria pusilla planta, Adv. Lob.

Floribus est luteis, aliquando albis.

POLYGALA.

Πολύγαλον Dioscorides lib. 4. cap. 142. frutex brevis, palmum altus, folijs lenticula, gustu subacerbis: potus lactis abundantiam facere creditur. Et Plinio lib. 27. cap. 12. Polygala, &c.

I. Polygala major Mafiliotica.

Polygala, Matth. Lugd. Tab.

Astragaloides herbariorum, Lob.

Astragalus fortè Matthioli, vel jam demum

Polygala ejusdem, Eidem.

Polygala Valentina 2. Clus. hisp. & hist. qui

& 3. addit.

II. Polygala altera.

Polygala Valentina prima, Clus. hisp. & hist.

Lugd. Tabern.

Coronilla five Colutea minima, Lob.

Colutea five Polygala Valentina, Ger.

an Polygala, Ang.

Xx 3

ORNI

ORNITHOPODIUM.

Ornithopodium id est avis pes à similitudine, quam siliqua adunca cum pedibus parva avicule habent, dicitur: quod veteribus incognitum, nisi forte ad Polygalon Dioscoridi l. 4. c. 142. referatur.

I. Ornithopodium majus.
Ornithopodium, Dod. ut: Gesn. hort. Adv. Lob.
Lugd. minus, Cam.
Polygala, Gesn. hort.

II. Ornithopodium minus.
Ornithopodium perpusillum, Adv. Lob. Lugd.

III. Ornithopodium radice tuberculis
nodosa.

Ornithopodium tuberosum Dalechampi, Lug.
IV. Ornithopodio affinis hirsuta Scorpoides.
Scorpoides leguminosa, Adv. Lob. Lugd.
V. Ornithopodio affinis hirsuta, fructu
stellato.

Arturo, Cortuso.

Stella leguminosa, Lob. Lugd. Cast. Tab.
Vicia selamacea Apula, Col.

TRIBULUS.

Tribulus tribulus Latinis dicitur, quod siliqua plantaque, muricata sit: & ut Theophrastus 6. hist. 5. Tribulo peculiare est, quod integumentum fructus aculeatum gignit.

Genera duo sunt Dioscoridi l. 4. c. 15. alterum terrestre, alterum aquis familiare: terrestres Theophrasto genera duo, unum folium ciceris habet, nullis spinis aculeatum, alterum folijs est spinosis. At Plinio l. 22. c. 10. Tribuli unum genus in hortis, alterum in fluminibus: & l. 21. c. 16. Tribulo uni cicercula folia, alteri aculeata.

Tribulus terrestris Ciceris folio fructu
aculeato.

Tribulus terrestris, Matth. Cord. in Dioscorid. Tribulus Theophrasti, Ang.

SECTIO SEXTA.

ONOBRYCHIS; ASTRAGALUS; OROBUS SYLVATICUS; GALEGA; GLYZYRRHIZA.

ONOBRYCHIS.

Onobrychis ab asini ruditu nomen obtinuit: Latinis similiter Onobrychis dicitur. Dioscorides l. 3. c. 152. & Plinius l. 24. c. 16. folia lentis paulo longiora, caulem dodrantalem, florem puniceum, radicem parvam tribuunt, ad Onobrychidis classem subsequentes plantae, tanquam illi quodammodo affines, auctores referant.

I. Onobrychis folijs Viciae fructu echinato
major.

Viciae sylv. alterius secunda species, Dod. gal.
Onobrychis, Lac. Dod. Clus. pan. & hist. Thal.
Tab. Ger.

Glaux vel Onobrychis, Gesn. hort.
Polygalon Rheticum, Gesn. hort. ap.
Caput gallinaceum Belgarum, Adv. Lob.
Lupinus sylv. rusticis, Cæs.
Polygala multorum, Lugd.

Onobrychis Dodonæi flore rubro, Eyst.
Flores communiter dilute rubent, aliquando
elegantius rubent: reperiuntur & albi coloris.

II. Onobrychis fructu echinato minor: sub
capite gallinaceo minore in Prodomo descri-
bitur.

III. Onobrych. femine clypeato aspero major.

Onobrychis altera, Dod.

Hedysarum alterum clypeatum, Lob. Lugd.

Securidaca clypeata, Cam.

Hedysarum clypeatum flore suaviter rubente,
Eystett.

IV. Onobrychis femine clypeato aspero
minor: in Prodomo sub 1. describitur.

V. Onobrychis femine clypeato laevi: sub
2. in Prodomo exhibetur.

VI. Onobrychis incana folijs longioribus
vel 3. in Prodomo.

VII. Onobrychis incana folijs rotundis.

Onobrychis quorundam, Clus. hisp.

VIII. Onobrychis spicata flore purpureo.

Onobrychis prima, Clus. pan. & hist. Tab.

IX. Onobrychis spicata floribus pallidis,
nigris radijs notatis.

Onobry-

Onobrychis 3. Clus. pan. & hift. Tab. Ger.

X. Onobrychis floribus Viciæ dilutè cæruleis.

Onobrychis 2. Clus. pan. & hift. Tab. Ger.

Flores dilutè cærulei, vel ex cæruleo purpurascens.

XI. Onobrychis floribus Viciæ majoribus cæruleo purpurascens: vel folijs Tragacanthæ.

Onobrychis quarta, Clus. pan. & hift. Tab.

Onobrychis montana 4. Ger.

XII. Onobrychis tragacanthæ folijs floribus in globum congestis.

Onobrychis quinta, Clus. pan. & hift.

XIII. Onobrychis montana siliquis oblongis nigris Viciæ similibus.

Onobrychis, Cæsalp.

Duplex est, altera angustioribus folijs flore rubente coralli modo: altera latioribus flore purpureo: utraq; siliquis nigris longis.

ASTRAGALUS.

Aστράγαλος & Latine etiam Astragalus Dioscoridi l. 4. c. 57. frutex parvus est, & folijs & ramis Ciceri similibus, flores purpurei parvi: radix rotunda raphani modo grandis, & c. Plinio lib. 26. c. 8. Astragalus folia habet longa, incisuris multis obliquis circa radicem: caules tres aut quatuor foliorum plenos: florem hyacinthi: radices villosas, implicatas, rubras, præduras.

I. Astragalus Syriacus hirsutus.

Astragalus Syriacus, Lob. Lugd. Tab. Ger.

an Astragalus, Ang. Cæsalp.

an Astragalus Dioscoridis, vulgo Christianæ radix, Rauvvol. & Lugd.

Flos cæruleo purpureus, Ang. flores magni & rubri, Lob. flos sanguineus, siliquæ corniculis similes rubentes, Cæsalp. flos purpureo, fusco & cæruleo distinguitur, folliculi coluteæ modo statu distenti semen continent, Rauvvolf.

II. Astragalus Boeticus lanuginosus radice amplissima.

Astragalus forte primus, Clus. hisp. Lugd.

Astragalus Lusitanicus Clusij, Lob. Tab. Ger.

Astragalus Boeticus, Clus. hift. & cur. post.

Phaseolus peregrinus Belli, Clus. cur. post.

Phaseoli novum genus, Belli in epist. & ad Clus.

an Apocynum Amati Lusitani.

III. Astragalus alpinus Helveticus.

Astragalus alpinus & 2. Clus. hisp. & hift.

Polygala, Camer. epit.

Cicer astragaloides Ponæ.

IV. Astragalus alpinus magno flore.

Anthyllis claviculata, Lugd.

Flos in nostra est ex cæruleo purpurascens: at Lugd. hift. suæ flores luteos ascribit.

V. Astragalus villosus floribus globosis.

Astragalus purpureus, Lugd.

Astragalus tertius, Clus. hisp. & hift.

Huic affinis si non idem

Astragalus Monspelienfium, Clus. hisp. & hift.

VI. Astragalus sylvaticus folijs oblongis glabris.

Astragalus, Cord. in Diosc. & hift.

Astragalus sylvaticus, Thal.

Cicer montanum, Cordi schol. & Cam. ad Thal.

VII. Astragalum Matthiolum in editione secunda proposuit, in ultimis verò retractavit: eandem figuram Lacuna, Lonic. & Lugd. proposuere: an forte ejusdem Pseudoapios.

OROBUS SYLVATICUS.

I. Orobis alpinus latifolius in Prod. descr.

II. Orobis sylvaticus purpureus vernus.

Phaseolus sylvarum, Lugd.

Orobis pannonicus primus, Clus. pan. & hift.

pannonicus, Eyst.

Orobis sylvestris vernus, Thal.

Astragalus, Colum.

Arachus latifolius alter, Dod. belg.

Flos coloris purpurei elegantissimi: at ubi evanescere incipit, coloris cærulei est.

III. Orobis sylvaticus pallido flore.

Arachus latifolius, Ddon.

Galega montana, Lugd.

Orobis pannonicus 4. Clus. pan. & hift.

IV. Orobis latifolius parvo flore purpureo.

Orobis Veneris, Clus. pan. & hift.

Duplex est: alteri folia dilutè virentia, flores purpurei: alteri folia ex viridi pallescentia, flores prorsus albi, utriusq; semen albicantis coloris oblongiusculum.

V. Orobis sylvestris angustifolius asphodeli radice.

Orobis pannonicus tertius, Clus. pan. & hift.

Semen nigrum interdum maculosum.

VI. Oro-

VI. Orobis sylvaticus Viciæ folijs.
Astragaloides, Dod. altera herbariorum, Lob.
Orobis panonicus 2. Clus. pan. & hist.

an Lupinus sylvestris, Cæf.
Flos purpurascens, qui vetustate in cærule-
um commutatur.

G A L E G A.

Galega ab herbarijs cur dicatur ignoramus: à quibusdam tamen Ruta nomen inditum, ab effectu & vi-
ribus non verò odore. Quidam Onobrychin, alij Glaucem, nonnulli Polemonium, alij Polygalam veterum
esse iudicant, quibus Dioscoridis descriptiones contradicunt.

I. Galega vulgaris.
Galega five Ruta capraria, Matth. Gef. hor. Lac.
Cast. Cam.
Ruta capraria, Gef. hor. Tab.
Galega quibusdam fœnumgræcum sylv. Dod.
gallic.
Galega, Ad. Lob. Dod. Lon. Lugd. Ger. vulgaris,
Clus. pan.
Onobrychis & herba gallica, Fracastorio.
Caprago vulgò, Cæf.
Galega flore cinereo, flore albo, Eyf.

Floribus est cæruleis, ex cæruleo purpureis:
penitus candicantibus.

II. Galega Ægyptiaca siliquis articulatis.
Seban five Sesban Indicum, Cam.
Sesban, Alpin. & Clus. ad Garz. cuius semen A-
nij nomine ex Alexandria accepit.
Seysban, Honor. Belli epist. 4. ad Clus.

III. Galegæ affinis Sophera dicta.
Hoxocoquomaclit, Cam. Clus. cur. post.
Sophera Galegæ proxima, Alpin.

Sofera Lentisci folijs, Honor. Belli epist. 4. ad
Clusium.

Honorio Belli videtur, suam plurimum ab
ipsius Alpini differre, quod ex descriptione &
icone colligere sit: equidem Alpini figura vitio-
sa, duplici potissimum nomine: primum quod
in costæ extremitate malè posuerit folium quod
imparitatem facit: dein quod siliquas depen-
dentes pinxerit, cum omnes oblongæ cylindra-
cæ fursum spectent. Non tamen differentes fa-
cio, cum & ab Honorio Belli integram plantam
ex Creta, & à Prospero Alpino semina (unde
plantæ enatæ) acceperim, in utraq; solam diffe-
rentiam in folijs notavi, quæ in Ægyptiaca acu-
tiora & atrovirentia sunt. Sic & ex horto Came-
rarij ramum habeo, in quo peculiare observavi,
quod in illius alarum cavis, qua parte costarum
latior extremitas caulem amplectitur, verrucæ
parvæ rubentes innatæ, quæ æstu intensissimo
liquorem candidum pellucidum exudant, ut
etiam Camerarius in suo horto admonet.

G L Y C Y R R H I Z A.

Lavopissa, id est, radix dulcis, à Latinis Glycyrrhiza & Dulcis radix, & à Sepasiarijs barbaro nomine Li-
quiritia appellatur. Dioscoridi lib. 3. c. 7. frutex est exiguus, ramis binum cubitorum, circa quos folia Len-
tisci, densa, pinguis, & ætug, glutinosa: flos est hyacinthi: fructus pilularum Platani magnitudinis, asperior,
qui siliquas habet lentium modo ruffas & parvas: radices longæ, buxæ coloris, subacerba & dulces: ex quibus
succus Lycij modo elicitur. Plinio lib. 22. c. 11. Glycyrrhiza, qui eadem scribit quæ Dioscorides, eo excepto quod
echinata tribuit, pro *glycor*, id est, lentisco echinum legens. Theophrasto 9. hist. 13. γλυκίαν ἢ οὐνόνιον πῖσσαν, dulcis &
Scythica radix, quam aliqui γλυκίανον vocitant.

I. Glycyrrhiza capite echinato.
Glycyrrhiza, Matth. Dodon. gal. Lac. Cast. al-
tera, Anguil.
Glycyrrhiza Italica, Gef. hort. vera Dioscorid.
Dodon.
Glycyrrhiza echinata Dioscoridis, Ad. Lob.
Lugd. (qui & Matthioli & Dodon. figuram ha-
bet) Tab. qui similiter duas figuras sub vulgari
& echinata proposuit, Ger.

II. Glycyrrhiza siliquosa vel Germanica.
Liquiritia, Brunf.

Dulcis radix, Trag. Tur. Gef. hort.
Glycyrrhiza, Fuch. Cord. in Diosc. & hist. Gef.
hort. Cam.
Glycyrrhiza Germanica, Dod. gal.
Glycyrrhiza Dioscoridis, Anguil.
Glycyrrhiza altera, Matth. vulgaris, Dodon.
Camer. ep.
Glycyrrhiza lævis, Lac. non echinata, Lugd.
Glycyrrhiza siliquosa, Ad. Lob.
III. Glycyrrhiza sylvestris floribus luteo-
palescentibus.

Fœnu-

Foenugræcum sylvestre, Trag. Clus. pan. 1. Dod.

Polygonum, Cord. in Diosc. & hist. Thal.

Glyzyrrhiza sylvestris, Ges. hor. Lugd. Cam.

Glaux, Tur. vulgaris, Ad. Lob. Clus. hist.

IV. Glyzyrrhiza sylvestris altera floribus
punicis, folijs Arachi.

Glaux, vel Glaux, quædam leguminosa her-

bariorum, Advers.

Flores communiter ex pallido flavent, rari-
us puniceant.

Glyzyrrhiza sylvestris, Thal. alia, Cam.

V. Glyzyrrhiza sylvestris primæ similis: hæc
sub Glauce leguminosa in Prodr. describitur,
cujus semen Araci Bœtici nomine accepimus.

CASPARI BAVHINI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER DECIMVS.

SECTIO PRIMA

DE PLANTIS CAPILLARIBVS.

PHYLLITIS; HEMIONITIS; OPHIOGLOSSUM; ASPLENIUM
SIVE CETERACH; LUNARIA MINOR; ADIANTHUM SIVE

Capillus Veneris; Trichomanes sive Polytrichum; Ruta mu-

riaria sive Salvia vitæ; Polytrichum aureum;

& Ros Solis.

PHYLLITIS.

QUæ Græcis *φύλλις*, quasi foliosam dicas, cum nihil nisi foliosus cespes appareat. Latini quoque, Græcum
asservaverunt nomen: officinis *Lingua cervina*. Diosc. l. 3. c. 121. folia fert rumici similia, sed oblongio-
ra magis, virentia, senu septenave, recta, quæ parte anteriore laviâ, posteriore tenues quasi vermiculos annexos
ostendunt, neg. caulem neg. semen, neg. florem profert. Theophr. sort. l. 9. c. 19. *σποδοποιός* *ἀγρίος*, *Γάζα* *Λinguam*
cervinam vertit.

I. *Lingua cervina officinarium*.

Scolopendrium, Brunf.

Scolopendria vulgaris, Trag.

Phyllitis, Matth. Dod. ut: Ang. Lac. Tur. Cord.

ut: Ges. hort. Ad. Lob. Thal.

Phyllitis vulgaris, Cam. Clus. hist.

Hemionitis, Leon. Manar. Ruel. Fuch.

Lingua cervina, Ericio Cord. Lonic. Cæf.

Phyllitis sive *lingua cervina*, Tab. emacul.

Est & latifolia & angustifolia: sæpe etiam in

fontibus exigua reperitur.

II. *Lingua cervina multifido folio*.

Phyllitis laciniata, Dodon. Clus. hisp. & hist.
Lugdun.

Phyllitis folijs laciniatis, Tab.

Phyllitis multifido folio, Lob. multifida, Ger.

Phyllitis, Cast. ap. mucronata, Cam.

Duobus, tribus, etiam pluribus mucronibus
in summo folij donatur: aliquando folia ad u-

HEMIONITIS.

HEMIONITIS seu *ἡμιόνη* Græcis, Latini similiter, quasi *Mulariam* dicas & *Splenium*, nominatur, quod ejus
folia sicut & Phyllitidis, Medicorum *splenia*, nimirum oblongas plagulas forma imitentur: quid si potius
ab eorum usu, quod spleni medeantur, siquidem ex aceto pota lienem absument, Dioscorid. authore l. 3. c. 152. cui,
folium emittit simile dracunculi curvata in cornua luna modo sinuatum: radices habet multas casq. tenues:
sed neg. caulem, neg. semen, neg. florem profert. Theophrasto l. 9. c. 19. *Μύλα* *Γάζα* vertit, quam fo-
lio *Lingua cervina* constare, & radice numerosa & tenui esse, asserit.

I. *Hemionitis vulgaris*.

Hemionitis, Matth. Dodon. ut: Ang. Ges. hort.

Lac. Lon. Cæf. Lugdun.

Hemionitis vera, Clus. hist.

Yy

Hemio

Hemionitis five sterilis, Lob.

II. Hemionitis minus vulgaris.

Hemionitis peregrina, Dod. Clus. hisp. & hist. Lugdun.

Hemionitis, Cast. altera peregrina, Lob.

III Hemionitis minor.

Hemionitis five sterilis, Ad. Lob.

Hemionitis minor, Penæ, Lugd.

IV. Hemionitis multifida.

Hemionitis altera Dalechampi, Lugd.

Lingua cervina ramosa, Colum.

Agleofotis seu Marmorite, seu Phylliridis aut Scolopendriæ nomine, à Cortuso accepimus.

Et hujus quemadmodum & præcedentis folia, parte averfa, sub flavo pulvisculo non conteguntur, qui in alijs id genus plantis cernitur.

O P H I O G L O S S U M.

Quam recentiores *Ὀφιδόλωρον* Græci vocant, Latine *Lingua serpentis* dicitur: quam alij veteribus inditam, quidam *Ceratiā* Plinij lib. 26. c. 8. esse volunt unicotantum folio assurgentem, radice nodosa & magna: quidam linguam Plinij l. 24. c. 19. quam circa fontes nasci, solum scribit: five *Lingulacam* l. 25. c. 11. quæ circa fontes nascatur, censent: quidam inter *Dracunculi* species referunt.

I. Ophioglossum vulgatum.

Serpentaria secunda, Brunf.

Ophioglossum, Trag. Matth. Fuch. Dod. ut. Gef. hor. Lon. Thal. Cast. Cam. Tab. Eyf.

Ophioglossum five Eneaphyllum, Ad. Lob.

Unifolium, Amato.

Lingula vulneraria, Cord. hist. Cam.

Lancea Christi, vel Luciola, Gef. hort.

Lingua serpentina, Cæf. Cast.

Variat: aliquando folio est sinuato: ligula communiter simplex est, aliquando duplex, & etiam triplex, quemadmodum Camerarius in epit. Matth. pingit: est & abortivum à Lobelio pictum, quas differentias, una figura in nostro Matthiolo emaculato exhibuimus.

II. Ophioglossum anguloso folio.

III. Ophioglossum minus subrotundo folio: utrumq; in Prodre mo describitur.

A S P L E N I U M S I V E S C O L O P E N D R I A.

Ἀσπλην quod splenem juvet: alijs *ἡμίωνιον* quod *ὄνομα πόντιος* ὅν à foliorum forma: sic enim Dioscorides lib. 3. cap. 151. folijs est Scolopendria animæ alijs similibus, pluribus ab una radice in ambitum sparsis: nec caulem, nec florem, nec semen habet: folia polypodij modo incisa, subtus flavescentia hirsuta, superne verò viridia. Plinio lib. 27. cap. 6. Asplenium sunt qui Hemionion vocant, &c. Alex. Trall. annus, Scolopendrium ab Aspleno in varijs medicamentis separat.

Ceterach officinarum.

Scolopendria, Ang. vera, Trag. Tab. emac.

Ceterach, Eric. Cord. Cæf.

Scolopendrium, Cord. hist. verum, Lob.

Asplenium, Matth. Dod. gal. Gef. hor. Lac. Tur.

Ad. Cast. Lugd. Cam.

Asplenium, Cordo, in Dioscoride, Dodonæo, Lobel.

L U N A R I A.

Lunaria recentioribus dicta à folijs luna crescentis modo falcatis. An veteribus cognita, ambigitur: aliqui Ceratium Plinij censent: quidam Tragium secundum Dioscorid. l. 4. c. 50. quod in montibus folio Scolopendrij radice tenui & candida nasci scribit: nonnullis hærentis triquetris & ovatis, quia aliqui Hemionitidem Lunariam majorem, hanc verò minorem & botryitem à plurimis racemulis utring, thyrsulo hærentibus & foliorum numerum aquantibus: Epipactis quibusdam. An *ἡμίωνιον* quod Dioscor. l. 4. c. 19. caule est non magno, hederæ folijs, denis aut duodenis, neg. semen neg. flores proferens: radicibus tenuibus nigris, gravi odore, gustu fatuo. Idem Plin. l. 27. c. 9. sub Epimedio quod forte Theophr. 7. hist. 8. Epimetrum.

I. Lunaria racemosa minor vel vulgaris.

Lunaria minor, Matth. Fuch. Dod. gal. Gef. hor.

Lon. Lugd. Cæf. Ger.

Lunaria, Trag. Dod. racemosa, Ad. Lob.

Lunaria petraea, Taura pastoribus, quod vaccæ hac degustata taurum requirant, Gef. de Lunar.

Lunaria botryitis, Thal. Cam. Col. Eyflet.

Lunaria major, Cast.

Lunaria botryitis minor, Clus. hist.

Lunaria vulgaris minor, Clus. hist. ap. alt. ad libr. 5.

Ruta lunaria vel jecoraria, Tab.

Epime-

Epimedium Dioscoridis, Col.

Folij est denis, duodenis: novemdecim in Baldo notavimus: quare putant aliqui totidem folia habere, quot luna dies, unde nomē habeat.

II. Lunaria racemosa ramosa major.

Lunaria rarior species, Cam.ep.

Lunaria minor ramosa Camerarij, Clus. hist. & in ap. alt. ad lib. 5.

III. Lunaria racemosa multifido folio.

Lunaria ramosa Silesiaca, Cam.

Lunaria botrytis πολύφυλλος, Thal.

Lunaria minor ramosa, Clus. pan. & hist.

IV. Lunaria minor rutaceo folio.

Lunaria botrytis πικνάνθηλος, Junger. in cat. Altorff.

V. Lunaria Magorum Arabum, Lob. quid?

ADIANTUM SIVE CAPILLUS VENERIS officinarum.

Aδίαντρον & ποδάρτερον Dioscoridi l. 4. c. 136. & δίαντρον Theophrasto 7. hist. 13. dicitur, quod & Αδίαντρον, quod in aquis non madescat, nec quicquam humoris adhaesisse constet: velut Nicander in Theriacis, quod imbris & caelo descendens stillicidia, folijs ejus non insideant. ποδάρτερον autem quasi multicomam, quod capillos multos ac densos faciat, eorumque defluvia expleat. Callitrichon verò Apulejo, quasi pulchricomum, quod capillos tingat, pulchrioresque reddat. Nec alia ratione Capillus Veneris hac herba dicta est, quam à speciosis reddendis capillis, nec alio nomine Veneris vox adjecta est, quàm quod hac pulcherrima pingatur. Plinio l. 22. c. 21. Adiantum quidam Callitrichon, alij Polytrichon vocant, utrumque, ab effectu, tingit enim capillum &c. crispum densumque, facit & defluere prohibet. Latinis Cincinalis, terra capillus, supercilium terra, crinita. Dioscoridi folia gerit pusilla coriandri similia, in extremo incisuris divisa: virgulas & quibus ea prodeunt, nigro colore nitentes, pratenuis, palmum altas, neg. caulem, neg. florem, neg. semen profert: radix supervacua est.

Genera duo sunt, candidum atque nigrum, Theophrasto l. c. Plinio l. c. duo, candidius & nigrum bevisque: id quod majus est Polytrichon: aliud Trichomanes vocant, utrique ramuli nigro colore nitent, folijs filicis &c. ubi Plinius Trichomanes, alterum Adianti genus sc. candidum facit: cum Theophrasto Trichomanes Adianti genus non sit, sed sui generis planta. Verum Adiantum album & nigrum, nihil differunt, nisi quod Adianto nigro, cauliculi poltiorē nigrē nigricant, foliaque saturatius virent: alba minus.

I. Adiantum folijs coriandri.

Adiantum magnum, Trag.

Adiantum, Matth. Fuch. Dod. ut: Ang. Lac. Ad.

(sive Capillus Veneris verus) Lob. Cast. Lugd.

Adiantum Lugdunense, Cam.

Adiantum nigrum, Cord. in Diosc. & histor.

Fracast. Tab.

Capillus veneris vulgo, Adiantum album Plinij, Cæsalp.

Capillus Veneris verus, Ger.

Hoc variat magnitudine & foliorum crassitie: quare majus & crassioribus folijs.

Adiantum Syriacum, Tab.

Capillum Veneris Syriacum, Ger. vocat.

II. Adiantum folijs longioribus pulverulentis pediculo nigro.

Adiantum pulchrum Lugdunense simile, Thal.

Onopteris nigra, Dod. ut: Lugd.

Adiantum nigrum Plinij. Adv. Lob.

Adianti nigri aliud genus, Cæf.

Onopteris major, Tab. mas, Ger.

III. Adiantum folijs minutim in oblongum scissis, pediculo viridi.

IV. Adiantum fruticosum Brasilianum:

quod in Prodomo descriptum est.

V. Adiantum mas, Tab.

Onopteris femina, Ger.

Quid sit nondum assequor.

TRICHOMANES SIVE POLYTRICHUM officinarum.

Tριχόμανες, quod etiam nonnulli & δίαντρον vocant, Dioscoridi lib. 4. cap. 137. Latinis etiam Trichomanes dicitur: officinis Polytrichum, quod nomen, secundum veteres, Adianti est. Dicitur Trichomanes à vi sua, quod rara cute fluentem capillum expleat & subnasci faciat: μανὼν enim illi rarum vocant & τριχὰ capillum: hinc Latinis capillaris dicitur. Hoc Dioscoridi l. c. folio est Filicis simili at longe exilius: folijs tenuibus, ordine utrinque dispositis lenticula similibus, adversis inter se: in virgulis itidem tenuibus, splendens, nigricantibus, ijsque acerbis.

Yy 2

I. Tri-

I. Trichomanes sive Polytrichum officinarum.
Saxifraga minor prima, Brunf.
Trichomanes, Trag. Matth. Fuch. Anguil. Dod.
ut: Cord. hist. Gefn. hort. Turn. Lac. Adv. Lob.
Cast. Cam.
Trichomanes nigrum, communiter Saxifraga
rubra, Thal.
Trichomanes mas, Tab.
Adiantum rubrum, Lon.

Polytrichum vulgo, Cæf.
Magnitudine variat: hinc & altera figura
Trichomanis maris majoris, Tab.
Trichomanis maris, Ger.
II. Trichomanes minus & tenerius.
Trichomanes candidum, Thal.
Trichomanes minor mas, Tab.
III. Trichomanes ramofum majus & minus.
Trichomanes femina, Tab. Ger.
Trichomanes minor femina, Tab.

RUTA MURARIA SIVE SALVIA VITÆ.

Ruta dicitur, ob quandam soliorum cum Ruta similitudinem, qua, ubi Adiantum verum, ut & Trichomanes defunt, aut vetusta sunt, uti licet: aliqui ob natales Empetron, alij ab effectu inter Saxifragas recensent: & hac sumenda quando Medici recentiores Adiantum recipiunt à Capillo veneris diversum.

Ruta muraria.
Capillus Veneris, Brunf. Trag.
Saxifraga major 2. Brunf.
Saxifraga seu Empetron, Fuch.
Paronychia, Matth. Lac. Cast.

Ruta muraria, Dod. ut: Gefn. hort. Ger.
Adiantum candidum, Cord. in Diof. & h. Guil.
Adiantum album, Lon. Cam. Tab. (Thal.)
Adiantum nigrum, Gefn. hort. Cæf.
Salvia vitæ, Adv. Lob. Lugd.

POLYTRICHUM AUREUM.

non dicitur, à ramulis qui capillorum instar tenues sunt, aureum verò à colore dicitur.

I. Polytrichum aureum majus.
Polytrichum majus, Trag.
Polytrichum Apuleij majus, Fuch.
Polytrichum aureum, Dod. gal. majus, Lugd.
Muscus saxatilis aut sylvestris, Trag.
Muscus 1. terrestris Tragi. Lugd.
Adiantum *apuleij* majus, Thal.
Adiantum aureum, Tab.
Muscus capillaris, Ger.

Hoc cubitalis sæpè longitudinis instar circuiturum inflexum ex Moravia adfertur, & à circulatoribus inter radices & Theriacas suas venale circumfertur, de hoc aureos montes pollicentibus.

II. Polytrichum aureum medium.
Polytrichum nobile vel primum, Trago.

Polytrichum Apuleij aureum vel 2. Lon.
Muscus capillaris, Dod. minor, Ger.
Adiantum *apuleij* medium, Thal.
Adiantum aureum minus, Tab.
Herbula graminis similis in parietibus major & minor, Cæf.

III. Polytrichum aureum minus.
Capillus Veneris, Brunf.
Polytrichum minus, Trag. Apuleij minus, Fuch.
Polytrichum aureum minus, Dod. gal. Lugd.
Polytrichum aureum tertium, Lon.
Musci capillaris altera species, Dod.
Muscus quidam in parietibus & regulis, Cæf.
Adiantum *apuleij* minus, Thal.
Hujus speciem Polytrichi nigri Brocenbergici nomine à D. Fürero accepimus.

ROS SOLIS.

Ros Solis & Rorella. quæ veluti stella alicujus jubare sub Sole fulget, à mirabili natura nomen adeptæ est: nam quantumvis diu sol fervidus astate eam illustret, ejus tamen folia semper rore & humiditate madent, eorumq; lanugo guttulis aspersa manet: & quod admiratione dignum, quod humidum illud in soliorum acetabulis contentum, ubi extremis digitis leviter attingitur, dum adhuc natæ suo solo inhaerens, aut confestim inde evulsa Solis radios experitur, mox velut in exigua filamenta sericea aut candenscula deducitur, quæ confestim concreta, ita postea semper perdurant. Hæc ob magnam cum capillaribus affinitatem, subjungenda fuit. Recentiorum aliqui *Agrostis* sed ab Alchimilla diversum nominant, *Agrostis* enim rorem significat.

I. Ros

I. Ros Solis folio rotundo.
Polytricho minori figuram sine descriptione
addit Tragus.
Ros Solis, Dod. ut: Lon. Cast. Camer. (cui &
Solaria) major, Ger.
Rosa Solis vulgo, Cajo Britanno.
Rorida five Ros Solis major, Lob.
Soliflora seu Sponsa Solis, Thal.
Rorella minor prima, Tab.
Rorella five Ros Solis, Eyst.

Mas & femina, inter Musci albicantis &
subrubentis genera crescunt.

II. Ros Solis folio oblongo.
Rorella five Salsiflora, Cord. hist.
Ros Solis, lunaria quibusdam & Artemilla,
Gefn. de lun.
Ros Solis alia, Dod. Lugd. minor, Ger.
Polytrichum Apuleij album, Lon.
Rorida five Solis ros, Adv. Lob.
Rorella minor 2. Tab.

SECTIO SECUNDA.

FILIX; DRYOPTERIS; LONCHITIS; POLYPODIUM;
HERBA VIVA; ET HERBA MIMOSA.

FILIX ET DRYOPTERIS.

Filix, *ἡλίξ* & *ἡλίξ* Græci dicta, ab aliis avium, quarum speciem ejus folia in ramulis disposita referunt,
cum folijs pennatis sit Filix: & ut Plinius, folia lateribus pennata, unde nomen Græci imposuere.

Duplex est, Græci & Plinio: mas & femina. Mas *ἡλίξ* simpliciter dicta Theoph. 9. hist. 20. at Diosc.
l. 4. c. 186. *ἡλίξ* & *ἡλίξ* & *ἡλίξ* dicitur, cui folia sine caule, sine flore, sine semine, eaq; ex uno pediculo
cubitali ferme longitudine exeunt, incisa & pennarum modo utrinque expansa, sub gravi odore: radicem ha-
bet per summa cespitem nigram, quadrantem longam, multas propagines fundentem & subastringentis gustus.
Vel ut Plinius l. 27. c. 9. Filicis duo genera: pterin Græci vocant, alij blechon quam marem existimant, ex una
radice quam plures exeunt filices, bina etiam cubita excedentes longitudine, non graves odore. Theoph. 1.
hist. 16. Filicis figura multifida, & quasi serrata sicut Abietis.

Femina *ἡλίξ* & *ἡλίξ* *ἡλίξ* Diosc. l. c. 186. *ἡλίξ* Theoph. 9. hist. 20. Plinio l. c. alterum genus thely-
pterin Græci vocant, alij nymphæam pterin: folijs est Dioscoridi filicis, quæ tamen non singulari, ut illa pediculo
hærent, sed è numerosis altioribusq; propaginibus exeunt: radices longæ, obliquæ, numerosæ, ex nigro flavescen-
ter, aliquæ etiam rubra: vel ut Plinius, est singularis, atq; non fructuosa, brevior, molliorq; & densior folijs; ad ra-
dicem canaliculata: radices utriq; longæ, in obliquum nigra, præcipue cum inaruerit. Theoph. l. c. differt femina
Filix à mascula, quod folium unico artu porrectum hæc habeat, & radicem crassam & longam & nigram.

ἡλίξ seu Filix querna: hæc à foliorum figura & loco natali nomen obtinuit: quæ Dioscoridi l. 4.
c. 189. filici similis, at multo tenuiore foliorum incisura radicibus inter se implicitis, hirsutis, gustu astringenti-
bus & ad dulcedinem vergentibus: & Plinio l. 27. c. 9. Dryopteris filici similis in arboribus nascitur, tenui
foliorum subdulcem incisura, radice hirsuta.

Filix ramosa.

I. Filix ramosa major pinnulis obtusis non

dentatis.

Filix sylvestris, Brunf.

Filicis majoris primum genus, Trag.

Filix femina, Matth. Fuch. Dod. Lac. Adv. Lob.

Cast. Lugd. Tab. Ger.

Thilypteris filix femina, Cord. in Diosc.

Filix mas, Gefn. hort.

Filix femina prima, Thal.

Filix, Cæs.

Filix mas major five femina credita vulgo,

Clus. pan.

Hujus folia communiter per ambitum non
sunt dentata vel serrata, aliquando tamen folia
inferiora, ad formam foliorum scabiosæ divisa
reperiuntur.

II. Filix ramosa major pinnulis acutissimis
non dentatis.

III. Filix ramosa non dentata florida.

Filicis majoris alterum genus, Trag. Lugd.

Filix aquatica, Dod. gal. Lugd.

Sideritis fortè Ruellio.

Filix mas, Ang.

Filix latifolia, Cord. hist.

Filix palustris, Gefn. ap. Dod.

Yy 3

Filicis

Filicis genus rartus, Gefn. hort.

Lunaria major seu filix lunaria & Filicastrum, Gefn. de lunar.

Osmunda, Adv. Lob.

an Filix palustris, Cæf.

Hujus species tenuiter dentata reperitur.

IV. Filix ramosa minor pinnulis dentatis.

Pteridion masculum, Cord. hist.

Filix femina altera tenuifolia, Thal.

Filicula petræa femina 4. Tab. ico.

Filix querna seu Dryopteris, Ger.

Filix non ramosa.

I. Filix palustris maxima dentata: in Pro-
dromo describitur.

II. Filix palustris altera subfusco pulvere
hirsuta.

Struthiopteris, Cord. hist. Thal.

III. Filix non ramosa dentata.

Filix, Brunf. vulgaris, Trag.

Filix mas, Matth. Fuch. Dod. ut: Tur. Lac. Lon.

Adv. Lob. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Filix femina, Ang. Gefn. hort. Cæf.

Filix mascula, Cord. in Diosc. & hist.

Filix mas altera, Thal.

Dryopteris, Matth. in epit. & Lugd.

Duplex est: altera cui pinnulæ in ambitu

sunt dentatæ, altera cui non sunt serratæ: illa

Filix mas altera: hæc

Filix mas prima, Thallio dicitur.

IV. Filix non ramosa petiolis tenuissimis
& tenuissimè dentatis.

Filicula petræa prima, Tab.

Filicula montana mas, Ger.

V. Filix querna.

Dryopteris, Brunf. Matth. fol. Cord. in Dioscor.

Gefn. hort. Adv. Lob. Cam. ep.

Filix arborea five Dryopteris, Trag. Lugd.

Dryopteris Tragi & Pteridion femina Cordi,
Thal.

Filix querna, Osmundula, Lon.

Filicis genus parvum alterum in montibus,
Cæfalp.

Filicula petræa femina 2. Tab.

VI. Dryopteris Dalechampij apud Lugd.
quid?

Filix saxatilis.

I. Filix saxatilis folijs non ferratis.

Filicula petræa femina tertia, Tab.

Filicis genus parvum primum in montibus,
Cæfalp.

II. Filix saxatilis ramosa nigris maculis
punctata.

Filix pumila saxatilis prima vel mas, Clus.
pan. & hist.

an Filicula candida & minor, Gefn. ap.

III. Filix saxatilis non ramosa nigris ma-
culis punctata.

Filix pumila saxatilis altera, vel femina, Clus.
pan. & hist.

an Filicula saxatilis, Cam.

Huic similis quam Gefn. in hortor. append.
Chlarosticton vocat, cujus folia supina, punctis
ad luteum viridemque & album colorem mix-
tis tendentibus notantur.

IV. Filicula alpina crispa.

Filicula saxatilis crispa, Pon.

an Pteriadion, Cord. hist. & Thal.

V. Filix saxatilis corniculata.

Filix nuda five saxatilis, Trag. Lugd.

Filix petræa, Lon.

Holostium alterum, Adv. Lob.

Holostium petræum, Tab. Ger.

Muscus corniculatus, Tab. Ger.

Adiantum *ἀνδροχίρον* seu furcatum, Thal.

Filicula fontana.

I. Filicula fontana major, five Adiantum
album filicis folio.

Dryopteris candida, Dod. ut: Lugd.

Adiantum album Plinij, Adv. Lob.

II. Filicula fontana minor.

Filicula fontana, Tab.

Filicula fontana femina, Ger.

III. Filicula maritima ex insulis Stœcha-
dibus.

Chamæfilix marina Anglica, Lob. Lugd.

Filix aculeata.

I. Filix aculeata major.

II. Filix aculeata minor: utraque in Pro-
dromo descripta est.

L O N C H I T I S.

Λογχίτις Dioscoridi l. 3. c. 161. duplex est, altera folijs porri, quam & Plinius l. 25. c. 11. *Lonchitidem* vocat: alia est quam *λογχίτιν τραχύν* dicunt: hac fortè *ἀλόχυν* lancea dicitur, eò quòd folia instar lanceæ in

acutum

acutum desinant. Hæc secundum Dioscoridem folia profert Scolopendrij, sed asperiora majoraq; ac multo magis divisa, de qua in præsens.

I. Lonchitis aspera.

Lonchitis aspera major, Matth. Lugd. Cam.

Lonchitis altera, Ang. Lac. Cast. Lon. cui &

Spicant Germanorum, fortè à radice, Indicam

spicam referente.

Lonchitis altera, quibusdam aspera, Cord. in

Diosc. Ges. hor. app.

Lonchitis altera mas, Taber.

Lonchitis Maranthæ, Ger. ico.

II Lonchitis minor.

Asplenium sylvestre, Trag. Lugd.

Lonchitis aspera minor, Matth. Lugd. Cam.

Lonchitis aspera, Dod. ut: Lugd. Thal. Ger.

Struthiopteris, Cord. hist. icon. Thal.

Lonchitis altera Dioscoridis, Ges. frac. Ad. Lob.

Scolopendrium majus, Lon.

Lonchitis altera fœmina, Tab.

Lonchitis altera Neotericorum, Clus. pa. & hist.

III. Lonchitis folio Ceterach.

Pseudolonchitis aspera, Matth. Lugd. ubi titulus transpositus.

Lonchitis secunda Dalmatica, Ang.

Lonchitis Maranthæ, Lob. altera Maranthæ, Clus. hist.

Lonchitis aspera Maranthæ, Cam. ep.

Lonchitis aspera Ilvensis, Lugd.

Ceterach genus in Ilva nascens, Cæs.

Lonchitis adulterina, Tab.

Filicis genus quæ Lonchitis altera, Clus. pan.

Polypodium Ilvense, Lugd.

Filicula petræa mas, Ger. ico.

Magnitudine variat: hinc 2. figuræ apud Lug.

Lonchitidis asperæ minoris:

Lonchitidis asperæ Ilvensis.

POLYPODIUM.

Polypodium Dioscoridi l. 4. c. 188. Theophrasto 9. hist. 14. Filiculam Gaza vertit: officina Græcum nomen retinere: ratio nominis ex Dioscoridis descriptione colligitur: nascitur palmi altitudine, filici simile, subirsutum & incisum, at non perinde tenui divisura: radix subjacet pilosa, cirros habens ceu polyporum, crassitudine minimi digiti: hæc de rasa coloris intus herbacei comperitur: & Plin. l. 26. c. 8. Polypodium quam nostri filiculam vocant, similis enim est filici: radix pilosa, coloris intus herbacei, crassitudine minimi digiti, acetabulis cavernosa ceu polyporum cirri, subdulcis: in petris nascens, aut sub arboribus vetustis.

I. Polypodium vulgare.

Polypodium, Brunf. Trag. Matth. Ang. Fuch.

Dogal. C. r. in Diosc. & hist. Ges. hor. Tur Lon.

A. Lob. cui & herba radioli Apuleji, Cæs. C. st.

Cam. Tab. Gerard.

Polypodium majus, Dod.

Polypodium primum, Lugd.

Laudatur quod in quercu nascitur: reperitur

in fago, corylo: in antiquis & cædis salubus,

gustu amarior provenit, quæ sylvatica cense-

tur: in rudibus saxosis.

II. Polypodium minus.

Polypodium alterum, Matth. Lac. Lugd. primum, Tab.

Polypodium minus, Dod.

Polypodium quercinum, Ger.

III. Polypodium exoticum folijs quercus.

Polypodium Indicum, Clus. exot. l. 4. c. 17.

Hoc sub incognita Americana, à Jo. Pona Verona accepimus.

HERBA VIVA FOLIIS POLYPODII.

Herba Viva dicitur, eò quod si eam quis apprehendere cupiat, folia illico contrahat & sub tenues ramulos recondat: si vero quis apprehendat subito licet, adeo marcida conspiciatur, ut exsiccata existimetur: at tamen si quis manum retrahat, illico nitorem recuperat: & toties marcescit, aut revirescit, quoties comprehenditur, aut manus ab ea retrahitur.

Anonymos in Malavar, Garziæ, Cast.

Planta in Peru nascens, Fran. Lopez de Gomar.

Herba Sentiola, id est, Sensitiva Lusitanis, Linf.

par. 4. Ind. Or. c. 17.

Herba viva, Guiland. pap. Acoftæ, Clus. Lugd.

cui & herba amoris.

an Æschynomine Apollodori, Scalig. Lugd.

an Planta per terram diffusa, quam si quis attin-

gat statim contrahitur, ut Brassica Murctana,

ex India Occid. missa Monardi, Lugd.

HERBA

HERBA MIMOSA FOLIIS FOENU.

græci sylvestris.

Herba Mimosa nuncupatur, quoniam manu adnota senescit & marcescit, manu verò remota, pristinam virorem recipit, sed non adeo celeriter ut prior: colore & sapore est Glycyrrhica & multis notis cum Fenugraeco sylvestri Tragi, Clusio monente, convenit.

Herba molle & herba delicata vulgo, Acoftæ. Clusius notis suis in Acoftam diversam plane Herba mimosa, Lug. eadem figura quæ Acoftæ. figurâ proposuit, herbam mimosam nominans.



SECTIO TERTIA.

MUSCUS; LICHEN; LENTICULA PALUSTRIS.

M U S C U S.

Muscus ὄρεον ἢ ἀνὰ ὄρεον Græcis appellatur, ut Dioscor. l. i. c. 20. Atticus Sphagnum & Hypnon: Plinius lib. 12. c. 23. Bryon & Sphagnum: l. 24. c. 7. Sphagnos sive Sphacos sive Bryon vocat: Muscus vocatur omnis villosa substantia, caudicibus annosis, aut saxis madidis, aut aquis palustribus, aut mari adnascens. Differentia: multiplex est: arboreus, de quo Dioscorides l. i. c. 20. Plinius l. 12. c. 23. terrestris, saxatilis, maritimus, de quo Plinius lib. 4. cap. 99.

MUSCUS TERRESTRIS.

Muscus terrestris repens.

I. Muscus vulgatissimus.

Muscus hortensis, Trag.

Muscus terrestris vulgaris, Dod. Lob. ico.

II. Muscus vulgaris pennatus major.

III. Muscus vulgaris pennatus minor.

Hi duo sub 1. Musco in Prodr. describuntur.

IV. Muscus filicinus major.

Muscus filicinus, Tab. Ger.

In hoc triplex varietas observatur.

V. Muscus filicinus minor floridus: in Prodromo sub 2. descriptus.

VI. Muscus abietis facie: qui 3. in Prodromo.

VII. Muscus denticulatus major.

Muscus terrestris denticulatus, Lob. Lugd.

Muscus terrestris minor, Dod.

Muscus tertius, Tab.

Muscus minor denticulatus, Ger.

VIII. Muscus denticulatus minor.

Muscus terrestris repens, Clus. hisp.

Muscus terrestris minor alter, Dod.

Muscus terrestris denticulatus alter, Lob. Lugd.

Muscus terrestris Lusitanicus, Clus. hist.

Muscus denticulatus, Ger.

Muscus secundus, Tab.

IX. Muscus denticulatus similis.

Muscus montanus, Taber.

Muscus terrestris vulgaris, Ger. ico.

X. Muscus terrestris clavatus.

Weintraut / Brunf. qui vinum pendulum restituit.

Muscus terrestris, Trag. Matth. l. ac. Dod. Cast.

Muscus urinus vel pes urinus, Gef. frac.

Lycopodium, id est, pes lupi, Dod. gal. Tab.

Chamæpeuce, Cord. hist. ico. Gef. Tur.

Permonaria sive Pulmonaria, qua pro spica

Celtica usi sunt, Ang.

Muscus clavatus, & Pes leoninus, Lob. Ger.

Muscus terrestris 2. & alius terrestris, Lugd.

Musci genus, quod pro spica vendebatur, Cæs.

Selaginis species altera, Thal.

XI. Muscus clavatus folijs cupressi.

Savina sylvestris, Trag. Gef. hor. Lon.

Muscus terrestris tertius, Lugd.

Chamæcyparissus, Tur. Tab. Ger.

Savina Tragi sylvestris, seu Silaginis Plinianæ

prima species, Thal.

Plinius l. 25. c. 11. hæc habet: Similis herbæ Sabinae est Selago appellata.

XII. Herbæ Musco similes, quas Terenacenses in fasciculum collectas & funiculo satis

longo colligatas in mare abijciunt, ad pisces capiendas: par. 3. Ind. Or.

XIII. Toucon herba apud Brasilianos qua

ad piscandum utuntur, spinas in hamorum modum componunt, lineamq; herba illa conficiunt: Lerijs descr. Brasil. c. 11.

Muscus terrestris ramosus.

I. Muscus erectus ramosus saturatè viridis.

Selago

Selago tertia, Thal.

Hæc inter foliola aliquando granula habet.

II. Muscus erectus ramosus pallidus.

Muscus scoparius, Lob. Lugd.

Muscus terrestris, Tab.

Muscus terrestris scoparius, Ger.

Hic claviculo vulgaris modo non insignit.

III. Muscus terrestris candidus ramosus.

IV. Muscus ramosus repens spicatus.

V. Muscus ramosus repens apicibus candidibus.

VI. Muscus ramosus erectus major.

VII. Muscus ramosus erectus minor.

VIII. Muscus ceranoides major & minor,

IX. Muscus cupressiformis ramosus.

Septem posteriores in Prodr. describuntur.

X. Muscus polytrichoides triplex: in Prodr. drom. descriptus.

XI. Muscus parvus stellaris.

Muscus in ericetis proveniens, Lob. belg.

XII. Muscus stellaris roseus: in Prodr. drom. descriptus.

XIII. Muscus pyxiodes terrestris.

Muscus terrestris pyxiditatus alabastricolos imitatus, Lob. belg.

XIV. Muscus pyxiodes saxatilis, in Prodr. drom. descriptus.

Muscus terrestris coralloides.

I. Muscus terrestris coralloides erectus incanus.

II. Muscus terrestris coralloides erectus cornibus rufescentibus: in Prodr. uterq; sub II. & 12. descriptus.

III. Muscus coralloides five cornutus montanus.

Muscus corallinus five Corallina montana, Tab. Gerard.

IV. Muscus coralloides saxatilis, cervi cornua referens.

Lythobryon coralloides, Colum.

Variat: major colore virente: minor colore cinereo.

Muscus arboreus.

I. Muscus arboreus: Ulfæ officinarum.

Muscus arboreus, Trag. Matth. Ang. Dod. Lug. Cast. Thal.

Muscus, Dod. gal. Cord. in Diosc. arborum, Lon. Tabern.

Muscus quernus, Lob. Ger.

Musci genus, quod privatim Splachnon vocant, Cæf.

Unus tenuior, crassior alter, brevior, alius prolixior: omnes candescentes, pauci rutilantes, quandoq; nigri.

Reperitur potissimum in quercu, populo, ulmo, betula, pomo, pyro, pinu, picea, piceastro, abiete, cedro, larice & alijs complurimis. Verum primæ nobilitatis & odorati sunt, Cedrinus, lariceus, piceus, pineus & abietinus: Secundum locum tenet populneus, sed candidus præstat, nigricans improbat: rutilans medium tenet: vilissimus quernus.

II. Muscus capillaceus longissimus.

Muscus capillaceus cinerei coloris, è ramis Illicis dependens, Clus. hist.

an Muscus ex præaltis arboribus ad terram usq; demissus, coloris viridis in cæruleum tendens, qua Regina in Florida cingitur, tenuib. staminibus catenularum instar invicem cohærentibus: par. 2. Amer. fig. 39. quemadmodum Rex sedem suam Musco lentiscino regit: par. 2. Ame. narr. 4.

III. Muscus arboreus cum orbiculis.

Muscus feniculaceus, Lugd.

Muscus ramosus & muscus ramosus floridus, Taber. Ger.

Muscus quernus fruticosus *το χέρον*, Col.

Potissimum in Quercu & Fago varians umbellis majorib. & minorib. planiorib. & radijs multo diametro longiorib. ramosis ac hirsutis.

IV. Muscus arboreus capitulis cavis.

Muscus alter *πλάτυνον διασπρόν*, Col.

V. Muscus arboreus coralloides.

Muscus alter quernus coralloides *ἀφύλλον*, Col.

VI. Muscus arboreus nodosus.

Dendrobryon geniculatum, Col.

VII. Muscus pulmonarius.

Pulmonaria, Trag. Matth. Fuch. Dod. ut: Gesn. hor. Lac. Lon. Tab.

Pulmonaria prima, Cast. tertia, Clus. pan.

Pulmonaria fungosa, Lugd. vulgaris, Thal.

Muscus pulmonarius, Lob.

Pulmonaria, Lichenis quoddam genus, Cæf.

Hepatica terrestris, Ger. ico.

Variat lacinijs latioribus & angustioribus & hæc Lichen arboreus, Tab. & Ger. dicitur. Arboribus præsertim Quercui, Sorbo aucupariæ & alijs adnascitur: petris quoque, sed hoc candidius est.

VIII. Muscus crustæ modo arboribus adnascens.

Lichen Dioscoridis & Plinij alterum, Col.

Zz

Procura

Procura Valesianorum.

In arborum caudicibus, in petris, tophis & testorum tegulis veluti patella adhæret: colore

varians, viridante, flavescente & cinereo vetustate petris adhæret: arborum caudicibus lutescens crustosa & maior observatur.

MUSCUS SAXATILIS VEL LICHEN.

Lεχλὺς Græcis, Latinis similiter Lichen sic dicitur Galeno, quia lichenes, id est, impetigines curat. Dioscoridi l. 4. c. 53. λεχλὺς, quæ petris innascitur & aliqui βόον appellat, ceu muscus est roscidus petris inherens. At Plinio duplex est l. 26. c. 4. Lichen herba in Lichenis remedijs omnibus præfertur, inde nomine invento: nascitur in saxosis folio uno, ad radicem lato: caule uno parvo, longis folijs dependentibus: est aliud Lichenis genus, petris tantum inherens ut Muscus: qui & ipse illinitur.

I. Lichen petræus latifolius sive Hepatica fontana.

Hepatica, Brunf. Lon. prima, Tab.

Jecoraria seu Hepatica fontana, Trag.

Lichen, Matth. Fuch. Ang. Dod. ut: Cord. in Dioscor. Lac. Tur. Cast. Lugd. Cæs. Thal.

Lichen primus, Lob. petræa, Ger.

II. Lichen petræus stellatus.

Lichen secundus, Lob. Lugd.

Hepatica secunda, Tab. Ger.

III. Lichen petræus umbellatus.

Lichen tertius, Lob. Lugd.

Hepatica tertia, Tab.

IV. Lichen petræus muscosus racemosus,

in Prodomo sub 15. descriptus.

V. Lichen petræus cauliculo pileolum sustinente.

Lichen Plinij primus pileatus, Col.

VI. Lichen petræus cauliculo calceato.

Lichen alter minor caule vincto, Col.

VII. Lichen petræus minimus fructu orobi.

Lichen alter acaulis, Col.

VIII. Muscus saxatilis ericoides: qui 7. in

Prodomo.

IX. Muscus saxatilis repens coma sparsa.

Duplex est latiore folio in aquis, qui Muscus est 14. in Prodomo: angustiore expanso, qui supra lapides Haryconia reperitur.

LENTICULA PALUSTRIS.

Lens sive Lenticula palustris, Dioscoridi l. 4. c. 88. φανός ἐν τῶν τετρακτύων dicitur (quod foliolum sit lenticula forma) quæ in aquis pigris stagnantibus reperitur, muscus scilicet lenticula similis.

I. Lenticula palustris vulgaris.

Lenticula aquatica, Brunf. Thal.

Lenticula palustris, Trag. Cæs. Tab.

Lens palustris, Matth. Dod. gal. Ang. Cord. in Dioscor. Tur. Lac. Lob. Lugd. Ger.

Lenticula, Ad.

II. Lenticula palustris bifolia fructu tragano.

Callitriche Plinij, Colum.

III. Lenticula aquatica trifolia.

Hederula aquatica, Lob. belg. Ger.

Hederula palustris, Tab.

IV. Lenticula palustris quadrifolia.

Lens palustris altera, Matth. Lac. Lug. Cast. ap.

Lenticula palustris secunda, Tab.

an Lenticulae alterum genus, Cæs.

Lemna Theophrasti, Lugd.

Theophrasto 4. hist. 11. λέμνα quod vocatur, altius mergitur in aqua.

V. Lenticula palustris latifolia punctata.

Stratiotes aquatica Dioscoridis, Cæs.

VI. Lenticula palustris Aegyptiaca, sive Stratiotes aquatica folijs Seda majore latioribus.

Hayhalem elmaoin, quasi dicas aquosum sedum, Stratiotes Dioscoridis, Alp.

Dioscoridi lib. 4. cap. 102. ὁ γαστήρως sive νοσήμιον ὁ γαστήρως, ex eo cognomentum traxit, quod

aquis supernatet, & sine radice vivit: folium

habet Aizoo simile, at majus. Plinio lib. 24. cap.

18. Stratiotis in Aegypto tantum & inundatione Nili nascitur, Aizoo similis, ni majora haberet folia.

VII. Quadrifolium aquaticum nobis incognitum.

Tetraphyllum, Lugd.

SECTIO

SECTIO QUARTA.

MUSCUS MARITIMUS; FUCUS SIVE ALGA; CORALLINA;
CORALLUM; PORUS; ANDROSACE; ALCYONIUM;
SPONGIA; URTICA MARITIMA.

MUSCUS ET FUCUS MARINUS.

Muscus Marinus βένος θαλάσσιος Dioscoridi lib. 4. cap. 99. in saxis testuq, ad mare nascitur, capillaceus, gracilis sine caule.

Fucus Marinus φύκος θαλάσσιος lib. 4. cap. 100. quoddam latum: alterum oblongum & quadautenus puniceum: tertium candidum, quod in Creta nascitur juxta terram, pulchrè floridum, neque corruptioni obnoxium. Et Theophrasto 4. hist. 7. φύκος & plura sunt genera: quoddam folio lato, colore herbido, quod Porrum quidam appellant, alij cingulum radice hirta, extrinsecus squammata: intrinsecus longa admodum crassaq, &c. Aliud folio crinito terra ipsi adherens, sepeq, à mari tantum alluitur. Alterum altius degit, in mari extersa circa Herculis columnas nascitur, mira magnitudine & latitudine, & ut ferunt, amplius quàm ut manu comprehendi possit, &c. Alga verò proveniens in alto, quam Spongiarij pelagicum deferunt, in Creta insula juxta terram, super saxa plurima oprimaq, provenit, qua non solum vitras, sed etiam lanas vestesq, inficiunt, &c. Sunt alia Graminibus proxima, quippe folio simili, radice geniculata, longa, oblique adharente modo graminis, & caule calamaceo ut gramen, magnitudine Alga minore. Est aliud βένος dictum, folio coloris herbidi, amplo, nec Lactuca dissimili, rugosiore tamen & veluti contractio: caret caule: sed ab uno initio plura folia ejusmodi exeunt & rursus ab alio: nascitur super regulas fistiliasq, juxta terram. His verbis Theophrastus Fuci marini quinque genera proposuit: Zosteræ sive Prasæ: capillaceum sive feniculaceum: tinctorium spongiariorum sive pelagicum: gramineum: lactuceum. Plinio qui βένος & φύκος confundit lib. 27. cap. 8. Bryon marina herba sine dubitatione est, lactuca folijs similis, rugosa veluti contracta sine caule, ab ima radice exeuntibus folijs: nascitur in scopulis maximè testisq, terra comprehensis. Idem lib. 13. cap. 25. (de Phycis sive Algis agens) Non habet lingua alia nomen, quod Greci Phycos vocant: quoniam Alga herbarum magis vocabulum intelligitur. Folia lata, colore viridi gignit, quod quidam prasæ vocant, alij Zosteræ. Alterum genus ejusdem capillaceo folio simile feniculo, in saxis nascitur, superius in vadis haud procul littore. Verno utrumque & interit autumnò. Circa Cretam insulam nato in petris purpuræ quoque inficiunt: laudatissimo à parte Aquilonis una cum spongijs. Tertium graminis simile, radice geniculata, & caule qualiter calami. Aliud genus Phycorum, Bryon vocatur folio Lactuce, rugosiore tantum, jam hoc interius nascens.

Muscus maritimus.

I. Muscus capillaceus multifido folio albidus.
Muscus marinus vulgarissimus, Lob. Lugd.
Muscus marinus 2. Dod. at primus, Eid. belg.
Muscus marinus 3. Tab. marinus, Ger.
Muscus marinus herbaceus mollior, Cæs.
Muscus albus marinus, Imper.

II. Muscus capillaceus multifidus niger.
Fuci marini nigri repentis nomine ex mare
Balthico accepimus.

III. Muscus maritimus viridis multifido
folio.

Palmula marina, Imper.

Muscus marinus, Clus. hist.

Hujus diversæ sunt species.

IV. Muscus maritimus tenuissimè dissectus
ruber.

an Fucus sive Alga tinctoria, Lugd.

V. Muscus pennæ similis.

Penna marina, Imper.

VI. Muscus maritimus filicis folio.

Myrophillum pelagium Cortusi, Clus. hist.

VII. Muscus maritimus Adianto affinis.

Pennaria marina, Imper.

VIII. Muscus maritimus Adianto similis
alter.

Polypodium marinum, Imper.

IX. Muscus maritimus Gossypio similis.

Gossypium muscus, Imper.

X. Alga bombycina, in Prodromo descripta.

Muscus Coralloides.

I. Muscus maritimus sive Corallina officinarum.

Muscus marinus, Matth. Ang. Dod. ut: Cord.
in Diosc. Lac. Tur. Cast. Lugd. Cæs. Tab.

Corallina, Lob. Lon. Lem.

Z z 2

Fucus

Fucus capillaceus, Lugd.

II. Muscus coralloides squammulis loricatus.

Bryon thalassion, Tur.

Muscus marinus 3. Dod. vel 2. Eid. belg.

Muscus candidus coralloides squamatus, Lobel.

Muscus marinus candidus coralloides, Lugd.

Corallina altera, Tab.

III. Muscus coralloides latifolius.

Muscus coralliformis, Lob. belg.

IV. Musc. foliolis latiusculis ambitu dissectis.

Muscus marinus 3. Dod. belg.

Fuci subrotundi.

I. Fucus folio rotundo.

Sertolaria, Imper.

Corallina latifolia & Opuntia marina, Cortuf.

Lichen marinus, Clus. hist.

II. Lichen maritimus, Lob. belg. Tab.

III. Fucus umbilicus marinus dictus.

Umbilicus marinus, Imper.

IV. Fucus fungis affinis.

Fucus fungularis, Imper.

Est major & minor.

V. Fucus cavi.

Herba cava, Imper.

Fucus five Alga latifolia.

I. Muscus marinus Lactuce folio.

Fucus marinus 1. Dioscoridis, Theoph.

Bryon Lactuce folijs Plin. & Lob.

Muscus marinus alter, Matth. Cast.

Muscus marinus Theophrasti, Dod. gal. Lugd.

Therapidion Cratevæ, Ang.

Bryon thalassion, Tur.

Fucus marinus prior, Dod.

Muscus marinus virens latifolius, Dod. belg.

Lactuca marina, Tab.

II. Muscus lactuce marinæ similis.

Fucus linza dictus, Imper.

III. Alga intybacea diversa à Musco primo.

Fucus five Alga intybacea, Lugd.

IV. Alga longissimo lato tenuique folio.

Sub Fucis 4. in Prodomo describitur.

V. Alga longissimo lato crassoque folio.

Fucus 3. in Prodomo.

VI. Alga latifolia chartæ similis costa carens.

Folium grande ex Algæ genere, quod ex Madera advehitur cum Saccharo, Cæsalp. cap. de Alga & de Musa.

VII. Alga latifolia coriacea.

Palmifolium giganteum five fucus giganteus, Imper.

an Urrack Nortmanorum, Lob.

VIII. Alga membranacea ceranoides.

Fucus 6. in Prodomo.

IX. Alga maritima gallopavonis plumas referens.

Fucus 7. in Prodomo.

Fucus five Alga angustifolia.

I. Fucus arboreus polyschides edulis: 2. in Prodomo.

II. Fucus alatus five phasganoides: 1. in Prodomo.

III. Fucus longo angusto crassoque folio: 3. in Prodomo.

an Fucus Zooster, Lugd.

Fuci maritimi 2. species, Dod. belg.

IV. Fucus angustifolius ligulas referens.

Fucus marinus alter, Dod. belg.

V. Alga angustifolia vitrariorum.

Fucus marinus primus, Ang.

Fucus marinus, Lac. alter, Dod.

Alga, Cæf. Imper. marina, Lob. ico.

Fucus five Alga marina graminea, Lugd. cum duplici figura.

Hæc duplex: folijs alia latioribus, alia angustioribus, utriusque folia initio virent, dein cum exiccantur albescunt: verum etiam angustifolia candidissima reperitur.

VI. Alga cornu cervi divifura.

Herba Cretica quæ tinctoribus Rubella, hoc nomine Imperatus misit.

VII. Alga gramineo folio.

Algæ minimum genus, Cæf.

Fucus five Alga capillaceo folio.

I. Alga viridis capillaceo folio.

an Conferva Plinij Ang.

Conferva Plinij, Lob. Lugd. Imper.

Linum marinum, Imper. qui hoc nomine misit.

Duplex est: alia in maritimis quæ Muscus tomentosus, five Conferva; alia in aquis stagnantibus, quæ Linum aquaticum Imper. dicitur.

II. Alga nigro capillaceo folio.

Filum maritimum Germanicum in Prod.

III. Alga fontalis trichodes.

Conferva trichodes, vel Trichomanes aquaticum, Lugd.

IV. Alga in tubulis aquam fontanam dulcentibus.

FUCI

FUCI ARBORIBUS, FRUTICIBUS.

vel etiam herbis assimilati.

Nascuntur etiam in mari Fuci qui fruticibus arboribusve assimilantur: quare Theophrastus 4. hist. 7. scribit, nasci Quercus & Abietes super lapides fistulias, radicibus carentes, sed patellarum nudo adherentes, &c. Ibidem & Palma Pelagica meminit. Et Plinius lib. 13. cap. 25. in alto vero Abies & Quercus cubituli altitudine, ramis earum adherent conche: Quercu etiam tingi lanas tradunt. Glandem etiam quassam ferre in alto, &c. Vitis passim nascitur, sed Ficus sine folijs rubro cortice & palma fruticum generis: extra Herculis Columnas, porri fronde nascitur frutex & alius lauri & thymi, &c.

Fuci folliculacei.

I. Fucus maritimus nodosus.

Fucus maritimus 3. Dod. belg.

II. Fucus maritimus alter tuberculis paucissimis.

Fucus marinus 4. Dod. belg.

III. Fucus maritimus, vel Quercus maritima vesiculas habens.

Quercus marina, Lobel. Clus. hisp. Tabern. at 1. Eid. histor.

Fucus marinus primus, Dod. belg.

an Alga vulgaris ramosa, Lem. ocul.

IV. Fucus maritimus vel quercus maritima, foliorum extremis tumidis, quam aliqui glandiferam vocant.

Quercus marina altera, Clus. hist.

Hec cum priore una figura à Lobelio, Tab. & Clus. in hist. exprimitur.

V. Fucus maritimus folijs tumidis barbatis: in Prodr. sub Quercu maritima 3. describitur.

VI. Fucus folliculaceus fœniculi folio longiore.

Phucus marinus folio fœniculi, Ang.

Fucus ferulaceus, Lob. Lugd.

an Algæ species 2. Lem. ocul.

VII. Fucus folliculaceus folijs fœniculi brevioribus.

Muscus marinus virens tenuifolius, Dod. belg.

VIII. Fucus folliculaceus folijs Abrotani.

Fucus marinus folijs Abrotani maris, Lob.

Fucus marinus tenuifolius, Tab.

Muscus marinus folijs abrotani, Lugd.

Gongularis marina seu Abies marina, Theoph.

Imper.

IX. Fucus racemosus vel racemus marinus.

Acinaria marina prima, Imper.

X. Fucus folliculaceus serrato folio.

Lenticula marina serratis folijs, Lob. Lugdun.

Tabern.

Sargazo Acoftæ, Lugdun. Linc. part. 3. Orient.

cap. 4. 5. 8. & part. 4. fig. 10.

Vitis marina Theoph. Alga prima, Lem. ocul.

Acinariae marinæ 3. species, Imper.

an Klaptmutsen herba magna copia fluctuans: part. 5. Ind. Orient.

XI. Fucus maritimus bacciferus.

Herba mari innatans folijs rutaceis, baccis Juniperinis similibus: mare ita herbidum efficiens ut pratum referret: Leriio desc. Brasil. c. 20.

XII. Fucus folliculaceus linariæ folio.

Lenticula marina Serapionis & Ulva marina quorundam, Lob. Lugd.

Lenticula marina Serapionis, Tab.

Acinariae marinæ altera species, Imper.

XIII. Abieti similis maritima.

Muscus coralloides alter, Lob. Lugd.

Abies marina belgica, Clus. hisp. & hist.

XIV. Tamarisco similis maritima.

Myrica marina Batavica, Clus. hist.

an Tamariciola Fucus, Imper.

XV. Fucus cupressifolius similis.

Fucus cupressinus, Imper.

XVI. Salix maritima.

Salix marina testis ostrearum & saxis innascens, Lugd.

XVII. Erica similis maritima.

Frutex marinus Ericæ facie, Clus. exot. l. 6. c. 5.

XVIII. Resedæ similis maritima.

Planta marina resedæ facie, Clus. exot. l. 6. c. 6.

XIX. Equifeto similis saxea.

Hippuris saxea, Clus. exot. l. 6. c. 8.

XX. Abrotano similis saxea.

Planta saxea abrotano similis, Clus. exot. l. 6. c. 7.

Fuci diversi ex Imperato: qui cum nobis incogniti, in certas classes reponi non potuerunt.

I. Fucus marinus Roccella tinctorum.

II. Fucus capillaceus Roccella.

an Fucus 3. Ang.

III. Fucus verrucosus tinctorius Roccella.

IV. Fucus lumbricalis, aliquibus Corallina.

Z z 3

V. Fu-

- V. Fucus marinus lanuta.
 VI. Fucus radicella five Vermicularis.
 VII. Fucus terzola, Vermicularis species.
 VIII. Fucus forcillata lumbricalis species.
 IX. Fucus tremula.
 X. Fucus scoparia, Pennachio marinus.
 XI. Fucus vermicularis laqueus dictus.

- XII. Fuci cristati sc. Quercus & Ilex marina.
 XIII. Fucus vermicularis duplex Retusa & Sempia.
 XIV. Mufcus marinus trifolia.
 XV. Mufcus marinus Alghetra.
 XVI. Fucus axungiola.
 XVII. Fucus aliquibus palma marina duplex vel cortice rugoso vel laevi.

C O R A L L I N A.

- I. Corallina fruticosa recta alba.
 Juncus petrosus, Ang.
 Lithophyton marinum albicans, Gefn. foss.
 Quercus marina Theoph. Clus. hisp. & exot.
 Corallina alba, Lob. Tab.
 Corallium album, Lugd.
 Mufcus marinus fruticosus, Cast.
 Corallij similes frutices, Cæs.
 Ligno intus durissimo & nigro cui crusta obducitur, alijs candida, alijs cinerea, alijs rubens, testacea substantia.
 II. Corallina lutea punctata.
 III. Corallina fruticosa purpurea.
 Lithophyton marinum rubri seu purpurei coloris, Gefn.
 Corallina rubens Antiphatis facie, Lob.
 Corallina rubra, Tab.
 Quercus marina Theophr. Clus. exot. libr. 6. cap. 4.
 Quercus marina cum sua basi, Ejd. curis post.
 IV. Corallina nigra veluti spinis exasperata.
 V. Corallina nigra setacea hirsuta.

- Antiphates 2. species, Ponæ.
 VI. Corallina nigra setacea.
 Antiphates five Corallina 3. Ponæ ital.
 VII. Corallina nigra setacea circumvoluta.
 Antiphatis five Corallina 3. altera species, Ponæ ital.
 VIII. Eschara coralloides, Clus. exot. l. 6. c. 9.
 IX. Corallinae affinis Nodularia.
 Nodularia, Imper.
 Variat colore albo, pullo, puniceo.
 X. Corallinae facie grumoso cortice.
 Arbuscula marina coralloides, Clus. exot. l. 6. c. 1.
 XI. Corallina alba nodosa: quæ 1. in Prod.
 XII. Corallina cinerea rugosa, 2. in Prod. quæ duplex est.
 XIII. Corallina cortice reticulato maculoso purpurascens.
 Frutex marinus elegantissimus, ad Palmæ marinæ genus Theoph. accedens, Cl. exot. l. 6. c. 12.
 XIV. Corallina reticulato cortice altera.
 Planta marina retiformis, Clus. exot. l. 6. c. 3.
 XV. Corallina pallide flavescens cortice lævi: quæ 3. in Prodomo.

C O R A L L U M.

- I. Corallum rubrum.
 Corallium, Gefn. Lob. Lugd. Cæs.
 Corallum rubrum, Imper.
 Variat: coloris vel intense, vel dilute rubri est, vel subflavescentis, vel fusci.
 II. Corallum nigrum.
 Corallium nigrum, Gefn. Cæs.
 Antiphates five Corallium nigrum, Lob. Lugd.
 III. Corallum extra rubens intus nigrum, Cæsalp.
 IV. Corallium album: & Lob.
 Corallium album, cujus nec apud Græcos, nec Latinos mentio sit, Cæs.

- In hoc varietas est: asperum est & striatum.
 V. Corallum album ramosum.
 Corallum album fistulosum, Imper.
 VI. Corallum album ramosum alterum.
 Coralloides seu Coralli albi varietas, Lob. Lug.
 VII. Corallum album verrucosum punctatum.
 Corallum album punctatum, Imper.
 VIII. Corallum album stellatum.
 Corallum stellatum, Imper.
 Est majus & minus.
 IX. Corallum album articulatum.
 Corallum articulatum ex Majorica, Imper.

Kopédon, inquit Dioscorides l. 5. c. 139. aliqui *Libédon* appellant, marina planta est, quæ alto mari exempta duratur statim atq; emergit, quasi à circumfuso nobis aëre lapidescat concrefcere. Probatissimum rubens colore *Sandrachæ*, aut *Sandycis* saturatæ, ut quod in lapidis duritiem coit scabrosum, fistulosum seu concavum, præterea inane seu spongiosum, vitiosum existimatur. Quod *Antirrhoe* vocatur corallium quoq; est, sed specie tantummodo distans: est colore nigro, arboris & ipsius figura, at magis ramosum. Plinio l. 32. c. 2. Corallio forma est fruticis, coloris viridis: bacca ejus candida sub aqua & molles, exempta confestim durantur & rubescunt quasi Corna sativa specie atq; magnitudine: ajunt tractu protinus lapidescere. si vivat: itaq; occupari, evellig, retibus, aut acri ferramento præcidi: hac de causa Curallium vocitatum interpretantur (ore cōd' d' d' n' g' g' e' r' e' a, quoniam in mari tondetur.) Probatissimum quam maxime rubens & quam ramosissimum, nec scabrosum aut lapideum, vel rursus inane aut concavum: auctoritas baccarum ejus non minus in Indorum viris quoq; pretiosa est, quam seminis nostris uniones Indici (sed putavit Plinius baccarum formam artificio paratam, sponte nasci.) Antiphatia verò l. 7. s. 10. inter gemmas meminit, quæ nigra sit & non trafulcens. Hujus volunt etiam meminisse lib. 3. cap. ult. his verbis: *Isidos plocamon*, corallio simile sine folijs: præcisum mutato colore in nigrum durescere: cum cadat frangi: item alium qui vocetur *charitoblepharon* efficacem in amatorijs: hac Plinius. Hoc posterius nigrum esse corallium, hinc quidam arbitrantur, quod olim in supercilij seminarum, color niger pulcherrimus & vetustissimus haberetur. Refert Linscottus par. 3. Ind. Orient. cap. 1. ad caput Bone sibi scopulos esse, qui magna ex parte Corallio, eoq; acutissimo, asperissimo, & omnifarj coloris, ut nigri, albi, aruginosi seu viridis, constant.

PORI CORALLO AFFINES.

Plinius l. 36. c. 17. Pori lapidis servandis corporibus idonei meminit: Pario simili candore & duritie, minus tamen ponderosus, qui Porus vocatur. Cum Plinius ita brevis sit, an de his locutus ignoramus: Equidem lapides substantia sunt Corallij proximi, & potissimum porositate, unde nomen habent. à Corallij differunt.

- I. Corallo affinis Porus magnus.
- Porus magnus, Imper.
- II. Corallo albo affinis Porus ramosus.
- Porus ramosus, Imper.
- III. Milepora, Imper.
- IV. Corallis affinis Madrepora stellata.
- Madrepora, Imper.
- V. Corallis affinis Madrepora ramosa.
- Madrepora ramosa, Imper.

In eadem planta varietas & in substantia &

- colore pro partium diversitate reperitur.
- VI. Porus facie Sabinæ, Imper.
 - VII. Porus cervinus, Imper.
 - VIII. Porus reticulatus & Eschara marina, Imper.
 - IX. Frondipora, Imper.
 - X. Porus tabularius, Imper.
 - XI. Porus anguinus, Imper.
 - XII. Corallij affinis Alcyonium rubrum.
 - Tabularia purpurea, Imper.

ANDROSACE.

Agæœnes Dioscoridi l. 3. c. 150. herba est alba tenuibus cirris sine folijs, folliculum habens in cacumine, quo semen continetur: in maritimis Syria nascitur. Idem Plinius l. 26. c. 4. *Androsaces* dicitur, quod *Hydropticorum* aquas ducat, vel *Hydroaces*, quia non nisi in aquis crescat.

- I. Androsaces petreæ innascens vel major.
- Androsaces, Matth. Lon. Cast. Lugd.
- Musci marini genus, Guil.
- Hanc ex Istria habemus, & à sequenti cirris longioribus, folliculis sive clypeolis (sed semine carentibus) in cacumine minoribus, differt.
- II. Androsaces Chamæ conchæ innascens, vel minor.
- Androsaces, Coryledon foliosum marinum,

Ad Lobel. icon.

Androsaces, Lobel. Lugd. (& Umbilicus marinus Monspel.) Cam. ep. utramque una figura exhibet.

Fungus marinus minimus, Cæs.

Androsace Matthioli, Tab. Ger.

Hanc communiter conchæ, rarius petreæ innascentem in stagnis circa Magalonam & Frontignanum observavimus.

ALCYO-

A L C Y O N I U M.

Aλκυών Dioscoridi l. 5. c. 136. cuius quinq. genera facit: unum spissum est, acerbis saporis, spongiosa facit, insuperq. virosum, grave ac piscem olens: alterum oculorum pterygio aut spongia simile, leve & multum, odore fere algæ: tertium vermiculi forma & colore pene purpureum est, quod Milesium quidam vocant: quartum succidis velleribus non admodum dissimile, multis inanitatibus hians ac leve: quintum figura fungi, inodorum, intus quidem asperum, quodammodo pumicosum, foris verò leve, acre. Plinius l. 32. c. 8. fit in mari & Halcyoneum appellatum, ex nidis ut aliqui existimant, balcyonium & cecum: ut alijs, de sordibus spumarum crescentibus: alijs è limo, vel quadam maris lanugine. Quatuor ejus genera: cinereum spissum, odoris asperi: alterum molle lenius odore fere algæ: tertium candidioris vermiculi: quartum pumicosius spongiæq. putri simile, pene purpureum, quod optimum: hoc & Milesium vocatur: quo candidius autem hoc minus probabile est.

- I. Alcyonium durum sive i. Diosc. Imper.
- II. Favago Australis, Alcyonium 2. Dioscor.
- quod duplex existit, Imper.
- III. Alcyonium vermiculare, Imper.
- Alcyonium 3. Diosc. Cæs.
- Hoc non solum purpureum, sed & candidum ac flavescens reperitur.
- IV. Alcyonium molle vel 4. Diosc. Imp.
- V. Alcyonium stuppofum, vel 4. Diosc. Imp.
- VI. Alcyonium foraminosum vel quintum Diosc. Imper.
- VII. Alcyon. forma fructus alicujus ficus.
- Alcyonium tuberosum vel 5. Diosc. Imp.
- VIII. Alcyonium ingens & 3. quod ad 5. Diosc. referri potest, Clus. exot.
- IX. Alcyonium cervi cornua cum cranij parte referens.

- X. Alcyonium chirothecæ facie.
- Alcyonium alterum, Clus. l. c.
- Cum secundo Dioscoridis nonnullam affinitatem habet.
- XI. Fungus auricularis, Cæs.
- Musculus saxatilis, aliquibus Alcyonium quintum Diosc. Imp.
- XII. Bursa marina & Alcyonij genus 4. Cæs.
- XIII. Rosa marina ad quintum Alcyonij speciem referenda, Cæs.
- XIV. Pila marina, Cæs.
- XV. Pila marina velut ex ampullis constans ad spumæ similitudinem.
- Spuma maris, Cæs.
- Variat colore modò candido, modò rubro, a liquando flavescente.

Z O O P H Y T A.

Zoophyta sunt quæ nec animalium, nec plantarum, sed tertiam ex utroq. naturam habent, & ut Aristoteles loquitur, τὰ ἐναυφύτιστα φύτλ' καὶ ζῷα, quæ ambigunt inter plantam & animal, quæ Plantanimalia dici possunt: talia sunt Spongia, Urtica marina.

S P O N G I A.

Sπόγγη Græcis, Spongia: Etymologicus sic dici scribit τὰ ἀπὸ τοῦ ὕδατος, quod humorem attrahat & combibat. Dioscoridi lib. 5. cap. 138. & spongiæ alias nonnulli mares appellare, quæ tenuibus sunt fistulis ac spissa densave, è quibus rursus duriores τὰ ὕδατος nominaverunt: alias vero seminas, quæ contrario ac antedicta modo se habent. Et Plinio lib. 9. cap. 45. Spongiarum tria genera accepimus: spissum ac prædurum & asperum, tragosid (ab odore gravi) vocatur: minus spissum & mollius, manon: tenue densumq. ex quo penicilli (sive turundæ sinuosis & cavis ulceribus immituntur) parantur. Hæ sane τὰ ὕδατος καὶ τὰ ὕδατος dicuntur, quæ ut habet Plinius l. c. neg. fruticum neg. animalium, sed tertiam quandam ex utroq. naturam habent: ejusmodi inquit idem, sunt Urtica & Spongia.

- I. Spongia globosa, Imper.
- II. Spongia compressa, Imper.
- III. Spongia compressa magna.
- Spongia marina alba & flava, Tab. Ger.
- Spongia compressa latissima, Imper.
- IV. Spongia hircina, Imper.

- V. Spongia velaris, Imper.
- VI. Spongia ramosa.
- Conservæ marinæ genus, Lob. Lugd.
- Corallina Britannica Penæ, Lugd.
- an Ifidos plocamon corallio similis Pl. l. 1. c. 24.
- VII. Spongia ramosa fistulosa.
- VIII. Spongia

VIII. Spongiosus fucus, Imper. humanæ: aliæ figuræ turbinatæ instar pini.
Hujus diversæ species: una barbæ similis: altera arbusculæ in ramos divisæ: alia instar manus IX. Spongia forma infundibuli.
Spongia elegans, Clus. exot. l. 6. c. xi.

URTICA MARINA, ET ALIA.

Urtica dicta, quod admota contrectantis manum pignat. Sic Plinius lib. 9. cap. 45. Urtica noctu vagatur, noctuq; mutantur: carnosæ frondis his natura & carne vescuntur: vis pruritu mordax eademq; quæ terrestris urtica, &c. Verum Bellonius, inter pisces molles: Rondeletius, inter animalia imperfecta & quidem genere mollia refert.

Genus duplex Aristotelis 5. hist. 16. At Rondeletio species sex sunt. Plinio lib. 9. c. 43. alterum earum quæ soluta sunt, quas vagari scribit Plinius: alterum earum genus saxi affixum semper heret.

- | | |
|--|--|
| I. Urtica 5. & 6. Rond. (& ex eo Aldroan. Urtica soluta 1. & 2. Tab. | detur, Aldroan. |
| II. Urtica explicata & contracta, Bello. Italis Cunnus marinus: & Tab. de his vide Gesn. Bellon. Rondelet. & Aldroandum, qui formas diversas pingit. | VII. Penna marina, Rond. Ges. quæ Mentula alata piscatoribus, Aldro. cui duplex est. |
| III. Pulmo marinus, Matth. Tab. Aldroan. | VIII. Manus marina, Ges. ex eo Aldroan. |
| IV. Holothuria, Aristot. Plin. Rondel. (qui duas species habet) & Aldroan. | IX. Arantia marina. |
| V. Tethya, Aristot. Plin. Rond. Bellon. Ges. Aldroando, cui sex species. | X. Malum granatum, Aldro. |
| VI. Mentula marina, Rond. cui duplex est. Genitale marinum, Bellon. Epipetron Gesneri, cum hac convenire videtur, Aldroan. | XI. Malum infanum marinum, Rond. ex eo Aldroan. |
| | XII. Pyrum marinum, Aldr. |
| | XIII. Cucumer marinus, Plin. Rond. ex eo Aldroan. |
| | XIV. Uva marina, Plin. Rondelet. ex eo Aldroan. |
| | XV. Fungus marinus, Aldroando. |

SECTIO QUINTA.

FUNGI ET TUBERA.

F U N G I.

Fungi Græcis μύκηες dicuntur: de quibus Theophrastus 1. hist. 8. & 9. Fungus pediculus longè majorem, æqualem quam Gladiolus habet & radice penitus caret: & 3. hist. 9. verum è radicibus arboris & juxta radices erumpit: & 4. hi. 8. cum autem aqua plures inceserint fungi juxta mare rubrum quodam in loco erumpunt, qui Sole tacti in lapidem mutantur. Horum origo Plin. l. 22. c. 23. ex putrita arborum. Nam Fungi sicut & Tuberæ, neg. plantæ, neg. radices, neg. flores, neg. sentina sunt, sed nihil aliud quam terræ, arborum, lignorum putridorum, aliarumq; putrilaginum humiditates superflue: id quod inde colligi potest, quod omnes Fungi & Tuberæ, maxime ea quæ edendo sunt, à tonitrubus & pluvioso cæli statu frequentius nasci soleant.

Differentia duplex Dioscori. l. 4. c. 83. aut enim edules sunt, aut exitiosi: hi multis de causis tales evadunt: aut qui juxta clavos rubiginosos, aut pannos putridos, aut serpentum latibula gignuntur, aut arboribus privatim fructus noxios ferentibus adnascuntur. Habent verò qui tales sunt intra se lentorem quandam concretum & stringenti modo viscosum, & terra eruti si reponantur, celeriter corrupti computrescunt. At Plin. l. c. Fungorum numerosa genera: tutissimi qui rubent albo (forte carne) minus diluto rubore quæ voluti: mox candidi, velut apice flaminis insignibus, pediculus tertium genus suilli, venenis accommodatissimi. Quidam discernere arborum generibus, serula (potius betula) & gummi ferentibus: nos item fago, aut robore, aut cupresso: omnium color lividus.

Verum alij ex terra nascuntur: alij veterum arborum caudicibus subinde & eorum ramis (vix enim ulla arbor senescens in qua non conspiciantur) adnascuntur: alij saxi, tectis stramineis, putridis lignis insident, & quandoq; supra finem reperiuntur. Guilan, com. de pap. & alterum genus sive Ciema alterum dicit.

Aaa

I. Fun-

I. Fungus porofus.

Fungorum primum genus, Trag. Lon.

Fungorum præcipuum genus, Gef. col.

Spongiola nonnullis, Dod. Imper. Neapolitanorum, Ponæ.

Fungi favaginosi, five Fungi rugosi favis mel-
lis fimiles, Lob. belg.

Fungus spongiosus Dalechampi, Lugd.

Fungi rugosi, Cast.

Fungi esculenti primum genus, Clus. hist.

Fungi præcoces, Dod. belg.

Hujus quatuor sunt species: nam primus fungus parvus est, rugosus albicans, quasi fuligine infestus: 2. radicem Aristolochiæ rotundæ ex-
iccatam refert, coloris ex ruffo fusci: 3. duplo
amplior plerumque orbicularis: 4. in longitudi-
nem metæ instar excrescit.

II. Fungus apice pyramidalis & angusto.

Fungi esculenti alterum genus, Clus.

III. Fungus in metam fastigiatus albus fusco tinctus.

Fungi esculenti quartum genus, Clus.

Hic triplex est: primus & secundus parvus
& mediocris, ambo coloris albicantis fusco
tincti: tertius major magis fuscus, interdum
notis distinctus.

IV. Fungus orbicularis ex albidus prætensis.

Fungi esculenti tertium genus, vel S. Georgij,
Clus.

V. Fungus angulosus pediculo exiguo.

Fungi esculenti quintum genus, Clus.

Triplex est: 1. angulosus: 2. magis orbicu-
laris: 3. major, in tres lacinias divisus: ad ar-
borum radices.

VI. Fungus radice carens dimidium fun-
gum & orbem referens.

Fungi pezizæ esculenti, Colum.

VII. Fungi umbilicum exprimentes plures
simul alti.

Fungus in populo alba, Matth.

Populnei *divergitæ*, Dod.

Fungi esculenti sextum genus, Clus.

Ad arborum radices, sola magnitudine diffe-
rens observatur, ex ætate proveniens.

Fungorum sub Populo nasc. ntium, qui Turini
vocantur, subrubentium, pediculo candido, qui
in cibis minimè præbantur, Cæs. auctore.

Huc referendi Calucci vulgo dicti apud Portam,
qui bini aut tres ab uno pediculo prodeunt ve-

lut galli cristæ, acri odore, coma velut villosa.

VIII. Fungus umbilicum referens variegatus.

Fungi esculenti decimum tertium genus, Clus.

Variat: nam in primo supernè color ex cæru-
leo, viridi & fusco commixtus conspicitur, in-
fernè ex albo sublateus: 2. supernè color flave-
scens veluti fuligine infectus, infernè albus fu-
scis strijs distinctus: 3. supernè ex albo viridis,
infernè candicans & striatus: 4. supernè ex pur-
pureo & saturatè rubro, raris albis maculis no-
tatus: infernè candicans fuscis strijs aspersis,
oris dilutè purpurascens: 5. asperior reli-
quis, supernè coloris ex albo fusci, inferius can-
dicans, fuscis strijs difcurrentibus.

IX. Fungus orbicularis sulcatus albus fusco
permixto.

Fungi esculenti septimum genus, Clus.

Duplex est: alter tumens, coloris vel albi fu-
sco permixti, vel maculis quibusdam aspersis:
alter orbicularis candicans.

X. Fungus pileolo lato orbiculari candicante.

Fungi orbiculari, vel Fungorum tertium ge-
nus, Trag.

Fungi boleti, Cord. in Diosc. Lon.

Fungi nemorum, Lob. Belg.

Fungi esculenti octavum genus, Clus.

Triplex est: 1. minor candicans: 2. major
albicans maculis fuscis & flavescentibus asper-
sis: 3. amplior adhuc ex fusco subrubens.

XI. Fungus pileolo lato orbiculari flave-
scente.

Fungi quartum genus, Trag.

Capreolini, Tabern.

Fungi esculenti duodecimum genus, Clus.

XII. Fungi pileolo lato & rotundo.

Fungi esculenti nonum genus, Clus.

Hujus quatuor sunt differentie: 1. supina
parte candicans, infernè magis fuscus evidenti-
bus strijs donatus: 2. supernè albicans crassis
strijs insignitus: 3. supernè in albedine magis
fuscus, pediculo crassiore nigricante: 4. rufescit
& pediculo est albo.

XIII. Fungus pileolo lato & rotundo livido.

Fungi vulgares Amanitæ vel Boleti, Trag.

Fungi, Matth. Lac. Lon. Dod. Cast. Lugd.

Fungi vulgarissimi esculenti, Lob. ico.

Hic ad præcedentem referri potest.

XIV. Fungus pileolo in plano orbiculari
villosa.

Fungi esculenti decimum genus, Clus.

Duplex

Duplex est: alter colore puniceo diluore: alter coloris ex rufo fusci.

XV. Fungus pileolo magno plano orbiculato venis exasperato.

Fungi esculenti vigesimum genus, Clus.

Triplex est: 1. supernè dilutè rubens, aut latericeo coloris venis exasperatus: infernè pallescens, strijs fuscis insignitus: 2. supernè extuberat, coloris ex albo pallido & fusco mixti: infernè candicans, strijs fuliginosis distinctus: 3. major supernè coloris ex albo, pallido, rufo & fuliginoso mixtis: infernè rubescens, strijs ex atro purpurascens notatus.

XVI. Fungus pileolo plano subfusco oris lateris.

Fungi esculenti undecimum genus, Clus.

XVII. Fungus pileolo lato puniceo, lateum & dulcem succum fundens.

Fung. sextus, què aliqui crudum devorat, Trag.

XVIII. Fungus candidus odoratissimus orbe magno.

Fungus Richione, quasi magnum fungorum regem dicas, Portæ.

Eius tam suavis ut crudus edatur & ægris innoxie præbeatur, Eid.

XIX. Fungus latus sanguinei coloris.

Linguae in caudicibus castanearum, Cæs.

An ij quos Plinius scribit tutissimos, qui collo rubent, minus diluto rubore, quam Boleti.

XX. Fungus angulosus & velut in lacinias sectus.

Fungi genus magnum à figura auriculi leporinis, Gesn. coll.

Arborum fungi auriculæ Judæ facie, Lob. belg. Gallinacei, Cæs.

Fungi esculenti decimum quartum genus, vel Fungus leporinus, Clus.

Duplex est: 1. supernè pallidus, flavis maculis variegatus: infernè flavescent, fuscis strijs distinctus: 2. duplo major, supernè flavus: infernè strijs distinctus, croceoq; colore infectus. an Fungus leporinus quem 7. facit Tragus, qui formam interaneorum vituli repræsentat, qui incanus & plumbei coloris.

XXI. Fungus orbicularis oris intrò reflexis.

Fungi esculenti genus, sive fuilli, Clus.

Duplex est: 1. utrinq; subalbidus veluti fuligine infectus: at supernè aliquot maculæ albæ asperguntur: infernè strijs crassis nigricantibus notatur: 2. major cujus pars superior coloris est

purpurei rubro saturno commixti, secundum oras maculis albis aspersis: inferior ex albo fuscus, strijs tenuioribus excurrentibus.

Suillos vulgo porcinos dictos, Boletis crassiores, supernè subfulvos, infernè cinereos, internè candidos, habet Cæs.

XXII. Fungus Augusti mensis.

an Fungi octavum genus, Trag. 6. & 7. gen. Lon. Fungi esculenti decimum sextum genus, Clus.

Triplex est: 1. superius colore est candicante subfusco, inferius albus strijs carens: pediculus coloris ex caeruleo, viridi & fusco mixti: 2. utrinque ex flavo rubescit: 3. supernè ex fusco rubescit: infernè æqualis albus.

XXIII. Fungus planus orbicularis aureus. Volva Plinij, Elvela, Ciceroni, Boleti, Ang.

Boleti Cæs.

Fungi esculenti decimum septimum genus, Cl.

Differentia notatur, quæ ratione ætatis contingit: nam cum primum erumpit, ovum candore & figura refert, at alba cute quam volvum vocant, lacerato, paulatim in planam orbicularem formam se explicat: supernè aureus est, infernè flavus, strijs distinctus: hic omnium præstantissimus censetur.

XXIV. Fungus pileolo lato, longissimo pediculo variegato.

Fungi esculenti decimum octavum genus, Cl. an Fung. Neapolitanis Conocielle vocat, Portæ.

an Fungus pratensis, quem quidam Scarogias vocant, Cæs.

XXV. Fung. bulbosus fuscus duplici pileolo. Fungus quercinus diplocoides, Col.

XXVI. Fungus lariceus aurei coloris.

Fungus in larice præter Agaricum nascens triginta librarum, aureum per ambitum dissectus, in cibis gratissimus, Matth.

XXVII. Fungus albus acris.

an Fungus piperis sapore, Cord. in Diosc.

Fungus piperitis, quia instar piperis linguam vellicat, Portæ.

XXVIII. Fungus minimus odoratus capitulo donatus cinereus.

Prunuli vulgo, Cæs.

XXIX. Fungus ramosus: & Imper.

Fungi esculenti decimum nonum genus, Clus.

Formæ est ab alijs diversæ, qui in tres species, colore inter se differentes, nonnihil etiã forma, dividi potest: nam parte superna vel flavus, vel dilutè rubescens, vel pallidus albo admixto.

XXX. Fungus digitatus major.

Digitelli genus spectabili magnitudine, ut unus sufficiat, qui in castaneis reperitur, Cæf.

Plinius forte hunc intellexit, cum inquit, mox candidi veluti apice flaminis insignibus pediculis: quos Galenus Amanitas vocat, secundo loco inter innoxios. Lacinia Hermolao dicitur.

XXXI. Fungus candidus digitatus minor.

Digitelli (vel Fungi 5. genus) Trag. Lon.

Digitelli sive Manninæ vulgo, Cæf.

Hic veluti in parvos digitos fissus est.

XXXII. Fungus maximus Ungaricus; multis lacinijs squammatim incumbentibus.

Fungi esculenti genus 21. monstrosum, Cluf.

Tanta molis, ut ternos, aut quaternos pacere possit: sunt qui dicant, nonnunquam tanta amplitudine excrecere, ut bigam facile impleat. Variat colore ex rufo nigricante, vel ex albo nigro, aut multis maculis nigris in albo conspersis notatur. an Gallinacea Neapolitanorum, Portæ: quæ mirabilis formæ & ad eam amplitudinem excrecit, ut brachijs diductis homo vix amplecti possit, pondere sexaginta librarum, ut integro universa familia vesci possit.

XXXIII. Fungus in faxis proveniens.

Fungi è lapidibus, Matth.

Fungorum postremum genus è faxis, Portæ.

Fungus in lapide fungoso Neapoli, Cam. in Matth. ger. Cæf.

Fungus petrosus, Imper.

Ex hoc fungi toto anno enascuntur, si aqua irrigetur etiam domi asservatus, crescit induratis, Cæf. Præciditur ad esum, alius subnascitur, semperq; novos producit, septem diebus perficitur: sexies anno demetitur: terra dodrante operitur. Afferuntur lapides ex Vesuvio, ex Fageto, ex Partenio, ex Gargano & celsioribus montium partibus, Joh. Bapt. Porta.

XXXIV. Fungi circa Babyloniam.

Fungi boni saporis, quos etiam crudos Æthiop. comedunt, præter quos nihil aliud circa Babyloniam, quamvis bona & pinguis terra sit, crescit: part. 3. Ind. Orient. c. 5. sed quales?

Fungi noxii.

I. Fungus membranaceus auriculam referens, sive Sambucinus.

Fungus ad Sambucum, Trag.

Auriculæ Judæ vulgo.

an Fungus auricularis, Imper.

Fungorum perniciosorum 1. genus, Cluf.

II. Fungus putridus arborum ramis inhaerens, plurimis simul coherentibus.

Fungorum noxiorum genus 24. Cluf.

Triplex est: 1. & 2. interdum simplex, interdum plures: ille ruber, hic egregie rubet & floridus est: 3. corpore rugoso, bini, plerumq; terni, elegantiore auri colore præditi.

III. Fungus in caudicibus nascens unguis equini figura.

Fungi igniarij, Trag.

Igniarij vulgo Esca, Cæf.

Hic attritu filicis ignem excipiunt.

IV. Fungus ad cutim extergendam aptus.

Fungi igniarij species, qua in constrictis prostrigili utuntur, Cæf.

Fungus furfures capitis depellens, Imper.

V. Fungus acetabulorum modo cavus radice carens.

Fungi Pezicæ Plinij, Col.

VI. Fungus Hepaticæ saxatilis forma.

Fungi Pezicæ altera species, Col.

An hi duo posteriores perniciosi sint, dubi^o sum.

VII. Fungus saliginus lichenis forma variegatus.

Fungorum noxiorum 4. genus, Cluf.

VIII. Fungus ceraforum imbricatim alter alteri innatus variegatus.

Fungorum noxiorum 5. genus, Cluf.

IX. Fungus pannis laceris similis igneus.

Fungus quem ignem sylvestrem vocant, Cæf.

X. Fungi ex eodem pede sed non conspicuo numero.

an Prunuli, Trag.

Fungorum perniciosorum 2. genus, Cluf.

Varij sunt magnitudine & forma, omnes coloris ex albo pallido & fusco commixti: sub pruno nascentes.

XI. Fungus fimetarius in plano orbicularis candidus.

Fungorum noxiorum tertium genus, Cluf.

an Præcolis similis, Cæf.

XII. Fungus pileo infernè subrufo aufrigicante, quem aliqui, nec sine periculo comedunt, Cæf. alp.

XIII. Fungus coryleus orbicularis.

Fungorum noxiorum 6. genus, Cluf.

XIV. Fungus buffonius orbicularis.

Fungorum noxiorum septimum genus, Cluf.

— Triplex est: 1. in metam sublatus albus, fuligine

fuligine infectus, in summo flavescens: parte cava fuscus, nigris strijs distinctus: 2. magis orbicularis, supernè modò fuscus ex albo pallescens, modò flavus fuligine infectus, maculis albis & nigris aspersis, rubetæ colorem refert: infernè albus, strijs subfuscis levibus distinctus: 3. major in plano orbicularis, superius albus, rubore admixto & maculis pallescentibus aspersis: infernè pallidus, fuliginosis strijs distinctus.

XV. Fungus satius candidus pileolo in metam assurgente.

Fungorum noxiorum undecimum genus, Clus.

XVI. Fungus betulaceus orbicularis albus.

Fungus ad betulam, Trag.

Fungorum noxiorum octavum genus, Clus.

XVII. Fungus orbicularis ex atro rufescens.

Fungorum noxiorum nonum genus, Clus.

XVIII. Fungus minimus flavescens infundibuli forma.

Fungorum noxiorum decimum genus, Clus.

XIX. Fungus muscis interficiens.

Fungi muscarij, Trag. Cord. in Diosc. Lon. Tab.

Fungorum noxiorum 12. genus, Clus.

Hujus quinque species: 1. orbicularis, cui supernè color vel pallescens, rubedine & fuligine admixtis: vel lividus & fuligine infectus, maculis albicantibus atro permixtis inspersis: infernè albus, fuscis strijs variegatus. 2. orbicularis, supernè coloribus ex purpura dilutior & saturatiore, rufo, pallido & albo variè mixtis: infernè pallido, nigris strijs sulcato. 3. ætate variat: emergens Ari radicem imitatur, coloris lateritij, maculis albicantibus aspersis: adultior, orbicularem figuram acquirit, interdum per latera fissus, coloris prona parte rubri, albis maculis infecti: supina albi, cum strijs levi fuligine infectis. 4. junior, minore est orbe, rubro colore saturo, instar concreti sanguinis tincto, maculis plurimis exalbidis aspersis: adultior multo latior, rubro colore remissiore tinctus & præter exalbidas maculas veluti intercurfantibus undis, distinctus. 5. junior coloris ex rufo fusci & velut fuligine infecti: adultior, latior in metam formam assurgens, oris valde laceris, coloris supernè ex albo rufo, pallido, fusco mixti & id vel radiatim, vel maculis inspersis: inferiore fuliginosis nigris strijs interfecantibus.

XX. Fungus latus orbicularis candidus.

Fungorum noxiorum 13. genus, Clus.

XXI. Fungus latus orbicularis oris intus

conversis.

Fungorum noxiorum 14. genus, Clus.

Dux sunt species: magnitudine & supinæ partis colore inter se differentes.

XXII. Fungus pediculo in bulbi formam excrecente.

Fungorum noxiorum 15. genus, Clus.

Duplex est: supernè pallidus, maculis dilutè nigricantibus distinctus & oris deorsum reflexis: internè multis strijs expallido fuscis distinctus: 2. tetri coloris est, radices potius fragmentum, quam fungus videtur, quod utraque manu vix comprehendi potest.

XXIII. Fungus clypeiformis major.

Fungus alter venenatus clypeiformis olidus, Lobel. belg.

Fungus alius clypeiformis perniciosus, Cl. ad.

XXIV. Fungus clypeiformis minor.

Fungorum alterius generis alter, Dod.

Fungus clypeiformis lethalis, Lob. belg.

Fungus perniciosus vulgaris, Cl. ad.

Alij albi, aut cinereis fuscisve maculis notati, in cavitate nigri: nunc & plani ut acetabula: nonnulli etiam parvis similes.

XXV. Fungus latus oris laceris.

Fungorum noxiorum 17. genus, Clus.

Duplex est: colore superna parte rufo ad nigredinem tendente in medio flavescente: infernè pallido, strijs fuliginosis distincto: 2. colore supernè ex pallescente fuliginosus, venis ex albidis maculosis: pars infima ut & fungi substantia, omnia atra, crassius nigris strijs obscure apparentibus.

XXVI. Fungus oris laceris & in lacinias divisus.

Fungorum noxiorum 16. genus, Clus.

In hoc triplex differentia occurrit.

XXVII. Fungus parvus, parvi galeri formam exprimens, rufus.

Fungorum noxiorum 18. genus, Clus.

XXVIII. Fungus parvus galericulatus alter flavus.

Fungorum alterius generis primus, Dod.

Fungus parvus lethalis galericulatus, Lob. belg.

Fungus exilis perniciosus vulgaris, Cl. ad.

XXIX. Fungus orbicularis secundum vias & in quercetis Autumno nascens.

Fungorum noxiorum 19. genus, Clus.

Hujus sex species sunt.

1. Supernè coloris ex flavo, rufo, fuliginoso commixti: infernè ex pallido fusci, multis strijs

Aaa 3

exarato.

exarato. 2. amplior est, supernè coloris vel rufi, raris maculis conspersi, vel fusci & fuliginosi: inferius pallidi, fuscis maculis aspersi, vel ex fusco omnino pallidi. 3. ex cineraceo fusci coloris, notis quibusdam distincto, lacer & hians. 4. supernè, ex atro rufescens: infernè flavus, maculis parvis aspersi: vel fusco supernè & scissuris quibusdam albis lacero: infernè ex flavo tantum pallescente. 5. supernè tumens & latericei, infernè cinericei coloris, & hic Fungi perniciosi generis 19. species dubia, Clusf.

XXX. Fungus tuberis figura.
Fungorum noxiorum 19. species 5, Clusf.

Hic ætate variat: junior supernè coloris fusci, infernè rubri saturi & nigricantis, oris flavis: dulcior orbicularis, supernè fusci coloris, diluto rubore permixto: infernè ex rubro atro & obscuro: ipsum verò corpus contractum cærulei, virecente intercepti est coloris.

XXXI. Fungus cyclamini radicem colore & forma referens.

Fungorum noxiorum 19. generis species 7, Clusf.

XXXII. Fung. omnium ampliss. purpureus.

Fungorum noxiorum 19. generis species 3, Clusf.

XXXIII. Fung. crassus in metam surrectus.

Fungorum perniciosorum 20. genus, Clusf.

Hic quadruplex est:

1. supernè cineraceus, infernè ex flavo pallens. 2. supernè, vel ex pallido fuscus, vel fuliginosus, infernè ochræ colore. 3. rufus: infernè ochræ colore fuligine perfusa. 4. ex rufo & fuliginoso commixti: infernè subrufo colore multis strijs fuliginosis interfecantibus.

XXXIV. Fungus abietinus oris reflexis substantia rubra.

Fungorum noxiorum 21. genus, Clusf.

XXXV. Fungi dumetorum ex uno pede prodeuntium.

Fungorum noxiorum 22. genus, Clusf.

Quadruplex est:

1. seni aut septeni orbiculati sed fornicati flavi, macula nigra distincti. 2. octo aut novem coloris flavi, rufo suffusi: infernè flavi, macula nigra distincti. 3. majore est orbe, quindecim aut pluribus ex eodem pede nascentibus, supernè vel rufi, vel ex rufo dilute albescences: infernè subalbidii, crassius fuscis strijs distincti: quinta species, Clusf. 4. turbinato corpore seni aut plures, supernè cineracei ex rufo coloris aut fusci: infernè crassius nigris strijs distincti.

XXXVI. Fungus truncis humi jacentibus innatus, pluribus ex uno pede prodeuntibus. Fungorum noxiorum generis 22. species 3. & 4. Clusf.

Hic præcedente multo minor: & duplex: 1. viceni & plures ex eodem pede supernè rufi, infernè fuscis strijs exarati. 2. triceni & plures colore inter se varij, vel flavo rufo perfusi, vel omnino rufi & fusci, infernè nigricantibus strijs notati.

XXXVII. Fungus orbicularis in palustribus. Fungorum noxiorum generis 23. species quatuor, Clusf.

1. orbe tumido eleganter rubro infernè albicans fuscis strijs exaratus. 2. paulo amplior, supernè coloris rufi & ad lateritium tendentis: infernè dilutioris & strijs frequentioribus distinctus. 3. coloris ex albo, rufo & fusco variè commixti. 4. orbe est inæquali, supernè ex cineraceo candidans: infernè etiam, sed fuscis strijs ad extremas oras productis.

XXXVIII. Fungus foetidus penis imaginem referens.

Phallus, Hadr. Junio.

Phallus Batavicus, Lugd.

Phallus Holandicus, Saryrion trifolium Matthiolo, Ponæ Ital.

Fungus virilis penis arrecti facie, Lob. belg.

Fungus marinus, Dod. belg.

Fungi perniciosi 23. generis species 5, Clusf.

XXXIX. Fungus minimus ligneis tabelis areolarum hortorum adnascens.

Fungus minimus ἀνώνυμος, Clusf.

XL. Fungus ramosus candidus.

Fungorum noxiorum 25. genus, Clusf. at figura habetur hist. ap. alt.

XLI. Fungus ramosus coriaceus.

Fungus borfaro, Imper.

Hujus ad ignem concipiendum apud Neapolitanos usus est.

XLI. Fungus rotundus orbicularis. Fungorum noxiorum generis 26. species 3, Clusf.

Fungus ovatus, crepitus lupi, Trag. Lon.

Fungus orbicularis, Dod.

Fungus glomeratæ rotunditatis, Lob. belg.

Lupi crepitus, Cast. Col.

Triplex est magnitudine, nonnihil etiā forma differens. 1. initio eximij candoris, dein pallescens tanquam fuligine suffunditur, maturus contractus pulverulentum fumum effundit.

Pezicæ

Pezicæ Plinij in pratis quem esculentum dicit, Cæf.

Fungus vesicarius, alijs ovum lupinum, Imper.

Fungorum pernicios. generis 26. species 1. Cluf.

2. Capitis pueri magnitudine, cute cineracei coloris tectus, quæ lacera substantiam spongiosam fuliginosam ostendit, quæ compressa pulverem effundit.

an Fungus villosus, Imper.

3. Sola magnitudine à secunda differt.

an Pezicæ genus in sylvestris aliquando humani capitis, quod sine periculo esitatur, Cæf.

XLIII. Fungus rotundus cancellatus.

Fungus coralloides cancellatus, Cluf. hist. ap.

alt. auct.

Fungus lupi crepitis vulgi efflorescens, Col.

Hunc à priore distinguere non oportet: a quo tamen differt (quem & Cluf. & Colum. peculiari figura expressere) quod huic sint radices in fibras divisæ, & quod per medium disrupto veluti

florescens speciosum reticulum, vel marsupium reticulatum rubri coloris emittit.

XLIV. Fungus niger culicis figuram referens.

Fungus semiorbicularis niger, Dod. belg.

Fungi lapidei.

I. Fungus lapideus major in Nilo natus.

Fungus saxeus Nili major, Cluf. exot.

II. Fungus lapideus minor.

Fungus saxeus minor, Cluf. exot.

III. Fungus lapideus forma bubulæ linguæ, Cluf. cur. post.

AGARICUM FUNGUS.

Agaricum, sorte ab Agaria nomen sibi adscribit gentile; nam ut Dioscorides, in Sarmatia regione quæ Agaria dicitur, gignitur: vel ab Agaro, quem & urbem & amnem in Sarmatia vocari tradit Ptolomæus: & ut Dioscorides l. 3. c. 1. radix fertur Silphij similis, non tamen densa summa facie veluti Silphium, sed tota rarior: sunt qui plantæ radicem esse affirmant: alij ut Fungus ex putredine nasci in arborum caudicibus. Plinio l. 16. c. 8. Gallicarum glandifera (imò Larices) maxime arbores Agaricum ferunt: est autem Fungus candidus, odoratus, in summis arboribus nascens, noctu lucens (fabulosum hoc) signum hoc ejus quo in tenebris decerpitur. Et l. 25. c. 9. Agaricum ut Fungus nascitur in arboribus circa Bosphorum colore candido.

Genera sunt duo Diosc. l. c. mas & femina: mas rotundus est & undiq; sui similis: femina presertur, quæ quidem rectas intus habet pectinum modo venas & quasi divisuras. At in præfatione l. 6. Agarici nigri let balem vim habentis meminit. Sic Plin. l. 25. c. 9. mas crispior amariorq;: femina solutior, initio dulcis, mox in amaritudinem transit. Menses feminam eligit, quia masculus malus sit, præcipue qui longus existit & niger & gravis: debet autem esse album, leve, velociter friabile, porosum & valde rarum: primum dulce, dein amarum & astringens.

I. Agaricus sive Fungus laricis.

Agaricus & Agaricum, Matth. Dod. ut: Cord. in

Diosc. Ang. Tur. Lac Lob. Cast. Cæf. Lugd. Tab.

Agaricum larignum, Ad.

Fungus hic Abieti, Piceæ fylv. Tædæ & Larici adnascitur, sed solum Larignus intra corpus u-

surpatur.

II. Agarico similis fungus diversarum arbo-

rum caudicibus adhærens.

III. Agaricus qui in speluncis montium Helveticarum reperitur.

Agaricus saxatilis, vel Fungus, petræus Lac lunæ incolis à substantia alba & spumosa, Gesn. in fracto.

Lac lunare, Eid. lib. de fig. lapid. c. 2.

Margæ friabilis genus cuidam, ut idem.

TUBERA.

Tubera, quæ radicibus, ut Galenus voluit, adnumeranda vocantur & ab imbris, & ab a tumore, ab oideis tumore. Dioscoridi l. 3. c. 175. & ab a radix est orbiculata sine folijs sive caule, flavescens, vere effoditur, ac seu cruda seu cocta esui apta est. Theophrasto l. 1. hist. 9. Tubera radice penitus carent. Plinio l. 19. c. 2. Tubera undiq; terra circumdata, nulliq; fibris mixta, aut saltem capillamentis, & c. corrice includuntur, ut plane nec terram esse possumus dicere, nec aliud quam terra callum.

Genera duo eorum (Plinio l. 2.) harenosa dentibus inimica & altera syncera: distinguuntur & colore rufo nigroq; & intus candido, & c. Sane Tuberum genera duo sunt, quæ magnitudine & colore differunt: majus & minus: majus cure quidem nigra, sed alteri pulpa candida, alteri pulla (subflava alij notant) subest: minus colore rufo inspidum & gustu injucundum.

I. Tube-

I. Tubera, Matth. Ang. Cord. in Diosc. Lac.
Lon. Dod. Cast. Lugd. Tab. Cæs.

Tufera terra, Tab. Ger.

II. Tubera cervina: & Lob. belg.

Fungus cervinus, sive Cervi boletus, Matt. Lon.

Fungi cervini Boleti officin. Cord. in Diosc.

Boleti cervini orbiculati, Thal.

Sic dicta quia reperiuntur ijs in locis ubi cer-

vi libidinem suam exercent: quamvis Cordus
invenerit etiam in præruptissimis montium
sylvis, quo ne damæ & rupica præ quidem per-
venire possunt, ne dum cervi.

III. Tuberibus similis fructus Indicus.

Fructus sub terra nascens, Monardi & Lugd.
an Mamci Brasilianorum, apud Lerium par. 3.

Ind. Occid. c. 12.

SECTIO SEXTA.

CARDUUS; CIRSIUM; CNICUS ET ATTRACTILIS; ACARNA;
CHAMÆLEON SIVE CARLINA; ACANUS; CARDUUS LACTEU S;

Carduus Sphærocephalus; Carduus totentofus; Acantha sive Branca Ulfina; Scolymus
sive Cinara; Carduus spinosissimus; Dyspacus; Eryngium; Carduus Stel-
latus; Euphorbium & Anteuphorbium; Tragacantha; Poterium;

Drypis; Amonis sive Restia Bovis.

CARDUUS.

Plantarum spinosarum divisionem universè à Theophrasto part. 1. hist. 16. part. 6. hist. 3. & 4. sic expressit.
Ακανθώδης, id est, spinosa, sive aculeata alia in totum spinosa, alia non in totum: in totum spinosa, ut Cor-
ruda, Scorpius: non in totum spinosa φωνάκανθα, id est, quæ folia omni ex parte sic in spinas divisa habent, ut
tangenti præter spinas undiq; nihil occurrat, ut acorna, drypis, acanacea. Alia eis οὐκ ἀκανθώδης ἢ ἀκανθώδης, id
est, mucronantur & habent latera angulosè dissecta, ut Smilax, Ilex. Alia eis οὐκ ἀκανθώδης ἢ ἀκανθώδης, id
est, pinus, picea cedrus, juniperus. Alia ἀκανθώδης ἢ ἀκανθώδης, id est, quæ spinas folijs adnata, & mu-
crone pungunt & lateribus, ut ilex phellodryis. Alia ἀκανθώδης ἢ ἀκανθώδης, id est, præter folium minime
spinofum horrentia, ut rhamnus, tribulus, ononis, stæbe. Alia ἐν τῷ κορυμνίῳ ἀκανθώδης ἢ ἀκανθώδης, id est, spinas
caulibus enascentes habentia, foliumq; insuper aculeatum, ut capparis Aegyptia: quadam ἐβόα
ἀκανθώδης, id est, arctii spinis muricata, ut smilax quadam παυνοδῶς ἀκανθώδης, id est, uncinatis arcuatisq; spinis ar-
mata. At Plinius l. 21. c. 15. sic expressit. Spinofarum multa species: in totum spina est asparagus, scorpio: multa
enim folium habent. Quædam spinosa foliata sunt, ut carduus, eryngium, glycyrrhiza, on. urtica: ijs enim
omnibus folijs inest aculeata mordacitas: Aliqua & secundum spinam habent folium, ut tribulus, ononis, phlecos,
quod aliqui Stæben appellavere: hipophæes spinis angulosis. Quædam in folio habent & in caule, ut Capparis.
Tribulo proprietas, quod & fructum spinofum habet. Hæc Plinio.

Verum hic non de omnibus spinosis agemus, sed potissimum de Carduis & Acanaceis: de cæteris inter ar-
bores & frutices.

CARDUUS.

Quemadmodum ἀκανθώδης ἢ ἀκανθώδης generaliter omnem spinam denotat: sic & ἑνὶ δυνάμει Græcorum, La-
tini Carduum generatim interpretantur. Similiter ἀκανθώδης, etsi herba quadam sit spinosa Theophrasto 6. hist. 1.
tamen eidem l. 6. c. 4. sic etiam dicitur illud quod in Carduorum genere, velut malum extnerat. Unde quasi
dicat Acanaceus spinam Acani genere est. Sic etiam Theoph. 6. hist. 3. illorum quæ folio constant aculeato genus
magna ex parte acanaceum est: acanaceum inquam, quoniam conceptus & id cui stas inhaeret, aut etiam fru-
ctus, spina vel spinaceum quidpiam sit.

Carduus in pratis humidis vineis
& avena.

I. Carduus pratensis latifolius.

Carduus pratensis, Trag. Gef. hor. Ad. Lob. ico.

Carduus, limonia forte Theophrasti (conjectu-
ra ex natalibus sumpta) Gef. hor.

Brassica pratensis, Lon.

Acanthus sylv. Lugd.

Theophr. 6. hist. 3. λεμονία (Gaza malè Betam
sylvestrem vertit) in genere carduorum, acu-
leatis folijs constat.

II. Carduus pratensis folijs tenuib. laciniatis.
Epist.

Erisithales, Ang. Lugd.

Plin. l. 26. c. 13. Erisithales est flore luteo, folijs acanthi.

III. Carduus pratensis Asphodeli radice latifolius.

Leucacantha, Ang.

Carduus bulbosus Monspelienſium, Ad. Lob. ic.

Cirsio quinto congener, Cluſ. hiſt.

Hujus alteram ſpeciem multis ſpinis donatam Lobelius notavit.

IV. Carduus pratensis Asphodeli radice, folijs profundè & tenuiter laciniatis.

Acanthus ſylv. alter Dalechampi, Lugd.

Jacea aculeata ſeu tuberoſa, vel 4. Tab.

Jacea tuberoſa, Ger.

V. Carduus pratensis polycephalus, ſub Carduo 6. in Prodr. deſcriptus.

VI. Carduus palustris, in Prodromo ſub 3. deſcriptus.

VII. Carduus vinearum repens folio Sonchi.

Ceanorhus, Theoph. Ang. Lugd. Col.

Theophrast. l. 4. hiſtor. 11. Hujusmodi verò eſt etiam ſpina *neobolus* verum non arundinoſa, neq; geniculata radix hujus.

VIII. Carduus in avena proveniens.

Carduus ſylv. in avena, Trag.

Carduus avenarius, Thal.

Carduus arvenſis, Tab.

Carduus muſcatus, Ger.

Alius procerior alius humilior: ſlor. bus ruſ. ſis roſeis, candidis.

Carduus mollis.

I. Carduus mollis folijs Helenij.

Carduus montanus folijs Helenij non ſpinofus, Camer.

Carduus mollis, Camerarij, Cluſ. pan. & hiſt.

II. Carduus mollis latifolius, lappæ capitulis, qui 1. in Prodromo.

III. Carduus mollis lapathi folijs.

Carduus mollis vel mollior 2. Cluſ. pan. & hiſt.

IV. Carduus mollis folio oblongo Cirsij capitulo.

Carduus mollis 3. Cluſ. pan. & hiſt.

V. Carduus mollis laciniato folio.

Carduus mollis primus, Cluſ. pan. & hiſt.

Carduus mollis tenuifolius, Cam.

Flos cæruleus, quandoque albus, interdum purpureus.

CARDUUS CIRSIUM DICTUS.

K *regior*, quod dolores *negar*, id eſt, varicum ſedet, Dioſcoridi l. 4. c. 119. quod his verbis deſcripſit: caule eſt tenero, dum ſerme cubitorum, tri angulari, ab imo folijs roſe puſillis circumdato, quæ quidem angulos habent ex intervallis ſpinofos, ſed molles: folijs bugloſſo ſimilibus, modice hirsutis, longioribus, ſubcandidis & per extremitates aculeatis: eſt autem pars ſumma caulis rotunda & hirsuta, illiq; inſident capitula in ſummo purpurea, quæ in pappos ſeu lanugines ſolvuntur. Cirsion Plinio l. 27. c. 8. qui eodem ſerè modo deſcripſit.

I. Cirsium maximum Asphodeli radice

Cirsium maximum montanum incano folio,

vel 3. Cluſ. pan. & hiſt.

II. Cirsium latissimum.

Cirsium, Dod. gal. Lugd.

III. Cirsium majus singulari capitulo magno.

Cirsium majus, Lob.

Cirsium tertium, Dod. Cluſ. pan. & hiſt.

an Cirsium tertium, Cæſ.

Variat flore, ſtaminibus purpureis aliquando niveis: folijs quæ in eadem planta alia integra ſunt, alia profundius diſſecta.

IV. Cirsium majus singulari capitulo magno: vel incanum variè diſſectum.

Cirsium Anglicum, Lob. Lugd.

V. Cirsium singulari capitulo squammato: vel incanum alterum.

Cirsium secundum vel Britannicum, Cluſ. pan.

Anglicum secundum, Eid. hiſt.

VI. Cirsium singularibus capitulis parvis.

Cirsium, Dod. alterum, Ad. Lob. an. & Cæſ.

Cirsium tertium & montanum primum, Cluſ. pan. & hiſt.

Cirsium aliud Dodonæi, Lugd.

VII. Cirsium folijs non hirsutis floribus compactis.

Cirsium, Matth. Geſn. hort. Lac. Ad. Lob. Caſt.

Lugd. Eyſt.

Cirsium secundum, Dod. quartum, vel montanum secundum, Cluſ. pan. & hiſt.

Cirsium agri Piſani, Cæſ.

III. Cirsium angustifolium non laciniatum.

Cirsium Pannonicum primum pratense, Cluſ. pan. & hiſt.

IV. Cirsium angustifolium, in Prodromo

Bbb

CNI-

CNICUS ET ATRACTILIS.

K Nicus Dioſcoridi l. 4. c. 196. Theophr. *uvin* 1. hiſt. 12. & *uvin* 6. hiſt. 13. 4. Cnicon, Plinio: Latinis, Cnicus & Cneus. Dicitur autem Cnicus, & no *ts* *uvin*, quod mordere & pungere ſignificat: vel & no *ts* *uvin*, quod pungendo pruriginem excitet, quod de ſylveſtri rectius, quam de ſativo dici poteſt: an porius à ſloris colore, cum *uvin* exponatur croceus, rutilus. Dioſcorides ſic deſcripſit: ſolys conſtat oblongis, per ambitum diviſis, aſperis, aculeatis: caulis cubitalibus, & in eorum cacumine capitulis olive magnitudine, flore croci: ſemine candido, aut ruſſo, oblongo, anguloſo. Ex his duo Cnici genera tradi colligitur, candidum ſcil. & ruſſum. Quare Theophr. 6. hiſt. 4. in ſylveſtrem, urbanumq; diviſit. Sic enim ſparſim de Cnico inquit: fructum aculeatum ac veluti retorridum fert: ſtorem unà cum ſtaminibus ipſis edit: ſolys aculeatis inter Acanacea excipitur, unà cum Struthio & Soncho: quamvis enim natura ſpiſioſa ſint, ſeminis tamen conceptum non ſpiſioſum habent: multis caulibus conſtat & ramos fundit: ſylveſtri urbanoq; diſcernitur: ſylveſtris genera duo notantur: alterum urbano admodum ſimile, rectis caulibus tamen: quamobrem ex eo mulierum priſcarum nonnulla colo utebantur: fructum nigrum, majuſculum amarumq; parit. Verum Dioſcorides, per Cnicum ruſſum videri intelligere genus ſyl. quod ex foliorum deſcriptione ſignificatur, quod forte apud Theophr. etiam Atractylis vocatur. Sic dum Theophr. dicit ſeminis conceptum non ſpiſioſum habere, de urbano intelligendus videtur, & hoc ex Plinio l. 21. c. 15. colligitur. Cnici, inquit, differentià prima ſylveſtris & ſativa: ſylveſtrium due ſpecies: una mitior eſt ſimili caule, tamen rigido: itaq; & colu antiqua mulieres utebantur, ex illis, quare quidam Atractylida vocant: ſemen ejus candidum & grande, amarum (quibus verbis Plinius potius domeſticum quam ſylveſtre demonſtrat, & quia mitius, & quia ſemen candidum.) Altera hirsutior, poroſiore caule, & qui pene humi ſerpat, minuto ſemine: aculeatarum generis hec eſt. Dicitur hodie Carthamum, voce à Mauritania mutuata, qui Karten vocant, vel & no *ts* *uvin*, quod eſt purgare: & Meſues, domeſticum & ſylveſtre fecit.

Atractylis dicitur, quoniam eo & *uvin*, id eſt, ſuſi antiquitus conſciebantur. Dioſcoridi l. 3. c. 107. ſpina eſt Cnicus ſimilis ſed qua in ſummis virgultis folia multo longiora proferat: major autem pars nuda eſt & aſpera, qua etiam ſemine pro colu utuntur: capitula etiam gerit in cacumine aculeata, ſtoremq; pallidum: radix tenuis eſt & ſupervacua. Theophr. 6. hiſt. 3. & 4. Atractylis (ſuſum agreſtem Gaza venit) ſpiſioſa eſt, & Cnicus acarnaq; candidior eſt: habetq; peculiare quod in ſolys evenit, decepta enim carnig; allat a ſuccum ſanguineum effundunt, qua de cauſa & *uvin*, id eſt, cruor, à quibuſdam ſpina hec eſt nominata, & c. Et 9. hiſt. 1. ſuccus ſanguineus eſt ſpina quam Atractylin vocant. At Plinio l. 21. c. 15. Atractylis idem eſt quod Cnicus mitior: & c. 16. Atractylis ſanguineum ſuccum fundit, qua de cauſa phonos vocatur à quibuſdam: & c. 21. Cnicus ſive Atractylis, & c. ubi Dalechampi cenſet, Plinium & hoc & c. 15. inepte cum Cnico Atractylidem confundere.

I. Cnicus ſativus, ſive Cartharum officinarum.

Cnicus urbana & ſativa, Theoph. & Plinij.
Cartamus, Brunf. Trag. Fuch. Lon. flore croceo, Camer.

Cnicus, Matth. Dod. ut: Lac. Ad. Caſt. ſativus, Cæſ. (cui & Crocus Sarracenicus) Eyſt.

Cnicus ſive Crocus ſylv. Ang.

Cneus, Tur. vel Cnicus, Gef. hor.

Cnicus ſativus, Theoph. Cord. in Dioſc. & hiſt. Lob. Lugd.

Cnicus vulgaris, Cluſ. hiſt.

Flore eſt croceo, rarius albid.

II. Cnicus cæruleus aſperior.

Cnicus alter, Cluſ. hiſp. & hiſt. Lugd.

Cnicus flore cæruleo, Lobel. Eyſt. cæruleus, Tabern.

Carthamum ſive Cnicus flore cæruleo, Cam.

Carthamus ſive Cnicus, Ger.

III. Cnicus purpureus folijs non ſpiſioſis. Atractylis purpurea, Cæſ.

IV. Cnicus ſylv. hirsutior, ſive Carduus benedictus.

Carduus benedictus, Brunf. deſc. Trag. (cui & Acanthus Germanicus) Matt. Lac. Gef. hor. Ad.

Lob. Lugd. Caſt. Tab. Cam. Ger. Eyſt.

Atractylis hirsutior, Fuch. Dod. gal.

Atractylis ſive Cnicus ſylv. 2. Ang.

Acanthium, Cord. in Dioſc. Lon.

Cnicus ſylv. alter Theophr. hiſt. Cord. in Dioſc.

Frac. Caſt. Cæſ. Lugd. Cam.

Cnicus ſupinus, Cord. hiſt.

Cnicus vel Atractylis ſylv. Gef. hort.

Carduus benedictus & Atractylis altera ſpecies, Dodon.

Carduus ſanctus, Atractylis Dioſcoridis, Cæſ.

V. Cnicus ſylv. ſpiſioſior.

Carduus & Dipſacus minor, Brunf.

Atractylis

Atractylis five Cartamus sylv. Trag.

Carduus vulgaris, Matth. Lugd.

Atractylis vulgaris mitior, Fuch.

Carlina sylv. Dod. ut: vulgaris, Clus. hist.

Colus rustica, Cord. in Diosc. Gesn. hort.

Cnicus sylv. i. Theoph. Atractylis Diosc. Cord. in Diosc.

Atractylis media, Gesn. hort.

Cirsium luteum Sequanorum, Lob.

Carduus vulgarissimus viarum, Eid.

Cartamus sylvestris, Lon. Cæs. cui & Cnicum ruffum Dioscoridis.

Cnicus sylv. prior, Lugd. Atractylis, Eidem.

Atractylis, five Cnicus sylv. procerior, Thal.

Carduus sylv. & Scolymus Plinij, Dodon. qui flosculos purpureos tribuit.

Acarna, Lugd. quoad z. ico.

Carduus & Scolymus sylv. Cam. ep.

Heracaatha, Tab. Eyst.

Carlina sylv. major, Ger.

an Acarna Theophrasti, Acorna Plinij, Col.

Vulgaris procerior est: altera quæ rarior & pumila locis montanis reperitur.

VI. Cnicus sylv. spinosior polycephalos.

VII. Carduus monstrosus figura Cornucopiæ, Imper.

Atractylis.

I. Atractylis lutea.

Atractylis, Matth. Dod. ut: Lac. Adv. Lob. Cast.

Cam. Tab. Ger. vulgaris, Ang.

Atractylis quorundam, Lugd.

Atractylis Theophrasti & Dioscor. sanguineo succo, Col.

II. Atractylis purpurea.

Atractylis cypria, Ang. Lugd.

Atractylis flore purpureo, Dod. Adv. Lugd.

Hæc aliquando non pubescit: at Cretica valde lanuginosa est.

III. Atractylidi & Cnico sylvestri similis. Calochiarni, Belli ep. s. ad Clus.

ACARNA SIVE ACORNA.

Acarne Theophrasto 6. hist. 4. aspectu Cnico urbano similis est, colore flavicans, succo pinguis. Et Plinio l. 21. c. 16. Acorna colore tantum ruffo distinguitur (scilicet à Scolymo) & pinguiore succo.

I. Acarna flore luteo patulo.

Eryngium Archigenis, Ang.

Carlina sylv. minor, Dod. Ger.

Carlina sylv. minor Hispanica, Clus. hisp. & hist.

Acarnæ five Sequanorum Cirsij, Carlinae varietas, Lob.

Acarnæ similis Carlina sylv. minor, Lugd.

Acorna, Cæs.

Carlina sylvestris, Tab.

II. Acarna flore purpurorubente patulo.

Acanthioides parva Apula, Col.

III. Acarna capitulis parvis luteis in umbella.

Acarna five Acorna altera Apula, Col.

IV. Acarna capitulis globosis.

Carlinae sylv. aliud genus, Clus. cur. post.

V. Acarna humilis caule folioso.

Picnomos Creticæ Salonenfis Galloprovinciæ, Adv. Lob. Lugd.

Chamæleon niger, Tab. Ger.

Eandem suspicor cum sequente

Acarna Valerandi altera, Lob. Lugd. Tab. Ger.

VI. Acarna major caule folioso.

Chamæleon niger Salmaticensis, Clus. hisp. & hist. Dod. Ger.

Chamæleon Salmaticensis, Lob. Lugd.

Chamæleon Hispanicus, Tab.

VII. Acarna major caule non folioso.

Acarna Theophrasti, Ang. Lob. Lugd. Tab. Ger.

VIII. Acarna minor caule non folioso.

Leo, Carduus ferox, Dod.

Phoenix, Leo, Carduus ferox, Lob.

Carduus ferox, Lugd. Tab. Ger.

CHAMÆLEON SIVE CARLINA.

Xαμῆλεον à foliorum varietate dicitur, Dioscoride & Plinio testibus: at ille de nigro, hic verò de utroque testatur: eo quod cū terra colorē mutet: hic enim viridia, illic albicantia, alicubi cerulea, nonnusquam rubra inveniuntur, Dioscoridi: at Plinio hic niger, illic viridus, alibi cyaneus, alibi croceus atq. alijs coloribus.

Duplex est Dioscoridi l. 3. c. 10. & 11. albus & niger, albus ideo fidei dicitur, quod quibusdam locis viscum ad ipsius radices inveniatur: At Plinio l. 22. c. 18. Chamæleonem ixiam vocant (de utroque intelligens) duo genera ejus, candidior, & c. & sub alijs foliorum gigni asserit, quo mulieres etiam pro mastiche utuntur, utroq. monente. At Guiland. Chamæleonem & Ixiam Dioscoridis lib. 6. qui inter venena recenset, plantas diversas facit.

Et Theophrasto 9. hist. 13. una candida, altera nigra : Vernilaginem Gaza reddit. Dioscoridi albus caulem non promit, verum ex medio spinam echino marino aut cinara similem erigit, floribus purpurascens & Plinio serpit in terra, echini modo spinas erigens : Et Theophrasto, capite est magno Acano simili, unde quidam Acanum vocarunt. At niger caulem habet dodrantalem, qui umbellam gerit, floribus spinosis tenuibus, hyacinthi emulis & versicoloribus. Verum Plinio duplex est : ex nigris, scribit, aliqui marem dixere cui flos purpureus esset, & feminam cui violaceus & una nascuntur cubitali, &c. Carlina vulgo quasi Carolina, quod credatur hanc herbam Carolo magno ab Angelo demonstratam fuisse, tanquam certissimum remedium ad pestem ab exercitu suo propulsandam.

I. Carlina acaulos magno flore.
Ebertwurfs id est apri radix, Brunf.
Carduus panis seu pacis, Ericio Cord.
Chamæleon albus, Matth. Cord. in Diosc. Lac.
Cast. Lugd.
Ixine Theophrasti, Ang.
Helxine Pliniana, Eid.
Spina arabica, Dod. gal.
Cardopatium caule nullo, Gesn. hort.
Carlina herbariorum, Adv. Lob. ob.
Chamæleon albus Dioscoridis, Guil. pap. Lob.
ico. Clus. hist.
Carlina humilis (vel altera) Dod. Col.
Carlina vulgo, Cæf.
Carlina fessili flore, Cam.
Flore est albo : est & purpureo.
II. Carlina caulescens magno flore.
Chamæleon niger vulgaris, Trag. Eyst.
Chamæleon niger alter, Matth. Lugd.
Chamæleon, Lon. niger, Lac.
Chamæleon albus, Fuch.
Leucacantha, Dod. gal.
Cardopatium flore albo caulem habens, Gesn. hort.
Carlina sive Leucacantha, Dod.
Chamæleon albus caule donatus, Lob.
Crocodilium, Carlina caulem habens, Lugd.
Carlina major, Clus. pan. elatior, Eid. hist.
Carlina alterum genus, Cæf.
Carlina caulescens, Cam. ep. & hort.

Carlina vulgaris caulem emittens, Col.

Flos albicans, rarissime rubens.

Hanc aliqui à priori nihil differre censent, nisi quod caulem proferat : alij negant : certe priori congener est.

III. Carlina acaulis gummifera.

Chamæleon albus gummi, ut mastix ferens, Belli ep. 1. ad Clus.

Chamæleon albus Apulus purpureo flore gummifer, Col.

IV. Carlina acaulos minore purpureo flore.

Chamæleon albus seu exiguus, Trag.

Chamæleon parvus, Lon. exiguus, Lugd.

Carduus acaulis septentrionalium & Chamæleon albus Cordi, Lob.

Carlina minor purpureo flore, Clus. hist.

Chamæleon Septentrionalium exiguus appellatus, Col.

V. Carlina polycephalos alba : ad bicubitalem altitudinem excrecit, cujus folia superiora candida sunt : apud Helvetios in pascuis provenit.

VI. Chamæleon niger umbellatus flore caeruleo hyacinthino.

Chamæleon niger, Matth. Cast. Lugd.

Chamæleon niger Dioscoridis, Ang. Marantæ, Adv. Lob. Cam. Col.

Chamæleon niger Cortusi, Dod. verus Dalechamp. Lugd.

Crocodilium, Tab.

A C A N U S.

DE Acano apud antiquos pauca reperiuntur, fortasse quia vulgarissima planta, omnibus cognita notas describere superfluum visum fuit : à qua reliqua spinarum genera Acanacea nuncupata. Apud Theophrastum 1. hist. 6. *Ἀκανὸς* inter *πολλὰν ἀνὰ* recensetur : & 6. hist. 1. alia solijs aculeatis constant, ut *ἀκανὸς*, *ἑρῖον*, *ῥῖνον*, &c. Guiland. in pap. Ixina à Theophr. aliter Acanus vocatur : quam vocem *ἑρῖον* Carduum pineam Gaza exposuit. Plinius lib. 22. cap. 9. Sunt qui Acanon *Ἐρῖον* ascribant, spinosam brevemq; ac latam herbam, spinisq; latioribus.

Carduus latifolius echinos obsoletæ purpureæ ferens.

Acanus, Anguil. Lugdun.

Aga vanus Cretensium, fortè Acanus Theophrasti, Honor. Belli epistol. 5. ad Clus. & Ponæ Ital.

SILY.

SILYBUM SIVE CARDUUS LACTEUS.

Σκῶλον Dioscoridi lib. 4. cap. 159. spina est lata folijs Chamæleonti albo similis. Plinio lib. 22. cap. 22. *Silybum Chamæleonti albo simile aque spinosum.*

I. Carduus albis maculis notatus vulgaris.

Carduus albus & Chamæleon, Brunf.

Carduus Mariæ, Trag. Fuch. ico. Gefn. hor. Lon.

Cast. Ger. vulgaris, Cam.

Carduus lacteus, Matth. Lugd.

Spina alba, Dod. gal. Lac. hortensis, Fuch.

Silybum, Ang. Adv. Lob.

Carduus Marianus, Cord. in Diofc. Tab.

Leucacantha, Lac. Cornaro.

Carduus leucographus, Dod.

Leucographis Plinij, Lugd.

Cardui sylv. aliud genus & Acanon Theophrasti, Cæsalp.

II. Carduus albis maculis notatus exoticus.

Carduus lacteus Syriacus, Cam.

Carduus lacteus vel Bedeguar Arabum, Rayvolff.

Aga Cretenfium nomine, semen accepimus.

CARDUUS SPHÆROCEPHALUS.

I. Carduus Sphærocephalus latifolius vulgaris.

Chamæleon verus, Trag. niger, Fuch.

Spina alba altera, Matth. (at in prima edit. & ep.

Spina alba) Spina alba putata, Cam. ep.

Spina incognita, Fuch. ico.

Spina peregrina, Dod. gal.

Carduus Sphærocephalus, Cord. hist. Dodon.

Tab. Eyst.

Echinopus, Gefn. hort.

Crocodilium, Lac. Adv. Lob. ob.

Ritro five Rutro Theoph. Lob. ico.

Chalceios, Lugd.

Tetralix spinosa, Lugd.

Silybum, Lugd. desc.

Spina alba: item Arabica, Lugd.

Ruthrum alterum, Eid.

Sphærocephalus annuus, Cam.

Carduus globosus, Ger.

Fructu est pilæ modo rotundo, flore candido vel cæruleo, vel staminibus in medio cæruleis.

Κροcodίλιον Dioscoridi lib. 3. c. 12. Chamæleontis

nigri figuram habet: nascitur in sylvis, radice

longa, levi, aliquantulum lata, odore ut nastur-

tij acri. Idem Plinio l. 27. c. 8. qui radicem scri-

bit longam, æqualiter crassam, odoris asperi.

Χαλκεῖος (Ærariam Gaza vertit) apud Theo-

phrastum & Plinium esse volunt, cum tamen

eius historia apud neutrum extet: Sic Theoph.

6. hist. 3. inter natura spinosas Chalceios, quæ

tamen non aculeatis folijs constat: Et Plinius

l. 21. c. 16. Item acarna, leucacanthos, chalceos

&c. in folijs non habent aculeos.

Τετραλίξ (quam cum reliquis aculeatis plantis

enumerat Theoph. 6. hist. 3.) inquit, à quibus-

dam vocata æstate floret: Et Plinius l. 21. c. 16.

quædam æstate florent ut Tetralix. Sed non est

confundenda cum Erica, quam Athenienses

Tetralicen vocant, eodem l. 21. c. 16. authore.

Ἀκανθολώνη five Spina alba, folia fert Chamæ-

leontis albi, sed angustiora & candidiora, ali-

quantulum hirsuta & aculeata: caulis bicubi-

talis candicans, &c. in cacumine capitulum spi-

nosum, echini marini æmulum, at minus & ob-

longum: flores purpurei, in quibus semen seu

Cnici, sed rotundius. Dioscorides lib. 3. c. 14. &

Plinius l. 25. c. 12. cui Spina alba dicitur.

Ἀκανθὰ ἀραβική, Spina Arabica, natura spinæ al-

bæ similis esse creditur, Diof. l. 3. c. 15. & Plinius

l. 25. c. 12. Spinæ Arabicæ vires recenset.

ῥύθρον: Theophrastus 6. hist. 3. hæc solum ha-

bet: alia superne cacumine tantum ramos spar-

gunt, quemadmodum Ruthrum. Sunt tamen

qui velint mendose pro *ῥύθρον* apud Theophra-

stum legi, quod ex Pliniana l. 21. c. 16. loci illius

Theophrasti interpretatione colligitur, cum

ibi non Ruthrum sed Eryngium legatur.

Hæc lubuit aspergere cum huic & sequenti-

bus, hæc nomina à quibusdam tribuantur: at

verborum brevitatis obstat quo minus certi quid

statui possit.

II. Carduus Sphærocephalus cæruleus minor.

an Ritrum five Rutrum Theoph. Ang.

Ritro floribus cæruleis, Adv. Lob.

Carduus sphærocephalus 3. Dod. Lugd.

Crocodilium Monspelienfium Dalech. Lugd.

Ruthrum Theophrasti, Eid.

Spina alba putata flore cæruleo, Cam. ep.

Bbb 3

III, Car-

III. Carduus sphærocephalus capitulo longis spinis armato.

Spina alba, Ang. Adv. Lob.

Cardus sphærocephalus acutus, Dod. Lugd.

an Sphærocephalus maximus, Cam.

Hujus major & minor species five 2. & 3. Dodon. & Lugd.

IV. Carduus sphærocephalus minimus acutissimis folijs.

Carduus Sphærocephalus 4. Dod. Lugd.

V. Carduus capite rotundo tomentoso.

Carduus eriophorus, Dod. Clus. pan. & hist. Cam. Lugd. desc.

Carduus tomentosus & corona fratrum, Lob.

Acanthium montanum Dalech. Lugd.

Jacea lutea, Clusij, Lugd. ico.

Onopordon, Lugd.

Spina alba, Cæf.

Flore est purpureo, interdum albo.

Onopordon Plinius lib. 27. cap. 12. si comederint asini, crepitus reddere dicunt: de hoc idem restatur Dalechampi.

CARDUUS TOMENTOSUS CAPITULO LATIORE.

I. Carduus tomentosus capitulo majore.

an Spina Arabica, Ang.

Carduus tomentosus, Adv. Lob. ico.

Spina Arabica Dioscoridis & Plinij, Matthioli. emend. & Cæf.

II. Carduus tomentosus capitulo minore.

Spina alba, Matth. Cæf. altera, Matth. Lugd.

Carduus sphærocephalus quintus, Dod.

Spina alba altera, Cæf.

Hujus folia aliquando maculis albis notantur.

III. Carduus tomentosus capitulis minimis aculeatis.

Carduus aræophyllos Dalechampi, Lugd.

IV. Carduus tomentosus capitulis echinatis.

Leucacantha Monspelienfium Dalech. Lugd.

ACANTHION.

A ^{καλὸν} Dioscoridi l. 3. c. 18. folia gerit spina alba similia, in summo verò eminentias aculeatas araneosæ lanugine obductas, è qua collecta textaq; vestes bombycinis similes fieri ajunt. Plinius l. 25. c. 12. Spina alba similis est spina illa, quam Greci Acanthion vocant, minoribus multo folijs, aculeatis per extremitates, & araneosæ lanugine obductis, quæ collecta etiam vestes bombycinis similes sunt in Oriente.

Carduus tomentosus latifolius.

I. Spina alba tomentosa latifolia sylvestris.

Spina alba 3. Trag.

Spina alba sylv. Fuch. Lon.

Acanthium, Matth. Dod. ut. Adv. Lob. Cæf. Cam.

Lugd. qui Matth. & Fuch. figuram exhibet.

Onopordon Athenæi, Ang. Gesn. hort.

Onogyros Nicandri, Eidem.

Acanthium vulgare, Tabern. flore albo & flore

purpureo.

Acanthium album, Ger.

Silybum sive Leucacantha Loniceri, Lugd. ico.

Carduus sylvestris, Cæf.

Floribus communiter purpureis, aliquando albis: hinc duæ figuræ apud Tabernæmont. & Gerardum.

Hæc duplex: altera folijs latioribus densa lanugine: altera angustioribus, tenuiore lanugine obfita, & in hac capitula majora & innocentioribus spinis horrentia: hinc apud Dodonæum figuræ duæ, altera Lobelij, altera Fuchij.

II. Spina tomentosa altera spinosior.

Acanos forte Bellonij.

Onopordon, Dod. Cam. Tab. cui 1. & 2.

Acanthium Illyricum, Adv. Lob.

Onopyxus 3. Dalechampi, Lugd.

Carduus viarum, & Card. viarum fl. albo, Ger.

Acanthium sylv. flore albo, Eyst.

Floris color ut prior variat: hinc duæ figuræ apud Tabernæmontanum & Gerardum.

III. Acanthium peregrinum, Tab. quid?

Solstitialis lutea peregrina, Ger.

ACANTHA SIVE BRANCA URSINA.

A ^{καλὸν ἢ ἰσπανικὸν} (quasi serpens spina) Dioscoridi l. 3. c. 19. folia habet lactuceis latiora multo & longiora, cruce divisura, nigricantia, pinguis ac levia: caulem lavem, binum cubitorum, digitali crassitudine, propè verricem ex intervallis foliolis quibusdam cæu alveolis circumdatum oblongis hyacinthinis, è quibus

quibus flos prodit albus: semen oblongum ac luteum: caput verd thyrſi ſpecie: radices ſubſequent viſcoſe, muſcoſe, ruſſe ac longæ. Plin. l. 22. c. 22. Acanthos eſt topiaria & urbana herba, elato longoz folio crepidines marginum adſurgentiūq; pulvinorum toros veſtiens. An hac ſit Acantha apud Theoph. 4. hi. 11. inter herbas, quam Gaza Spinam vertit, de qua inquit: pari modo & ſpina quæ Ceanothos (ἀκανθὰς αἰνῶδης) appellatur, ut Cyperrus germinat: verum huius radix non harundinoſa neq; geniculata eſt: & utrum ea quæ pro Acantho exhibetur, ſit Dioſcoridis Acanthus aliqui dubitant, quæ de re ſuo loco.

Genera duo ſunt, eſt ſativa & ſylveſtris: de hac Dioſcorides l. 3. c. 20. eſt & ſylveſtris Acantha, carduo ſimilis, aculeata, brevior ſativa: & Plinius l. c. duo genera ejus ſunt, aculeatum & criſſum, quod brevius: alterum leve, quod aliqui Paderota vocant, alijs Melanphyllum.

I. Acanthus ſativus vel mollis Vergilij.

Acanthus, Matth. Cord. in Dioſ. Lac. Lon. Caſt.

Cæſ. lævis, Eyſt.

Acanthus verus, Trag. (cui & Branca urſina Italica vera) Fuch. Cam.

Acanth. ſativ. Dod. ut: Gef. h. Ad. Lob. Lug. Tab.

Branca urſina Italorum, Guil. epiſt.

Et plantæ ſucco glutinoſo & quaſi mucoſo quidam gummi Tragacanthę æmulum faciunt.

II. Acanthus aculeatus.

Acanthus ſylveſtris, Dodon. ſpinofus, Eyſt.

(Ger. Acanth. ſyl. Scolymo ſimilis aculeat. Dioſ. Lob.

Chamaeleonta Monſpelienſium, Lob. ico.

Branca urſina aculeata, Lugd.

SCOLYMUS SIVE CINARA.

Σκόλυμος Dioſcoridis l. 3. c. 16. folia habet Chamaeleonis & Leucacanthę, at nigriora & craſſiora: caulem edit longum, folijs obſitum, in quo capitulum eſt ſpinofum: radix craſſa nigra. Plinio l. 19. c. 7. Carduus dicitur, ubi & maximi queſtus eſſe teſtatur, & ſerendi modum deſcribit. A' g'ioſon, Tralliano: Κινάρα, Galeno de alimentis: Cinara (à cinere quo ſtercorari amat) Columella & Palladio.

Genera: ſativus eſt qui folijs eſt ſpinofis & non ſpinofis: eſt & ſylveſtris, qui videtur eſſe apud Theophr. 6. hiſt. 4. c. 27. nuncupatus. Caſtus, inquit, ſtatim à radice caules repentes in terram mittit, folio lato atq; ſpinofis: caules hos Cactos appellant, deſquamati cibo idonei ſunt fructus in quo ſemen ſpinata ſpecie eſt, & c. Et Plinio l. 21. c. 16. Cactos in Sicilia tantum creſcit, ſue proprietatis & ipſa, cujus in terra ſerpunt caules à radice emiſſi, lato folio & ſpinofis: caules vocant cactos, & c.

I. Cinara horteniſis folijs non aculeatis.

Cardui alterum genus, Trag.

Carduus non aculeatus, Matth.

Cinara, Dod. gal. Lacun. Eyſt.

Scolymus non aculeatus, Ang. Tab.

Carduus horteniſis, Gef. hort.

Carduus aut Scolymus non aculeatus, Lon.

Cinara non aculeata, Matthioli & Dod. Lugd.

Carduus ſativus, Gef.

Cinara ſeu Artichocho vulgarior, Eyſt.

Carduus horteniſis non ſpinofus, Caſt.

II. Cinara horteniſis aculeata.

Scolymus, Trag. Fuch. Cord. ut: Gef. hort. Ad.

Lobel.

Carduus horteniſis folijs ſpinofis, Gef. hor. Caſt.

Cynarę aliud genus, Dod. gal.

Carduus, Lac. Tur. ſive Scolymus, Lon.

Carduus altilis, Lugd.

Scolymus Dioſcoridis, Cluſ. hiſt.

Utramq; qui eandem fecerit non repugnabimus: quia folijs eſt aliquando aculeatis, aliquando mitibus: Sic caput nonnunquam in gracileſcentem metam erigitur: nonnunquam in compreſſiorem & rotundiorem globum extuberat,

laminis interdum ſponte ſeſe recludentibus, interdum arctius compactis: capitum ſquamæ nunc virides, nunc pallentes, nunc ſubrubentes in aculeum deſinentes, nunc brevem nunc robuſtum, nunc infirmum, eumq; in alijs ſurſum erectum in alijs deorſum inclinatum, nunc prope nullum. Eſt quædam capite maximo, quæ dicitur & pingitur ſub

III. Cinara maxima Anglica, Lob. ico. Ger.

Scolymo majore, Taber.

Scolymus ſeu Cinara maxima, Eyſt.

Additur in horto Eyſtertenſi

Cinara major Boloniensis quod è Polonia allatum, folijs eſt minus aculeatis. Item

Cinara Genuenſium, ſquamis circa latera inæqualibus & aculeo infirmo.

IV. Cinara ſpinofa cujus pediculi eſt antur.

Carduus aculeatus, Matth.

Cinara ſpinofiſſima, Scolymus Dioſcoridis, &

Cactos Theophrasti, Ang.

Caſtus Matthioli, Lugd.

Cardones, Cæſalp.

Scolymus aculeatus, Tabern.

Carduus horteniſis, quem Cardum vulgo, Cam.

Folio.

Foliorum pediculi terra obruti candidi, à cute emundati, hyeme crudi cum sale & pipere in cibos veniunt: & licet capitulis sint spinosissimis, longissimis aculeis armatis & vix vescis; colitur tamen, ut Stolones teneri gulę arrideant.

V. Cinara sylvestris latifolia.
Scolymus sylvestris, Ad. Lob.

Scolymus Dioscoridis, Lugd.

VI. Cinara sylv. Cretica.

Agriocinari, Belli ep. 2. ad Clus.

Agrioancinara Cretica, Ponæ Ital.

an Cynara sylv. Bœtica, Clus. cur. post.

Echini licet spinosissimi antequam aperiantur & crudi & elixi esitantur.

CARDUI ALIQUOT EXOTICI

I. Melocactus Indiæ occidentalis.
Echinomelocactus, Ad. Lob. ico. Clus. ex. lib. 4. cap. 24.

Melocarduus echinatus Penæ, Lugd. Tab. Ger. Melocactus, Eyst.

Ex melone, pepone & carduo coaluisse videtur.

II. Carduus Guyavenfis.

Spina ex Guyava ex cardui capite detracta, Clus. exot. l. 2. c. 6.

III. Carduus spinosissimus brachiatis ex Hispaniola.

Pithaja, Card. de variet. Gef. hort.

Carduus pithaya Oviedi, Lugd.

Hujus fructus esitatus, urinas sanguini similes non secus quam Ficus Indiæ fructus causat.

IV. Carduus Insulæ Madagascar.

Cardui cujusdam elegantissimi caput sub fructu 15. Clus. exot. l. 2. c. 15.

V. Carduus Brasilianus folijs Aloës.

Nanas Theveti, Lugd. Clus. Garz. & par. 3. Americ. epist. 1. de Brasil.

Strobilus sive nux pinea, Monardi.

Ananas Acoctæ, Lugd. ap. Cast. & par. 4. Ind. Or. cap. 5. fig. 14.

Ananas, Ananasa: Brasilianis, Nana: Hispaniola, Jajama: Hispanis, Pinas, cujus duo genera, mas & femina, par. 6. Ind. Or. c. 38.

Pineæ nuces in America, Joseph. Acoctæ lib. 4. cap. 19.

Pineæ in arbusculis, Benzoni lib. 1. c. 28. vel par. 4. Ind. Occid.

Ananas optimus Americæ fructus, qui Panacous Brasilianis, Lerio cap. 12.

Aizoi majoris ortu persimilis exotica planta, Lob. ico.

Aberas nomine fructus Francofurti venalis fuit. Species hujus tres secundum Oviedum: prior

Jajama: altera Bonjama: tertia Jajagua dicitur.

VI. Carduus Brasilianus sylvestris.

Ananas sylvestris, Acoctæ, Lugd. Cast.

VII. Carduo Ananæ similis.

Hoyriri, Theveto.

SCOLYMUS THEOPHRASTI

Σκόλυμος Theophrasto 6. histor. 4. (Carduus à Gaza vertitur) sive Limonia inter Acanacea, folijs constat aculeatis: pulchre diu floret, &c. radix lacteum succum emittit: floris quoque, proventus peculiaris videtur: etenim circa solstitium incipit: carnosam ciborum, idoneam partem crassescens sortitur: ortus autem ejus non spinosus, sed oblongus fieri assolet, &c. Plinio lib. 21. cap. 16. Scolymus floret sero & diu, Carduorum generis, ab ijs distat, quod radix ejus vescendo est, decocta: mirumque, quod sine intervallo tota æstate aliud floret in eo genere, aliud concipit.

Scolymus chrysanthemus.

Eryngium Vegetij, Ang. Cam.

Ascolimbros, Bellonio.

Scolymus Theophrasti, Clus. hisp. Ad. (& Eryngium luteum Monsp.) Lob. Cæs. Lugd. Taber. Camer.

Carduus chrysanthemus, Dod. Ger.

Atractylis marina, Lugd.

Variat ratione loci: qui circa Monspelium provenit magis luxuriat, ramis latius sparsis &

longioribus: cujus folia lacteis maculis notata sunt: floribus est paucioribus, quam in ea planta quam Hispania profert: hinc duæ icones à Dodonæo & Clusio in sua historia proponuntur: illa quidem nomine

Scolymi Theophrasti Narbonensis, Clus.

Cardui chrysanthemum alterius figura, Dod. hæc

Scolymi Theophrasti Hispanici, Clus.

Cardui chrysanthemum, Dod.

CAR.

CARDUUS SPINOSISSIMUS.

O *Nævç* à Theophrasto 6. hist. 3. & à Plinio l. 21. c. 16. inter spinosas stirpes numeratur (natura, inquit Theophrast. spinosus est) Buxum asininum Gaz a vertit, quod sit carduus astuus in cibo gratissimus.

I. Carduus spinosissimus latifolius sphærocephalus vulgaris.
Scolymus, Dod. gal.
Carduus asininus, Ges. col.
Carduus sylvestris primus, Dod.
Onopyxus Dodonæi, Lugd.

II. Carduus spinosissimus sphærocephalus rigidus aculeis armatus.
Cujus semen Cardui Arabici nomine missum fuit: excrevit caule crispo cubitum superante, folijs latis, longitudine palmum excedentibus per caulem rarioribus: capite est rotundo supernè æquali, spinis oblongis atrociter pungentibus armato: flore albo odorato: in cuius lanuginoso capitulo semen continetur striatū & transversim canaliculatum, caucalidis Hispanic. fere modo sed rudius & crassius. Hortis facile aslucescit.

III. Card. spinosissimus angustif. vulgaris. Agriacantha, Ruellio.

Carduus sylv. tertius, Dod. ut:

Aculeosa Gazæ, Ad.
Carduus spinosissimus vulgaris, Lob.
Polyacanthos Theophrasti, Lugd. Tab.
Onopordon, Gerard.

IV. Carduus spinosissimus capitulis parum aculeatus.

Onopyxos alter, Lugd.
V. Carduus spinosissimus segetibus frequens.
Carduus avenarius, Lonic.
Drypis, Lugdun.

Capitulis est ut in Scolymo echinatis, flore alius purpureo, alius candicante, alius puniceo.

VI. Carduus lanceatus latifolius.

Carduus lanceolatus, Tab. Ger.

II. Carduus lanceatus angustifolius: qui pro 4. in Prodromo describitur.

VIII. Carduus vertice corticoso.

Carduus chondrilloides Dalechamp. Lugd.

DIPSACUS SIVE CARDUUS FULLONUM.

Δ *ῥαν*, id est, sitibundus, nomen à contrario invenit: quoniam ut Dioscorid. l. 3. c. 13. monet, alarum sinu concavo rorem vel imbrem recipiat, quo velut ad sitis injurias abigendas abutitur. Latini, Labrum Veneris, à soliorum cavinato habitu, quæ se ambage anfractuosa sinuantia pelvis speciem constituunt, & intra se humorem continent. Caulem habet, inquit Dioscorides, altum, spinis horridum, & folia caulem amplectentia liguca foliorum amula, bina in singulis geniculis aculeata, &c. in cacumine caulis, singulis surculis, singula capitula in sunt echino similia, oblonga aculeata, quæ divisa in medulla vermiculos ostendunt, &c. Plinius l. 26. c. ult. Labri Veneris meminit, at non descripsit: quare dubium an Dipsacum intellexerit. At l. 27. c. 11. Galedragon Xenocratis vocasse videtur, sic describens: leucacantha similis, palustris & spinosa, caule ferulaceo, alto, cui summo caput inhaeret simile ovo: in hoc crescente atate vermiculos nasci tradunt, &c.

Genera: duplex est, sativus & sylvestris: hic major & minor:

I. Dipsacus sativus.
Carduus fullonum sativus, Trag.
Labrum Veneris, Matth. Cord. in Dioscor. flore candido, Cæf.
Dipsacus hortenſis albus, Fuch.
Galedragon Xenocratis, Anguil.
Dipsacus sativus, Dod. ut: Cord. hist. Ges. hort. Gerard.
Dipsacus sativus fullonum, Ad.
Carduus fullonum, Lob. & an Spina Selenitis Theophrasti, Guiland.
Dipsacus sive Labrum Veneris, Lugd.

II. Dipsacus foliolaciniato.
Dipsacus secundus, Tab. syl. Ger.

III. Dipsacus syl. aut Virga pastoris major.

Carduus fullonum, Brunf.
Carduus fullonius erraticus, Trag.
Labrum Veneris alterum, Matth.
Dipsacus Lac. Lon. Tab. purpureus, Fuch.
Dipsacus sylv. Dod. ut: Tur. Cord. hist. Ges. hor. Thal.
Labrum Veneris, Cord. in Dioscorid. Ad. Lob. sylv. Cast.
Labrum Veneris flore purpureo, Cæf.
Dipsacus sativ. alter, & Dipsacus syl. major, Lug.

IV. Dipsacus syl. capitulo minore, vel Virga pastoris minor.

Cardui fullonij tertium genus, Trag.

Ccc

Virga

Virga pastoris, Matth. Ad. Lob.

Dipsacus 3. & Galedragon Plinij, Dod. ut:

Dipsacus minor, Gef. hor. Thal. fyl. minor, Lug.

Virga pastoris & Dipsacus fatuus, Cam.

Molybdena Plinij, vulgo Dipsacus secundus

capite rotundo, Dalech. in Plin.

ERYNGIUM SIVE IRINGUS OFFICINAR.

E *Ἐρύγιον ἢ ἰρύγιον* Græci Philosophi Eryngium, quasi *ἐρύγιον*, id est, ructum, dictum putant, quod capra quæ morfu surculum Eryngij præciderint, vel deglutiverint, cunctum gregem pone sequentem quasi stupore attonitum sistunt, donec Eryngium ructu rejecerint. Eryngio Diosc. l. 3. c. 24. folia lata sunt & extremo ambitu aspera, & ubi augescunt circa complures caulium eminentias in spinas aculeantur, in quorum summitatibus glabrosa sunt capitula, spinarum acutissimarum durarumq; ambitu stellatim circumvallata: radix oblonga, &c. Plin. l. 22. c. 7. Erynge & Eryngion, dura, fruticosa, spinosis folijs, caule geniculato, cubitali & majore aliquando, alia albicans, alia nigra, radice odorata: & c. seq. ex his candidam nostricentum capita vocant. Sunt qui velint apud Theophrastum 6. hist. 3. *ἰρύγιον* mendose pro *ἐρύγιον* exaratum esse, quod ex Plinio colligatur.

Genera: Dioscorides unius quidem meminit: sed capitulorum colorem alias viridem, nunc pallidum, alias album, interdum cæruleum inveniri scribit: & Plinio sativum est: est & sponte nascens in asperis: & in litonibus maris durior nigriorq; folio apij.

I. Eryngium maritimum: & Gef. hor.

Eryngium marinum, Matth. Dod. ut: Ang. Tur.

Ad. Lob. (cui & Acanos Plinij) Cast. Lugd. Cæf.

(cui & Crocodilium Dioscoridis & Plinij) Cam.

mer. Clus. hist. Eyf.

Glyzyrrhiza spinosa, Lacun.

Eryngium rotundo folio, Colum.

II. Eryngium vulgare: & Cam.

Eryngium primum, Trag. Lon.

Eryngium montanum sive campestre, Matth.

Cast. Lugd.

Eryngium, Fuch. Ang. Lac. Cord. in Diosc. Cæf.

Tab. vulgare, Dod. gal.

Eryngium mediterraneum, Turn. Gef. hor.

Gerard.

Eryngium campestre, Dod. Cast. vulgare, Clus.

hist.

Eryngium campestre mediterraneum, Ad. Lob.

III. Eryngium montanum amethystinum.

Eryngium caule & flore cæruleo, Ang.

Eryngium aliud in montibus, Cæf.

Eryngium totum cæruleum, Cam. hort. Eyf.

Eryngium montanum cæruleum, Ad. Col.

Interdum tota planta est coloris saturate cæ-

rulei, aliquando solum pars superior: cujus eti-

am pumila species, Camerario monente.

IV. Eryngium montanum pumilum.

Eryngium pumilum, Clus. hisp. & hist. Dodon.

Lugd. Tab. Ger.

V. Eryngium montanum minimum, capi-

tulo magno.

Carduncellus montis Lupi, Ad. Lob. ico.

Carduncellus Penæ, sive Cardui minimi spe-

cies, Lugdun.

VI. Eryngium alpinum cæruleum, capitu-

lis dipfati.

Eryngium alpinum, Gef. ho. cæruleum, Eid. col.

Eryngium magnis latifq; capitulis, Gef. hor. ap.

Eryngium alpinum cæruleum, Ad. Lob. ic. Tab.

Eryngium montanum tenuifolium ambitu

profundè sinuatum, Lob.

Eryngium planum Matthioli, Dod. ico.

Eryngium aliud montanum Dalechamp. Lug.

Spina alba Dalechampij, Eid.

Herba peregrina folijs acanthi, Cæf.

Eryngium capite dipfati, nobile dictum Gef-

nero, Cam.

Eryngium spurium primum, Ger. ico.

VII. Eryngium latifolium planum.

Eryngium planum, Matth. Cast. Lugd.

Eryngium spurium primum, Dod.

Eryngium pannonicum latifolium, Eyf. Clus.

pan. latifolium primum, Eid. hist.

Eryngium cæruleum, Ger. 1. & 2. Tab.

Flore est cæruleo: est & albo: caulis in illo

purpurascens, in hoc ex viridi pallescens: à pri-

ore differt potissimum capitulis, quæ in illo ob-

longa lata: in hoc rotunda sunt.

VIII. Eryngium planum minus.

Eryngium pusillum planum Mutoni, Lob. Lug.

Clus. hist.

IX. Eryngium arvense folijs serræ similibus.

Crythamus agrestis, Trag.

Crithmum quartum, Matth. Cast. Tab. Cam. an

agrestis Tralliano.

Eryngium quartum, Dod.

Eryng. mont. recentiorum, Ad. Lob. Lugd. Ger.

Ammi quorundam Dalechampij, Lugd.

CAR-

CARDUUS STELLATUS.

- I. Carduus stellatus latifolius acaulos. *Spina folstitialis, Eid. Dod. Ad. Lob. ico. Cam.*
ο φαντασμα, sive findens oculos, Cast. quid?
 II. Carduus stellatus latifolius caulescens. *Leucacantha quorundam, Lugd.*
Carduus stellatus Dalech. Lugd. *Calcatreppola altera, Cæf.*
 III. Carduus stellatus folijs papaveris *Carduus folstitialis, Cam.*
erratici. *Spina folstitialis mitior Apula, sive Carduus*
Eryngium, Brunf. alterum, Trag. Lon. *stellatus minor, Col.*
Calcatreppola, Matthiol. cap. de Eryngio: & *V. Carduus caule stellato Peruanus.*
Cæfalpino, quasi caccotribulus, id est, infestus *Carduus, Monardi.*
tribulus: qui Stœbe Theophrasti putat. *Arundinacea pinnata & spinosa exotica plan-*
Carduus stellatus, Dod. ut: Adv. (sive Calci- *ta, Adv. Lob. ico.*
trapa) Lob. Cam. Ger. *Palmacea seu arundinacea pinnata spinosa 1.*
Carduus stellatorius sive stellario, Gefn. hort. *Lugd. desc. ar. ipsa figura sub titulo Nerei facie 1.*
Polyacantha, Cord. hist. *habetur.*
Myacanthos Theophrasti Dalechampion, Lug. *Calamus Peruvianus asteroides, Tab.*
Spinastella, & Spinastella alba, Tab. *Calamus Peruvianus spinosus, Ger.*
Hippophæstum vel Hippophæus Dioscoridis, *Λσπινάκινθα Dioscoridi 1.3. c.22. radice est cyperi*
Colum. *amara & calida: Idem Plinius 1.22. c.16. Apud*
Carduus muricatus, Clus. hist. *Theophrastum 6. hist. 4. (spina candida Gazæ)*
Variat florum colore, communiter subru- *spinosa est, sed non aculeatis folijs constat.*
bens, aliquando albus: hinc duæ figuræ apud *Alij ἀκανθα βραχύνη spinam regiam Theophra-*
Tab. & Ger. *sti volunt, de qua 1. cauf. 10. Spina regia aculeis*
 IV. Carduus stellatus luteus folijs cyani. *constat, & radix in caput excrescit, ceu nepa.*
Spina citrina vel lutea, Gefn. hort. *Utriusque descriptio brevior, quam ut quid*
statui possit.

EUPHORBIIUM ET ANTEUPHORBIIUM.

Euphorbium auctore Dioscoride 1.3. c.96. Juba in Libya regnante primo inventum est: & ut Plinius 1.25. c.7. Invenit rex Juba quam appellavit Euphorbiam, medici sui nomine & fratris Musæ, à quo Divus Augustus conservatus fuit. Dioscoridi Libycæ arbor est serula speciem habens, quæ in Atlante Mauritanie monte nascitur, acerrimo liquore referta, quem propter eximium fervorem non citra metum incolæ colligunt: ventres ovillos lotos arbori circumligant & è longinquo caudicem contis vulnerant, unde statim copiosus liquor effluit. Plinius scribit folijs acant binis spectari, & colligendi & adulterandi modum ex Dioscoride subjungit, qui herbam Euphorbiam, succum vero Euphorbium vocavit. Leo Africanus inter Africæ plantas describit: herba, inquit, est ex toto aculeata, quæ caput cardui sylv. emulatur: inter ejus ramos ab radice exeunt fructus cubitales & ampliores, crassitudine citruli, virides, granulosis quibusdam tuberculis distincti ut Citrulus, veluti caudices viginti & triginta ex eodem cespite. Rustici hos gladijs pungunt, cum ad maturitatem pervenerint: effluit autem humor lacti similis, qui paulo mox densatur & tandem siccatur utribus collectus. Vide infra 1.12. sect. 6. Plantam ipsam primus Dodonæus expresit, quæ Bruxellis Anno 1570. est nata: quam ex Anglia unâ cum Anteuphorbio, à Lobelio accepimus.

- I. Euphorbium à Dodon. Lob. Lugd. Lon. Castor. Tabern. Gerard.
 Tabernæm. Gerard. pingitur: de ipsius succo Sic dictum à contrarijs Euphorbio facul-
 plures egere, ut Matth. Cord. Lac. Cæfalp. Lugd. tatibus, hoc enim adversus Euphorbij acrimo-
 & alij. moniam, indigenis remedio esse fertur. Do-
 Euphorbia, Cord. hist. donæus hanc herbam ad Telephium referri
 II. Anteuphorbium, Dodon Lob. Lugdun. posse censet.

TRAGACANTHA.

TRAGACANTHA, quam GAZA Hircinifum vocit. & de herba & de ejus lacryma dicitur. Diosc. l. 3. c. 23. radice est lata & lignosa, ac supra terram eminente: à qua surculi humiles robusti latissime fusi: & in ipsioli numerosa, tenuia, inter quæ aculei sese proferunt, quos ipsa occultant, candoi, firmi, recti, Theophr. b. 1. lacryram gignit: & s. hist. 9. & scilicet sponte consistit spissatior, lacrima emendi: & s. hist. 15. large in Arcadia nascitur, nec deterior Cretica existimatur, sed etia visus pulchrior. Plin. l. 13. c. 21. Creta gignit & Tragacanthem spina alba radice multum prelatam apud Medos aut in Achaja nascenti. Sed de lacryma vide infra l. 12. sect. 6.

I. Tragacantha.

Tragacantha, Matth. Ang. Gesn. hort. Lac. Lon.

Adv. Lob. Lugd. Clus. cur. post.

Tragacantha prima, Tab.

Tragacantha five Hircispina, Clus. in corol. ad

|Dodon. gal. & Dodon. Gerard.

H. *Tragacantha humilior luteis floribus.*

Tragacanthæ alterum genus, Rauvvolf. & Lugd. ap.

Lugd. ap.
Addit & tertium florib. purpureis & speciosis.

P O T E R I U M.

POTERIIUM.
Poterium secundum aliquos dictum, quia potrix herba paludosum riguumq; solum amat: & vovæ, quod nervi amica sit. Dioscorides l.3. c.17. *Poterium* *Jones* *Neuradæ* vocant, frutex grandis est, ramulis longis, mollibus, tori modo dens ac flexilibus, tenuibus, *tragacantha* proximis: folijs vero parvis & rotundis: totus autem frutex tenui lanosa lanugine obducitur, estq; spinis horridus: flores sunt parvi & candidi: radices binum: ternumve cubitorum firmæ ac nervosæ, quæ proximè terræ ac lacrymæ fundunt gummi similem. *Plinio* l.27. c.12. *Poterion* aut *Phrynon* aut *neuradæ*, qui eodem fere modo descripsit, nisi quod florem dicat longum herbæ coloris: at l.25. c.10. flores parvos tribuit.

I. *Tragacanthæ affinis lanuginosa*, five

Poterium.

Poterium, Matth. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Tragacantha altera forte Poterium, Clus. hisp.

& hist. Lob. Lugd. Tab. fortè & Bellonio.

Tragacanthæ primum genus, Rauvvolf. &

Lugdun. ap.

Spina hirci minor, Ger.

II. *Poterio affinis foliis Pimpinellæ spinosa.*

II. *Poterio affinis* folijs
Chalcios five Ereria. Ang.

Chalciosive Eferia, Ang.
Chalceion Anguillaræ, Lugd. Clusift.

Chalceion Anguillaræ, Lugd. Clu. Mit.
 Posterior. Adv. Lob. Lugd. Cæs. Tab. Ger.

Poterion, Adv. Lob. Lugd. Cael. Tab.
Rimpinella spinosa Clus. hisp. Cam.

Pimpinella ipinola, Clud. filip. C.
Ballan. Bauhoff & Lugd. an.

Stoebe legitima Dioscoridis & *σείβη* in Græc.

Stoebe legitima Diolcoridis &
cia. Honor Bellien 2 ad Cluf

D R Y P I S.

D R Y P I S.

Δ *Ponis Theophrastus 1. hist. 16. semel tantum meminit scribens. Acornam, Drypida, Acanum in genere spinoso esse, loco enim folij spina oritur. Sic dicitur ἀcornὸν τὸ δρυπίδων ἐστὶν ἀκανθώδες, ὡς αὖτ' ἐκ λανθάνοντο, pungendo, vellicando, quod aculeis suis attrahentes & colligere volentes vulneret.*

Spina umbella folijs vidua.

(Tab. Drypis ab Anguillara descripta, fortè Cenno-

Drypis Theophrasti, Ang. & ex eo Lob. Lugd. thus, Col.

ANONIS SIVE RESTA BOVIS.

ANONIS SIVERESTA BOVIS.

ANovis Diofcoridi, & Avicenna & Theophrasto. Anonis dicta videtur a non juvando quod nullam utilitatem præbeat, cum aratoribus (hinc Remora aratri dicitur) inimica sit: nisi quis ex adverso nomen impostum censuerit. Anonis quidam deducunt à νῶν ὄσ & βῶν, quasi dicas asini oblectationem: nam ex Graecis quidam affirmant, asinos in ea se volutare, & dorsum sub aculeis ejus herba libenter exterre. Diofcorides l. 3. c. 21. Anonis quam aliqui Ononida vocant ramus habet doctranales, etiam majores & fruticosos, frequentibus geniculis cinctos, multis alarum cavis præditos & capitulis rotundis: folioli pusillis, tenuibus & cæculentula, ad ruta aut lini prætensis folia accedentibus, subhirsutus, odoratus: ramulus spinosioribus horrent: radix candida est. Ac Theophrasto 6. hist. 4. Anonis junctum foliumculeata est, altero quoque folio conditur: & c. 5. verum ramis aculeigerum est: folio ruta simile, sed per totum apposito caulem, ut veluti coronam ejus intervallis totam speciem repræsentet: florem minutum & in siliqua non undique separam edit. Plinio l. 21. c. 15. Anonis secundum spinam habet folium: & c. 16. in ramis spinas habet apposito folio ruta simili, toto caule foliatum in modum coronæ: & l. 27. c. 4. Anonin quidam Anonida malunt vocare, ramosam, similem senugræco, nisi fruticosior hirsutiorq; esset, odore jucundo: post Ver spinosa.

I. Anon.

I. Ano-

I. Anonis spinosa flore purpureo.
 Resta bovis, Trag. Lon.
 Ægyption Cratevæ, Ang.
 Anonis sive Ononis, Matth. Lac. Tab.
 Anonis, Fuch. Dod. ut: Tur. Cast. spinosa, Eyft.
 Ononis, Cord. in Diosc. (cui & Acutella,) Gesn.
 hort. Adv. Lob. Lugd. Thal. Cæf.
 Anonis sive resta bovis, Ger.
 Flore est communiter coloris dilutioris pur-
 puræ, raro albidæ, quæ
 Anonis flore albo, Tab. Ger. rarissimè luteo.
 II. Anonis spinosa lutea major.
 Ononis montana lutea, Gesn. hort.
 III. Anonis spinosa lutea minor.
 Ononis lutea sylv. minima, Col.
 IV. Anonis spinis carens purpurea.
 Ononis perpetuo lævis, Gesn. hort.
 Anonis non spinosa, Claf. pan. Eyft. purpura-
 cea, Tab. Ger.
 Anonis sive Ononis sine spinis, Cam.
 Anonis mitior prima, Cluf. hist.

Hæc & candidis floribus reperitur, quæ
 Ononis candidis floribus, Adv.
 V. Anonis viscosa spinis carens lutea major,
 Natrix Plinij herbariorum, Adv. Lob.
 Anonis mitis flore luteo, Cluf. pan.
 Ononis lutea montana, Cam. ep.
 Anonis flore luteo, Eid. hort.
 Anonis non spinosa lutea, Cast. Tab. Ger.
 Ononis mitis luteo flore, Eyft.
 VI. Anonis non spinosa flore luteo varie-
 gato.
 Ononis lutea non spinosa: alijs Melilorus ma-
 jor, vel sylv. pinguis, Lugd.
 Ononis flore luteo variegato, mitis, Eyft.
 A priori differt floris colore, qui luteus, sed
 pallidior, est & lineis subrubris variegatus.
 VII. Anonis viscosa spinis carens lutea mi-
 nor, vel Anonis viscosa minor flore pendulo:
 in Prodomo describitur.
 VIII. Anonis non spinosa capreolis donata.
 Ononis Senensis, Spigelio. Sed quid?

CASPARI BAVHINI
 PINACIS THEATRI BOTANICI
 LIBER VNDECIMVS.
 SECTIO PRIMA.

CYTISUS; ANAGYRIS; LABURNUM; ACACIA;
 ASPALATHUS; SANTALUM; ARBOR BRASILIA; AGALLOCHUM;
 sive Xyloaloes; Genista-Spartium; Genista spinosa sive Scorpius; Geni-
 sta non spinosa; Chamægenista; Spartium; Colutea;
 Senna & Jovis barba.

CYTISUS.

Frutices & Arbores proposituri, à Cytiso ordini lubet, qui nomen Græcis dicitur, Latinis Cytisus, à Cythino
 insula, in qua, Plinio l. 13. c. 24. auctore, inventus est, unde in omnes Cycladas, mox in urbes Græciæ magno
 casu proventu, translatus: Est autem Dioscoridi l. 4. c. 113. Cytisus frutex: totus albus, uti Rhamnus, ramos spar-
 gens cubitales etiam majores, in quibus folia similia Fœnugraci aut Loti trifolia, sed minora & dorsum promi-
 nentiora habentia. Theophrasto i. hist. 9. & 5. caus. 6. Cytisus medullam duram, spissam & nigram habet: &
 4. hist. 5. fruticosa est veluti Hebenus. Plinio l. c. Cytisus frutex est canus aspectu, breviterq; si quis exprimere
 similitudinem velit, angustioris trifolij frutex. Columella l. 9. c. 4. Sativum est & sue sponis.

Cytisus incanus vel hirsutus.
 I. Cytisus incanus, filiquis falcatis.

Cytisus Maranthæ, Matth. Lob. Lugd.
 Cytisus ut existimatur, Dod.

Ccc 3

Cytisus,

Cytifus, Cæfalp. Galeni, Cam.

Cytifus tertius cornutus, Tabern. septimus cornutus, Ger.

Cytifus Galeni Maranthæ cornutus, Eyft.

Lignum Rhodium, five Cytifus verus, Honor. Belli epist. 4. ad Cluf. qui hujus ut & sequentis ramum ad nos misit.

II. Cytifus incanus Creticus.

Barba Jovis altera, Ang.

Cytifus Creticus *αγγορδισιον*, id est, nobile lignum, Hon. Belli epist. 1. ad Cluf.

Ebenus Cretica, Eid. epist. 4. ad Cluf. & Ponæ.

III. Cytifus incanus folio oblongo Austriacus.

Cytifus 2. Cluf. pan. quintus, Eid. hift. Eyft.

Cytifus sextus, Tab. ico. alias undecimus.

Cytifus incanus, Ger.

Pseudocytifus 2. Dod. belg.

Hujus altera species angustis folijs, ijsque velut in aculeum desinentibus, quemadmodum in Italia reperitur, qui Cytifus acuminatis folijs dici possit.

IV. Cytifus incanus filiqua longiore.

Cytifus, Adv. Lob. ico. Cast.

Cytifus prior Penæ, Lugd.

Cytifus quartus, Tab. octavus, Ger.

Cytifus sylv. species prima, Cæf.

In hortos translata canitiem amittit.

V. Cytifus albicans, folio trifolij vulgaris.

Cytifus albus sylvestris, Cord. in hift.

an Cytifus alpinus Dalech. Lugd.

VI. Cytifus folijs subrufa lanugine hirsutus.

an Cytifus, Tur.

Cytifus 4. Cluf. hisp. tertius, Eid. hift.

Cytifus quartus Hispanicus Clusij, Lob. Lugd.

Cytifus 12. Hispanicus 4. Tabernæm. ico. alias decimus.

Pseudocytifus hirsutus, Ger.

an Cytifus sylv. alter, Cæf.

VII. Cytifus hirsutus major folijs pinnatis.

Cytifus secundi species altera, Cluf. pan. 5. species altera, Eid. hift.

Cytifus septimus, Tab. ico. alias duodecimus.

Cytifus pinnatus, Ger.

VIII. Cytifus incanus folio medio longiore.

Cytifus 3. Cluf. hisp. sextus, Eid. hift.

Cytifus tertius Hispanicus Clusij, Lob. Lugd.

Cytifus undecimus Hispanicus 3. Tabernæm. ico. alias nonus,

Cytifus sempervirens, Gerard. icon.

IX. Cytifus hirsutus flore luteo purpurascens.

Cytifus magnus flore luteo purpurascens, Ponæ Ital.

X. Cytifus supinus folijs incana lanugine infernè pubescentibus.

Cytifus tertius, Cluf. pan. septimus, Eid. hift.

Cytifus 8. Tab. ico. alias sextus.

Cytifus hirsutus, Ger.

an Cytifus supinus, Cam.

XI. Cytifus supinus folijs infernè & filiquis molli hirsutic pubescentibus.

Cytifus septimi species altera, Cluf. hift.

Cytifus septimus, Eyft.

XII. Cytifus minoribus folijs ramulis tenellis villosis.

Cytifus primus, Cluf. hisp. & hift.

Cytifus Hispanicus primus, Lob. Lugd.

Pseudocytifus prior, Dod. Ger.

Cytifus nonus: Hispanicus 1. Tabern. ico. alias septimus.

XIII. Pseudocytifus flore Leucoij luteo.

Cytifus facie Alysson fruticans quorundam, Lobel. Lugd.

Cytifus adulterinus, Tab Ger.

Cytifus glaber.

I. Cytifus glabris folijs subrotundis, pediculis brevissimis.

an Cytifus primus, Ang.

Cytifus alter minor, Adv. Lob. ico. Lugd.

Cytifus quintus rotundifolius, Tab.

Cytifus, Ger.

Trifolium arborecens, Eyft.

II. Cytifus glaber viridis.

Cytifus secundus, Tab.

Cytifus filiquosus, Ger.

Trifolium fruticans Guilandinus nominabat.

III. Cytifus glaber nigricans.

Pseudocytifus five niger, Cord. hift.

Cytifus, Lac. Ger. & apud Cordum pingitur.

Cytifus Gesneri, Lugd.

Cytifus & Cytifus minor, Gesn. hort.

Cytifus primus, Cluf. pan. Tab.

Cytifus quartus, Cluf. hift.

Cytifus niger five major, Cam.

Pseudocytifus primus, Dod. Belg.

Cytifus 1. Tab. spicatus, Eyft.

IV. Cytifus folijs incanis angustis quasi complicatis.

Cytifus

Cytisus secundus, Clus. hisp. & hist.
Cytisus secundus Hispanicus, Lob. Lugd.
Pseudocytisus alter, Dod. Ger.
Cytisus decimus: Hispanicus secundus, Tab.
icon. alias octavus.

Hic circa Monspelium folijs est viridibus, in

Hispania prorsus incanis.

V. Cytisus foliolis glabris filiquis Ornitho-
podij hirsutis, in Prodromo descriptus.

VI. Cytisus in Thraciæ & Macedoniæ pratis,
quam neq; Gallia neq; Italia alat: his solum ver-
bis meminit Bellon. l. 1. obs. c. 56. 60. 63. Sed quid?

ANAGYRISET LABURNUM.

A *Nagyris* sive *αγάριον*, alijs *ἀνεριον* Dioscoridi l. 3. c. 167. fructus est arboris instar, folijs & virgū Vitici as-
similis, perquam gravis odoris: flore brassicæ simili: semen in longis corniculis renum figura, versicolore
ac solido, quod uva mutrescente durecit: Et Plinio l. 27. c. 4. *Anagyros*, quam aliqui *Acopon* vocant: fruticosa
est, gravis odoris: flore oleris: semen in corniculis non brevibus gignit, simile renibus, quod durecit per messes.
Laburnum Plinio lib. 1. cap. 18. alpina arbor est, nec vulgo nota, dura ac candida materie, cuius flos cubi-
tali longitudine: apes non attingunt.

I. *Anagyris foetida*.

Anagyris, Dod. utr. Ang. Cord. in Diosc. & hist.
Tur. Lon. Ad. Cæs. Lug. qui & *Colyteam* Theo-
phrast. suspicatur.

Anagyris prope Arelatum, Ges. hor. Lugd. Clus.
histor.

Anagyris folio foetido, Ges. hor. foetida, Ger.

Anagyris foetida arborecens, Lob.

Anagyris vera, Clus. hisp. Lugd.

Anagyris prima, Cam. Tab.

Semina superficie glabra quidem sunt, sed co-
lore inter se diversa: quædam enim purpureo,
quædam livente, quædam in cinereo pallido.

II. *Anagyris foetida* altera, rotundo folio.

Anagyris Cretica, à Clusij diversa, Hon. Bell.
ep. 2. ad Clus.

Anagyris, *Anagyros* vulgo in Creta circa Idam
montem, Bellon. obs.

III. *Anagyris non foetida* major, vel Alpina.

Anagyris prima & major, Matth. Cast.

Egano, forte Ebeni 2. species, Theopl. Ang.

Trifolia arbor, Cord. hist. Bellon. de cult.

Laburnum, Dod. gal. Bellon. de cult. Lugd. Ca-
mer. Cæs. alp.

Anagyris latifolia, Eystett.

Trifolia quidem communiter est, attamen
sæpe quatuor, etiam quinque folia uni pediculo
adhærent, ut ei qui antea non observârit, diver-
sa ab altera videatur.

In horto Lugduno Batavo habetur folio lon-
giore angustiore, solidiore & atrovirente, quod
Laburnum latifolium nominant.

IV. *Anagyris non foetens* minor.

Faba inversa, Trag. Lon.

Anagyris altera, Matth. Lac. Cam. Tab. minor,
Castor.

Anagyris alia species, Ges. hort.

Eghelo. Dodon.

Anagyris minus foetens, Ad. Lob.

Laburnum alterum, Lugd.

Anagyris foetens, Ger. ico.

Anagyris angustifolia, Eystett.

A C A C I A.

A *Cacia*, à *νύκτα* Dioscoridi & *Gracis*, ab *ἀκρίω*, id est, acuo, unde *Acacia* quasi acuta: quam Theophrast
l. 4. hist. 3. *Ἀκακία*, id est, *Spinam*, sive *Ἀκακίαν ἀγρυσίαν* spinam Aegyptiam 9. hist. 1. esse volunt: &
Dioscoridi l. 1. c. 133. *spina* est arborecens fruticosa in rectum non assurgens, florem habens album, fructum verò
instar Lupini filiquis inclusum: ex hac succus exprimitur & gummi ex ea spina manat: de hoc succo Plin. l. 24.
c. 12. Est, inquit, & *Acacie spina* succus: fit in Aegypto, alba nigraq; arbore, &c. Et Theophr. *Spina* ex eo nomen
accepit, quod tota arbor aculeis horret excepto caudice: nam & super germina, foliaq; aculeos gerit, magni-
tudine excellit, materies quippe duodenorum cubitorum, rectis idonea ceditur: ejus duo genera, quædam can-
dida imbecillis facileq; putrescens: quædam nigra, qua robustior & incorrupta, &c. fructus in filiqua modo le-
guminum, flos pulcher aspectu ut coronas ex eo facerent, &c. Eadem ferè Plinius l. 13. c. 9. nomine *Spina* Aegy-
ptiæ. Et Diosc. duplex est: altera longè minor humilis ac tenerior, aculeis vallorum in modum obfita, folia
rura similia habens: semen in folliculis connexum, ternum quaternumve capitibus, lenticula minus.

I. *Aca-*

I. Acacia folijs Scorpioidis leguminosæ.
 Acantha & Acantha Ægyptiaca, Hippoc.
 Acacia Ægyptia, Dod. gal. Lugd. Cam. Alexandrina, Cam.
 Acacia prima, Ang. Lac.
 Acanthus Theophrasti, Ang.
 Acacia, Bellon. (quæ Akakia in offic. Constanti-
 nop.) Dod. Cam. ep. Alp. vera, Clus. ad Garz.
 Spina Acaciæ Dioscoridis, Ad. Lob.
 Acacia, Arabibus Schamuth, Schack, Halepi,
 Rauvvolf.
 Acaciam i. à Matth. & Lugd. propositam quam

Acaciam maiorem Durantès vocat, Arborem
 Judæ cui aculei adpicti sunt, multi existimant.

II. Acacia trifolia.

Acacia altera, Matth. Dod. ut: Lac. Bellon. Rau-
 vvolf. Lugd.

Acacia, Lon. altera Dioscoridis, Ad. Lob. Tab.
 Aspalathus, Cæs. sive Acacia 2. Matthioli, Gesn.
 hort. Cam.

Aspalathus 2. Dioscoridis, Guil. epist. & Hon.
 Belli ep. i. ad Clus. (quo nomine & Græcis in-
 digenis hodie donatur) Ponæ Ital.

Acacia Dioscoridis, Ger.

ASPALATHUS.

Aspalathus, Ἀσπλάθος & alijs Erythrosceptrum, frutex est lignosus, spinis crebris aculeatus: duplex est, alter
 detracto cortice rubens aut purpurascens, alterum genus candidum est Dioscoridi l. i. c. 19. At Plinius non
 eadem omnino tradit l. 22. c. 24. in eodem tractu Aspalathus, inquit, nascitur spina candida, magnitudine ar-
 boris modica, flore roseo, radix unguentis expetitur: quidam Erythrosceptrum, alijs Sceptrum vocant, &c. & l. 24.
 c. 13. Orientalem, alium à Rhodio facit.

I. Aspalathus cortice cinereo, ligno purpureo.
 Aspalathi prima species Dioscoridis, Ponæ
 Ital. à quo portionem accepimus.

II. Aspalathus colore buxi.
 Aspalathi primum genus, Ad. & Lugd.
 Lignum Americ. buxei coloris, Leriio de Brasil.
 an Lignum aureum & flavum in Terzera insu-
 la, Linscot. 3. part. Ind. Or. c. 6.

III. Aspalathus albicans torulo citreo.
 Rhodium lignum, quibusdam Agallochum, O-
 lea æthiopica videtur, Cord. in Diosc.
 Agallochum fortè, id est, Xyloaloe solida, qui-
 busdam lignum rhodium, rhodifium & aspalat-
 hium, alijs Oleastrum lignum, Cord. hist.
 Aspalathi tertium genus, Ad. & Lugd.
 Aspalathus Rhodius, Lob. ico.
 Lignum rosei odoris in Brasilia, Leriio descr.
 Bras. vel par. 3. Ind. Occid. c. 12.

IV. Aspalathus rubeus.
 Rhodium lignum rubescens & purpurascens
 Ruellij, Cord. in Diosc.

Aspalathi secundum genus, Penæ & Lugd.
 Aspalathus roseus, Ad. Lob. ico.
 Lignum Americanum rubrum diversi à Brasilia
 generis, è quibus claves suas barbari confici-
 unt, Leriio l. c.

an Lignum Sanguinho dictum, totum rubrum
 & cruentulum in Terzera insula, Linscot. l. c.

V. Lignum Americanum album.
 Lignum album ut charta, Leriio l. c.

VI. Lignum Americanum violaceum, quæ
 ligna folius naturæ miraculo distincta, terra il-
 la profert, Leriio l. c.

VII. Lignum Feixo, & varij generis ligna
 præstantissima, insula Pico promit, Linsc. l. c.

SANTALUM.

Cum multi Santalum pro Aspalatho vero sumperint: & aliqui Agallochum, lignum rhodium, credide-
 rint, utrumq; subjungemus.

Santalum veteribus Græcis inditum videtur, & Sandal Avicennæ, Serapioni & Mauritanis: Indis verò
 Sarcanda, Garzia auctore, dicitur: quod folijs est Lentisci amulū, flore ex caruleo nigricante, fructu cerasi ma-
 gnitudine nigro, infipido: trium generum, rubrum album pallidum, quæ uno in loco non proveniunt: eadem A-
 costa & Lugdunensis historia habent. Santali cinericei quoq; in regni Congiani descriptione mentio fit.

I. Santalum album, Matth. Lac. Lon. Cord.
 hist. Cast. Garz. Lugd. Tab. Ger. Linscot. part. 4.
 Ind. Or. 30.

Lignum odoratum candidum, Cæs.
 II. Santalum pallidum, Mart. Lac. Garz. Lugd.

Santalum citrinum, Cord. hist. Lon. Cast. Lin-
 scot. l. c.

Santalum flavum, Tab. Cæs. cui flavum quod
 hodie habetur, candidi medulla est & citrinum
 Serapioni dicitur.

III. San-

III. Santalum rubrum, Matt. Lac. Lon. Cast. Garz. Lugd. Tab. Ger. Linscor. l. c.

Lotus veterum, Sandalus rubea officinarum, Cord. in Diosc.

Sandalum rubeum, Cord. hist.

Lignum odoratum rubrum, Cæs.

Santali rubri, quod in officinis Lignum aquilinum dicitur, & quo in regno Congiano febres curentur, Pigafetta in desc. regni Congiane c. 7. meminit.

IV. Santal. cinericeum, quo Scabiem Gallic. sanant, tanti apud eos precij, ut vel parva ejus particula servo robusto comutetur, id. proponit.

V. Pseudosantalum rubr. five arbor Brasilia. Arbor Brasilia Theveti, Lugd.

Bersilium, Lon.

Perfilium rubrum & citrinum, Cord. hist.

Bresiliensis arbor in Guajana: par. 8. Ind. Occid. Brasilia arbor, barbaris Araboutau, quercum

proceritate & ramorum copia adæquat, folijs buxeis persimilibus: fructum non ferens: harum quædam, quam vix trium: altera, quam vix octo: & altera quam vix sedecim hominum ulnæ amplecterentur, Leri. in desc. Brasil.

VI. Arbori Brasiliæ affinis: in regno Guineæ, in Insula Caico, arbores sunt, quæ vel Brasilienses rubedine superant, quarum lignum instar politissimi speculi nitet, tantæ duritiei, ut vix ingenti labore inflecti possit, ut habetur in 6. parte Indiæ Orientalis cap. 56.

an Lignum Brasilianum quod flammei coloris est, & tincturis adhibetur, Joseph. Acoftæ l. 4. c. 29. meminit.

VII. Arbores pigmentifera.

Arborum peculiaria genera ex quibus rubrum, nigrum, flavum & purpureum colorem extrahunt, in Insula Madagafcar seu Laur. p. 4. Ind. or.

VIII. Ligno Brasiliano simile.

Lignum Sapou lanis tingendis percommo- dum, Linsc. par. 2. Ind. Or. c. 24.

IV. Pseudosantalum Creticum.

Abelicea folijs Alaterni, fructu piperis, ligno rubro, cujus pulvis Santalum imitatur, Hon. Belli epist. 2. ad Clus. Ponæ Ital.

X. Pseudosantalum album.

Lign. Sambarane Santalo albo persimile, Garz. Sambarane, Acoftæ.

XI. Lignum ex freto Magellanico medulla flavescens.

Lignum exoticum alterum, Clus. exot. l. 1. c. 7.

Fructum fert nigrum myrtillis similem.

XII. Lignum Moluccense folijs malvæ, fructu avellanâ minore, cortice molliore & nigricante, Pavana incolis, Lugd.

Lignum Molucense, Acoftæ.

Lignum Pavanum, Tab.

XIII. Ligna preciosissima ex Havana & Insula Cuba in Hispaniam vehuntur, cujus generis sunt Ebanos, Caovana, Granadillos, Cedrus & similia: Joseph. Acofta l. 4. c. 30.

A G A L L O C H U M.

Alexand. veteribus, at recentioribus etiam *ἁγὰλοχον*: Agallochum & Lignum aloës. Dioscoridi l. 1. c. 21. lignum est quod ex India & Arabia deportatur, Thyia ligno simile, maculatum, odoratum gustu adstringens, cum quadam amaritudine, cute verius quam cortice vestitur, aliquantum versicolore. At Garzia arbor est oleæ instar, interdum minor, quæ non nisi in India nascitur. Tarum Plinij l. 12. c. 20. aliqui existimant, quod Agallochum syl. esse, Dalechampsius, notus in Plinio, sufficitur: sed brevior est Plinius, quàm ut quid pronunciaré liceat. Agalagen & Xyloaloes, Avicenna.

Hujus plura genera Serapio l. simp. c. 197. enumerat, Indum Mondunum, Seiscum, Alcumericum: & Ruell. l. 1. c. 36. quatuor Agallochi genera recenset, Lud. Romano triplex genus ejus arboris: 1. quod Calampart vocetur: duo alia in Insula Taprobana, quorum 1. Lubam, alterum Bochor nominat, quæ duo genera ad nos convehantur.

I. Agallochum præstantissimum.

Agallochum primum quod Calampart vocatur, & solum inter Reges Indiæ distribuitur, Lud. Romano.

Lignum Calamba, quod syncerum cum auro argenteo persæpè deponderatur, Linsc. part. 2. Ind. Or. c. 24.

Lign. Aloës Calamba dictū, Ei. p. 4. Ind. or. c. 32.

Lignum Calambes five Aloës, par. 8. Ind. Or.

II. Agallochum officinarum.

Agalloc. esse Lignum aloës, multi credunt, Ang. Aloë & Aloa, Vartomano.

Agallochum, lignum aloë, vel paradyfi, vel S. Crucis, Cornaro.

Agallochus five Xyloaloes, Cord. in Diosc. Ad. Lob. Cast. Garz. Lugd.

Tarum, id est, Xyloaloes fisisilis, levis & aromatica, Cord. hist. & Tarum crispum, Eidem.

Ddd

Lig um

Lignum aloës, Lon. Frag. Tabern. Cæsalp. qui Tarum Aëtij facit: at Cornarus Xyloalœn Aëtij dicit.

Lignum aloës quod Palo d'Agula dicitur, Lin. Scot. par. 2. Ind. Or. c. 24. sive Palo d'Aguilla, Eid. par. 4. Ind. Or. c. 32.

III. Agallochum sylvestre.
Lignum aloës sylv. Garziæ, Frag.

Xyloalœ sylv. Lugd.

Aquilla brava sive sylvestre, Malaice Garro, Linc. l. c.

Ex illo, sed ex hoc frequentius, sphaerulae precatoriae odoris jucunditate & precij magnitudine commendabiles conficiuntur, sunt etiam ex alio ligni genere, quod Agallochum æmulatur, sed inodorum est.

GENISTA SPARTIUM.

I. Genistaspartium spinosum majus primum flore luteo.

Aspalathus alter primus, Clus. hisp. & hist.

Aspalathus, Cast. primus Monspel. Lugd.

Acacia altera, Ang.

Aspalathus secunda Monspel. Lob.

Genistaspartium spinosum majus, Ad. Lob. ico.

Scorpius primus, Tab.

Genista spinosa minor, Ger.

II. Genistaspartium spinosum majus secundum flore pallido.

Aspalathus alter secundus, Clus. hisp. & hist.

III. Genistaspartium spinosum majus tertium hirsutum.

Aspalathus alter tertius, Clus. hisp. & hist.

IV. Genistaspartium spinosum minus.

Scorpius secundus, Clus. hisp. & hist. Cast.

Genistaspartium spinosum alterum, Lob.

Genista spinosa altera icon. Dod.

Aspalathus alter Hispanicus, Lugd.

Scorpius tertius, Tab.

Spina Christi, Cæsalp.

Genista spinosa major, Ger.

V. Genistaspartium spinosum folijs polygoni.

Alhagi Maurorum in cujus fronde, præcipue

apud Persas, Manna colligitur, Rauvvolf.

Planta spinosa Maurorum Alhagi, Lugdunensi app.

VI. Genistaspartium spinosum folijs lenticalæ, floribus ex cæruleo purpurascens.

Spartum aphyllon fruticosum juncis aculeis

lanatis capitulis, Ad. Lob. Lugd.

Erinacea, Clus. hisp. & hist. Lugd. Belli.

Genista rotunda alterum genus, Cæsalp.

Scorpius quartus, Tabern.

Spartum aculeatum aphyllon, Eid.

Genista spinosa humilis, Ger.

VII. Genistaspartium spinosum aphyllon

alterum, tribus aculeis semper junctis, floribus

luteis.

Achinopoda Cretenensis, Bellonio.

Echinopoda Cretica.

Chenopoda Plinij l. 12. c. 8.

Echinopoda Plurarchi & Athenæi,

an idem sit cum quarta, dubitat Clusius.

Hon. Belli,
epist. 2. ad
Clus.

GENISTA SPINOSA

sive Scorpius.

Scorpius, Theophrasto 6. hist. 1. (Nepam Gaz a vertit) spinosa planta, tota spinis constat ut Corrua: sic nec adulta nullo modo foliosa est, sed spinas tantum pro folijs habet: præterea radice singulari brevique, constat, ante æstatem non germinat, germinationem in autumnum prorogat: flores etiam post æquinoctium autumnum: florem in cavis extruberante, sub extrema aculei profert.

I. Genista spinosa major brevibus aculeis.

Scorpius sive Nepa, Anguil.

Nepa Theophrasti, Ad. Lobel. Tabern. Camer.

Rauvvolf.

Scorpius Theophrasti, Lugdun.

Genista aculeata minor, sive Nepa Theop. Ger.

II. Genista spinosa major longioribus aculeis.

Ulex Plinij quibusdam l. 32. c. 4. qui nullas notas addidit.

Genista spinosa, Dod. ut.

Scorpius primus, Clus. hisp. & hist.

Scorpius

Scorpius alter, five Genista spinosa, Lugd.
Scorpius secundus, Tab.

Genista spinosa flore albo, Ger.

Floribus est luteis, at in regionibus calidioribus ruffo colore, ut rubere videantur, nitent: & ratione loci variat magnitudine & aculeorum multitudine, paucitateve.

III. Genista spinosa minor Germanica.

Genistella, Trag. Fuch. Dod. ut: Lugd. Tab.

Genista vel Genistella spinosa, Gefn. hort.

Genistella aculeata, Ad. Lob. Tab. spinosa, Cam.

Genista minor vel aculeata, Lon.

Genista minor, vel Genistella, Caff.

Genistæ species spinis & aculeis horrens, Clus. hist.

Coroneolæ similis suffrutex, Cæf.

IV. Genista spinosa minor Hispanica villosissima.

Genistella Monspeliaca spinosa in Prodomo.

V. Genista minor aspalathioides, vel

Genista spinosa Anglica in Prodomo descripta.

GENISTA NON SPINOSA.

I. Genista angulosa & scoparia.

Genista, Brunf. Trag. Fuch. Dodon. ut: Cord. in Dioscor. Cam. ep. Tabernæm. Ger. vulgaris, Bellon. Clus. hist.

Genista angulosa, Cord. hist. descr. (ubi male Chamæspartij icon additur) Lugd.

Genista minor seu non aculeata, Lon.

Genista scoparia vulgi, Lob. Eyf.

Genista quadrato juncio i. Cæf.

Spartium, Turn. Adv.

Flos communiter luteus, rarius albus, hinc duæ figuræ apud Tab.

Genistæ & Genistæ albæ: & apud Gerardum

Genistæ & Genistæ tenuifoliæ nomine: hujus flores nondum apertos, vicini nostri in Brisgoja

muria condunt & Capparium loco utuntur.

Radici quinetiam sæpe Orobanche adnascitur, & Radium Genistæ vocant.

Genistellam Taber. pingit, quam Chamægenistam Anglicam Ger. nominat, quæ sola magnitudine à priore differre videtur.

Hujus generis exiguum in alpinis lato cespice, palmaribus juncis, mollibus, sine folijs crescere, Cæsalpinus scribit.

II. Genista tinctoria frutescens folijs incanis.

Genista tinctoria Hispanica, Clus. hisp. & hist.

Genistæ tinctoriæ altera icon, Dod.

Genistella infectoria, Lob. Ger.

Genista tinctoria Clusij, Oricella Theveti, Lug.

Genista infectoria Hispanica, Tab.

Sub hac, quo tempore floret, Hæmodori quoddam genus elegans, brachialis interdum

longitudinis, floribus magnis & luteis crescit, Clusio monente.

Meminir Dodonæus Genistæ hirsutæ Hispanica, quam tertiam facit, cujus Calphurnius meminit: hanc non novi.

III. Genista tinctoria Germanica.

Luteam herbam Plinij l. 33. c. 5. aliqui volunt.

Flos tinctorum, Brunf. tinctorius, Fuch. Lon.

Castor.

Ferula, Trag.

Lyfimachia, Leonicens.

Coroneola, Ang. Cæf.

Genista humilis, Dod. gal. Gefn. hort. Lugdun.

Thal.

Genista tinctoria, Dod. vulgaris, Clus. hist.

Genistella infectoria vulgi, Adv. Lob.

Genistella tinctoria, Tab. Ger. Eyf.

Chamæleuce, Cord. hist. quoad iconem, nam

Hederam terrestrem describit.

Variat folijs latioribus angustioribus, ramulis modò erectis, modò procumbentibus:

quinetiam magnitudine, quare

Florem tinctorum minorem Lonicerus addit.

IV. Genista ramosa folijs hyperici.

Genista minima, Lugd.

Hæc variat: eam non longè Friburgo, & ad

Petram pertusam frutescentem, & Monspelij

humilem collegimus.

V. Genista Arabica quæ à nostra diversa,

planities ad montem Sinai obicit: sunt: quæ

etiam in Arabiæ solitudinibus nascitur, Bel-

lon. ob. sed quid?

CHAMÆGENISTA.

I. Chamægenista folijs Genistæ vulgaris.

Chamægenista prima, Clus. hist. seu Pannonica,

Genistella pannonica, Tab.

II. Chamægenista sagittalis.

Chamæspartium, Trag. Lon. Lugd. Tab.

(Ger. Genista angulosa, Cord. hist. quoad iconem.

Ddd 2

Genista.

Genista minima, Gefn. hort.

Genistella graminea montana, Adv.

Genistella montana, Lob.

Chamaegenista altera, Clus. pan. & hist.

Genista sagittalis pannonica, Cam.

Genistella lagopoides, Ger.

Variat magnitudine, hinc

Chamaespantium 1. & 2. Tab.

Genistella lagopoides major & minor, Ger.

III. Chamaegenista caule foliato.

Genista humilis, Dod. pumila, Cam.

Chamaegenista peregrina, Cl. hisp. & hist. Lug.

Genistella pinnata altera Hispanica, Lob.

Genistella pinnata, Ger.

Chamaespantium tertium, Tab.

IV. Chamaegenista folio articulo.

Chamaespantium Narbonense, Tab.

Genistella globulata, Ger.

V. Chamaegenista Cretica, in Prodromo descripta.

VI. Chamaegenista montana hispida.

Genistae minoris species, Thallio.

S P A R T I U M.

Superior frutex est proferens virgas longas, sine folijs, firmas, fractu contumaces, quibus vites alligantur: fert lobos ceu Phaseolus, in quibus semina parva lenticula similia, florem luteum instar Leucoj. Diosc. lib. 4. cap. 158. quod nusquam in Europa gigni Guiland. scribit. Et Theoph. 1. hist. 8. λευκαειον. Linogenistam Gaza vertit, cujus cortex multiplex tunicis cadit. At Plinio lib. 24. cap. 9. Genista est, cui easdem vires, quas Dioscorides Spartio ascribit.

I. Spartium arborecens seminibus lenti-
similibus.

Genista, Matt. Tur. Italica, Dod. Hispanica, Ger.

Genista major, Cast.

Spartium, Matth. Lon. Lugd. alterum, Lac.

Spartum, Fuch. Dod. gal. Tur.

Genista onopris Græcis, Ang. Guiland. pap.

Genista juncea, Cord. hist. Gefn. hort.

Spartus vel Spartium, Gefn. hort.

Spartium Dioscoridis, Genista Plinij five Hi-

spanica, five Africana, Clus. hist. Lugd.

Spartium Dioscorideum Narbonense & Hi-
spanicum, Adv. Lob.

Genista altera junco rotundo, Cæf.

Genista transalpina, Cam.

Spartium Hispanicum, Eyst. 1. 2. & 3. Tab.

Pseudospartum Hispanicum, Ger.

II. Spartium alterum monospermon semi-
nereni simili.

Spartum frutex majus, Dod.

Spartium primum, Clus. hisp. at in hist. Spar-

tium 2. Hisp.

Spartium Hispanicum alterum flore luteo, Lob.

Spartium Hispanicum alterum, Lugd.

Spartium Hispanicum 4. Tab.

Pseudospartium Hispanicum & φυλλον, Ger.

III. Spartium tertium flore albo.

Spartium 2. Clus. hisp. at in hist. 3. Hispanicum.

Spartum frutex minus, Dod.

Spartium 2. flore albo, Lob.

Spartium aliud Hispanicum Clusij, Lugd.

Spartium Hispanicum quintum, Tab.

Pseudospartum album & φυλλον, Ger.

IV. Sparto primo affinis.

Genistae Hispanicae affinis, in Prodromo.

V. Spartum triphyllon.

Genista Ilvensis, Lugd.

Genistae rotundae genus in Ilva, Cæf.

Cassia Latinorum, Guilandino.

an Spartum minimum montanum triphyllum,
Colum.

VI. Spartum sterile.

Sparti genus, in Hispania & Africa, juncus
proprie aridi soli, quod neque folium, neque
florem, neque semen fert, quo ad varia utuntur,

Guiland. pap.

C O L U T E A.

Kολυτεια Colutea, Liparia peculiaris, inquit Theophrastus 3. hist. 17. arbor procera, fructum fert in filiqua,
magnitudine lentis, folium mittit senograceo non absimile, &c.

I. Colutea vesicaria.

Colutea, Theophrasti, Trag. (cui vulgo Sena)

Dod. gal. (cui & Cytisus Latinorum) Gef. hor.

Lob. Clus. hist. Tab. Ger.

Colutea, Fuch. Matth. Lac. Lon. Dod. Ad. Cast.

Sene Mauritanorum, Ruellio.

Sena, Cord. hist.

Senna sylv. quibusdam male, Gefn. hort.

Colutea, Sena genus non est, cum nullas facul-
tates cum Sena communes habeat, Bellon.

Colutea vesicaria, Lugd. (cum duplici figura)

Cam. Eystett.

Emeri

Emeri alterum genus, Cæfalp.

II. Colutea filiquosa sive scorpioides major.

Colutea scorpioides, Ad. Lob. Lugd. Cæ. ep. Ger.

Colutea scorpioides prima, Clus. pan. Tab.

Colutea scorpioides prima elatior, Clus. hist.

Emerus vulgo, Cæfalp.

III. Colutea filiquosa minor.

Colutea scorpioides humilior, Clus. pan. Ger.

Colutea scorpioides 1. humilior, Clus. hist.

Colutea scorpioides 2. Tab.

IV. Colutea filiquosa minor coronata.

Colutea scorpioides altera, Clus. pan. & hist.

Colutea scorpioides tertia, Tab.

Colutea scorpioides montana, Ger.

V. Colutea scorpioides maritima glauco folio: in Prodomo descripta.

VI. Siliqua oblonga cinericea granis Colutea.

Fructus minor 12. Paludani, Clus. exot. libr. 2. cap. 20.

S E N N A.

Sennam, quidam Dioscoridis Delphinium, alij Pelecium, alij Peplium, alij Empetron, alij Alypon: alij Theophrasti Cercidem sive Coluteam tertiam, alij Colyteam primam esse putant: at rem novam veteribus Grecis & Latinis Scriptoribus indicant, & à Mauritani primò propositam à Serapione sub Sene, à Mesue, qui domesticam & sylvestrem facit, sub Senna, censemus: cujus, ex Græcis solus Actuarius meminit.

I. Senna Alexandrina, sive folijs acutis.

Sena Alexandrina, Trag. Gesn. hort. Cam. epit. & hort.

Sena Orientalis, Ang. Bellon. Ad. Cæf. Tab. Ger.

Senna Ægyptia sive Alexandrina & Syriaca, quæ præstantissima, Lugd.

II. Senna Italica sive folijs obtusis.

Senna, Hermolao.

Sena Italica, Trag. Tabernæm. Adv. Gerard.

Cam. ep. & hort.

Sena, Matth. Fuch. Dod. ut: Lac. Cord. histor.

Lon. Lob. Cast. Lugd.

Sena altera, Ang. forte Androsace.

Sena altera media dicta, Bellon.

Sena communis & vilior, Gesn. hort.

Sena nostras, Cæfalp.

B A R B A J O V I S.

Plinius lib. 16. cap. 18. inter arbores, inquit, odit aquas & quæ Jovis Barba appellatur, in opere topiario consilij: & in rotunditatem spissa, argenteo folio. Hujus Anguillara species duas facit, alteram de qua inter Cytisos egimus: alteram de qua in præsens.

Barbæ Jovis prima species, Ang.

Barba Jovis, Cæf. Cam.

Jovis barba, Lugd. Clus. hist.

S E C T I O S E C U N D A.

JASMINUM; SYRINGA; LENTISCUS; MOLLE; THURIFERA ARBOR; TEREBINTHUS; BALSAMUM; PISTACIA; STAPHYLODENDRON; Glans Unguentaria; Ceratia sive Siliqua; Calsia nigra sive Fistula; Tamarindus; Lobi & Fructus exotici.

J A S M I N U M.

Jasminum Arabes Zambach & Sambach Serapione auctore appellant, & Græcos imitari volentes, Jeseimin, à Jafme Græca voce. Jafme autem dicta fuit, quasi medicatus odor, aut immutat à literâ Jofme, quasi violæ odor.

Genera tria Serapio tradit: unum cui flos albus, alterum cui luteus, tertium cui caruleus: etiam rubro flore in Asiaticis hortis reperiri, Clusius refert: Dalechampius puniceum addit.

I. Jasminum vulgatius flore albo.

Gelsseminum vel Jasminum, Matth. Cast. Cam.

Gelsseminum, Anguil.

Jasminum, Dod. ut: cui & Apiaria, Cord. in Diof.

Jafme & Sambac, Gesn. hort.

Gelsseminum vulgatius, Adv. Lob. Cæfalp. cui Smilax lævis Dioscoridis.

Jasminum album, Lugd. Tab. Ger. fl. albo, Eyf.

II. Jasminum humiles luteum.

Gelsseminum luteum, Adv.

Ddd 3

Jasmi-

Jasminum lateum, Lob. in ico. Tab. Ger. flore luteo, Eyst.

Gelseminum humilium alterum fl. luteo, Cæf.

III. Jasminum humilium magno flore.

Gesmini 3. species, Ang.

Chamaegelseminum grandiflorum, Lob.

Gelseminum humilium primum, Clus.

Jasminum puniceum, Dalech. Lugd.

Gelseminum Catalanicum, Cam. ep. (sive Hispanicum) Eyst.

Jasminum candidum, Tab. majus, Ger.

Flos candidus est averfa parte rubens.

IV. Jasminum caeruleum, Scapioni.

Jasminum caeruleum, Tab. Ger.

In hoc genere caeruleum nondum vidimus: an Arabes Ligustrum Orientale, quod alias Syringa caerulea dicitur intellexerint, Cæsalpinus dubitat: alij Clematidem caeruleam esse volunt.

V. Jasminum luteum vulgo dictum, bacciferum.

Polemonium Monspelienfium, Gefn. Ad. Lob. Lugd. Cam. Eyst.

Ruta capraria Gallorum Monspel. Gefn.

Trifolium fruticans, Dod. Tab.

Ruta baccifera sive trifolia, Tab.

Jasmini species trifolia non videtur a Polemonium accedere, Colum.

Folij ludit: nam licet communiter, praesertim si in hortis colatur, trifolium sit, attamen circa Monspelium aliquando unico folio reperitur.

VI. Jasminum millefolij folio.

Gelseminum alterum rubrum, Cæf.

Quamoclit, Cam.

Gelseminum Indianum pennatum flore sanguineo, Ponæ Ital.

Convolvulus pennatus exotico, Col.

Quamoclit sive Jasminum Americanum, Clus. cur. post.

S Y R I N G A.

Syringa licet Africum vocabulum videatur, aliquibus tamen a virgaram rectarum longitudine & inferioris medulla fungosa copia dicitur: vel potius quod ramuli exempta medulla fistulosi sint.

I. Syringa caerulea.

Lilac, Marthiol. (qui glandem unguentariam existimat) Adv.

Lillach, Dod.

Cauda vulpina Turcarum, Bellon.

Syringa caerulea Lusitanica, Lob. Eyst.

Syringa flore caeruleo, Clus. hisp. & hist. Lugd. Cam. Ger.

Syringa Lusitanica, Tab.

Ligustrum Orientale, forte Jasminum caeruleum Mauritanorum, Cæf.

Ostryam Theoph. 3. hist. 10. esse aliqui volunt, auctore Lugd. historiae monente: est Ostrya, inquit, quam nonnulli Ostryam vocant, unica species Oxyæ (Plin. 13. c. 21. *ὄξυς*, id est fraxino, legit) tum satum, tum cortice similis: folio pyrorum, multo oblongiore, in acutum contractiore & majore, fibris multis & crassius, à medio dorsi in modum costarum recta secundum magnam fibram porrectis, in fibris ipsis rugato & in ambitu leviter serrato, materie dura, decolore albida: fructu parvo, oblongo, hordeo simili, flavo: radices sublimis habet. Idem fere Plinius, lib. 2. cap. 21.

Variat floris colore, qui communiter caeruleus: aliquando cinereus & quasi argenteus: hinc figurae duæ apud Eyst. nomine Syringæ flore lacteo & flore caeruleo.

II. Syringa Arabica folijs mali arantij.

Sambac Arabum sive Gelseminum Arabicum, Alpini.

Jasminum Arabicum sive Syringa Arabica, Clus. cur. post.

III. Syringa alba sive Philadelphus Athenæi.

Syringa, Dod. Cæf. alba, Tab. Ger.

Syringa flore albo, Clus. hisp. Lugd. (quam Ostrya Theophr. volunt, quod Clusius negat) odorato, Cam.

Syringa Italica, Lob. Eyst.

Frutex coronarius, Clus. hist.

Flore communiter est simplicis, rarius pleno, quare Syringa Italica flore albo pleno, & Syringa flore albo simplici, apud Eyst.

IV. Syringæ albæ affinis.

Fructus miscellaneus undecimus, Clus. exot. lib. 2. cap. 21.

LENTISCUS ET MOLLE.

Lentiscus fortasse dicta, quod folia lentore quodam lentescant: *ῥῆν* Dioscoridi 1. c. 89. quasi *ῥῆν* est lentis, quod facile & frequenter in dentiscopia findatur: quod & Diosc. tempore facit arum, qui arborem ut notam non describit, sed ejus resinam quam *μαρίνη* nominari ait: de qua inter Resinas. Hujus baccas Hippoc. de nat. mulieb. *ῥῆν* (non *ῥῆν*) appellat.

I. Len-

I. Lentiscus vulgaris.

Lentiscus, Matth. Ang. Dod. ut: Bell. Lac. Lon.

Ad. Clus. Lob. Cæf. Lugd. Cast. Rauvvolf.

Lentisci in Chio similes sunt ijs qui in Gallia Narbonensi & Italia nascuntur: solæ tamen quæ in Chio Mattichen præbent, Bellon. obs.

II. Lentiscus Peruana.

Molle, Clus. in Monardem, Lob. & lib. de Balf.

Cam. Ger. Colum. addens, quod si in Creta nasceretur, pro Tragio supponi posset.

Mollis, Cast. arbor, Tab.

Molle arbor, Lugd. & hist. Ind. Occid. p. 9. lib. 4.

c. 30. quæ in Moxu vocatur arbor ex Peru, quod hinc primum alio translata sit.

Moly, melle & muelle, Frag.

Variat folijs, quæ in tenella dissecta: in adultâ nec incisa, nec crenata sunt, quemadmodum ramus adultioris arboris in Mathiolo nostro, & Clus. cur. post. exhibetur. Uvæ quoddam genus producit, unde Indi vinum premunt, Ind. Occid. l. c.

III. Arbor exotica folijs alatis.

Juvvâ apud Amazones nascens, Clus. exot. l. 4. cap. 14.

IV. Arbor exotica Lentisci folijs.

Moringa, Acoftæ, Cast. Lugd.

Fructus raphani crassitie, radix unicornu vi-

ces supplet; & ejus in Theriaca usus est.

V. Arbor exotica spinosa folijs lentisci.

Bonduch Indorum, Ponæ Ital.

Fructus peregrinus primus, Clus. l. 2. exot. c. 30.

Lobus exotus, Clus. exot. l. 3. c. 15.

Mates Indorum cinericei coloris, id est, Legu-

men Indicum, Eid. & Ponæ.

Eructus peregrinus prior, Clus. exot. l. 2. c. 30. & in tab. 2. Lugd. Tab. Ger.

Hujus fructum Milij Indici primum, dein Bonduch nomine à Ponæ, Veronâ accepimus, qui Avellanæ magnitudine, durissimus, splendens & cinericei coloris.

Ex Brasilia, Java, & Virginea etiam Pisorum nudorum nomine multi adferuntur.

VI. Lobus orbicularis fuscus spinosis tuberculis oblitus, binos phaseolos nigros continens.

Fructus quartus qui Indis Samparantem, ex navigatione. Batau. Clus. exot. l. 2. c. 15.

Lobus echinatus Molucensis, Ponæ Ital.

an Samparanton radix valida & amara quæ in Sunda nascitur, in Ind. Or. par. 4. c. 8. hujus arboris radix est?

VII. Arbor Malabarensium fructu Lentisci.

Pauare, Acoftæ, Lugd. Cast. ap.

Arbor erysipelas curans, Lusitanis.

THURIFERA ARBOR.

Thurifera arbor, Græcis *Ἀλβύς* & *ἡ δὲν Ἀπολλωνίας*: quemadmodum lachryma *Ἀλβύς* dicitur, quæ Hippocrati *Ἀλβύς* dicitur, necnon dicitur: *Ἀλβύς* à *Ἀλβό* stillo: licet Græci fabulentur à juvene Assyrio hujus nominis, quod Deos studiosissime coleret, ab invidis occiso & in hunc fruticem converso dici: hinc *Dysithure* gratius nihil esse. Lozan Arabibus: de qua sic Theophrast. 9. hist. 2. arborem nonnunquam quæ quinis fere cubitis attollatur & ramosam ferunt, folio pyri sed multo minore, coloris herbacei ut Ruta, cortice levi Lauri modo: 4. hist. 6. in Arabia, Syria, India nascitur: 9. hist. 2. sub cane & ferventissimis diebus incidi reserunt: 9. hist. 3. & eam sponte quam incisura thuris prodire posse. Idem 9. hist. 4. alythuris arborem lentisco similem prodidere, & fructum quoque lentisci folium subrutilum: idem folia lauri & Lavie tribuit. At Garzia, arbor est humilis, folia lentisco similia habens, & Arabia peculiaris: Theveto pinis resiniferis similis. Non solum ipsius lachryma in usu fuit sed & cortex arboris apud Diosc. l. 1. c. 82. & *ἡ δὲν* manna thuris c. 83. & *ἡ δὲν* fuligo c. 84. Vide inter Resinas.

Duplex est: alia montana, alia in planis nascens Garzia, Fragofo.

Arbor thurifera Theveto, Lugd.

Thuris limpidi folium, Ad. Lob. ico. Lug. Tab.

pingunt: & Taber. arboris caudicem cum Stagonia thure adpingit.

TEREBINTHUS.

Terebinthus, Græcis *Τερεβινθός* nominatur, quam Dioscorides l. 1. c. 9. velut arborem cognitam non descripsit. Theophrasto 3. hist. 15. alia mascula est, alia femina: & mascula quidem sine fructu: *στεινὰ* arborum altera fructum statim rubentem edit, lentis magnitudine, qui coqui nequit: altera viridem (*ἡ δὲν* Plinius pallidum l. 13. c. 6. vertit) deinde rubentem & cum vite maturentem, tandem nigrum saba magnitudine, resinofum, odore jucundiore, &c. flos oleæ similis, rubens: folia in uno pediculo multa, Laurinis similia, binæ veluti

Balsami veri fructus, Alpino.

III. Xylobalsamum officinarum.

Myrtum potius quam Balsamum refert, Matth.

Alterius fruticis surculi, quamvis aliquando inter eos mirum in modum odoris & saporis gratia commendabiles reperiantur, Cord. in Diosc. & hist.

Xylobalsam. vulgo nuncupatum, quod ex felici Arabia deferitur cum Ægyptio convenit. Bel. ob.

Lignum Balsami ex Arabia felici, Linscor. par. 2. Ind. Orient. 7.

IV. Balsamum Indicum, ex arbore Punica malo majore Xylo dicta, folijs Urticæ.

Balsamum Indicum novum, Matth.

Balsamum ex nova Hispania, Lacun.

Balsamum ex Occidentali India, Monard. Lug.

& Ind. Occid. p. 9. l. 4. c. 28.

Balsami genus novum, Cæs. Frag.

Hujus genus limpidum, quod pura est ex stil-lans lacryma, opobalsamum vocant: aliud im-perfectius, quod ex ligno, cortice & folijs ex-pressum est, aut ignis vi prolicitur, quod Xylo-balsamum appellatur, Ind. Occ. l. c.

V. Balsamum fructu racemoso ex Hispaniola.

Balsamum novum ex Hispaniola, Auctori hist. gener. Indiæ, Lugd.

Ex planta sponte nascente arboris magnitu-dine folijs amplis (quale Lug. hist. exhibet) sex digitos longis, 4. cum dimidio latis, elicitur.

VI. Balsamum Americanum.

Balsamum aliud ex Americæ continente, Lug.

Ex arbore vasta, ramosa fructu pisi magnitudi-ne siliqua digitum longa inclusa, quæ pingitur nomine Fructus balsami Monardis, Lugd.

Lobus oblongus aromaticus, Clus. exot. l. 3. c. 18.

Balsami Peruani fructus, Ponæ, Clus. cur. post.

Balsamum quod ex India occidentali adfertur

primum in Hispaniola inventum: arbor unde

elicitur Goaconaz ab indigenis vocatur, Ovied.

hist. Ind. l. 10. c. 13.

Balsamum ex Nicaraguæ, Benzoni, Ind. Occid.

part. 5. cap. 16.

an Balsamum ex Gueana, Ind. Occid. p. 8.

VII. Balsamum Tolutanum folijs Ceratiæ

similibus, quod candidum est.

Balsamum de Tolu, Monardi, ex Insulis Tolu,

Ind. Occid. q. 9. l. 4. c. 28.

Balsamum Tolutanum ex arboribus pumili-

bis pinis similibus, Lugd. ap.

an Balsam. album Curcas vocatum, Ind. occ. p. 8.

VIII. Frutex Indiæ Orient. Lavendulæ folio.

Arbor Lavendulæ folio, Clus. exot. l. 1. c. 5.

P I S T A C I A.

Pistacia Dioscor. l. 1. c. 177. in Syria gignuntur pineis uncibus similia. Theoph. 4. hist. 5. ferunt & in India Te-rebintum esse, arborem alteri terebintho similem, cujus folia, rami & reliqua omnia, terebintho similia: fructus autē diversus, similis enim amygdalis, non magnus sed aspectu similis & suavitare amygdalis præstantior.

I. Pistacia peregrina fructu racemoso, sive

Terebinthus Indica, Theoph.

Pistacia, Matth. Ang. Tur. Lac. Cord. in Diosc.

& hist. Lon. Dod. Lob. Cæsalp. Cast. Cam. Tab.

Ger. Eyst.

Pistacium, Gef. hort.

Terebinthus Indica Theophrasti, Ad.

Pistachia, incolis Fisluc, Rauvvolf.

Pistaciarum arbor, Dod. gal. Lugd.

Fructus dicuntur *πιστία*: Nicandro *πρωτόν*:

Posidonio, monente Athenæo, *πρωτόν*: Latini

nis Pistacia: officinis & barbaris Fisticci.

II. Arbor exotica fructu racemoso, Chara-

mais dicta.

Charamais & Ambela, Acoftæ, Lugd. Cast.

Duo genera, unum pyrifolio, alterum malo

minore, fructu avellanæ acido.

III. Pistacia sylvestris.

Staphylodendron Plinij, lib. & c. 16. est & trans

alpes arbor similima aceri, alba materia, quæ

vocatur Staphylodendron: fert siliquas & in

ijs nucleos sapore nucis avellanæ.

Nux vescaria, Trag. Dod. Ger.

Staphylodendron, Matth. Bellon. Ad. Lob. Lug.

Cam. Tab. Plinij, Dod. gal. Gef. hort. Eyst.

Arbor vitis & Lacryma Joppi, Ang.

Pistaciorum species, Scaligero in Aristot.

Pistacia Germanica, Lon. sylvestris, Cast.

Coulcoul & Hebulben Turcarum, Matth. epist.

At Bellonio obs. Hebulben semina sunt in offi-

cinis Turcarum venalia, quæ nobis in usu non

sunt: quemadmodum nec Nux quædam gemi-

ni pungi magnitudine, parvis granis esui aptis,

avellanæ instar dulcib', plena, quam Coulcoul,

hoc est, nucem de Coulcoul nominant.

Ex fructu sphaerulæ præcatoriæ fiunt.

Ecc

GLANS

GLANS UNGUENTARIA.

Glans unguentaria, βαλαν & αμυγδαλίς Dioscoridi l. 4. c. 154. fructus est arboris Myrica similis, magnitudine nucis Avellanae, cujus interior pars expressa, veluti amygdala amara humorem emittit, quo ad preciosa unguenta pro oleo utuntur: at Theoph. 4. hist. 1. βαλαν & simpliciter: Balano, inquit, a fructu nomen inditum: solum ejus Myrto simile est, sed oblongius, fructus magnitudine & aspectu capparis fructui similis, cujus corticibus contusis unguentarij utuntur, &c. Hæc unguentaria nomine a cæteris glandibus distinguitur, quod ea unguentarij plurimum utantur. Plinio libr. 12. cap. 21. Myrobalanus Troglodytis nascentis unguento, ut ipso nomine apparet, fructus magnitudine avellanae nucis, &c. Arabes Habel, Ben & Granum ben nominant: inter quos Mesues qui duplex facit, aliud Ben magnum ut Avellana, quod Monardes Avellanas purgatrices esse vult: aliud parvum Ciceris magnitudine: ex quo Monardes monente, Itali oleum de Ben conficiunt.

Glans unguentaria, Matt. Lac. Cord. in Diosc.
Clus. in corol. Dodonæi, Lugd. Cæs.
Granum ben, Lon.
Balanus myrepica, Pharagon incolis ad montem Sinai, Bellon.

Macalep album, Rauvvolf.
Glans unguentaria cathartica filiquata, Adv.
Lob. icon.
Balanus myrepica, Cord. hist. Tab. Ger. Pon.
Ben parvum, Monardi.

CERATIA SIVE SILIQUA.

Keratin, id est, filiqua, a corniculorum similitudine, à Dioscoride l. 1. c. 158. qui eam non descripsit: à Galieno & Aeginetæ verò νεράσιον, quasi cornuta filiqua, hæc arbor appellatur: a recentioribus Græcis χυλλοκεράτα: Arabibus Charnub: à Plinio l. 15. c. 24. Siliqua (quia semen fert in filiqua leguminum modo) de qua hæc: haud procul abesse videntur & praeluces Siliqua, nisi quod Cortex in his manditur: digitorum hominis longitudo illis, interim falcatis pollicari latitudine, &c.

I. Siliqua edulis.

Siliqua, Matt. Ang. Tur. def. Cord. in Diosc. Gef.
hor. Lac. Lon. Rauvv. Cast. Cam. arbor, Cæs. cui
& Ceronia Theophr.

Siliqua five Ceratia, Bellon.

Siliqua dulcis Alpino.

Ceratonia, Dod. ut: Gef. hor. Lugd. Frag.

Cerata vel filiqua, Ad Lob. Tab. Ger. Clus. hisp.

filiqua νεράσιον, Eid. hist.

Ceraunia filiqua Theophr. 4. hist. 2. & Plin. l. 13.

c. 8. Dalech. in Plinium: at hist. Lugd. auctor diversam facit.

Fructus νεράσιον, filiqua, vulgo Carobenominatur: cujus semen sex grana pendens, ponderis illi auri quod Karat dicitur, nomen dedit.

II. Siliqua purgatrix.

Caroba five Sili. ex Guinea purgatrix, Pon. Ital.

III. Siliqua sylvestris rotundifolia.

Arbor Judæ, Bellon. (quæ Græcis vulgo Couchias) Gef. hor. Dod. Ad. Lob. Rauvv. Lugd.

Tab. Cam. Ger. Eyf.

Fabago five filiquastrum, Bellon. Gef. hor.

Ceratia agrestis, Eid.

Siliqua syl. Bellon. Clus. hisp. & hist. Cam. ep. &

hor. Cæs. cui Cercis Theophr.

Siliquastrum & Siliqua sylv. & fatua, & arbor amoris, Cast.

Quibusdam Cercis filiquata Theophr. 1. hist. 18. alijs Colytea tertia Theophr. 3. hist. 14. quibusdam Laburnum vel ejus species.

Acacia vera Matth. quibusdam videtur, quam spinis horridam pingit, quas commentitias suspicantur.

Flores eleganter purpurei, quandoque albi & cortice candicante.

IV. Siliqua sylv. rotundifolia Indica.

Semen nummi instar rotundum planum denarij magnitudine, crassiusculum, rufum, à Rev. D. Terentio ex India accipi, cum hac inscriptione: Semen numulariæ est arboris Judæ Indicæ, cujus flos magnus elegans & odoratus est.

V. Siliqua sylv. spinosa arbor Indica.

Coral arbor, ob flores colore Corallij æmulus, Clus. append. 1. hist. plant. & append. altera ad appendicem primam.

an Acacia prima, Matthiol. & Lugd.

an Acacia major, Cast.

VI. Siliquæ sylv. similis.

Acacalis, vel Syriacæ Kismisen five Sisme, Cam.

Acacalis Kismesen, Bellon.

an Acacia Dioscoridis, Rauvvolf.

Semen hoc Cairine & Kismisen nomine à Doct. Paludano ex Syria reduce an. 1579. Patavij accepimus: an Dioscoridis Acacalis? cum hæc nostra

nostra folijs rotundis enata sit. Dioscoridi verò quadantenus similis. Valer. Cordus in Diosc. non
 Li. c. 118. & ex eo Eginetæ ἀνέναντος, fructus sit cognosci scribit, nisi aliquis ex Myrobalanis
 fruticis in Aegypto nascentis, myricæ fructui Emblicis sive Belliricis hunc esse existimet.

CASSIA NIGRA SEU FISTULOSA.

Cassia Fistula ab Arabibus inventa est, & à recentioribus Græcis, ut Actuarius, κασσία μέλαινα nominatur.
 Fabam Indicam veterum, ut Aristobulū, Valerius Cordus credidit. Siliquam Aegyptiam Theophrasti
 hist. 18. nonnulli censent.

I. Cassia fistula Alexandrina.

Cassia solutiva sive Aegyptia filiqua, Matth.

Cassia fistula, Dod. gal. Lac. Cord. in Diosc. Gesn.

hort. Cast. Alpino, Frag. Tabern. Ger. Pigafette

desc. regni Congiani & Ind. or. p. 1. & 4.

Cassia fistula laxativa, Lon.

Cassia solutiva, Bellon. Monard. Garziæ, Lin-

scot. p. 4. Ind. or. fig. 17.

Cassia stercoraria, Guiland. pap.

Cassia nigra, Dod.

Siliqua Ind. veterum, Cord. hist. Ind. Gesn. hor.

Canna fistula seu fistularis, Lins. p. 4. Ind. or. c. 37.

Cassiam quæ hujus arboris fructus est, Aegyptij

Chaja-ar-xambai vocitant, Paludanus in Lins.

Siliqua aut Cassia purgatrix Arabum, Ad. Lob.

Siliqua sive Cassia cathartica, Lugd.

Cassia, filiqua Aegyptia Theoph. videtur, Cæs.

Cassia Aegyptia sive purgans, Cam.

Canna fistula, Acoftæ.

Canna fistula sive Cassia: Joseph. Acoftæ, lib. 3.

cap. 22. quæ in Hispaniola copiosissima: Idem

lib. 4. cap. 29.

Eligenda fistula insignis, plena, gravis & re-
 cens, & quæ concussa, inclusis feminibus mi-
 nime constrepat, splendens, foris ac etiam in
 pulpa pinguis: pulpam (quæ non antequam
 extrahi debet) florem Cassiæ & Cassiam ex-
 tractam vocant.

II. Cassia fistula Brasiliiana.

Cassia filiqua Brasiliiana purgatrix compressa,

Lob. in pharm. Rondel.

Hæc ex Brasilia advehi cepit, cujus pulpæ
 uncia una, plus quam uncia duæ alterius A-
 gyptiacæ, purgat.

III. Siliqua Arabica, quæ Tamarindus.

Arabicam vocamus, eò quod ex Arabia in
 Indiam aliasque regiones deferatur: à quibus

Tamarindus nominata, quasi dicas Dactylos

Indos, sive Palmulas Indicas: Tamar enim

illis Dactylum significat: licet arbor Palmæ

similis non sit, nec ex Palmarum generibus,

nisi ad fructus effigiem, quæ dactylum sive di-

gitum iuxflexum refert, respexerint. Sunt qui

velint Plinium lib. 12. cap. 6. de hac intelligen-

dum esse, cum inquit: est & alia similis huic

(Palmæ scilicet) dulcior pomo, sed interaneorum

valetudini infesta.

Tamarindi, dactyli Indici

Palmæ syl. Indicæ fructus } Mesuæo, Lac. qui à

Palmulis Thebaicis non differe vult.

Tamarindus Serapioni, Cæs.

Tamarindi, Matth. Bellon. Garz. Acoftæ, Frag.

Lob. qui addit perperam Oxyphœnicum ap-

pellari, Lugdun. qui in ap. & alteram figuram

Acoftæ exhibet.

Thamarindus, id est, Acacia Indica, Cord. hist.

Palmæ sylv. fructus Oxyphœnica, Lonic. Cæs.

cum ficta figura.

Thamarindi, Cam. ep.

Tamarindus Derelvide appellata, Alpin.

Tamarinio, Puly & Ambisy Indis, Linscotto

Ind. or. p. 4. c. 37.

Alia sive Tamarindus: par. 4. Ind. or. fig. 15.

Folliculi recentes, cum melle aut Saccharo

in India condiuntur: ex substantia intinctum

(Caryl vocant) parant, cum cibis utendum.

IV. Tamarindis simile semen spadiceum

dentatum.

Fructus alicujus semen num. 20. à Gareto, Clu-

sio exot. lib. 2. cap. 16.

V. Tamarindo similis frutex.

Queillos frutex folij Tamarindi, fructu ut fabæ

Romanæ subduplo longiore, quo in cibis u-

tuntur: par. 4. Ind. or. 8.

DE LOBIS.

Est Dioscorides Smilacis horrensis fructum lobis, quasi filiquulas dicas, vocavit, eamque ob causam de Lobis
 post Phæolos dicendum videretur, tamen cum alij sint Lobis, qui arborum fructus sunt, de alijs vero non
 satis constet, placuit de omnibus hic agere, usque dum certius quid cognoverimus.

¶ Ecce 2

I. Arbor

I. Arbor filiquosa Juglandis folio Brasili-
na, lobo longissimo Acaciae filiquae instar di-
stincto.

Lobus Brasilianus ingens, Clus. exot. l. 3. c. 1.

Lobus cineraceus binos pedes Romanos
cum triente longus, quatuor uncias latus: se-
mina ex albo rufescentia pene orbicularia, nu-
ci vomicae non admodum dissimilia.

II. Arbor filiquosa Brasiliانا lobo latissimo.
Lobus Brasilianus alter, Clus. exot. l. 3. c. 2.

Hic Lobus, duplex est: major ex fusco cine-
raceus, octo uncias longus, quatuor cum semis-
se latus, semine quasi quadrangulo: alter mi-
nor, ex fusco rubescens, semine citrij mali se-
mini non valde dissimili.

III. Arbor filiquosa ex Virginea lobo fusco
scabro.

Lobus ex Wingandecaovv, Clus. exot. l. 3. c. 3.

In hoc oscicula verius, quam Phaseoli, nigra,
dura, Avellanae magnitudine.

Hic duplex est: alius ex Virginea fuscus,
quinque vel etiam sex uncias longus, duas vel
duas cum semisse latus, unam crassus. Alius ex
insula Hayti sive Isabellae vicina, spadicei colo-
ris, septem uncias longus, tres cum semisse latus.

IV. Arbor filiquosa ex qua gummi Anime
elicitur.

Lobo ex Wingandecaovv similis, Clus. l. c.

an Guama Oviedi horum duorum, alteruter.

V. Arbor filiquosa lobo quadrangulo fusco.

Lobus peregrinus quadrangularis, Clus. exot.
lib. 3. cap. 5.

Lobus fulcis distinctus, septem uncias lon-
gus, binas latus.

VI. Arbor filiquosa Africana, folijs fere pyri
semine fabaceo.

Phaseolus quintus peregrinus, sive Phaseolus
Coles, Clus. exot. l. 3. c. 7.

Siliquae candidae, phaseolis longiores &
maiores: semina albo putamine ablato minij
colorem habent & siccata in binas partes spon-
te finduntur.

VII. Fructus oblongus cineraceus rugosus
& gibbosus.

Fructus ex Bengala ad Coles accedens, Clus.
exot. l. 2. c. 14.

VIII. Fructus compressus quadrangulus
venis candicantibus & nigricantibus, ut Coles
fructus distinctus.

Fructus 6. Parduyni, Clus. exot. l. 2. c. 12.

IX. Lobus orbicularis fuscus spinosis tu-
berculis obsitus, binos phaseolos nigros con-
tinens.

X. Arbor filiquosa Guinensis lobo spadi-
ceo, fulco.

Lobus ex Guinea, Clus. exot. l. 3. c. 4.

Lobus decem uncias longus, tres latus, grana
dura ex spadiceo fusca, medulla tetri odoris.

XI. Arbor filiquosa Guinensis, fructu faba-
ceo, lobo longissimo.

Lobus fabae arborecentis, Clus. exot. l. 3. c. 6.

Lobus nigricans & fuliginosus, uncias no-
vendecim, vel viginti longus, tres latus, pha-
seolos septem, binas uncias cum semisse lon-
gos, semunciam latus, planos, ex spadiceo ni-
gricantes & splendentes continens.

an Arbor fabas majores proferens, par. 6. Ind.
Orient. tab. 14. lit. H.

XII. Lobus cortice cartilagineo, rugoso,
fulco, duplici crista sinuosa donatus.

Lobus primus cartilagineus ex insula Mauritiij
3. Clus. exot. l. 3. c. 9. & 10.

Hic vel uncias quatuor cum semisse, vel tres
longus, binas latus; ille tres, hic duos phaseo-
los orbiculatos ex puniceo nigros, veluti annu-
lo cinctos, eosque duos continet.

XIII. Fructus subrotundus durus elegan-
ter rubens.

Fructus peregrinus 10. Mates nomine acceptus,
Clus. exot. l. 2. c. 30. & tab. 3. Lugd.

XIV. Lobus cortice membranaceo, atro
tumido.

Lobus niger primus turgidus, Clus. exot. lib. 3.
cap. 18.

Hic uncias binas longus, unam latus, semina
nigra, plana, Acaciae fructu similia continet.

XV. Lobus membranaceus atropadiceus,
planus Guinensis.

Lobus niger 2. planus, Clus. l. c.

XVI. Lobus quadrangularis, Clus. exot.
lib. 3. cap. 17.

Hic ex fusco fuliginosus, grana quadrangula,
in binas partes dividua continet.

XVII. Lobus aromaticus subfuscus Tere-
binthi corniculis similis.

Lobus oblongus aromaticus, Clus. exot. lib. 3.
cap. 18.

Hic sex, septem, etiam octo uncias longus,
vix semunciam latus, tenuem pollinem ni-
grum tenacem, Benzoini ferè odore, continet.

FRU.

FRUCTUS EXOTICI.

Fructus exoticos plurimos Clusius proposuit, plurimos etiam à D. Jacobo Guiljelmi Hooft Amstelrodame ante octennium accepimus: quos quantum licuit in aliquem ordinem digessimus, aliquos ad arbores quibus consimiles sunt, vel saltem fructu, retulimus: alios verò ratione forma distributos, hic recensemus.

Fructus rotundi & orbiculares.

I. Fructus magnus ex rotunditate compressus, cortice rugoso fusco.

Fructus crassus peregrinus, Clus. exot. l. 2. c. 7.

II. Fructus rotundus cortice fungoso subpurpurascens.

Fructus 1. à Gareto, Clus. exot. l. 2. c. 16.

III. Fructus orbicularis spadiceus lævis.

Fructus miscellaneus 3. Clus. exot. l. 2. c. 25.

IV. Fructus orbicularis fuscus, nucleo cineraceo.

Fructus miscellaneus 4. Clus. exot. l. 2. c. 25.

V. Fructus orbicularis flavus maculâ subfusca notatus.

Fructus peregrinus 6. Clus. exot. l. 2. c. 29. Lugd. Tab. Ger.

VI. Fructus orbicularis spadiceus nucleo duro.

Fructus exotici 4. Clus. exot. l. 2. c. 19.

VII. Fructus orbicularis ex rubro nigricans.

Fructus peregrinus 3. Clus. exot. l. 2. c. 30. & in tab. altera, Lugd. Tab. Ger.

VIII. Fructus orbicularis fuliginosus.

Fructus 15. à Gareto, Clus. exot. l. 2. c. 16.

IX. Fructus orbicularis ater & acidus.

Fructus peregrinus acidi saporis, Cl. ex. l. 2. c. 13.

X. Fructus orbicularis cinericeus ut Chamaeriphus nucleus.

Fructus 12. navigat Borau. Clus. exot. l. 2. c. 15.

XI. Fructus orbicularis Arantij forma cineraceus.

Fructus minor 7. Paludani, Clus. exot. l. 2. c. 20.

XII. Fructus rotundus parvus putamine spadiceo flavescente, nucleo subacido.

Fructus 7. à Gareto, Clus. exot. l. 2. c. 16.

XIII. Fructus orbicularis compressus cineraceus.

Fructus minor 1. Paludani, Clus. exot. l. 2. c. 20.

Fructus orbiculares sulcis nervisque distincti.

I. Fructus orbicularis major fuscus striatus.

Fructus orbicularis peregrinus 1. Clus. ex. l. 2. c. 9.

II. Fructus orbicularis minor cineraceus striatus.

Fructus orbicularis peregrinus 2. Clus. ex. l. 2. c. 9.

III. Fructus orbicularis subniger & splendens sulcis distinctus.

Fructus 1. è Walachria, Clus. exot. l. 2. c. 22.

IV. Fructus alter splendens quatuor sulcis distinctus.

Fructus 9. à Gareto, Clus. exot. l. 2. c. 16.

V. Fructus orbicularis in summo lineâ triangonâ distinctus.

Fructus 10. à Gareto, Clus. exot. l. 2. c. 16.

VI. Fructus orbicularis Arantium siccum referens, quatuor venis distinctus.

Fructus 2. Jacobi Plateau, Clus. exot. l. 2. c. 19.

VII. Fructus orbicularis fuscus senis nervis distinctus ex Guinea.

Fructus orbicularis peregrinus 3. Cl. ex. l. c. 10.

VIII. Fructus orbicularis spadiceus novem venis distinctus major.

Fructus peregrinus orbicularis nervis distinctus 1. Clus. exot. l. 2. c. 10.

IX. Fructus orbicularis minor novem venis, ut & semen, distinctus.

Fructus peregrinus orbicularis nervis distinctus 2. Clus. exot. l. 2. c. 10.

Fructus figura oblonga ovali.

I. Fructus ovi anserini magnitudine fusco cinereus.

Fructus peregrini pulpa, Clus. exot. l. 2. c. 13.

II. Fructus ovi anserini forma.

Fructus orbicularis peregrinus 3. Clus. ex. l. 3. c. 9.

III. Fructus ovalis fuscus nucleo avellanæ simili.

Fructus 2. à Gareto, Clus. exot. l. 2. c. 16.

IV. Fructus ovalis putamine crasso fibroso.

Fructus 3. à Gareto, Clus. l. c.

V. Fructus ovalis fuscus.

Fructus miscellaneus 1. Clus. exot. l. 2. c. 25.

VI. Fructus ovalis lapidi Judaico similis ex rubro nigricans.

Fructus peregrinus alter, Clus. exot. l. 2. c. 3. & in tab. 2. Lugd. Tab. Ger.

VII. Fructus olivæ osiculum referens.

Fructus minor 5. Paludani, Clus. exot. l. 2. c. 20.

VIII. Fructus ovalis spadiceus.

Nux peregrina 2. Clus. exot. l. 2. c. 13.

IX. Fructus oblongus fuscus striatus.

Ecc 3

Fructus

Fructus exoticus 3. Cluf. ex. l. 2. c. 24.

X. Fructus oblongus arcuatus fuscus.

Fructus 1. è navigat. Batav. Cluf. ex. l. 2. c. 15.

XI. Fructus oblongus fuscus splendens.

Fructus 1. Simonis Tovar Coxco cypote, id est nux five ofsiculum Cypote, Cluf. ex. l. 2. c. 18.

XII. Fructus oblongus cineraceus nervis crassis.

Fructus 3. Parduyni, Cluf. ex. l. 2. c. 22.

XIII. Fructus oblongus cineraceus acidulus.

Fructus 12. & Oregioella, ex quo Cacao potionem conficiunt, Cluf. ex. l. 2. c. 16.

XIV. Fruct. oblongus cortice flavo spadiceo.

Fructus 13. à Gareto, Cluf. ex. l. 2. c. 16.

XV. Fructus oblongus lobum referens niger.

Fructus 13. Gareti, Cluf. l. c.

Fructus pyriformes.

I. Fructus pyriformis major rugosus niger, binis cellulis distinctus.

Fructus exoticus 1. Cluf. ex. l. 2. c. 24.

II. Fructus pyriformis minor spadiceo cinereus.

Fructus exoticus 2. Cluf. ex. l. 2. c. 24.

Fructus orbiculares & rotundi: & ovales tuberculis obfiti.

I. Fructus orbicularis fuscus tuberculis obfitus.

Fructus 2. Parduyni è Guinea, Cluf. ex. l. 2. c. 22.

II. Fructus orbicularis cineraceus tribus foraminibus donatus.

Fructus 8. à Gareto, Cluf. ex. l. 2. c. 16.

III. Fructus rotundus flavus tuberculis obfitus, linea eminentiore transversa.

Fructus peregrinus 4. Cluf. ex. l. 2. c. 30. & tab. alt. Lugd. Tab. Ger.

IV. Fruct. rotundus flavus tuberculis obfitus.

Fructus peregrinus 5. Cluf. ex. l. 2. c. 30. & tab. alt. Lugd. Tab. Ger.

V. Fructus ovalis ex fusco subrubens tuberculis mucronatis obfitus.

Fructus 5. è navigat. Batav. Cluf. ex. l. 2. c. 15.

VI. Fructus olivæ ofsiculum referens tuberculis obfitus.

Fructus minor 6. Paludani, Cluf. ex. l. 2. c. 20.

VII. Fructus oblongus cineraceus durus tuberculis exasperatus.

Fructus 1. Plateau, Cluf. ex. l. 2. c. 19.

VIII. Fructus cordis formam referens, fuscus tuberculis inæqualis.

Fructus minor 2. Paludani, Cluf. ex. l. 2. c. 20.

IX. Fructus subrotundus rugosus, ater.

Nux peregrina 1. Cluf. ex. l. 2. c. 13.

X. Fructus Frago similis.

Garnitre fructus parvus & subtilis fragi similitudine, qui globulorum vicem supplet, Linsc. p. 3. Ind. or. 21.

Fructus angulis donati.

I. Fructus orbicularis fuscus trifidus granis refertus.

Fructus miscellaneus 5. Cluf. ex. l. 2. c. 25.

II. Fruct. rotund. inæqualis cineraceus saxeus.

Fructus 6. Camiri Indis, ex navig. Batav. Cluf. ex. lib. 2. cap. 15.

Fructus peregrinus 2. Eid. l. 2. c. 29.

Nucis est magnitudine, putamine saxea durtie, nucleo albo amygdalino.

III. Fructus Brasilianus inæqualis semine fusco fervido.

Fruct. 1. à Gareto Aratucon dictus, Cl. ex. l. 2. c. 17.

IV. Fruct. angulosus cineraceus cortice fibroso.

Fructus miscellaneus 2. Cluf. ex. l. 2. c. 25.

V. Fructus in gibbum extuberans cortice reticulato villosus.

Fructus peregrinus reticulato corio ex Guinea, Cluf. ex. l. 2. c. 11.

VI. Fructus niger in duas partes separabilis acidiusculus.

Fructus 10. à Gareto, Cluf. ex. l. 2. c. 16.

VII. Fructus avellanæ magnitudine putamine velut in duas partes diviso.

Fructus peregrinus 4. Cluf. ex. l. 2. c. 29. Lugdun. Tabern. Ger.

VIII. Fructus subrotundus cineraceus duplici angulo.

Fructus 9. è navig. Batav. Cluf. ex. l. 2. c. 15.

IX. Fructus triangularis fuscus.

Fructus minor 4. Paludani, Cluf. ex. l. 2. c. 20.

X. Fruct. pentagonus tuberibus inanibus obfitus.

Fructus minor 9. Paludani, Cluf. ex. l. 2. c. 20.

XI. Fructus oblongus pentagonus fuscus.

Fructus 2. è navigat. Batav. Cluf. ex. l. 2. c. 15.

XII. Fructus cristatus spadicei coloris.

Fructus 11. è navig. Batav. Cluf. ex. l. 2. c. 15.

Fructus diversarum figurarum.

I. Fructus in orbem convolutus fuscus.

Fructus minor 11. Paludani, Cluf. ex. l. 2. c. 20.

II. Fructus est quatuor membranaceis folijs compositus nucleo orbiculari.

Fructus 17. navigat. Batav. Cluf. ex. l. 2. c. 15.

III. Fruct. è multis fibris contextus spadiceus.

Fructus miscellaneus 6. Cluf. ex. l. 2. c. 25.

IV. Fructus metæ figuram referens cineraceus

Fructus

Fructus mior 3. Paludani, ad quem pro Balsami Peruan fructu missus, Clus. ex. l. 2. c. 20.

V. Fructus juli figuram quasi exprimens cineraceus, grana spadicea continens.

Fructus miscellaneus 8. Clus. ex. l. 2. c. 25.

VI. Fructus Brasil. ex fusco cinereus acidus.

Fructus secundus Gareti, Clus. ex. l. 2. c. 17.

VII. Fructus Quittenfis.

Fructus ad Dysenteriam, Monardi, Lugd.

Fructus varij.

I. Fructus in Bali Insula, sub terra juglandis magnitudine sed durior & oleaginosior, quo ad cibos condiendos utuntur: Lint. p. 3. Ind. or. c. 39.

II. Fructus purpureus alij sapore: par. 6. Ind. Orient. c. 54.

III. Cautior fructus frequenter cibis adhiberi solitus, uberrime in Guinea provenit: par. 4. Ind. Or. 8.

IV. Gato Gambar, fructus olivis aut Arecae similis in Cambaja, qui dentium dolori medetur, par. 4. Ind. Or. 8.

V. Jalave Malays, arboris fructus glandis magnitudine, quæ infirmi potiunculis miscent, l. c.

VI. Javanos fructus in Bantan: par. 3. Ind. Orient. 35.

VII. Indiamas fructus in Guinea: par. 6. Ind. Or. 19.

VIII. Lucumas fructus in India, quem nihil aliud quam lignum esse dissimulatum ajunt: Joseph. Acosta l. 4. c. 26.

IX. Madian, Main, Corassani, ex civitate Dachen importantur, ad acuendam gulam & ebrietatem facilius ciendam: par. 4. Ind. Or. 8.

X. Tianco, fructus copiose in Malacca, quem tulum cum liquore bibunt, quoties male habent: l. c.

SECTIO TERTIA.

A R O M A T A.

NUX MYRISTICA; MACIS ET MACER; CASSIA SIVE CANELLA; CINAMOMUM; TAMALABATRUM SIVE FOLIUM; BETHRE sive Tembul; Caryophylli Aromatici; Piper; Cubebæ; Fagara; Mungo; Amomum & Amomis; Grana Paradisi & Cardamomum.

N U X M O S C H A T A.

Nux Moschata, quæ veteribus Græcis cum sua Maci incognita fuit at recentioribus *μωσχάτος* vel *ναξάτος* *δρυάκινος* dicitur: forte Nux Indica, in sissimento moscato *δρύγ.*

I. Nux moschata fructu rotundo.

Chrysobalanos Galeni quibusdam,

Comacum Theophrasti & Cinnamum Caryopon Plinii, Guilandino.

Nux Bandensis, Jausibant Arab. Avicennæ.

Nux myristica, Matth. Cast. Lugd. qui & Acosta figuram in appen. habet, Clus. ex.

Nux muscata, Lac. Lon. Ad. Leb. ico. Frag.

Nux moschata, Cord. hist. Lob. (cui & odorata & aromatica) Cæs. Tab. Acosta.

Nux aromatites, quæ incolis Palla & lapatri, Garz. Linsc. Ind. Orient. p. 4. c. 22.

Arbor in Insula Banda quæ nucem & macim proferit, pyri magnitudine, folijs laurinis, latioribus brevioribus: fructus cortice denso, ut in nostris Nucibus tegitur, cui alter tenuior reticulatus, rubescens subest, qui Macis dicitur.

Fructus cum utroque cortice muria conditus adfertur: quem & Saccharo condiunt & externum

corticem in capitis affectibus commendant. In Java majore, ex nucib. Conervas & confectiones, & tam ex nucib. quam olijs, oleum conficiunt. Sic aliam in planis, quæ ad nos adfertur, aliam in montanis provenire scribunt, à cujus fructu cum vix maturescat, saltem Macis admittitur.

II. Nux moschata fructu rotundo parvo.

Nux moschata humilis & fructu pusillo in Moluccis, Acosta.

Nux aromatites infructifera in Moluccis & Zeilan, Garziæ.

III. Nux moschata fructu oblongo.

Nux moschata mascula vel major, Cord. hist.

Nux moschata mas oblongior, Lob.

Nux myristica mas, Clus. exor.

IV. Macis Officinarum.

Macis dicitur cortex alter tenuis rubescens, à

Maceris Græcorum similitudine, qui aëri expositus paulatim flavescit.

Macer,

Macer, officinarum Macis, Cord. in Diosc.
 Macis, veterum Macer seu medius nucis mosch.
 cortex, Cord. hist.
 Macis, Ad. Garziae, Acoftæ, Frag.
 Macer, Tab. qui cum fructu pingit.
 Bunapalla & Jaifol incolis, Garziae, Linsc. Ind.

Oriental. part. 4. cap. 22.
 Macis Javanensibus Massa & Foelien, Linscort.
 Ind. Orient. part. 2. c. 22.
 Befhæ Arab. Avicennæ cui odoratæ nucis involucrum est.
 Nucum myristicarum flos, 4. par. Ind. Or. c. 21.

MACER VETERUM.

Macer Veterum, cortex est arboris sui nominis, res à Maci recentiorum planè diversa: de quo sic Dioscor. l. 1. c. 110. *μακρίσ*, cortex est à Barbaria advehi solitus, subflavus, crassus & gustu per quam astringens: & Plinius lib. 12. c. 8. Macir ex India (Galenum secutus) advehitur, cortex rubens, radice magna, nomine arboris sue. Arbor Ulmo multò major in India Orientali, præsertim in Provincia Malabar, Acoftæ.

Macer & Macir, Talisafar radice cortex, Avic.
 Macer, arbor dysentericæ, à radice corticis usu
 & arbor sancta, Acoftæ, Lugd. in ap.
 Cortex Xylocassie facie, Ad. Lob. ico.
 Macer veterum, Clus. exot. l. 4. c. 4.
 Macer Græcorum verum, ignotum putat Garz.
 Macer veterum, Macir officinarum censent,
 Cord. in Diosc. & hist.

Macer veterum est alter cortex crassior nucis
 moschatæ, Cæsalp.
 An idem.
 Cortex ad alvi profluvia in novo orbe, Monard.
 Arbor contra fluxum, Cast.
 Cortex ad dysenteriam, Lugd.
 Anonymos arbor in novo orbe folijs cordis fi-
 gura, Frag.

CASSIA SIVE CANELLA ET CINAMOMUM.

Kassia sive κασία, καπὰ τὴν ἰνδὴν, quasi κασιόσσω, ἀπὸ τῆς ἀνοσμίατος τῆς κασιόσσης. Kassia Dioscoridi l. 1. c. 12. complura sunt genera, quæ circa aromatiferam Arabiam gignitur: habet autem sarmentum crassi corticis, folia verò piperis: primum locum habet ylig rosarum odorem spirans: 2. xvo indigeni, mercatoribus Alexandrinis daphnitis, odore vinoso: 3. κασιόσση κασιόσσης, mosyleticus germen: reliquæ viles habentur, ut quæ ἀροπύων, nigra in jucunda: & ea quæ κασιόσση ἡ ἀλγυα vocatur: est & quædam κασιόσση illi similima, quæ neg, acris, neg, aromatica, & corticem medullæ coherentem habet, &c.

Quædam plura genera Diosc. l. 1. c. 13. regionum in quibus nascuntur nominibus designata: excellit quod prædictor dicunt, quod similitudinem aliquam habet cum Mosylitide cassia, & quæ recens colore nigrum ex vino in cinereum vergens, nodosum, colore rutæ, aut cardamomo proximum est, huius generis quing, recenset.

Fabulosa varia & incerta, de Cassia & Cinamomo à veteribus Græcis & Latinis, ob longas & difficiles navigationes scripta sunt. Hinc Diosc. scribit Cassiam esse virgulta crassi corticis, piperis folijs: Cinamomi verò descriptionem prorsus omittit. At Theoph. Cassiam & Cinamomum, magnitudine Viticis, multos ramos lignosos habere. Plin. l. 12. c. 19. Cinamomum dicit fruticem esse duorum cubitorum altitudine amplissimum, palmis minimum: Cassiam fruticem esse trium cubitorum amplitudine. Galenus 1. Antid. arcam Romanam delatam à Barbarorum regione tradit, longitudine cubitorum quatuor cum dimidio: & licet Cassiam & Cinamomum diversas arbores esse statuatur, scribit tamen Cassiam sæpe in Cinamomum transmutari: sic Cinamomi succulos, Cassie prorsus per similes. Genera Cassie, eadem Galenus quæ Dioscor. recenset: item Cinamomi sex à Dioscor. etiam declarata. Theophr. 6. hist. 2. & Plinio, Cassia duo duntaxat genera sunt, candidum & nigrum. Recentiores, qui iudicio valent, Cinamomum officinarum vulgo Canella dictum, legitimam antiquorum Cassiam dicunt: cuius generis à Dioscor. & Galeno tradita, apud Mercatores qui magnam copiam habent, inter nosci possunt. Et in compositionibus Græcorum Xylocassiam, id est, Cassiam ligneam sive Cassiam odoratam postulantibus, Canella nostra adhibenda: in Mauritanorum enim Medicamentis, Cassia fistula purgatrix intelligenda.

I. Cinamomum sive Canella Zeilanica.
 Cassia, Cinam. & Canella orientalis, Monard.
 Cinamomum, i. e. lignum odoratum quasi Amomum ex Sina, Canella & Cassia idem sunt, Garz.
 Darfina Avicennæ & Arabibus, quod Persis Lignum Sinenfe sonat.
 Canella legitima, Matth. Lugd. Acoftæ.
 Cassia, Ang. Lob.

Cinamo-

Cinamomum, Lac.

Cinamomum & Calsia unius plantæ cortices,

Guil. the.

Cinamomum & Calsia Græcorum, Ad.

Cinamomum Seylenſe, Linſcorto Ind. Orient. part. 2. c. 16. & par. 4. c. 19.

Arbor in Zeilan frequens oleæ magnitudine, folijs forma ad Citri folia accedentibus, fructu rotundo exiguus olivis ſimili. Canella eſt ſecundus & interior arboris cortex, in tubulos convolutus, qui ſingulo triennio adimitur, & ab exteriori cinerea pellicula, qua obductus eſt, repurgatur: In Canarijs etiam Inſulis Cinamomi nulla eſt penuria, 3. part. Ind. Or. c. 5.

II. Cinamomum ſive Canella Malavarica & Javanenſis.

Canella ignobilior, Garziæ.

Calsia veterum forte, Cluſ. ex.

Canella in ſylvis Malabar, Acoſtæ.

Cinamomum Malabaricum, Canella de Mato, ſeu ſylv. cinamomum, Linſc. Ind. Orient. par. 4. c. 19. & figura 17.

Cinamomum ſylv. Canella de mare, 2. par. Ind. Orient. c. 13.

Cortice eſt enodi cinereo in Malaya & Java: & ut Acoſta, fructus oleæ baccis par oſiculum continens, qui fructus ſeſili parte, parvo calice præditus eſt.

III. Cinamomum ſive Canella Peruana.

Canella in America, quæ calices & glandes ſuberis modo fert, quam ſui generis arborem, non Canellam eſſe, Garzias ſcribit.

Canella Peruana quam Gomara, Auguſt. Caratæ, Petrus Cieca, & ex his Cluſ. notis in Garziam proponit.

Canella novi orbis Monardi, cui Calsia, Cinamomum & Calsia lignea, unius arboris cortices ſunt, & ſola loci varietate, altera alteram præſtantiorem facit: itaque Calsiam & Cinamomum ſolis nominibus diſſerre aſſerit.

Hujus fructum, qui parvo pileo ſimilis, ſua latitudine Taleri Germanici amplitudine æquat, in uſu eſſe ſcribit.

IV. Cinamomum ſive Canella tubis minoribus alba.

Canella alba quorundam, Cluſ. ex.

Duplex eſt: altera majoribus, longioribus & craſſioribus tubis: altera tubis tenuioribus & minoribus: Idem habet,

Canellam albam è radice: &

Canellam albam ex arbore.

Lignum aromaticum Monardi, Lugdun. Caſt. Frag. Cluſ. ex.

an Aſcopo, arbor lauro ſimilis, cujus cortex calidus & acris eſt, in Inſul. Virgin. deſcript. vel Ind. Occid. par. 1.

V. Cinamomum craſſiore cortice.

Xylocalsia, Ad. Lobel. qui an Pſeudocinamomum Dioſcoridis ſit, dubitat, Lugd.

VI. Calsia lignea fuſca aromatica.

Xylocalsia ſubnigra, Lob. belg. & ico. an Calsia Syringitis, vel Syringis Cinamomo cognata, Cord. in Dioſc.

an Calsiæ genus, quod Galeno referente, junior Andromachus, Calsiam fiſtulam nominavit, quia inanis & cava & craſſi corticis, cujuſmodi in vulgari Cinamomo frequentiffimè conſpicitur.

VII. Cinamomum ſeu Calsia craſſior, quæ præter odorem & ſaporem in officinis occurrit, Pſeudocalsiam eſſe non temerè quis dixerit.

VIII. Cortex cinereus acris ſapore.

Cortex eriophorus, Cluſ. ex. l. 4. c. 5.

Cinamomum veterum.

Cinamomum veterum, à Calsia ſive Canella diſverſum eſſe volunt, cujus ſe tres ſurculos vidiffe Cluſius aſſerit, qui recti, ſed non enodes, cortice tenui, ſubcinerei coloris, jucundi & ſuavis guſtus, acrimonia linguam vellicante: lignum verò inodorum & inſipidum.

Galenus primus de Antidot. Calsiam quæ Zizir cognominatur, adeo Cinamomo ſimilem ſcribit, ut ejus loco divendita fuerit: & pro qualibet Cinamomi parte, duas Calsiæ adhiberi poſſe.

TAMALAPATRUM SIVE FOLIUM.

Malabathron φάρμακον, Latiniſimè Malabathrum & Folium ſimpliciter, & Folium Indicum dicitur, Dioſc. l. 1. c. 11. malabathron inquit, nonnulli Nardi Indici folium eſſe arbitrantur, odoris quædam cognitione decipit: peculiare genus eſt, quod in paludibus Indiciſ gignitur: folium, id eſt, quod lentis paluſtris modo aqua innatât, radicem non habens, &c. Et Plin. l. 12. c. 26. dat & Malabathron Syria arborem folio convolato, arido colore: mox ſubjungit: in paludib. Indiæ gigni tradunt, lentis modo, oderatini croco, nigricans ſe abrumg., quodam

Fff

quodam

quodam salis gustu: minus probatur candidum. Quibus verbis Plinius diversa Malabathri genera proposuisse videtur: at Dioscorides unicum. Sed quid velint, non assequimur: nostrum enim non innat: aquis, sed in pro-cera arbore, procul ab aquis in Cambaya nascitur, secundum Garziam: at Linsc. 4. par. Ind. Or. c. 39. arbor est mediocrius magnitudinis, quæ non nisi ad fluminum ripas aut lacus enascitur, in omni quidem India vulgaris, præcipue tamen in Cambaya: folij odor qui Caryophyllorum, quare aliqui male Caryophyll. folium esse putant.

Cadegi Indi, id est, folium indum, Arabib.

Folium Indi Sepasiariorum, Trag.

Malabathr Mat. (cui & Folium) Lac. Lob. Tab.

Calsia folium, Cord. in Diosc.

Calsia aromatica, folium malè, nec Cinamomi

folium, nec Malabathrum, Cord. hist.

Malabathrum, Folium, & folium barbaricum,

res differentes sunt, Ang.

Malabathrum & Folium, medicamenta duo

sunt, Guil. the.

Tamalapatra, ex qua voce corrupta Malaba-

thrum, Garz. Clus. Lugd.

Folium nostrate, Malabathrum est, Ad.

Folium Indicum Acoftæ, Cast. Frag.

Folium indum vocatur, Tembul Avicenn. Cæs.

Folium Indum, incolis Tamalapatra.

Figuræ: fructus glandis exiguae effigie ad-

pingitur à Clus. Lobel. & Lugd. quem Fructum

Canellæ quorundam, alijs Tembul convulsi

in India nomine à Corrufo, Clusius, uti in notis

in Garziam monet, accepit: qui tamen Mala-

bathri nostri fructum esse suspicatur.

Huc referantur

Folia saporem Caryophyllorum referentia, in

Insula St. Maria, ad littus Madagascar: part. 3.

Ind. Orient. c. 12.

BETRE SIVE TEMBUL.

Betre Mallaccensium volubilis modo arborescens, fructu lacerta caudam emulante.

I. Tembul pro Tambul, Avicennæ.

Betre, Garz. Frag. Lugd. qui in append. figuram

Clusij habet.

Betre sive Betle, Aloyf. Cadamusto, Clus. ad Gar.

Betella, Lud. Romano, Odovardo Barbosa.

Betel, Cast. Betele. Acoft.

Betle vel Betre, Tab.

Betelle sive Betre, Linsc. 4. par. Ind. Orient. c. 16.

& figura 14.

Sunt qui Folium Indum putant, ut Barbosa:

& Amatus utrumq; confundit, cum Betre folio

acutius & tenerius sit.

Hoc Indi Orientales perpetuo mandunt, apud

quos in maritimis regionibus provenit: at

in Malaca Vitis modo feritur, & additis peda-

mentis, Hederae modo se sustinet.

II. Kaate, ex hujus arboris ligno pastillos con-

cinnatos cum Betelle comedunt: Linsc. p. 4. I. O. 16.

CARYOPHYLLUS AROMATICUS.

Fructus qui Καρυόφυλλον sive καρυόφυλλον, (i. e. si verbum verborum reddas, Nucifolium, cum quo tamen simili-tudinem nullam habet) Latinis Caryophyllum & Caryophyllus dicitur: à Germanis & Gallis, Clavius no-minatur, quod clavi modo caput sit. Hujus, nec Dioscor. nec Galenus meminisse videntur, licet Serapio Gale-num falso citet, forsan rectius Aeginetam, vel Serbi nominaturus. Apud Pl. l. 12. c. 7. hac leguntur: est etiam in India Piperis grano simile, quod vocatur Caryophyllon grandius fragiliusq;. Verum hunc Plinij, a quo no-men Theoph. 9. hist. esse putant: Comacum, inquit, ex India & Arabia deportatur, ad unguentum idoneum est.

I. Caryophyllus aromaticus fructu ob-

longo,

Caryophyllon, ipse frutex, Aegin. Serbi.

Charunfel, Arabibus.

Caryophylli, Matth. Lac. Ludov. Romano, Ma-

ximiliano Transylvano de Moluc. Tab. qui &

Matthioli & Clusij figuram (à Clusio tamen

improbatam) exhibet.

Caryophyllus Cord. hist. Ad. Cast. Cæs. qui Car-

pesium Q. Medici suspicatur.

Caryophyllon sive Caryophyllon, Arabibus &

plerisq; Indis, Calasur, in Maluccis Chanque,

Garz.

Chamke in Maluco Insulis, in quibus folijs na-

scuntur, Linsc. 4. par. Ind. Orient. c. 12.

Caryophylla arbor quæ Arabibus Siger: fru-

ctus, Carnusul, Acoftæ.

Caryophylli, Lob. Linsc. l. c.

Caryophylli aromatici, Lugd. cui etiam in ap-

pend. Caryophyllus Acoftæ.

Caryophyllus florens & Caryophylli veri, Ger.

cum utraq; Tabern. figura.

Arbor

Arbor est, nostris Malis, aut Pyris non minor, folijs venosis: & ut Linscottus, Lauri similibus, (mea verò ad Pyri folia accedunt) non ita angustis & oblongis, ut Lobelius, Tabernmontanus, Gerardus ex Clusij editione prima pinxere, & Lugd. suæ figuræ, ex Matthiolo desumptæ, folium adposuit: sic fructus non sparsim ramis inhæret, ut Acofta, & ex eo Lugd. in append. pinxere, sed extrema parte bacillis oblongis insident, ut Clusius in notis postremis ad Garziam, Acoftam, & exot. lib. I. pinxit: qui demum in Aucario ad exot. lib. Caryophyllorum ramulum cum fructus rudimento, florem nondum expletum sustinente, & eo qui primum formari incipit, exhibet. In Maluccis ut etiam Makian & Tidore fructifera: in Zeilan, infructifera gignitur: & in Ambona insula summa diligentia nunc colitur, ut ad curas posteriores Clusij plenius habetur. Hos rectè scitatos subflavescere, & ut nigriores evadant infumari, & ex recentibus aquam destillatione elici, & cum Sacchara Eleætuarium confici, Linscottus l.c. scribit. Fructus qui in arbore remanentes crassiores fiunt, & quos Javanenses magis expetunt, dicuntur Caryophylli mares, Avicennæ. Caryophylli maturi seu majores, Cord. hist.

Antophylli, Lob. Lon. Tab. Ger. Linscott.

Antophylli apud Nicolaum, Cæf.

Sic fructus qui ab arbore decutiuntur & maxime expetuntur, aliqui

Flores Caryophyllorum vocant, cum fructus rudimentum sint:

Caryophyllus immaturus aut minor, Cord. hist. Ita pediculi oblongi, à quibus flores dependent, festucae Cordo, alijs Fusti, Lusitanis Bastan, dicuntur.

II. Caryophyllus albus spurius.

Clusius in aucario ad lib. exotic. Solani Beladonnæ, aut ei congeneris flores suspicatur: hoc Caryophylli quoque nomine à J. Pona Veronâ accepimus.

III. Caryophylli odore fructus exoticus.

Fructus caryophyllum olens avellanæ magnitudine, Garziæ, Fragoso.

Fructus avellanæ nucis magnitudine, cujus folia Caryophyllos odore referunt, in Baya: par. 3. Ind. or. 15.

IV. Caryophyllus aromaticus fructu rotundo. Caryophyllon, Plinij.

Amomum quorundam, Clus. exot. l. I. c. 17.

V. Fructus fuscus formâ caryophylli aromatici majoris.

Fructus 7. ex navigat. Batavor. Clus. ex. l. 2. c. 15.

P I P E R.

Piper, *πίπερι* Græcis, Arabibus *Fulful* & *Fulful* dicitur. Dioscoridi lib. 2. cap. 182. arbor brevis, quæ fructum oblongum instar siliquæ profert, &c. & Plinio lib. 12. cap. 7. Piperis arbores Juniperi nostris similes sunt, & semina à Junipero distant parvis siliquis.

Genera: Dioscorides (& cum eo Galenus) eandem arborem & longum & candidum & nigrum proferre, & sola maturatione differre credidit: quæ pleraque & Plinius habet: quæ cum falsa sint, hic non adscribemus. At Theophr. 9. hist. 22. piperis genera duo: unum rotundum Ervi modo, cunctæ carne, constans sicuti lauri bacca, subrubrum: alterum oblongum, nigrum semina parva papaveris continens, quod altero longè validius. Verum Piper ad arbores, potissimum Fausel seritur, quas circumvolvendo conscendit, folijs latis non serratis, Betre similibus, fructum habens racemosum, semper viventem, donec perfectè maturuerit: alia tamen est quæ Piper album, alia quæ nigrum fert, tam parva inter arbores differentia, quantâ inter Vites, quæ uvam nigram vel albam profert, quamvis Ludovic. Romanus arborem quæ album profert proceriorem, crassiore caudice, majoribus folijs esse dicat. & Piper longum, non plus cum illius similitudinis habet, quam faba cum ovo.

I. Piper rotundum nigrum.

Piper nigrum, Matth. Lac. Cast. Garz. Frag. Clus. exot. Lugd. qui in Append. Acoftæ fig. habet, & insuper, Arborem piperiferam ex Theveto, Tabern. Linscottio in Arabia, Filfil; in Java, Sahanang. 4. part. Ind. or. c. 18. & fig. 15.

Piper rotundum nigrum, Cord. hist. Adv. Cæf.

Piper nigrum in Calecut, Ludov. Romano.

Piper rotundum Hippocratis, Garz.

Grana perpetuo virent, at Decembri & Januario, ubi maturari incipiunt, sensim nigrescunt: & hoc vulgatissimum est, cum albi proventus rarior sit: cum viride est, ab indigenis sale & aceto conditur.

Quid sibi velit Matthiolus cum sua figura, quam & Cast. Lug. Tab. & Ger. habent, non assequimur. de qua figura sic Guilandinus scribit:

Si frutex ille Piper est, vel etiam Amomum, ut

Fff 2

alij

alij somniant, parum aberit, quin vulgare Ribes, vel Piper, vel Amomum esse possit.

II. Piper rotundum album.

Piper album, Matth. Lac. Lob. Garz. Frag. Clus. ad Garz. Cast. Lugd. Tab. Linscot. 4. part. Ind. orient. c. 18.

Piper rotundum album, Cord. hist. Adv.

Piperis alterum genus, quod in Taprobana Molaga vocant, Lud. Romano.

Piper alterum candidum, Cæs.

Sabanh pute seu piper album, reliquis paulo exilius, in Sunda: part. 4. Ind. or. c. 8.

Hoc crassiore est grano, nequaquam rugoso & acriore.

III. Piper longum orientale.

Piper longum, Matth. Lac. Cord. hist. Adv. Lob. Garz. Frag. Clus. ad Garz. & exor. lib. 1. cap. 20.

Linscoto & Javanensibus Pepileni.

Piper longum Orientale, Cast.

Macropiper minus, Tab.

Hujus arboris facies longè alia existit, Linscoto, non autem Clusio.

IV. Piper longum Occidentale dimidij pedis longitudine.

Piper, Monardi.

Piper longum Occidentale, Cast.

Piperis longi genus in India occidentali, Cæs.

Macropiper majus, Tab.

Piperis longi genus ex Carthagine, Frag.

Piper longum incolis Chiabe dictum, Linsc. 4. part. Ind. Orient. fig. 20.

Hoc priore longius, acrius & veluti ex multis granulis compositum.

V. Piper longum angustissimum ex Florida.

Piper longum, Felsel, Alpino.

Plantula peregrina, Clus. ex. 1. 4. c. 11.

VI. Piper oblongum nigrum.

an Piper longum, Diosc.

Habzeli & Piper Nigrorum, Serapioni.

Piper Æthiopicum, Matth. Lob. Cast. Lug. Tab.

Crone & Granum Anescen Avicennæ, Ang.

Carpesium, Cord. hist.

Piperis aliud genus Æthiopicum, Frag.

Amomum officinarum nonnullarum & longa vita, Lob. ico.

VII. Piperi similis fructus striatus.

Haernia Serapionis.

Fructus cap. de Mungo additus, forte Negundo,

Clus. ad Garz.

Mungo similis fructus, Lugd.

Caryophyllus Plinianus sive Negundo, Imper.

Negundo, Garziæ, Acostæ, Fragoso: mas pro-

cul aspicienti Sambuco similis: foemina folijs

populi albæ similibus: fructus utriusque piperi

similis & acris.

VIII. Lobus Æthiopico piperi similis,

Clus. ex. 1. 3. c. 16.

IX. Piper abortivum.

Dioscor. 1. 2. c. 182. reperitur etiam quoddam in

genere nigri, nutrimenti defectu, cassum seu in-

ane & leve, quod *bractea* vocant.

Bresma sive Brasma, Cord. hist.

An exotica fructus 4. ex Valachia, Clus. exor.

lib. 2. cap. 22.

X. Piper inane.

Piper quod lingua Malavarica à Canara nomen

sumpsit, Garz.

Piper Canarynum, Frag. Lugd. Linscot. 4. part.

Ind. orient. c. 18.

Hoc cæruleum est, intus cavum, in cujus spa-

cio granula quædam continentur, quod pau-

perculæ plebis usibus cedit: quare Canarium,

i. e. rusticum vocari solet; & propter vilita-

tem, ad externos non effertur.

XI. Piper racemosum caudatum ex Guinea.

Amomum, Ang.

Piper caudatum, Adv. quod pimenta del rabo

Lusitanis, Clus. ad Garz. Frag. Lugd.

Piperis nova species, Imperato.

Pimento del Rabo, Linsc. 4. part. Ind. or. fig. 15.

CUBEÆ; FAGARAS; MUNGO.

Quas Cubeas officina vocant, *Actuarius* vocat. Arabes Cubebe & Quabebe nominant: cujus arbor folijs est Piperis sed angustioribus, simili modo in altum repens, cujus fructus & forma & magnitudine per referunt.

I. Cubeæ vulgares, nec Arabum Cubeæ, simplicite: Hippocrati cui & Myrtidano, Gui-

nec Galeni Carpesium, Matth.

Cubeæ, Lac. Cord. hist. Garz. Acostæ, Frag.

Lugd. Cast. Tab. Linsc. 4. par. Ind. or. c. 29.

Cubeæ Græcorum *napthor*, Lon.

Cubeæ officin. Piper rotundum, Theop. Piper

Cubeæ officinarum, Adv.

Cubeæ vulgo. Amomi fructum putarim, Cæs.

Hæ à Javanensibus, nunquam nisi prius aqua

decoctæ venduntur, ne apud externos quoq; plan-

II. Cubebis affinis Fagara major. (centur. Fagaras

Fagaras Avicennæ, Clus. in Garz. Lob.

Fagara, Cast. Tab. Lugd. Linscot. 4. part. Ind. or.

c. 7. & fig. 18.

Fagara major, Imperato.

III. Cubebis affinis Fagara minor.

Fagara minor, Imperato.

IV. Fructus niger Coriandro similis.

Mungo, Garziæ.

Melle Avicennæ pro Mex.

Mens, Bellunenfi.

AMOMUM ET AMONIS.

Amomum, Græcis ἀμόιον, & Arabibus Hamana sive Hamanus, & Constantinopoli in mercatorum officinis Amama nominatur. Dioscoridi l. i. c. 14. parvus frutex est, in uva modum suo pte ligno in seipsum convolutus: florem habet parvum ceu Leucoium: folia vero Bryoniæ similia. Differentias vero facit ratione loci, Armeniacum præstantissimum: Medicum infirmius: Ponticum racemosum, fructu plenum & odore naves feriens. Et Plinio l. 12. c. 13. Amomi uva in usu est Indica vite labrusca, uti alij existimavere, frutice myrtaoso palmi altitudine, carpitur 3. cum radice & c. addit: est & quæ vocetur Amomis, minus venosa atque durior, ac minus odorata: quo apparet aut aliud esse, aut immaturum colligi. At sic Dioscorides: Sunt qui Amomum, herba simili quæ xasolus dicitur, adulterant, sed quæ & modica sit & fructu careat. Theoph. 9. hist. 7. Amomum alij ex Media, alij ex India cum Nardo advehi narrant. Verum alij Rosam Hiericunticam: alij Cubebas: alij Piper racemosum: alij Piper Aethiopicum: alij quid aliud esse volunt. Vide & Adversar. auctores.

I. Amomum racemosum, quod verum credimus Amomum, Martinelli & Ponæ, de quo Nicol. Marogna Medicus Veronensis librum Latine scripsit, quem Doct. Franciscus Ponæ Italicum dedit.

Amomum spurium, Clus. exot. auctario.

Fructus 5. è Walachria, Clus. exot. l. 2. c. 22.

Amomum verum Ponæ, Clus. cur. post. & ibidem sub Amomo.

II. Amomum spurium foliosum.

Amomum, Clus. ad Garz. Lugd. Tab.

III. Amom. arboræ, folijs bryoniæ florib. violæ pingit Castor Durantes, sed quid sit ignoramus.

IV. Amomis, Clus. ad Garz. Lugd. Tab.

GRANA PARADISI ET CARDAMOMUM.

Cardamomum, Græcis καρδάμωμον (quasi Nasturtium suave) Arabibus Cordamoni nominatur: quod Diosc. l. i. c. 5. non descripsit, sed solum quibus in locis optimum nascatur, his verbis expressit: Cardamomum optimum est, quod ex Comagine, Armenia, Bosphoroq. devehitur: in India quoque & Arabia provenit: eligitur, quod est fragranti contumax, plenum, occlusum & caput odore tentans, gustu acre & subamarum. Plinio l. 12. c. 13. Simile his (Amomo & Amomidi) & nomine & frutice Cardamomum, semine oblongo, & c. Et licet Dioscorides, Galenus & ceteri Græci, unus tantum meminerint, Plinius tamen quatuor genera fecit: vridissimum ac pingue, acutus angulis: proximum è rufo candidans: tertium brevius atque nigrius: pejus ramentarium, odorisq. parvi. Est autem Cardamomum aroma Indorum culinæ familiare, carnem quam elixant condientes, quod frumenti modo provenit, & ocymii plantam ferè amulatur.

I. Grana paradysi officin. cujus folia (quæ ut & Nucis moschata à D. Clurio Amstelrodamo accepimus) sub Melegueta in Prodomo descripsimus.

Cardamomum majus, Matth. Lon. Lac. (cui etiam Cardamomum hortense) Cast. Lugd.

Grana paradysi, Cord. in Diosc.

Mellegetta seu Cardamomum piperatum, Eid. histor.

Millegetta, Adv. Lob.

Malagueta Garziæ (cui & Combazbange, Avicenn.) & ad Clus. cur. post.

Cardamomum primum, Cam. ep. alterum, Cæs.

Cardamomum Arabum majus, Tab.

Grana paradysi seu Mellegettas, Lins. par. 3. c. 14.

Hoc Cardamomi minoris loco aliqui utuntur & Melegeta dicitur, propter similitudinem, quam cum Melicæ semine habet.

II. Granis paradysi sive Mellegetæ affinis fructus.

Fructus 14. sive Melegueta spuria, Clus. exot. lib. 2. cap. 15.

III. Cardamomum majus officinarum.

Saccollæ Arabum, aut Sacoule Avicennæ, Elachi Mauritanis.

Cardamomum medium, Matth. Lonic. Castor. Lugdun.

Cardamomum majus, Cord. in Dioscor. (cui

Fff 3

Heyl

Heyl Arabum) & hift. Cluf. ad Dod. Lincot. 4. part. Ind. orient. c. 23.

Cardamomum majus vulgare, Adv. Lob. Cluf. in Garz. Tab.

Cardamomum, Garz. Frag. secundum, Cam. ep.

Avicennæ duum generum, alterum Saccolaa quebir, id est, magnum: alterum Saccolaa cequer, id est minus.

IV. Cardamomum medium: Adv. & Lob. Tabernæm.

Cardamomum mediocre, Cord. hift.

V. Cardamomum simpliciter in officinis dictum.

Cardamomum minus, Matth. Lac. Lonic. Adv. Lugd. Tab. Lincot. 1. c.

Cardamomum verum, Ang.

Cardamomum minus, Cord. in Diosc. & hift. cui & Helbane Arabum.

Cardamomum minus vulgare, Lob. Clin. Garz.

Cardamomum primum, Cæf. tertium, Cam. ep.

VI. Cardamomum minimum: & Lob. Tab.

Cardamomum quartum, Cam. ep.

SECTIO QUARTA.

RHUS; COCCONILEA SIVE COGGYGRIA; SORBUS;
AZEDARAETH; FRAXINUS; NUX JUGLANS; NUX AVEL-
lana, five Corylus; Castanea; Fagus; Quercus; Robur; Quercus
excrementa; Viscum; Phellodrys; Suber; Smilax
Arcadum & Ilex.

R H U S.

Poss & Hippocrati $\rho\acute{o}\varsigma$, à coccineo acinorum colore dicitur: $\rho\acute{o}\varsigma$ enim $\rho\acute{o}\varsigma$ interpretantur, unde ruffus vox Latina: Rhus, inquit Diosc. lib. 1. cap. 147. quam aliqui Erythron, id est rubrum vocant, fructus est ($\rho\acute{o}\varsigma$ $\beta\omicron\gamma\omicron\gamma\omicron\gamma\omicron\gamma$) rhois coriaria, sic vocata, quod coriarij ea utantur ad coria spissanda: est vero arbuscula binum cubitorum, in qua folia oblonga subrubentia, per ambitum llicis modo serrata: fructus autem racemulis similis, densus, terebintini magnitudine, quadantenus latus, cujus corticosa tunica ambiens perutilis est. At Plinio lib. 24. cap. 11. Rhus quæ Erythros appellatur, frutex est, & hujus semen aspergitur pro sale obsonij. Verum Plinius malè à Rhoë coriariorum distinguit: de Theophrasti Rhoë vide in Viburno.

I. Rhus folio Ulmi.

Rhus, Matth. Ang. Cord. in Diosc. Lac. Lugd. Tabernæm.

Rhus coriaria, Dod. ut: Ger. & desc. Virgin.

Rhus, Rhus veterum, coriaria, obsoniorum & Sumac, Bellon.

Rhus obsoniorum, Ad. Lob. Cæf. Cam. Cluf. hift.

Sumach Arabum, Lon. Cast. Rauvvolf.

Rhus obsoniorum, five rubrum, five culinarium, five coriariorum, idem sunt: cujus seminis tunica externa, quæ sapore acido est, vice salis condimentis aspergebatur.

II. Rhus angustifolium, sub Sumach angustifolio in Prodromo describitur.

III. Rhus myrtifolia Monspeliaca.

Rhus Plinij exstigmatum Monspelij, Gesn. hort.

Rhus Plinij myrtifolia Monspeliensium, Adv. Lob. ico.

Rhus sylvestris Plinij, Lob. Dod. Lugd.

Rhus myrtifolius, Tab. Cam. Cæf. alp.

Rhus Plinij nonnullorum, alij Driophanon ejusdem lib. 27. cap. 9. arbitrantur.

IV. Rhus myrtifolia Belgica.

an Myrtus nemoralis & Dryophanon Plinij, Ruell.

Elæagnus lacus Orcomenij Theopraft. Bellon. cult.

Rhus sylv. Plinij, Dod. gal.

Chamælagmus Dod. sed melior figura in editione Belgica.

Gagel Germanorum & Myrtus Brabantica quibusdam, Adv. Lob. vel Belgarum, Eid. Adv. parte altera.

Elæagnus Cordij, Lob. ico.

Rhus sylv. altera, Lugd.

Rhus herba Plinij, Cluf. hift.

Plinius 1. 24. c. 11. nec Rhus inquit, Latinum nomen habet, cum in pluribus modis veniat: nam

nam & herba est sylvestris, folijs myrti, cauliculis brevibus, quæ venena & tinea pellit, & fructu inftar crenatis, ut Rostochio, nomine Rosmarini Septentrionalium, seu Myrti nostratis, Variat folijs aliquando laticioribus, aliquando à Doct. Backmeistero accepimus.

COCCONILEA SIVE COGGYGRIA.

KOCCONILEA apud Theophrastum 3. hist. 16. habetur, ubi plerique nonnulli legunt, & Gaza, Prunum transtulit: de qua, ubi de uocibus ῥοδον & ῥοδον (Arbutum & Portulacam Gaza reddit) egisset, subiungit: bis folio similis arbor parva, quæ hoc proprium habet, quod fructus in lanuginem abeat: hoc enim de nulla alia arbore audivimus: Plin. l. 13. c. 22. Coggygriam legit: nam cum Andrachnen delineasset, subiicit: similis & Coggygria folio, magnitudine minor, proprietatem habet fructum amittendi lanugine, pappum vocant, quod nulli alij arborum evenit (imo Salici, Populo & Nerio similiter contingit) Verum & Plinij Cotinum lib. 16. c. 18. esse voluit, de qua sic: est in Apennino frutex, qui vocatur Cotinus, ad lineamenta, modo Conchilij colore insignis. Sane Allobroges Rhu vocant, & cortice (sicut & Austriaci circa Viennam) coria spissant: etiam ad pannos luteo colore tingendos utuntur: imò & radicibus pannos rubro colore insciunt, Anguillara notante.

Cotinus, Mart. Ang. Gef. hor. Cast. Cam. Tab. Coccigria Theophrasti, Ad. Lob.
Corinus coriaria, Dod. Eyst. coriarius Plinij, Coggygria Plinij, Clus. pan. & hist. Tab. Ger. u.
Ger. Rhus, Turn. terq; bis pingit. sub Coggygria & Corino Plinij.
Coccigria, forte Barba Jovis Plinij, Gef. hor. Coggygria Theophrasti, Corinus Plinij, Lugd.
Corinus Plinij, Rauvvolf. Scotanum vulgo, Cæfalp.

S O R B U S.

SORBUS arbor in hunc nominatur Dioscor. l. 1. c. 137. qui non descripsit: at Theophr. 3. hist. 12. Sorbi folium totum prolixo nervaceoq; pediculo constat, pinnis similia è lateribus exeunt, perinde ac si id unicum folium sit, ad nervosum n. g. pediculum, tanquam in lacinas divisum: omnibus in postremo pediculi folium impar prominere, ambu serrata, nec in extremum tam acutè mucronata, sed rotundiora: florem racemosum habet ex una veluti clava ex multis parvis & albis constantem: fructus quoq; cum magnus ejus proventus est, racematim coit, &c.
Sorborum genera (eidem) duo sunt, semina fructifera, mas sterilis (& 3. hist. 3. sylvestris maturior urbanà est) fructu differt, quod alia orbiculatum, alia ovatum ferant: distant & succis: nam orbiculati magna ex parte odoratiore sunt & dulciores: ovati, sæpe acidi & minus odorati. At Plinio l. 15. c. 21. Sorbis quadruplex differentia: alijs enim rotunditas Mali, alijs turbinata pyri, alijs ovata species, cæu malorum aliquibus: odore & suavitate rotunda præcellunt: cæteris vini sapor: quantum genus torminalis appellant.

I. Sorbus fativa. Sorbus sylvestris, Matth. Lugdun. Cast. Taber. Gerard.
Sorbus, Branf. Trag. Dod. ut: Ang. Lac. Cord. in Fraxinus bubula, Dod. gal.
Diosc. Gef. hor. Lon. Lugd. Tab. Ger. Fraxinus aucuparia, Gef. col.
Sorbus domestica, Mart. Ad. Lob. (qui Ostriam Ornus, Ruell. Gef. frac. Dod. Portæ.
Theophr. l. 3. c. 10. suspicatur) Cast. Sorbi prima species, Tur.
Sorbum ovatum, Fuch. Tur. Sorbi s. genus aucuparium, Cord. in Diosc.
Sorbus legitima, Clus. pan. & hist. Sorbus sylv. alpina, Ad. Lob. Cæf.
Sorbus esculenta, Cam. Sorbus aucuparia, Bello, Clus. pan. & hist. Thal.
II. Sorbus sylv. folijs domesticæ similis. aucupalis, Cam.
Fraxinea arbor, Trag. Sorbus torminalis, Lugd.
Grosser Meehlbaum/ Eid. Lon.

A Z E D A R A E T H.

AZEDARAEH Avicen. l. 2. c. 17. arbor est nota, habens fructum similem Nabach (i.e. Loto) & nominant eam in Rechi, arborè Myrobalanor. & est ex magnis arborib. Hanc esse eam quam subjecimus plures existimant.
Arbor fraxini folio flore cæruleo. Perlaro, falso Sycomorus Italarum, Bellon. cult.
Pseudosycomorus, Matth. Cast. Tab. Eyst. Azedaracht Avicenne, Gef. hor. Rauvvolf. cui &
Sycomorus Italarum malè, Cord. in Diosc. Gef. h. Astergir Rhafis, incolis Zenselacht.

Azeda-

Azedarach, Dod.

Azedarach, Lotus alba Pelicerio, Clus. hisp. & hist. Camer.

Laurus Græca Plinij & Myxus alba, Gesl. hor.

Zizypha candida Monspel. Lob. Ger.

Zizyphus alba Matthioli, Lugd.

Tuber, Zizypha Columellæ videtur forte & Plinij, Cæs.

Plinio lib. 15. cap. 14. de Malorum generibus agenti Tuberum duo genera: candidum & a-

colore sericum dictum: penè peregrina sunt, in uno Italiæ agro Veronenfi nascentia, quæ lanata appellantur: lanugo ea obducit, &c. ex his Plinij verbis quid colligas?

Ex nucleis precatorios globulos Monachi conficiunt, hinc arbor de gli patre nostro, Italis: Gallis verò, arbor Sancta dicitur.

Variat folijs, quæ in Italica laciniata, in Gallica solum crenata sunt, quod herbarij Lugd. auditor, duplici figura demonstrare voluisse videtur.

FRAXINUS.

Fraxinus, nuclea arbor nota est inquit Dioscor. l. 1. c. 198. Theophrastus 3. hist. 11. descripsit, ejusq. genera duo fecit: unum excelsum, procerum, ligno candido, nervoso, molliore, crispiore, magis enodi. Alterum humilius, minus augescens, scabrius, durius & magis flavum. Et Plinius l. 16. c. 13. inquit, Græci fraxini duo genera fecere, longam, enodem: alteram brevem, duriorē fusciorēq. laurinus folijs. Alij situ divisere: campestem enim crispam esse: montanā verò spissam.

I. Fraxinus excelsior.

Fraxinus prior & *Fraxinus bubula* (Fraxinus bubula Græcæ) Theophrasto.

Fraxinus bumelia, Plinio & Bellon.

Fraxinus, Brunf. Trag. Matth. Dod. ut: Gesl. hor.

Lac. Tur. Lon. Ad. Lob. Tab. Lugd. Cast.

Fraxinus prima, & major, Anguil.

Theophr. monet Ideos existimasse fructu & flore carere: ferretamen in filiqua fructum minutum nucis modo, qualem Amygdalæ, gustu subamarum: ferre & quædam alia *βραχέα*, veluti muscos, ut Laurus: cæterum densiores & magis compactos, globosos, non aliter, quam Platani pilulas. Sane globosos hos muscos, unā cum fructu hist. Lug. pingit, qui circa Veris initium observantur: qui veluti ex musco glutinoso impensus resiccato concreti videntur: Sic Camer. mas floret nigris racemis seu granulis, sed fructum non fert, qui absq. fructu, ut juglandiū juli decidunt: quare Thal. alia sterilis, alia frugifera.

Fructus ipsius sive semen, Ornoglossum & Lingua avis dicitur, Anguil. alijs fructus Fraxini: alijs lingua passeris: alijs anseris. Avicenna inter medullas computat.

Ex fraxino hastæ, mensæ, vasa & utenfilia mul-

ta sunt: sunt & pocula, ex quibus si quis assidue bibat, lienem extenuari ajunt: cujus nomine & corticis decoctum quidam exhibent: quo etiam aliqui vice ligni Guajaci felici succellu utuntur, Cæs. monente: addens ejus corticem internū, aquam, in qua maduerit, caeruleam reddere.

II. Fraxinus humilior, sive altera Theophr.

minore & tenuiore folio.

Fraxinus sylvestris, Columellæ.

Ornus, Bellon. cult. (cui & pumila fraxinus & *βραχέα*) Lugd.

Triplitem Fraxinum facit Thalius: 1. Fraxinum passim nascentem.

2. Fraxinum Fago similem, Buchsæhen.

3. Fraxinum duram seu *αίθρα*, Steinäshen.

III. Fraxinus rotundior folio.

Ornus, Galli Pressani lib. de re rustica.

IV. Lign. peregrin aquam caeruleam reddens. Lignum ad renum affectiones & urinæ incommoda, Monard.

Lignum ad Nephritidem, Lugd.

Lignum in Nova Hispania repertum, Cæs.

Lignum ex novo mundo Pyro simile, Frag.

V. Arbor Indica fraxino similis, oleæ fructu.

Nimbo, Garziæ, Acoltæ, Cast. Lugd. Frag.

NUX JUGLANS.

Nuces juglandes, Dioscor. l. 1. c. 178. *νύκτα βασιλικά*, nonnullis *πικρά* dicuntur: & Theophr. 1. hist. 18. *νύκτα*, Nux Juglans, Persica & Basilica nuncupatur, quod è Perside à regibus translata sit. Juglans verò quasi Jovis glans: hinc Cloatius, Macrobio referente, Dinglandem primo vocatam scribit, quasi duos *βασιλικά*. Arbor, *νύκτα*: fructus, *νύκτα* dicitur, quod caput, *νύκτα* *ἀνὰ*, i. e. *τὸν* *νύκτα* *ἀνὰ* odoris gravitate offendat, ut Pl. l. 15. c. 22. habet: imò l. 17. c. 12. juglandis umbra capiti noxia: & l. 23. c. 8. asserit nuces juglandes Græcos à capitis gravedine sic vocare. Genera: Pl. l. 15. c. 22. sola differentia generum in putamine duro, fragiliore & tenui, crasso, loculoso, ac simpli. Addamus etiam in magnitudine & parvitate: quare recentiores 5. differentias potissimum notarunt.

I. Nux

I. Nux juglans sive regia vulgaris.

Nux regia, Brunf. Cord. in Diosc.

Nux juglans, Trago, Matthiol. Lac. Gef. hor.

Lon. Dod. Ad. Lob. Cæf. Cast. Lugd. Tab. Cam.

Nux, Dod. gal.

Juglans, Fuch. Tur.

Has à duo cortice & frangendi mora, Moracias & Moracillas appellari Hermolaus tradit, & Lug. & quæ à putamine vix purgari possunt, Surdæ nominantur, Cæf. alp.

Nuces regie maxima frequentia in Virginea habentur, eaq; duorum generum: unum forma & sapore parum ab Anglicis differt, putamine crassiore & duriore: alterum majus cortice scabro & duro, nucleo magno, dulci & oleaginoso, ex quibus contusis Lac conficiunt cum suis cibis miscentes: harum arborum nonnullæ octuaginta pedes longæ, part. 1. Ind. Occid.

II. Nux juglans fructu maximo.

Nuces caballinae, Lugd.

Ex haru cuppis, marsupia pueris gestanda fiunt.

III. Nux juglans fructu tenero & fragili putamine.

Nuces juglandes cortice tenuissimo, Gef. hor. Mollusca & Persica, Suevio poetæ apud Macro-
bium: cum Tarentina eadem, aut proximæ natura, Lugd.

IV. Nux juglans bifera.

Harum & Plinius meminit, & in agro Patavino provenire Hermolaus asserit, Lugd.

V. Nux juglans fructu ferotino.

Nuces S. Johannis, quia ante diem S. Johanni sacrum, neq; folia, neq; nuces ostendunt: cum verò id tempus adest par reliquis nucib; quoad

fructum & folia: harum Tragus meminit: Johan. Bauhinus circa Tigurum, Dalechampsius circa Lugdunum observavit, Lugd.

VI. Nux juglans folio serrato.

Juglandis genus alterum, fructu teneriore & longiore, Clus. hist.

Arbores Indica Juglandi similes.

I. Arbor Indica Mamei dicta.

Mamei arbor juglandis proceritate, folijs paribus, fructu duorum pugnorum, aliquando minore, Oviedo, Lugd.

Mamay, Gomarae hist. Indicæ.

Mamei arbor Castaneæ forma, fructu etiam maximi cydonij globum superante, Scalig. Lugd.

Mamei arbor mediocris nucis magnitudine, fructu in Hispaniola rotundo, in continente longo, & crassiore, Benzo Americ. lib. 4.

Mamei fructus, par. 6. Ind. Occid.

Mameyen fructus melocorones sive Persica æquant superantve, Joseph. Acost. parte 9. Amer. l. 4. c. 24. Alias dulces, alias acidi. Idem.

II. Arbor Indica folijs Juglandis, fructus nucis magnitudine.

Ambare; Garz. Acostæ; Frag.

Ambares, Cast.

III. Fructui prædicto affinis.

Fructus Brasiliensis i. & 2. Clus. ex l. 2. c. 7.

IV. Arbor Brasiliensis juglandi similis nucibus carens.

Copau, Ind. Occid. p. 3. c. 12.

V. Hobos, Pacayes sive Guavas multi pro nuce juglande habuerunt: sæpius transplantatas, nuces Hispanicis similes gignere ajunt: part. 9. Ind. occid. l. 4. c. 26.

N U X A V E L L A N A.

Nuces avellane, *νέγνα* *αυελανή* & *αυελανή*, Dioscor. l. 1. c. 169. id est, nux Pontica & tenuis dicitur: at Theophrasto 3. hist. 15. *νέγνα* *αυελανή* *νέγνα*, nuces Heracleoticæ (quod ex Heraclea Ponti translata) alijs Pranesina & Avellane dicuntur. Avellane Plinio l. 15. c. 22. quas antea Abellinas, patrio nomine vocabant: in Asiam Graciamq; è Ponto venere: & ideo Ponticæ nuces vocantur. At arbor Latinis Corylus dicitur. Theoph. 1. hist. 16. folia insecta habet ut Ulmus & Robur: 3. hist. 6. quidam florere existimant: 3. hist. 7. sed postquam fructus decidit, racemosum quiddam vermis prægrandis magnitudine nascitur, ex uno pediculo pingui: 3. hist. 8. julos nonnulli vocant, quod ex minutis squamis innumeris ordine nucis pinea constat, &c.

Genera: Sylvestris est & urbana: ambobus genere constant, quædam enim rotundam, quædam oblongam nucem largiuntur: sed urbanarum fructus candidior est, Theoph. 3. hist. 15.

I. Corylus sativa fructu albo minore sive vulgaris.

Nux avellana rotunda, alba, domestica, Brunf.

Nux avellana fructu rotundo, Matth. Lac. Cæf.

Corylus hortensis, Dod. gal. sativa, Lon. Lugd.

domestica, Clus. histor.

Avellana domestica, Fuch. Tur.

Avellanae tertium genus, Cord. in Diosc.

Corylus domestica rotunda alba, Cast.

Corylus persimilis albo, Ad. Lob.

Ggg

Nux

1 Corylus avellana, Tur.

Avellana *Corylus sylv.* Ges. hor.
Fructu est minore, albidior & rotundior,
quàm sativa sit.

VI. *Avellana peregrina humilis.*

Nux barbata Plinij lib. 19. cap. 1.

Avell. pumila Byzantina, Clus. pan. & hist. Ger.

Avellana Byzantina, Tab.

Variat fructu majore & minore.

Avellanæ purgatrices, Monar

Avellanæ purgativæ, Cæs.

Nuces purgantes, Tab. Ger.

Ben magnum Medicorum vulgo, Monard.

Ex novi orbis Insula S. Dominici adfertur.

VIII. *Avellana Indica* osculo trifido.

Avellanæ Indicæ 2. Matth. & Lugd. adpinxit.

unguentariæ genus) Tab. Lugd.

IX. Avellanae praedictae affinis fructu spadi-

Fructus miscellaneus 7. Clus. ex. l. 2. c. 25.

X. *Avellana quadrifida.*

Avellana purgativa, Oviedo.

Fructus exoticus 6. Clus. ex. l. 2. c. 16.

Hic velut ex quatuor avellanis simul conne-

xis lævibus & spadiceis constat.

XI. Nux purgatrix.

Fructus exoticus, 17. Clus. ex. l. 2. c. 16.

XII. *Avellanæ Indicæ* 3. genus, *Matt. Lugd.*

Avellana Indica 2. Clusij, secundum, Lugd.

Fructus exoticus 2. Clusij in Garz.

Fructus peregrinus i. quem etiam pro Ballamo

Peruana accepit, Clus. ex. l. 2. c. 29.

Balsama fructus, Lugd.

C A S T A N E A.

Genera: antiqui plura ferere, nominibus pleriq; à locis unde importabantur, indit, ut ex Plin. L. 15. c. 6. colligere est: à quorecenſentur, Tarentina, figura plana: Balanitis, qua orundior & ſponte proſilit: & Salaria-
naria plana eſt: Coralliana Laudatio ipſa Tarentina: Metereana rubenti cortice. Sane ſuctus magnitudine
parvitate: item figura, cum quædam in ventrem magis creſcant, quædam in longitudinem: & ſapore, differunt.

Castaneæ majores, Ges. hort. Lugd.

At fativę duplices sunt, grandiores quas Ma-

nas vocant, quæ divitum mentes claudunt, quæ

cinerib. obrutę igne coquuntur: sunt & minores.

11. Cane

II. Castanea sylvestris, quæ peculiariter

Castanea.

Castaneæ populares & coctivæ, Plinio.

Castanea, Brunf. Trag. Tur. Fuch. Ang. Dod. ut:

Gefn. hort. Guil. Lac. Lon. Adv. Lob. Tab. Ger.

Castaneæ minores, Matth. Lugd.

Castaneæ sylv. Cord. in Diofc. Cæs. Cast.

Hæ in aqua decoctæ pauperum jejunia saturant: & ex earum farina panis conficitur. Sic in Virginia Castanearū magna quantitas est, & in Florida, sed Gallicis magis sylvestres: p. 2. Am.

III. Castanea humilis iacemola.

Castanea humilis, Joh. du Choul in hist. montis Pilati, Lugd.

IV. Castanea folio multifido.

Castanea equina, Matth. Dod. Ad. Lob. Cast. Cl.

pan. & hist. & hist. app. alt. Lugd. Cæs. Tab. Ger.

an sit Myrobalanus folio heliotropij Plinij l. 12. c. 27. dubitat Cæsalpinus.

Ex Oriente primum Constantinopolim, hinc Viennam, ubi provenit, delata: & quia equis anhelosis prodest, equina dicitur.

V. Castanea leporinofeni similis.

Castanea Peruana, Clus. hist.

VI. Castanea purgatrix.

Castaneæ purgativæ, Monard. Cast.

Fructus cholagogus, Monard. Lugd.

Ex maritimis Nicaragua in Hispaniam delatus.

VII. Castanea ex Bali insula.

Fructus pyri magnitudine, castaneæ forma cortice tenui minus tamen aculeato, albicans, sapore jucundo, Ind. or. par. 2. c. 39.

VIII. Arbor Mexiocana fructu castaneæ coccifera.

Arbor finium regundorum, Scalig. & ex eo Lug. quia in fructu coccos, quo ad picturas utuntur, & in tabellis pictis, cum literas non habeant, agrorum facies, sineque prædiorum servant.

an Daburi, Clus. exot. l. 3. c. 19.

Bixa Oviedj, Clus. exot. l. 3. c. 20.

IX. Fructus peregrinus Castaneæ similis.

Gor fructus castaneæ similis sed amarus, Scalig. Lugdun.

F A G U S.

Fagus Theoph. 3. hist. 7. *δῆρος* (Gaza Scissima vertit, quod sit in lamina scissilis) cuius fructum 3. hist. 10. describit. Irem, glandem in calice echinato, placido tamen & levi non hispido ut Castaneæ; illi tamen dulcedine & succo similem. Sed præter glandem etiam baccam parvam gignit, de qua sic Plinius l. 16. c. 16. Fagi glans nucleus similis, triangula cute includitur, & c. media parte folij, plerumque gignens superne parvulam baccam viridem cacumine aculeatam. Theophrasto 3. hist. 10. & 3. hist. 8. duplex est: altera montana candida: altera campestris, nigra: sed campestris minus utilis montana, quæ ad multa perutilis.

Fagus, Brunf. Trag. Matth. Anguil. Dod. ut:

Gefn. hort. Lac. Tur. Lon. Adv. Lob. Cast. Lugd.

Cæs. Tab. Ger.

Oxya, Bellonio,

(lapid.

Oxya Græcorum, Fragus recentiorum, Gefn. de

Ornus, Pandectario.

Q U E R C U S.

Quercus *ἀλφειός* Græcis: licet præci Græci omne genus arboris *ἀλφειός* nomine intellexerint, à verbo *ἀλφειός* erum-po: sic Latini Glandis nomine, omne fructū complexi sunt, ut Fabolinus ait, ex ipso Græci sermonis & *ἀλφειός*, apud quos omnes arborum species *ἀλφειός* appellantur, ut *αἰγός* & *ἀλφειός*, fiat dictio *ἀλφειός*, quo verbo Cælius omnem fructum significari dixit. Quæ etiā glandis appellatione apud scriptores intelliguntur, a Græcis *βανδανόα* vocantur: sed revera *ἀλφειός* tantum arbore glandiferam denotat, & præsertim Quercum. Glandem verò (ut habet Plin. l. 16. c. 6.) quæ propriè intelligitur, ferunt, Robur, Quercus, Esculus, Cerrus, Ilex, Suber: quàmvis Roboris appellatione omnia genera contineri posse, Gaza censuerit: cum tamen Robur una solum species sit, quæ *ἀλφειός* generi subiecta sunt. Et Theop. 3. hist. 9. Quercus genera sunt, *ἀλφειός*, *αἰγός*, *αἰγός*, *αἰγός*, *αἰγός*, *αἰγός*, *αἰγός*: Gaza sic vertit: Roboris genera habentur, placida, cærrus, latifolia, fagus, salicortex, quam aliqui recte corticem vocant.

I. Quercus latifolia, quæ brevi pediculo est.

II. Quercus latifolia foemina.

Platyphyllos foemina, Lugd.

latifolia, Plinio.

Glandiferarum arborum species tertia, Ang.

Platyphyllos mas, Lugd.

Glande est mediocri, calice tantum pustulata

scabritie asperato: sæpe ternis aut binis simul

coherentibus, raro unica, in summo ramorum

prodeunte.

Hæc per omnia minor, folijs ob densas lacinias

veluti crispis: glandib. interdū lenis aut quinis,

sæpe ternis aut quaternis, raro binis, rarissime

singularibus, calici firmiter adnexis. Verum sæpe

penè rotundæ imperfectæ calyci continuè re-

periuntur, quemadmodū in historia Lugdunensi

pingitur. Ggg 2 III. Quer-

III. Quercus latifolia perpetuo virens.

Quercus ubi Sybaris perspicua, quæ nunquam folia demittit, Theoph. i. hist. 15.

Quercus in Thurino agro, ubi Sybaris fluit, Plin. l. 16. c. 27.

Quercus in Apennino & Andium Gallicæ gentis agro, Lugd.

IV. Quercus cum longo pediculo.

Hemeris Idæorum, Erymodrys Macedonum, Hemeris, Plinio; placida, Gazæ. (Theop.

Quercus, Trag. Matth. Fuch. Dod. gal. Tur. Lon. Tabernæm.

Quercus vulgaris, Lob. Ger.

Quercus vulgaris, hemeris, Cord. in Diosc.

Hemeris erymodrys, Lugd.

Huic peculiare, quod glans modo unica, modo gemina longo pediculo affixa dependeat.

Quercus latifolia amplissimæ circa Viennam Clusius meminit, cujus omnes glandes è longis pediculis dependentes, quasi viridi quadam excrescentia, multis inæqualibus angulis prædita, inclusæ erant, quæ reliccata gallarum modo firma & dura erat.

Querc. Pannonica latifolia, rectius Cerrus, Cæ.

Sic Quercus præaltæ & vastæ in insula Virginea: & in Guayaquil singularis præstantiæ & longissimæ durationis: Joseph Acoſta l. 4. c. 30.

V. Quercus parva sive Phagus Græcorum & Esculus Plinij.

Φαγός, ἀπό το φαγέειν, Latinis ab esca vel esu, Esculus, quod fructus ejus dulcis sit, ac ceu Castanea edulis, cum cæterarum Quercuum fructus, suis tantum sapiat.

Quercus, sive glandiferarum arborum 1. species, Ang.

Phagus, Quercus species, Cord. in Diosc.

Esculus veteribus Græcis πάλυρον, Bellon.

Phagus esculus mas & femina, Lugd.

Ilcis genus, quod in Hispania Enzinas vocant, Cæsalp.

ROBUR SIVE QUERCUS GALLIFERA.

I. Quercus folijs molli lanugine pubescentib. Robur primum, Clus. hisp. & hist.

Hujus altera species, quæ folio est minus amplo, & minore glande. (ne ferens.)

II. Querc. gallam exiguæ nucis magnitudi-

Robur 2. Clus. hisp. at 3. Eid. hist.

Galla, an Theoph. Fagus, Adv.

Galla major, Lob. & Dod. Galla, Cast.

an Gallæ magnæ, quas Poma de Coquo nancupant, Garziæ.

Folio præcedenti angustiore, inferne candicante, glande communiter unica, raro gemina & aculeo magis pungente: quas Hispani sub cineribus coctas, secundis mensis apponunt.

Quercus genus à nostris diversum, quod veteribus ignotum arbitramur, cujus glandes minoribus fabis haud sunt majores: hæc Bellon.

VI. Quercus calice echinato glande majore. Αἰγίωψ Idæorum, Aspris Maurorum, Latino-rum Cerrus.

Cerrus, glandiferarum 2. species, Ang.

Ægilops sive Cerris majore glande, Dod.

Quercus Ægilops, sive præcella dicta Cerris Plinij, Adv.

Cerris Plinij majore glande, Lob.

Quercus altera, quæ Cerrus, Cæf.

Cerris sive Quercus 4. genus, Lugd.

Cerris Plinij. Tab.

Hiscæ glandibus ad pannos atro colore inficiendos, gallarum vice utuntur.

VII. Quercus calice hispidio glande minore.

Ægilops minore glande, Dod.

Cerris Plinij minore glande, Lob.

Cerrus Ægilops Theoph. Clus. pan. & hist.

Glandifera folio sinuato deciduo tertia, vel Quercus 3. species quæ in Etruria Farnia, Cæsalp.

Haliphleos, Cerrus femina, sive Quercus 5. genus, Lugd.

Huc referatur,

Quercus peregrina sive Mauritanica grandissima glande, cujus ex Scaligero, Lugd. meminit.

VIII. Quercus Burgundica calyce hispidio.

Quercus alia Bauhini, sive Haliphleos Sequanorum, Lugd. nisi eadem cum priore.

IX. Quercus pedem vix superans.

Robur 5. Clus. hisp. hisp. (at 7. in hist.) Tab.

Quercus humilis, Dod. Ger.

Quercus pumila fruticis specie, fronde Ilcis molliore, Lob.

III. Quercus folijs muricatis, non lanuginosis, gallâ superiori simili.

Robur tertium, Clus. hisp. (at quatum in hist.)

Galla major altera, Lob.

Galla sive Robur majus, Ger.

IV. Quercus folijs muricatis, minor.

Robur quartum, Clus. hispan. (at quintum in hist.) Tab.

Galla minor, Lob. Dod. Ger.

V. Querc.

V. *Quercus humilis* gallis binis, ternis aut pluribus simul junctis.

Robur humile, Clus. pan. at sextum, Eid. hist.

Quercus etiam miræ magnitudinis & amplitudinis reperiuntur in Septentrionali plaga Hærcyniæ sylvæ, Plin. lib. 16. cap. 2. *Quercus* quæ B. silvæ in D. Petri nemore est, Cardanus lib. 6. var. rer. cap. 23. Bellon. Lugdun. & etiam Gesnerus meminere.

VI. *Glans Virginea*.

Fructus exoticus 21. vel glandis calix ex Win- gaudea ovv allatus, Clus. exot. l. 2. c. 16.

an Mangummenauk, Virginie historia, quæ in cibum cum piscibus & carnibus cedit.

VII. *Glandium* vel baccarum quinque genera, quæ in diversis arboribus nascuntur.

1. Sagatémener. 2. Osamener. 3. Pummuckoner: ex his indigenæ oleū dulce eliciunt: 4. Sapum- mener dictum, coctum Castaneæ est sapore, ex hac interdū panem pinunt: 5. Magūmenauk, glans est *Querc.* illius provincie: omnibus decoctis in cibis utuntur in Virginea, par. 1 Ind. oc.

VIII. *Quercus lapidea*.

Lithoxyla sive ligna lapidea Anglica, Ad. Lob.

Ligna lapidea, Lugd.

Lithoxyla ex Cerro, Clus. pan. & hist.

Verum & *Abies*, *Alnus*, *Ulmus montana* & alia quoque ligna aliquando in lapidem mutantur, monente etiam Gesnero l. de lapidibus. *Abietes* integræ cum cortice in Elbogane tractu, in lapidem versæ, Agricola.

Fagus altitudine 170. ulnarum cum trunco, ra-

mis, folijs, in saxo cinereo durissimo sub terra in valle Joachimica reperta: & ibidem ex Alno lapis, unde cores fiant, arte conficere docet, Jo. Kentmannus lib. de fossilibus.

Quercinum lignum sub terra defossū, in cotem lapideam mutatum, manibus suis eruit Langius.

Arbores integræ petrificatæ, stantibus adhuc ramis, cortice, medulla ac radicibus, sæpissimè in Bohemiâ & vicinis locis subterraneis invenias, Agricola authore.

Narrat Porta l. 2. Magiæ natur. alicubi succum abundantem petrificum ab arborib. per radices & trunci poros exfugi: atq; radices ipsas, truncum, ramos, folia & flores in lapidē convertere.

Amnes & rivuli sunt in Anglia, ubi pali lignei, ridice, aut conti, si immergantur, aliquot mensibus lapidescunt, imò fere ferrescunt, &c. Adversar. quod in Pannonia quoque Clusius notavit. Sic in Tercera fons quoque, qui omnia vel illapsa, vel injecta, in solidissimum lapidem commutat, Linscot. 3. part. Ind. or. 6.

Similiter in Java majore affirmant incolæ, flumen præterlabi, in quod si ligna quæcunq; immergantur, ea in lapides mutari. 2. p. Ind. or. 12.

Et Plinio l. 2. c. 103. in Ciconum flumine & in Piceno lacu lignum dejectum, lapideo cortice obducitur: & in Surio Colchidis flumine, adeo ut lapidem plerumque durus adhuc integat cortex: Similiter in flumine Silaro, non virgulta modò immersa, verum & folia lapidescunt, alias salubri potu ejus aquæ.

QUERCUS EXCREMENTA.

Quercus præter glandem plurima alia gignunt, Theophr. 3. hist. 8. & Plinio lib. 16. cap. 7. auctoribus.

Galla Græci unius dilla sortè à vineæ, id est fuligine: quod Gallarum, pannis nigro colore tingendis, magnus usus sit. Et licet Plinius l. 16. cap. 6. voluerit Gallam omnes ferre quæ & Glandem, *Quercubus* tamen magis peculiaris est: adeo ut Dioscorides lib. 1. cap. 146. Gallam *Quercus* fructum appellaret: quam Græci duplicem fecere: Dioscoridi altera siccior, parva, tuberosa, gravis, nullo foramine pervia: altera plana, levis & perforata, quæ major est. Theophr. 3. hist. 6. altera candida & exigua, quarum aliquæ non majores fabis evadunt: altera nigra, & magnitudinem mali nonnullæ capessunt: & cap. 8. *Quercus* præter fructum gignit Gallam parvulam, atque alteram resinofam & nigram: & Plin. lib. 24. cap. 4. *Galla* genera facimus, solidam, perforatam: Item albam, nigram: majorem & minorem. Hic notatu dignum, quod Mattioli in comment. addit: majores Gallas illud peculiare sibi vendicasse, ut quotannis, aut annonæ fertilitatem, aut sterilitatem, aut pestilentem auram prænuncient: nam si integræ rumpantur quæ perforatæ non sunt, aut musca, aut araneus exit: si musca evolat, futurū belli: si repat vermiculus, annonæ penurie: si currat araneus, pestilentium morborum præsagium esse. Gallarum genera, Tabern. & Gerard. quatuordecim proposuere. Tragus scribit, *Quercus* peculiare genus esse, quod Gallam ferat, nec in Germania provenire.

I. *Gallæ* maximæ orbiculatæ.

Gallarum 1. & 2. genus, Tab.

Gallæ ex Oriente: & Provinciales, Lugd.

Gallæ orbiculatæ, Gerard.

Harum aliæ sunt Orientales, aliæ Provinciales, & Illyricæ.

Ggg 3

II. *Galla*

II. Galla oblonga: & Ger.

Gallæ ex Istria, Lugd.

Gallarum 3.4. & 5. genus, Tab.

III. Galla minor.

Gallarum 6. genus, Tab.

Galla viridis sive omphacitis, Ger.

IV. Galla galericulata: & Ger.

Excrementa duo fungum quodammodo expri-
mentia, Lugd.

Gallarum genus 12.13. & 14. Tab.

V. Galla angulosa.

Gallarum genus 7.8.9.10. Tab.

Galla viridis sive omphacitis, Ger.

VI. Galla umbilicata.

Excrementum umbilicatum, Lugd.

VII. Galla Brasiliana quinquangula.

Fructus miscellaneus 10. Clus. exot. l. 2. c. 25.

Alia Quercus Excrementa.

I. Excrementum moro simile.

Ξηραυρῶδες Theoph. 3. hist. 8. specie mori, sed
durum & fractu admodum difficile: quædam
veluti mora fert, Plin. lib. 16. c. 7.

II. Excrementa pudendi virilis effigie.

Αἰδιδῶδες sive colis effigie representans, Theoph.

Veretrum, Lugd.

III. Excrementum tauri caput referens: &

Ταυροκεφάλιον durum & perforatum & tauri caput

quodammodo æmulans, quod præruptum nu-
clei oleæ speciem intus ostendit, Theoph. Tau-

ri caput imitantia, Plinio.

Gallarum genus undecimum, Tab.

Galla asinina, Ger.

IV. Pilulæ lanatæ: & Lugd.

πῖλον pilum quidam appellant: pilulæ sunt la-

nuginosæ, molles, nucleum duriores amplexæ,

quibus ad lucernas utuntur, Theoph. Pilulæ

nucibus non absimiles, intus habentes floccos

molles, &c. Plin.

V. Pilulæ capillatæ: & Lugd.

Ξφαιρίων ὀβύλιον ἔχον, pilula comam habens, quæ

inutilis Theoph. pilula alia inutilis cum capil-

lo, verno tamen tempore mellei succi, Plin.

Bedeguaris effigie excrementum spongiosum

& muscosum, Lob.

VI. Pilulæ in alis ramorum.

Ξφαιρίων μαχαλινέες, in ramorum alis pilulam

aliam gignit, sine pediculo, concavoq; sessilem

& vericolem, &c. Theoph. gignunt & aliæ

ramorum pilulas, corpore, non pediculo, ad-

hærentes, candicantes umbilicis, Plin.

Pilulæ sessiles, Lugd.

Capita multis squammis constantia, Clus. in
Cervi historia: vide & Thallium in Quercu.

VII. Pilulæ è folijs convolutis.

Ξφαιρίων ὀβύλιον, pilula è folijs compressa & con-

voluta, Theoph. è folijs convolutæ pilulæ, Plin.

Pilulæ foliosæ, Lugd.

an idem cum ὀβύλιον Theoph. 3. hist. 7. & Cachry

Plinij lib. 16. cap. 8.

VIII. Pilulæ aquosæ: & Lugd.

Ξφαιρίων ὀβύλιον: super folijs tergo adherentem

pilulâ fert candidam, aquosam dum tenera est,

in qua culices, & maturescens in modum parve

Gallæ durefcit, Theoph. in folio rubente aquosi

nuclei, candicantes & translucidi, &c. Plin.

Οὐρανίδες, Galeno.

Pilulæ asininae, Trago.

Quercus vulgaris cum suis excrementis fungo-

sis, Lob.

IX. Pumex quercinus.

Λυθόγιον pumiceum lapillum quoque gignit,

quanquam rarè: Theoph. aliquando & pumi-

ces gignit, Plin.

Pumex, Lugd.

X. Quercus excrementum villosum.

Ξπλάγχθον, Diosc.

Πάχυνον, Theoph. 3. hist. 9.

Panos arentes, muscoso villo canos è ramis de-

pendentes, Plinius l. 16. c. 8. vocat.

Sphagnos & Bryon, Plin. l. 12. c. 23.

Splanchnon & Hypnum, Lugd.

Ufnea, Arabum.

XI. Foliorum quercus gemmæ foraminu-

lentæ.

XII. Coccus Quercuum.

Coccus cochlearum exilium in similitudine in

Ciliciæ Quercubus, Diosc. l. 4. c. 48.

XIII. Verruca seu nodi Quercus.

XIV. Quercus albumen.

XV. Uva Quercina.

Uva Quercina à me inventa, quâ nihil prestan-

tius in dysentericis etiam deploratis, Encelius

l. 3. de lapid. c. 51. vide & Schenck.

Uva Quercina in annosarum Quercuum trun-

cis, Thal. in Quercu.

an Hypodrys fungus rubes, ad Quercus radices:

eodem modo quo Hypocistis sub Cisto pulula-

re solet, Solinander consil. sect. 4. conf. 24. & 25.

XVI. Boleti Quercus, qui è radicibus & cir-

ca radices gignuntur, Plin. l. 16. c. 8.

XVII. Quer-

XVII. Quercinum Agaricum vel Fungus.
de Boletis & Fungo inter Fungos actum est.

XVIII. Quercus excrementum purgans: &
Lob. obf.

VISCUM ARBORUM.

Viscum licet multis arboribus adnascatur, quia tamen in Quercubus optimum provenit, unde Jon poëta sudorem Quercus vocavit, idcirco Quercus excrementis illud subungere lubet. Viscum dicitur Aristoteli 1. gen. an. 1. dicitur, unde Latinum Viscus fluxit: igitur Theoph. 3. hist. 9. & 16. quod nomen commune. at Stelin Eubœum, Hyphear Arcadium vocabulum esse scribit. Dioscor. 1. 3. c. 103. igitur (sic glutinum quod ex eo fit appellatur) est fructu quodam rotundo fruticis in Quercu nascentis, folijs buxo similibus conficitur, igitur quidam derivari dixerunt ab ἔξω significante extra, quasi ἔξω ἀστυρο igitur.

Genera Visci: Plin. 1. 16. c. 4. 4. in abiete ac larice (pino Theophr.) Stelin dicit Eubœa, Hyphear Arcadia nasci scribit: Viscum autem in Quercu, Robore, Illice, Pruno syl. Terebinto, nec alijs (& alijs Theophr.) arboribus adnasci plerique: vide Theoph. 2. c. 23. & hist. 16. At Dioscor. l. c. gignitur quoque in malo, pyro & plerumque alijs arboribus. atque etiam apud fruticum quarundam radices reperitur. Quare recentiores observarunt in abiete, acere, betula, castanea, cerro, corylo, coronio, cynosbato, ilice, larice, mesphilo, nuce, olea, oxycantha, oxycedro, poma, populo nigra, pruno syl. pyro domestica & syl. quercu, robore, rosis, salice, subere, sorbo, terebinto & tilia. Veteres arbitrati sunt, Visci acinis à Turdo comestis, quod ad pulpam pertinet, concoqui: quod seminis est, incoctum ab alvo dejecti sisti, in arboribus illis, in quibus isti quiescere consueverunt. Sed quasi cornua ex ossibus animalium: sic ex arboribus viscum educi, cum Scaligero exerc. 168. credimus.

I. Viscum baccis albis.

Viscus, Brunf.

Viscum, Trag. Matth. Fuch. Dod. ut: Cord. in Diosc. Ang. Tur. Lac. Lon. Ad. Lob. Cæf. (qui fruticem dicit) Clus. Cast. Tab. Ger.

Lignum Visci quercini & Lignum S. Crucis, Gentilis & Jacobus de partibus, vocant.

Quercinum omnes commendant: quidam & quod Castanea adnascitur, probant: quod verò malo ac pyro syl. ac domestica, penitus inutile scribunt: & ut Bellonius refert, nulla Quercus est inter montem Athon & urbes Ceres & Tricala, quæ Viscum non alat & à rusticis Oxonuncupatur: nam tenacissimum Viscum ex ejus baccis, quemadmodum Rhodienses ex fructu Sebesten conficiunt.

II. Viscum baccis rubris.

Viscum baccis rubris in oleis circa Hierusalem, Bellon. Cast. Lugd.

Viscum baccis purpureis, in olea, Clus. hisp. & hist. qui & Visci oxycredri meminit.

III. Viscum racemosum.

Viscum polycoccon, Cam. ep.

Hoc à vulgari solum baccarum racematim coherentium copia differt.

IV. Viscum latifolium senis circulis utrinque insculptis.

Viscum Indicum, Adv. Lobel. Lugdun. Taber. Gerard.

V. Visci modo arboribus Indicis adnascens.

Peruviana alia Aloës facie, arboribus innascens

Visci ritu, Ad. Lob. Lugd.

Planta Peruana Viscio similis, Tab.

Viscum Peruvianum, Ger.

PHELLODRY S.

Quam deinde Arcades nuncupant, natura est inter Illicem & Quercum media, atque aded Illicem fami-
nam quidam esse putaverunt, Theoph. 3. hist. 18. auctore. Dicitur Phellodrys quasi Suberiquercus, nomine ex Subere & Quercu facto, quod natura utriusque participem esse ostendit. Hæc, Theoph. l. c. Illice mollior ac subtilior, Quercu durior ac spissior: colore ligni decorticati, candidior Illice, fulvior Quercu: folio simili ambobus, verum majori quam Illex, minori quam Quercus: fructu Illice minore, at Quercu majore. Plinius 1. 16. c. 8. eandem cum Subere existimasse videtur, ut qui Theophrasti de Phellodry verba ad Suber transtulerit.

I. Phellodrys candicans latifolia molliter

aculeata.

Phellodrys alba latifolia, Lugd.

an Suberella, Cæsalp.

II. Phellodrys candicans angustifolia serrata,

Phellodrys, Matth. Ad. (& Illex foemina) Cast. Lugd. Tab.

sub Subere latifolio ramus ferratis folijs apud Lobel. pingitur.

Phellodrys alba angustifolia folio serrato, Lug. Cerro.

Cerrofugaro Matthioli, Cluf. hist.

III. Phell. nigricans latif. incisuris spinosis.

Phellodrys nigra latissimis folijs, Lugd.

IV. Phellodrys nigricans angustifolia.

Phellodrys nigra mediocribus folijs, Lugd.

V. Phellodrys folijs muricatis.

Phellodrys folijs muricatis calyce glandis echinato, Lugd.

S U B E R.

Suber dicitur Græcis à ποδὶν fluctuo, Suberis modo, quod aquis semper innatet: quæ ratione etiam h. c. quod semper altum petat dicitur. Theophr. 3. hist. 16. arbor est candidiora, parumq, ramosa proceratamen, ætenuq, insignis, ligno robusto, cortice unico crasso, disrumpiq, solito: folio fraxini, crasso oblongiori & deciduo, fructu glandoso Agria simili: corticem detrahunt, inversumq, dividendum censent: alioqui arborem deterioreffici volunt: rursum verò intra triennium repletur. Plin. l. 16. c. 6. Suber inter glandiferas recenset: & c. 8. corticis usum in hyberno fœminarum calceatu: quare non infacetè Græcos, corticis arborem appellasse scribit.

I. Suber latifolium folio deciduo, & Theop.

Suber, Matth. Lac. Bellon. Cæf.

Phellos five Suber Gazæ, Ang.

Suber Aquitanicum folio deciduo, Cluf. hisp. & hist.

Phellos five Suber in Aquitania, Dod.

Suber folio breviorè & latiorè, Lugd.

II. Suber latifolium perpetuò virens.

Suberifera latifolia Ilex glandæ echinato, Ad.

Suber Hispanicum latifolium perpetuo virens, Cluf. hisp. & hist.

Phellos five Suber in Hispania, Dod.

Suber latifolia, Lob. Cast. latifolium, Tab. Ger.

Videntur hæ duæ species saltem in eo differre, quod altera, quæ circa Pyrrhenæos montes, folijs hyberno tempore exuatur, quod Theophr. de p. Pyrrhenos scribit: altera verò perpetua fronde in Italia ac Hispania vireat.

III. Suber angustifolium non ferratum.

Suber 2. & angustifolium, Matt. Cast. Tab. Ger.

Suberifera angustifolia Ilex, Ad.

Suber folio longiorè & angustiorè, Lugd.

Suberis latifoliæ ramus dexter, apud Lob.

Suber alteru oblongis angustisq, folijs, Cl. hist.

IV. Suberi affine lignum fomitis vicem præbens.

Lignorum duo genera Brasiliæ habent, quorum alterum est mollissimum, alterum clarissimum, quibus ad ignem excitandum utuntur hoc modo: virgam ex præduri illius ligni, pedali longitudine ab altera parte ad fusi modum excavant, hujus cuspidem in mollis illius ligni frusto defigunt, virgam maxima celeritate volvunt, quasi ligni suppositi frustum perforaturi, sicq, non modò fumus quem Tataron vocant, sed etiam ignis qui illis Tata excitatur, & gossypio, vel folijs ficcis admotis, ignis concipitur, Læsius in hist. Brasiliæ c. 17. an Lignum fomitis vicem præbens, Cluf. exot. lib. 1. cap. 8.

Ligna in Brasilia quæ Urakuciba vocant, quæ exliccant, dein invicem terunt, ex quo attritu pulvis derafus inflammatur. Stadius par. 3. Ind. Occid. c. 6.

V. Lignum leve fungosum è Java majore, Lignum cotis vicem præbens, Cluf. l. c. At Gef. lib. de lapide, ubi adeo est lignum induatur, ut vel Cotes ex eo fiant, aut fieri possint.

I L E X E T S M I L A X A R C A D U M.

Ilex Diosc. l. 1. c. 144. & Theophr. 3. hist. 16. æiv, quia serra propter duritiem secanda sit. Est autem Theophr. l. c. folio Quercus, sed minore aculeatior: cortice leviori quam Quercus: arbor magna instar Quercus assurgit: materies spissa & robusta: radix alta admodum atq, multiplex: fructus glandosus, sed glans ipsa pusilla est: veterem novus occupat, nam sero maturefcit, quamobrem bifer a nonnullis existimata: fert præter glandem granum quoddam puniceum, & viscum atq, hyphear habet, & c. Smlax Arcades vocant arborem Ilici similem, folio tamen non aculeato, sed molliori profundioriq, nec materia ut illo solida spissaq, sed soluta molliq, & c. Theophr. l. c. At Plinio l. 16. c. 6. Ilici duo genera: ex ijs in Italia folio non multum ab oleis distant, Smlaces à quibusdam Græcis dictæ: in provincijs Aquifolia, & c.

I. Ilex oblongo ferrato folio.

Ilex, Matth. Ang. Lac. Bellon. Cæf. Lugd.

Ilex arborea, Ad.

Ilex angustifolia, Taber.

Sanè Phellodryn, si faciem & folia perpendas, Ilicem quampiam dixeris: ipsum autem lignu, molli & laxius Ilice, & fructu major quàm Ilicis.

II. Ilex folio angusto non ferrato.

Smlax

Smilax humilis angustifolia, Lugd.

III. Ilex folio rotundiore, molli, modicèq; sinuato, sive Smilax Theophrasti.

Ilex major, Clus. hisp. & hist.

Ilex major glandifera, Dod.

Ilex arbor, Lob.

Ilex, Taber. glandifera, Ger.

Ilex latifolia, Camer. epist.

Ilicis alterum genus, Cæs.

Ilex in Gallia Narbonensi, Lugd.

Smilax Arcadium glandifera, Lugd.

Fructu est majore & longiore Hispanica: at Narbonensis minore & brevior.

Huc referri debet

Ilex Londinensis duplex, quas Clusius in sua historia descripsit: qui etiam in Illice Monspelica, aliquando granum ex puniceo nigricans, & interdum tenue & capillaceum mulsimum cinereum, è ramis dependentem, non verò Viscum aut hyphæar, observavit.

IV. Ilex aculeata cocciglandifera.

Ilex hæc à Diosc. l. 4. c. 48. *νότον βαρύνον*, à Theophr. 3. hist. 16. communi nomine *μύρτις*: à Plin. l. 16. c. 6. Ilex aquifolia, & c. 6. Ilex parva Aquifolia: à quibusdam Phellodrys coccifera appellatur. Est autem Diosc. l. c. frutex parvus è cremiorum genere, cui grana ceu lentes adherent, quæ decerpta reponuntur: hæc ille. Etenim in foliorum supina parte, nonnunquam sed rarius, in surculorum quoq; nodis, granum quoddam rotundum, parvum rubens, sanguineo colore plenum innascitur, quod Diosc. & Theophrast.

νότον βαρύνον: Pausanias, Coccum: Plinius, granum, coccum, quisquilium (cusculium aliqui legunt.) Arabes, Chermes: officinæ granum tinctorium, nam in ipso grano vermiculus nascitur, ex quo Chermesinum conficitur: aliqui Scarlatum vocant: ex hoc quoq; Monspeluli confectio Alkermes conficitur.

Coccum infectorium, Matthiol. Lacun. Bellonio cult.

Coccus infectoria, Cord. in Dioscor. Ad. Lob. Cast. Tab.

Cocci infectorii arbuscula, Lugd.

Granum & coccus Baphica, Ang.

Ilex in quo coccus baphica, Bellon. & Ilex pumila.

Granum tinctorium, Lon. Cæs.

Ilex minor coccigera, Dod.

Ilex coccifera, Rauvolf. Clus. hispan. & hist. Gerard.

Ilex coccifera, Bellon. Cam. ep. Tab.

Ilex aquifolia, Lugd.

Ilicis species, Fragofo.

Ilicis alterum genus, Quiquerano.

Huc referatur ex Anguillara

Agria quam Plinius Aquifoliam vocitat, quæ folijs est Ilicis aliquantulum spinosis, glande minima, & quæ in agro Patavino provenit. an Milav sive Acylaca, ilicis species Bellon.

V. Ilex aculeata baccifera folio sinuato.

Hæc Theophr. 3. hist. 4. *ἀγρία* (Aquifoliam Gazavertit) quam perpetuè virere & in montibus nasci scribit: & Plinio l. 16. c. 21. Aquifolio, folia non decidunt, & montes amat.

Aquifolia, Trag. Dod. gal. quibusdā Ruscus syl. Aquifolium, Ruel. Matth. Bellon. Ges. hor. (quibusdam Palma aculeata) Lobel. Cast. Lugdun. Thal. Tab.

Agrifolium, Guilan. (fortè Cratægus Theoph.) Dod. Cæs. Cam. Ger.

Aquifolium sive Agrifolium Septentrionis, Ad. Paliurus secundus, Lacun.

Ilex aquifolia, Lonic.

an sit Hedera rigens Plinij dubitat Cæs. at Plinij l. 16. c. 34. hæc sunt: est & rigens Edera, quæ sine adminiculo stat, sola omnium generum ob id vocata cissos.

Hæc multis in locis tam pumila, ut ad fructus referenda sit: alijs in locis in justam arborem attollitur: hinc apud Tragum Aquifolia arbor, & Aquifolia frutex.

Hæc per ætatem redditur folio nequaquam fimbriato, nec pungente, sed solum extremitate acuminata, & hæc est

Aquifolij alia species levi folio, Ges. hor.

Rustici ex cortice radicibus detracto Viscum parant.

Hhh

SECTIO

SECTIO QUINTA

TILIA; ULMUS; OSTRYS SEU OSTRIA; BETULA; ALNUS;
EVONYMUS; VIBURNUM; POPULUS; GOSSIPUM SIVE
Xylon; Acer; Platanus; Sassafras & Ricinus.

TILIA.

Tilia, Theophr. 3. hist. 10. φλογα dicitur, quod in tennes assulas sive phylaras dissepatur: & inter cortices & lignum, alia tenues interiores cortices sunt, & veluti membrane, a quib. aliarum quoq. arborum cortices interiores, Tilia & Phylra vocantur: quod ex Plin. l. 16. c. 14. & l. 24. c. 8. colligere est. Theophr. l. c. altera mas est, altera femina: differunt inter se cum tota forma, tum ligno: & quod mas sterilis est & sine flore: femina, florem & fructum gignit, & c. folium figura Hederae folio simile, verum sensim magis rotundatur, & juxta pediculum, id quod velut in gibbum prominet, a folij medio, longiore tractu, in acutum magis cogitur: per ambitum crispata & serrata folia sunt, & c. & Plin. l. 16. c. 14. Tilia mas & femina, quae omni modo differunt, & c.

I. Tilia mas folijs Ulmi.

Tilia mas, Brunf. Dod. Lugd. quoad descriptionem, non iconem, quae Ulmi est.

Haec cum non semper fructum ferat, à quibusdam sterilis existimatur: interdum siliquas rotundas; compressas, coacervatas, cum fissura in summa parte edit, quarum singulae & singulis petiolis dependent.

II. Tilia mont. maximo folio: an mas Theophr.

Tilia sylvestris sive montana, Thal.
In monte nostro Mutero provenit, in qua nullum hactenus fructum observavimus.

III. Tilia femina folio majore.

Tilia femina, Brunf. Matt. Fuch. Ang. Dod. gal. Gef. hor. Ad. Lob. Cæs. Lugd. Tab.

Tilia, Tur. Lac. Lon. Dod. lativa, Tr. g.

Phylra Graecis, Tilia Latinis, Guil.

Phillyrea, Cast. ico.

Ex tiliarum cortice funes, & ut Bellonius refert, in monte Athou etiam lagenae fiunt.

Mirum profecto quod Plinius l. 17. c. 16. scribit Tiliam juxta Tiburtes conspici omni genere pomorum onustam, alio ramo nucibus, alio bacis, aliunde vite, ficis, pyris, punicis, malorumque generibus, sed cui vita brevis fuit.

At tiliarum antiquarum radices saepenumero simile observatur ei, quod ad Quercus radices Uva est, Thallio monente.

IV. Tilia femina folio minore.

Tilia sylvestris, Trago.

Tilia minor, Gef. hort.

Haec per omnia minor est, & fronde nigriore.

ULMUS.

Quae Latinis Ulmus, φελῆα Diosc. l. 1. c. 111. & Theophr. 3. hist. 14. qui genera duo fecit: unum oporoxeia (montiulus Gazae, Ulmus montosa, Plinio) alterum φελῆα (Ulmus campestris Plinio) interest quod Ulmus fructu osior est, montiulus auctior: folium individuum leviter circumferratum, oblongius quam pyro, scabro neg. levi: materies flava, robusta, nervosa, deformis, quia tota cor est: sterilis putatur. At Plinius l. 16. c. 40. semen fert latusculum, rotundum tenue: qui l. 16. c. 17. Ulmi quatuor genera fecit: Graeci, inquit, duo Ulmi genera novere: montosam, quae sit amplior: campestem, quae fruticosa. Italia Atinia vocat ex celsissimas, & ex his siccae praefert, quae non sunt riguae: alterum genus Gallicas: tertium nostrates, densiore folio & ab eodem surculo numerosiore: quartum sylvestre. Theophr. 3. hist. 8. Ulmus mas fert & folliculos quosdam: & 8. hist. 8. oporoxeia (φωραξ Dioscoridi) in folliculis gummi gignit & animalia quaedam culicibus similia (& ut Dioscorides, humor is dum exiccatur, in animalcula culicibus similia resolvitur.) Nam si Ulmus verno tempore pluvijs, subito calore Solis infestetur, ipsius folia protinus corrugantur, & vesica seu folliculi ferori humani figurae generantur, quibus humor initio lentus, mox in gummi concrevens includitur, qui dum siccatur in vermiculos, qui cnipes, culices & muliones appellantur, avolant. Addit Theophr. Cachryn (amentum Gazae) etiam edere peculiarem, autumnno, multam minusam, nigram. Semen à Plinio Samora vocatur.

I. Ulmus campestris, & Theophr.

Ulmus nostras sive Italica, Plinij.

Ulmus vernacula, Columellae.

Ulmus, Trag. Matt. Dod. ut: Bellon. Lac. Turn.

Cord. in Diosc. & hist. Gef. hort. Lon. Ad. Lob.

Cæs. Lugd. Cam. Cluf. hist.

Ulmus

Ulmus in planis proveniens, Ang.

Ulmus 1. Tab. qui & 2. habet, quæ Ulmus, Ger.

Huc referri debet ea, cujus folijs averſa parte folliculi adnaſcuntur, quæ dicitur

Tilia mas, Matth. Adv. Lob. Lugd. Tab. Ger.

Carpinus nigra, Caſt.

Ulmus aut. ei ſimilis cum folliculis, quam alii qui pro Tilia mare offerunt, Dod.

Notatu omnino dignum quod Cluſius obſervavit, nempe Ulmorum, juxta Thormim amnem in Hiſpania naſcentium, quaſdam radices in tenuiſſima ſtamina deſinere, quæ cum à præterlabentibus aquis perluuntur, ruſcenscem colorem contrahere, in quibus exigua quædam animalcula, exiguis locuſtis ſimilia naſcuntur & latitant, quæ piſcatores in eſcam capiendis piſcibus colligunt: quæ verò adole-

ſcunt ex radiculis emergentia, inſtar terreſtrium locuſtarum avolare: poſtea certo tempore in aquas ad ſuum genus conſervandum remeare. Sic Bellonius ex Ulmi cortice lagenas confici ſcribit.

II. Ulmus montana.

Ulmus latifolia, Trag. Ger.

Ulmus montana, Matth. Ang. Caſt.

Ulmi alterum genus, Cord. in Dioſc. Cæſ.

Ulmus 2. Dod. tertia, Tab.

Ulmo ſimiles arbores.

I. Cortex arboris Ulmo ſimilis ad catarrhos.

Arboris cortex ad rheumatismos, Mon. Lugd.

Arbor vaſta Ulmo ſimilis cum amplitudine, tum forma.

II. Pacal Indis arbor jam deſcripta minor, Monard. Lugd.

OSTRYS SIVE OSTRYA.

OSTRYS, quam nonnulli *ὄστρυον* vocant, inquit Theoph. 3. hiſt. 10. eſt unica ſpecies. Oxya (id eſt Fago, ſciſſima Gaze) tum ſatu tum cortice ſimile, folio pyri non multo oblongiore, in acutum contractiore & majore, fibris multis & craſſis, à medio dorſi in modum coſtarum rectè à ſecundum magnam fibræ porreſtæ, in fibris ipsis rugato, & in ambitu leviter ſerrato: materia dura, decolor, albida: fructu puſillo, oblongo, ordeo ſimili, flavo: radices ſublimis habet. Et Plinio lib. 13. cap. 21. Oſtrys quæ & Oſtrya, arbor ſimilis Fraxino cortice & ramis, folijs pyri, paulo tamen longioribus, craſſioribus, ac rugoſis, incifuris, quæ per tota diſcurrunt: ſemine boræo figura ſimili & colore.

I. Oſtrya Ulmo ſimilis fructu in umbilicis foliaceis.

Ornus, Trag. Lon.

Carpinus, Matth. Dod. Adv. Lob. Tab. Cam.

Carpinus alba, Caſt.

Ulmi 3. ſpecies, forſè Ulmus ſyl. Plinij, Dod. gal

Oſtrya Cordi, Gefn. de lapid. Bellon. Thal.

Oſtrys Theoph. Fagulus herbariorum, Cl. hiſt.

Fagul ſepiaria, Gefn. hort.

Ulmus Atinia, Lugd.

Fago ſimilis altera, Cæſalp.

Betulus, Lob. in ico. Ger.

(Cam. Carpinus, Matth. quæ Oſtrya ſatis repræſentat,

II. Oſtrya Ulmo ſimilis fructu racemoſo lupulo ſimili.

Fago ſimilis prima, Cæſ.

Hæc Italis, illa Germanis frequens, quam

aliq. ad Ulmum, ad Fagum aliq. aliq. vero ad Car-

pinum Plinij, quæ Aceris ſpecies eſt: aliq. ad

Oſtryn Theophrasti referunt.

BETULA.

Betula vel Betulla, quæ quibusdam ſic dicta videtur, quod bitumine ſcateat: Theophrasto 3. hiſt. 14. *ὀμβλὴν* folio eſt Caryæ (forte Oxyæ) paulo anguſtiore, cortice verſicolore, materia levi, nec niſi ad baculos utili: at Plinio lib. 16. c. 18. Betula arbor eſt Gallica mirabili candore atque tenuitate, terribilis magiſtratum virgis, (idcirco arborem ſapientia appellare conſuevimus,) &c. Hujus cortici liber albus ſub eſt (qui liber Betula) tenuis, candidus, charta noſtra modo, cui veteres opera ſua, ante charta noſtra uſum repertum, inſcribebant.

Betula, Trag. (qui papyri ſpeciem veterum cenſet) Matth. Dod. ut: Ang. Bellon. Lon. Adv.

Lob. Lugd. Caſt. Tab. Ger.

Populo albæ ſimilis in alpiſ, Cæſ.

Hæc sæpè in arborem altam & craſſam aſſur-

git: aliquando pumila reperitur: hinc

Betula arbor, &

Betula pumila, Thallio.

ALNUS.

Alnus, quod amne alatur: *ἄλναξ* Theoph. 3. hiſt. 14. ſterilis eſt & unius generis, recta arbor natura, ligno molli, medulla tenera, folio pyri ſed ampliore nervoſiore, cortice ſcabro, intus rubẽre, quo coria tingunt:

Hhh

radice

radice est per summa terra sparsa, nec major quam *Laurus*: & 3. hist. 4. cum sterilis, tum fructifera floreat. Verum Theophrastus aliquando eas steriles vocat, quæ fructum non conspicuum, aut inutilem ferunt: quidam & cortice & fructu viridi, gallarum vice ad scriptorium atramentum utuntur. Plinius lib. 16. cap. 24. *Alno* folia crassissima tribuit: & cap. 26. nullum semen aut fructum ferre scribit: forè Aristotelis auctoritate motus, qui inter naturæ miracula retulit, quod *Alni* in sola *Creta* non sint steriles: sed ne apud nos quidem infructifera sunt.

I. *Alnus rotundifolia glutinosa viridis.*
Amedanus, Crescentio.

Alnus, Brunf. Trag. Matth. Ang. Dod. ut: Turn.
Lon. Adv. Lob. Cæf. Cast. Lugd. Thal. Tab.

Alnus vulgo Schlitro in *Creta*, Bellon.
Alnus vulgaris, Clus. hist.

Ad hujus radices quandoque excrecentiam ramosam, *Uvæ quercinæ* similem observavimus. Ex hujus ligno pali in aqua ædificiorum fundamentis subacti lapidescunt, cujus causam Vitruvius refert.

II. *Alnus folio oblongo viridi.*

III. *Alnus folio incano.*

Alnus hirsuta, in Matthiolo nostro picta & descripta.

an *Alnus altera*, Clus. hist. qui figuram ex Lobelij iconibus habet.

IV. *Alnus alpina minor.*

Hæc cum prima venit quidem, sed per omnia minor & humilior est, nec folia ita lento

humore aspersa sunt: quæ in Alpibus Austriacis provenit.

Alnus baccifera.

I. *Alnus nigra baccifera.*

Avornus, Crescentio.

Gaulbaum, Trag.

Frangula, Matth. Dod. Lugd.

Alnus nigra, Dod. gal. Adv. Lob. Cam. Thal.

Jovis barbæ species, Bellon. cult.

Alnus nigra baccifera, Lugd.

Alnus baccifera, Tab.

Arbor foetida, Lon.

Siler Plinij quibusdam monente, Lugd.

Hæc dum pusilla est in locoque pingui folia oblonga & magna fert. Cortice interno multo pro *Rhabarbaro* utuntur.

Sunt qui & hirsutam notarunt.

II. *Alnus nigra pumila* Thalij quid?

III. *Alnus nigra polycarpus.*

Kreutzbeere, Lonic.

EUONYMUS.

Εὐώνυμος (Theoph. 3. hist. ult.) arbor, nascitur magnitudine mali *punica*, atque folia ejusdem, majori quam *Vinca perrinca*: & molli ut *punica*: flos odore alba *viola* similis, odore infestus, fructus cum putamine siliqua *Sesame* proximus, intus solidus, præterquam quod in versus quatermos dividitur.

I. *Euonymus vulgaris granis rubentibus.*

Fufanus, Crescentio.

Carpinus, Theoph. Trag. Lon.

Euonymus, Matth. Don. ut: Ang. Turn. Gefn.

hort. Adv. Lob. Thal. Cast. Tab.

Anonymos alijs *Euonymus*, Cord hist.

Siler Plinij, Cæf.

Tetragonia Theophrasti, Lugd.

Theophrasto 3. hist. 6. *τετραγωνία* (*Quadratoria*

Gaza vertit) serotino germine constant, sicut

Thuya & *Taxus*: hæc Theoph.

Fructu est communiter rubescete: rarius albo.

II. *Euonymus granis nigris.*

Euonymus alter, Clus. pan. & hist.

Euonymus pannonicus, Tab. Cam.

III. *Euonymus latifolius.*

Euonymus Pannonicus prior, Clus. pan.

Euonymus primus sive *latifolius*, Eid. hist.

Euonymus latifolius, Tab.

IV. *Euonymo* similis *Ægyptiaca*, fructu baccis laurifimili.

Bon vel Ban, ex cujus semine *Ægyptij* potum

Caova conficiunt, Alpin. & Palud. notis in Lin-

scot. part. 2. Ind. or. c. 28. sed *Choana* vocat.

Buncho *Avicennæ* & *Bunca* *Rhais* ex cujus

fructibus *Turcæ* potionem *Chaube* parant,

Rauvvolff.

Buna ex qua in *Alexandria* potio fit, Clus. notis

in Garz. Lugd. Tab. Belli ep. 4. ad Clus.

Elkanen nonnullis, Pancio.

VIBURNUM VULGO.

Εἰς *Viburnum* alicujus singularis plantæ nomen non fit, sed cujusq; virgulti fructusve proprium, *Sera-* bene & *Nemesiano* testibus, cum tamen vulgo huic, nomen hoc tribuatur, asserere placuit.

Reiner

Kleiner Nesselbaum/Trag.Lon.
Viburnum, Matth. Gesn. hort. Cam. Cast. Lugd.
Spiræa Theophrasti Dalechampi, Lugd.
Viurna vulgi Gallorum & Ruellij, Lob. Cast.
Lantana, Gesn. hort. (quod lenti sint rami)
Guiland. Dod. Cæs.
Rhus coriariorum Theophrasti & Plinij Cæs.
salpino videtur.

Rhus (ait Theop. 3. h. 18. Fluidam Gaza vertit,
nomen illi à πένω impositum fuisse existimans)
alia mascula, alia foemina, quia alia sterilis, alia
fructifera: nec virgas longas gerit, neq; crassas:

folium Ulmo simile, nisi quod parum oblon-
gius densumque aliquantulum: ramulorum
novellorum folia paribus internodijs conjuga-
tim condita adhærent, & planè à lateribus ordo
versus conspicitur: flos candidus racematim
enascens: hic ubi defluxit cum labrusca rufe-
scit fiuntque cœu lentes tenues congestæ: figura
his quoque in modum uvæ, &c. Plinio l. 24. c. 11.
Rhus frutex est coriarius, subrutulus, cubitalis,
crassitudine digitali, cujus aridis folijs, ut Ma-
licorio coria perficiuntur, &c. & alibi inter Sy-
riæ arbores, Theoph. describit.

P O P U L U S.

Populi tria genera Plinius l. 16. c. 23. fecit, albam, nigram & Lybicam: Theoph. 3. h. 1. λέβυς, αἰγυρὸς ἢ
νεγίς: Gaza sic reddidit: primam quidem simpliciter nomine populi, 4. h. 1. 9. aliquando populi albæ, 3.
h. 1. 6. Alteram populi nigræ, 2. h. 1. 3. at 3. h. 1. 1. voces λέβυς ἢ αἰγυρὸς, reddidit populum tam albam quam ni-
gram. Tertiā, alpina nomine: nam 3. h. 1. 14. ἡ νεγίς ἐκ παρρησιαίων τῇ λέβυς, alpina, populo albā non absimi-
lis: quamvis Gaza 3. h. 1. 6. ubi habetur λέβυς, αἰγυρὸς, vocem posteriorem non reddiderit. Sic apud Dioscori-
dem l. 1. c. 109. & 113. λέβυς ἢ αἰγυρὸς legitur: ubi interpretes nomen populi addidere.

I. Populus alba (quæ λέβυς ab albedine dici-
tur) majoribus folijs.

Populus alba, Matth. Dod. ut: Cord. in Diosc.

(cui & Farfara antiquorum) Bellon. Lac. Adv.

Lob. Cæs. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Populi albæ alia species, Trag.

Populus alba latifolia, Lob. ico.

Populi prima species, Ang.

Populus alba Arabibus Haur, Rauvvollf.

Uvas lanofas quædam fert: quædam steri-

lis, ut etiam non floreat. Dioscorides σφαρπύων,

id est pilularum, prima foliorum germinatione

erumpentium meminit. Theoph. 2. cauf. 21. τὸν

λέβυλον ἡ αἰγυρὸς δὲ παρὶς, i. e. populum albam in ni-

gram transire ferunt, tum fronde tum etiam to-

ta specie: & 4. cauf. 6. populus alba in totum

nigræ dissimilis, fronde formaque tota est, sed

in senecta similima efficitur.

Muscus quandoque etiam adnascitur, quem

Populneum muscū Dioscorides & Galenus,

unguentis & oleis inferunt.

II. Populus alba folijs minoribus: & Lob. in ic.

III. Populus nigra.

Populus alba, Trag. (cui & 1. five vulgaris) Lon.

Populus nigra, Matth. Dod. ut: Cord. in Diosc.

Bellon. Lac. Ad Lob. Cæs. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Populus secunda, Ang. Tur.

Quædam floret, & fructum non fert: quæ-

dam fructum fert, & non floret: flos instar a-

menti, colore rubente, aut candicante: fructus,

racemulus oblongus ex plurimis granis viridi-
bus compositus, in quibus lana candida conti-
netur: nonnunquam etiam ramis nodi quidam
duri adnascuntur. Ex gemmarum (oculorum)
viscido & flavo humore, Unguentum popu-
leum in Vere paratur. Resina πύστιν ex hac colli-
gitur Dioscoridi, qui & δάκρυον, i. e. lachrymam
destillatam condescere & Electrum fieri ex a-
liorum sententia monet.

IV. Populus tremula.

Populus Lybica Plinio, alpina, Gaza.

Populus nigra, Trag. Lon.

Populus Lybica, Matth. Dod. ut: Bellon. Adv.

Lob. Cast. Lugd. Thal. Tab. Ger.

Populus alpina, Bellon.

Populi 3. species, Ang. Cord. in Diosc. cui &

Tremula Latinorum.

Populo nigræ similis in albis, Cæs.

Cercis Theophrasti five Populus Lybica Plinij,

Clus. hist.

Hanc νεγίς Theophrasti volūt, de qua 3. h. 1. 14.

ἡ νεγίς παρρησιαίων τῇ λέβυς, sic Gaza, Alpina populo

albæ non absimilis est, cum magnitudine, tum

verò quod ramis albicantibus spargitur, folio

hedera, sed parte altera sine angulo, altera ob-

longo, in quæ angulum acutum exeunte, colore

parte resupina, pronaque ferè simili: pediculo

prolixo tenuique annexo, quare non erecto sed

inflexo, cortice asperiori, quā populus alba, &c.

Sunt qui νεγίς à crepatu, non νεγίς dicendum

Hhh 3

cenfiant.

cescant. Aliqui Cratægum Theophrasti vo-
lunt, Lobelio monente. Plinio l. 16. c. 23. populus
quæ Lybica appellatur, minima folio, ac niger-
rima, fungisque enascentibus laudatissima.

V. Populus rotundifolia Americana.

Populus novi orbis, Adv. Lob. Cast.

Populus America sive Peruana, Lugd.

Populus Americana, Tab. Ger.

Populo similes exotica.

I. Arbor populo similis resinosa.

Focot Guebit, i.e. lignum expetitur, Frag.

Tocot Guebit, i.e. lignum desiderij, Cl. in Mon.

Arbor in India occid. ex qua Idola conficiunt:
sub cuius cortice, gummi Thure candidius, cu-
jus loco etiam utuntur.

II. Arbor populo similis resinosa altera.

Tacamahaca colligitur in nova Hispania ex
arbore odorata, magna ut Populus, cuius fru-
ctus coloratus ut Pæonia est, Monard. Frag.
Lugd.

Tacamahaca 9. hist. Ind. occid. l. 4. c. 29.

Gummi Tacamahaca ex arbore quæ folijs longis
angustis, fructu prunorum magnitudine, 4 par.
Ind. orient. 7.

GOSSIPIUM SIVE XYLON.

UT Græcè Ἐλάν & Ὠσπύριον, ita Latinis Xylon & Gossipium nominatur. At Theoph. 4. hist. 9. Ἀνδροειδία
popov dicitur: in Tylo inquit, insula multa sunt arbores lanigerae, quæ folia vitis habent, verum minora,
fructum fert in quo lana continetur mali magnitudine, vere nascitur oclusum, quod cum maturum est, aperitur
& lana excipitur, quæ telas texunt. Plinius l. 12. c. 10. de his arboribus paulo aliter egit: & fortè seq. c. 11. eadem
sunt arbores, quas Gossypinos vocari tradit: qui alias inter lini generat. l. 19. c. 1. recensuit, his verbis: sint ex quæ
aliqui Gossipion vocant, plures Xylon & ideo lina inde facta. Xylina: parvus est, similemque barbata nuda desert
fructum, cuius ex interiore bombyce lanugo netur: nec lina sunt eis candore mollitie præferenda.

I. Gossipium frutescens femine albo.

Coto & Bombax, Serapioni.

Xylon sive Gossipium, Matth. Guil.

Xylon, Fuch. Dod. gal. Gefn. hort. Lac. Lon.

Gossypium, Turn. Dod. Raupvolff. Adv. Lobel.

Cast. Cæf. Lugd. Cam. Tab.

Bombax Officinatum.

Gossipium par. 4. Ind. occid. c. 15. & p. 8.

Algodon, Catoen sive Gossypium in arbusculis

ram magnis quam minoribus nascitur: aliud

densum & crassum, aliud molle & tractabile,

part. 9. Ind. occid. l. 4. c. 23.

Gossipium in sylvarum humilibus arboribus

copiosè, Linscot. Ind. or. part. 3. c. 9.

II. Gossipium arboreum caule lævi.

Gossipium perenne & arboreum, sive Asiati-
cum, Bellon. (cum, Alpin.

Gossipium arboreum, Gotte Mægiar appella-

III. Gossipium arboreum caule spinoso.

Gossipium Brasilianum, Bellon. & Belli.

Bombax Indica, Ponæ ital.

Xyloa, Stadio in Brasil. part. 3. Ind. occid. c. 38.

Xyliferæ arbores, Leri, part. 3. Ind. occid. c. 12.

Hujus femina nigra sunt, in dena vel duode-

na grana uvæ modo congesta: cum Asiaticum

singula grana separata habeat.

IV. Gossipium Javanense falicis folio.

Cylæ, Oviedo.

Lanifera arbor peregrina, Clus. exot. l. 1. c. 14.

an Lanifera arbor, Bellon.

A C E R.

ACER Græcè ἄκρῳ & dicitur. Theophrasto 3. hist. 11. ἄκρῳ & ἄκρῳ (Acer Gazæ vertit) alij bina, alij
tria genera faciunt: unum quod communi nomine ἄκρῳ & ἄκρῳ (Acer) vocant: alterum ἰσχυρῶν (Car-
pinum) tertium verò ἰσχυρῶν (Lectirotariam Gazæ) At 3. hist. 4. ἄκρῳ & ἄκρῳ quæ in monte ἰσχυρῶν, quæ in
planis γλῶκρον (Gallicum Gazæ) vocari tradit. Plinio lib. 16. cap. 16. Aceris plura genera: album, quod præci-
pui candoris, vocatur Gallicum: alterum genus (Zygias Theoph.) crispo macularum discursu, qui cum ex-
cellentior fuerit, à similitudine caudæ pavonis nomen accepit: è viliori genere crassivenium (clinotrochon
Theoph.) Greci situ discernunt: campestre candidum esse, nec crispum, quod glinon vocant: montanum verò,
crispum duriusque: & tertium Zygiam. &c. quod alij generis proprij esse volunt & Latine carpinum appellant.
Verum sic distinguere licet, quod Sphendamnus acer sit nervosum & album: Zygias verò, flavum & crispum:
clinotrochos, flavum & non crispum: glinon, candidum, minus crispum.

I. Acer montanum candidum.

Platanus, Trag. Lon.

Aceris species folio majore, Carpinus viderur, Acer, Cord. in Diosc. Cæf.

Sycomor Ruellij, Gefn. hort.

(Dod. gal. Aceris prima species, Ang.

Aceris

Aceris species Platanus Gallorum, Bellon.

Acer major, Cord. hist. Gefn. hort. Dod. Ad. Lob.

Cam. ep. Thal.

Acer, *ἄκρως* & antiquis, Ad.

Acer latifolia, Clus. pan.

Acer montanum, Gef. hor. five Gallicum, Lugd.

Hujus turiones lacte scatent, ut Ficus: sic quæ-

dam floret, quædam non floret, nec fructum fert.

II. Acer montanum flavum five crispum.

Acer crispa materia, Acer montana Asphen-

damnos rusticis Cretenfibus, Bellon.

Aceris altera species, quæ fortè Zygia Theo. Ad.

Opulus montanus, Lugd.

Acer montanum in marem & fœminam di-

stinguunt: mas colore magis flavo, ligno durio-

re & venosiore, magisque crispo, citiusq; floret:

fœmina tardius, & ligno est pallidior, minus-

que crispo. Germani ob flexuosos venarum dis-

cursum ad opera lautiora utuntur, lignum no-

bile vocantes, ex hujus radicibus cochlearia

pulchra conficiuntur.

III. Acer montanum tenuissimis & acutis folijs.

Acer acutioribus folijs, Gef. hort.

Acer tenuifolia, Thal.

IV. Acer campestre & minus.

Acer, Trag. Lob. Tab. minus, Gef. hor.

Acer campestre, Dod. gal. & Lugd. cui & Carpi-

nus & Opulum campestris veteribus,

Opulus, Tur. Gef. hort. Cæs.

Acer tenuifolia, Cord. hist.

Acer, Opio cognominatum Romanis, Bell. cult.

Aceris species quæ Sphendamnus Theoph. Ad.

Acer minor, Dod. Clus. pan. Cam.

Platanus, Lon. ico.

Opulus & Rhambolinus, Cordi Schol.

Acer latifolium, Clus. hist. ico.

Alibi frutex, alibi arbor est.

V. Acer trifolia.

Acer Monspessulanum, Lugd.

an Aceris arboris genus à reliquis diversum ad

sextum id genus à nobis observatum, Bellon.

PLATANUS.

Platanus *ἰκέρων* & Græcis, à latè diffusis ramis nomen sortita est; *ἰκέρων* enim dilato & speciosum red-
do, significat: hujus apud Diosc. l. i. c. 107. nulla descriptio: at Theoph. i. hist. 16. platano folia ampla tri-
buit: & 3. b. 2. semen manifestum producit, eoq; gignitur: quam (i. hist. 15.) in Creta Insula apud fontem stare
asserant, quæ nunquam folia deperdat: & Plin. l. 2. c. 1. de Platano multa habet, ostendens quomodo mero as-
fuso enutriatur: sicq; & arbores vino potare: Aelianus scribit (cum adeo patulis ramis diffundatur) Xerxen
adeo ipsius umbra dalectatum, ut in Lydia diem integrum, cum maximo exercitu sub ea consumpserit.

I. Platanus, Matth. Ang. Dod. ut: Cord. in

Diosc. Bell. Gef. hor. Tur. ico. Lac. Ad. Rauvvolf.

Lob. Cæs. Cast. Lugd. Tab. Clus. hist.

Fructus ipsius *σπέρμα* Dioscorides, pilulas Pli-

nius l. 2. c. 1. vocat.

Ex hujus truncis craisfis montis Athon incolæ

naviculas conficiunt, Bellonio eas describente.

II. Arbor Platani folio fructu peponis ma-

gnitudine eduli.

Mamœra ipsa arbor: at fructus Mamaon ab u-

berum forte similitudine, Lusitanis in America

est mas sterilis, fœmina fructifera, Cl. cur. post.

SASSAFRAS.

Arbor ex Florida ficulneo folio.

Pavame Indorum, Monardi, Lugd. Frag.

Sassafras arbor, Monardi, Lugd.

Sassafr. Cast. Capevaccio, cui & Ind. Sassafragia.

Lignum ex India Occid. Sassafras vocant, Cæs.

Sassafras, ab indigenis in Virginea, Winauck

appellatum, par. i. Ind. Occident.

Ex Florida, novi orbis provincia, adfertur:

fructum oblongum, rugosum, longissimis pe-

diculis donatum habet. Hujus folia fructumq;

Dof. Doldius p. m. unâ cum infinitis alijs ad

me Norinberga misit.

RICINUS.

Ricinus, Dioscor. l. 4. c. 164. *ῥικινός*, à similitudine Croronis vel Ricini animalis, quod semen ejus re-
fert: quod animal Plinius l. 11. c. 34. & l. 30. c. 10. descripsit. Alijs Pentadactylus & vulgo Palma Christi,
à figura foliorum, quæ palmam digitis expansis emulantur, Mauritanis Cerva. Dioscoridi arbutula est ut
parva ficus, habens folia Platani, at majora, leviora ac nigriora, ramis radicibusq; cavis harundinis modo: se-
men in uvis aspersis. At Plinio l. 15. c. 7. Cici arbor in Aegypto copiosa, & in Hispania repente provenit, altitudine
oleæ, caule serulaceo, folio vitium, semine utarum gravidum, &c, meminit & l. 16. c. 22.

I. Rici-

I. Ricinus vulgaris.

Granum regium majus, Mesuæo.

Ricinus, Trag. Matth. Fuch. Dod. ut. Ang. Cord. in Diosc. & hist. Gesn. hort. Lac. Lon. Adv. Lob. (Gallis Palma Christi) Cæs. Cast. Lugd. Tab. Cici, Gesn. hort.

Kikaion S. Jonæ: Alkaroa & Kerua Arabibus:

Mira sole Italis, Guiland. epist.

Ricinus vulgaris, Cam.

Phaselus Romanus Thufcis, Mar. Virgilio.

Ricinus, Kerua Tripoli, Rauvvolf.

Cerva aut Cataputia major, Frag.

Ricinus major, Eystet.

Folij s. Iudit: quare Theop. i. hist. 16. Crotonis folia initio cum proveniunt, rotunda sunt, deinde in angulos formantur tamquam perfectè articulata. Ratione loci magnitudine variat: nam hominis crassitudine in Hispania Clus. & magnas arbores in Creta, Bellon. vidit, ut scalis admotis conscendi debeant: ex quo apud Hispanos oleum conficiunt, quod oleum ficus infernalis nominant Monar. & Fragofo monentib.

Fit etiam in horto Eystetenli mentio Ricini minoris, qui omni ex parte prædicto magnitudine cedit.

II. Ricinus vulgaris minor.

Ricinus minor, Eystet.

III. Ricinus Americ. major semine nigro.

Ricinus Americus, Curcas incolis, Clus. notis ad Monard. Lugd. Tab.

Ricinus Syriacus, Cam.

IV. Ricinus Americanus minor.

Eravay: Ricini pusillum genus, Clus. exot. l. 2. cap. 21. &

Ricini femina exigua l. 2. c. 25. sub fructu nono.

V. Ricinus Americanus folio Staphysagriae.

Ricinus Americanus folio ficus Ponæ.

VI. Ricinus Americanus falso creditus. Dende Serapionis, & Abelmoluch Mauritano- rum, Imperato.

Serapioni species tres sunt, Seni, Sahati & Indi: at Imperator legit, Chinense, Indianum & Sahatense, quod minus probatur.

VII. Ricino affinis fructus.

Exoticus fructus quartus, Clus. ex. l. 2. c. 24.

VIII. Curcas Malavarensium: Carpata, Cambayensium, Garziae: fructus est magnitudine Avellanæ cum suo putamine, candidus, gustu quali sunt tubera cocta: forte Habilcul Serapioni.

SECTIO SEXTA.

Pomiferæ Arbores.

MALUS; MALUS CYDONIA; CITRIA; LIMONIA; ARANTIA; PUNICA; PYRUS; PERSICA; PERSEA; AMYGDALUS; ARMENIACA;

Prunus; Myrobalani; Sebesten; Jujubæ; Cornus; Lotus; Guajacum; Ebenus; Cerasus; Chamæcerasus; Styra; Aria & Hamomilis; Cotonaster & Chamæmespilus.

POMUS SIVE MALUM.

Et si Pomi nomen apud Latinos latius pateat, quam μάλον apud Græcos: attamen usus obtinuit, ut Pomum pro Malo arbore, & Pomum pro Mali fructu capiat: ut quævis Plin. l. 15. c. 17. etiam ipsam arborem Pomum appellavit. At Græcis si nullum Adjectivum addatur. Malus μάλεα, & Malum μάλον nominatur: derivatur autem μάλον, à verbo μάλω, quod idem atq; ποτίζω, sive curo sollicitusq; sum, denotat: quia de ipsis præci mortales multum solliciti fuerunt cura, seduloq; studio digna judicant: & id forte propter insignem usum alimentarium cibariumq;. Pomum autem, cujus primus inventor Dionysius ab Athenæa statuitur, sorte sic dictum quod eorum plurima etiam strim tollant, ita ut simul sint cibo & potui.

Genera malorum Diosc. sunt l. 1. c. 159. & seq. vulgaris, cotonea, persica, armeniaca, medica sive citria, quæ Adjectivo addito distinguuntur. At vulgaris eidem sunt, verna, melimela, epirotica, sylvestria. Sic Theop. 6. c. 15. 24. sunt tam sylvestria quam urbana: & 4. hist. 16. sunt verna, ex omnibus infirmissima: 1. hist. 19. & 4. hist. 14. malus punica: & 4. hist. 4. malus persica & malus medica. Et Plin. l. 15. c. 14. multa genera enumerat, citria, Zizipha, tuberes, & quæ lanata vocantur: in summa genera 29 recenset. Mala, inquit, habent originem à Martio, Cestioq; & Manlio: item Claudio: quin & Cotonæo, infra ab Appio, Appiana cognominata, ideo his cotoneorum

neorum magnitudo quæ Claudianis: sunt & Sceptiana ab inventore Libertino. Cato adjicit Quiriana, & quæ tradit in dolis condi, Scantiana: sunt parva gratissimi saporis, quæ Petisia nominantur: patrias nobilitavere Camerina & Grecula. Cetera è causis traxere nomen: germanitatis coherentia & Gemella, nunquam singula in feru, coloris Serica, cognationis Melapia (quod malorum & pyrorum quandam speciem habeant.) Muslea à celeritate mitescendi: quæ nunc Melimela dicuntur à sapore melleo. Orbiculata, à figura orbis in rotunditatem circumacti, quæ Græci epivrotica vocant: Mammæarum effigie Orthomastica: à conditione castrati seminis, quæ Spadonia appellant Belgæ. Melosolijs folium unum, aliquando & geminum erumpit è latere medio. Celerrimè in rugas marcescunt Pannucea: stolidè tument Pulmonea: Sunt quibus sanguineus est color, origine ex Mori insitu tracta. Sunt & parva gratia saporis atq; etiam acutiora odore, sylvestria. Datis fermè vilissimè nomen, quanquam primis adventu, decerpit, properantibus: hæc Plin. & Colum. l. 5. c. 10. de malorum generibus egit: sic & Ruell. l. 1. c. 96. & ex eo Lugd. hist. hii Plinij diversas species Gallis familiares adjicit. Nam singula regiones plurimas malorum differentias habent: sic Valerius Cordus in sua historia, supra triginta genera recenset: Tabernemontanus viginti tres figuras habet: & Joh. Bauhinus frater, in suo de balneo Bollenfi l. 60. genera cum suis figuris & descriptionibus exhibet. Nostri, imprimis magnificiunt ea quæ Grumichey id est, Prasomila (quæ duplicia, nobiliora & vulgaria) nominantur, quæ colore sunt in viridi pallido, figura oblonga, sapore ex dulci & acido mixto, quæ serius cruda comeduntur, quare per totam hyemem durant, egris asservantur, in cibis & medicamentis commendantur, quæ fortè Malacria Ruellij & Lugd. Secundum locum tribuunt illis, quæ Curtipendule vulgo Gallis dicuntur, & apud ipsos principatum obtinent, (quæ hodie primæ commendationis, ad nobilem Alkermes consecutionem, Ad.) Sic in Hetruria præstantissima quæ Appiole & Milerose vulgò appellantur, Matthiæ notante. Et Scaligero, ut ex eo Gesn. lib. de hortis, Mala apiola Italij dicta, quæ dulcia quidem, sed tam jucundè fragrant, ut universas Indias suavitare superent. Sed subsisto, quis enim posset in tanta Malorum varietate, nominumq; pro cujuslibet regionis & rustici placitò, diversitate, & cum quotidie novo inscriptionis ingenio, velut nova prodeant, sine errore ea recensere? nec etiam opus est, cum arbores valde similes sint: licet fructus variet, siquidem poma magna sint & exigua: rotunda oblonga: candida, viridia, lutea: quædam rubedinis aliquid, alia multum habeant, & quædam foris tantum, alia & intus, & quidem vel rubris tantum notis, vel lineis oblongis aspersis: sapore quos, alijs acido, aquoso, austero: alijs dulci: alijs indolci subacido, vel vinoso: alijs inter dulcem & acescentem medio. Sunt deniq; præcocia, media, serotina. Sic malorum quædam genera, ramis & brachijs suis in latitudinem diduci solent, ita ut recti cujusdam speciem, pedamentis in orbem digestis, sustentata, præ se ferant: peculiaria tamen videntur sequentia.

I. Malus pumila, quæ potius frutex quàm arbor.

Malus præcocia, Trag. Tab.

Malus humilis, cujus fructus pomum Adami, Gesn. hort.

Hæc duplicia rubentia & candida.

II. Malus exigua pallidis floribus.

Malus arbor cujus fructus poma nana, Camer.

III. Malus sine semine interius in fructu, Camer.

IV. Malus non florens, fructificans tamen, Gesn. hor. ap.

V. Malus folio pyri.

VI. Malus flore pleno.

Poma flore multiplici seu pleniflora, Eyst.

VII. Mala sylvestria, quæ & alba & rubra: majora & minora.

Mala sylv. rubentia, Tab.

Mala sylv. rubens, Ger.

Malus sylv. major albus, Tab.

Malus sylv. alba, Ger.

Malus sylv. minor, Tab. Ger.

Arbores pomifera exotica.

I. Malus Maluccensis nonnihil spinosa.

Mala Indica, Acoftæ, Lugd.

Ber, Bor, Garziæ, Frag.

In hujus ramis formicæ alatæ Laccam conficiunt.

II. Mala Goënsia fructu octangularem pomi vulgaris magnitudine.

Carambolas, Garz. Frag. Acoftæ, Lugd. Linfc.

4. par. Ind. Or. 10.

Carambolas, Camarix, Carabelli, Chamarocho,

Bolunbac, Palud. in Linfcot.

III. Mala Guianensia.

Pinas, quæ totius mundi poma superat, necul-

libi meliora, quàm in Gujana, par. 8. Ind. Occid.

IV. Mala Americana pyri specie.

Pomi peculiare genus in Micaragua, nulli alteri

Indiæ parti concessa, par. 5. Ind. Occid. c. 16.

Pomum Nicaragua Bentzoni, Lugd. Clu. exot.

lib. 2. cag. 28.

V. Pomo similis Brasiliiana,

III

Geni-

Genipat Theveto, Lugd. Lerio.

an Xagua, Oviedo.

Juni Pappaeyma, Lerio 3. part. Ind. Occ. 37. Clus. ex. l. r. c. 11.

Duplex est, alia fructu majore & eduli; alia fructu minore non eduli, & hujus fructus succo totum corpus inficiunt.

Theveto, Lerio.

VI. Fructus prædicto affinis.

Fructus Brasiliensis 1. & 2. Clus. exot. l. 2. c. 7.

VII. Pomo similis fructu Castaneæ asperiore.

Duriae fructus tribus involucris donatus, in Java 4. part.

Ind. Orient. c. 6.

VIII. Arbor pomifera fructu aculeato melonis magnitudine.

Baran arbor, cujus fructus Duryaen, flos Buæ dicitur, Palud. in Linscot.

Darion, Costino, Scalig. Lugd.

Doriones, Garz. Frag.

Duriones, Acosta, Lugd.

Jaca major, Cast.

Guanabanus, Oviedo, Clus. in Garz. & Lugd. qui fructum pingit.

Guanabanus Oviedi huic fructui valde similis Frag.

Duryaen ex Malacca, Linsc. par. 4. Ind. Or. c. 13. fig. 12.

Fructus cui suavitatis in toto orbe similis non reperitur, tantum in Malacca proveniens.

IX. Anon, Oviedo, Clus. in Garz. magnam cum Guanabano similitudinem habens.

X. Abavo arbor radice tuberosa.

Baobab, Alpino.

Abavo, Honor. Belli ep. 4. & 5. ad Clus.

Baobab five Abavi, Clus. exot. l. 2. c. 1.

Fructus Æthiopius melonis magnitudine, brevi lanugine oblitus: folijs nunc singularibus, nunc binis, vel ternis, serratis, uni petiolo adhaerentibus: modo non serratis, etiam binis aut ternis, aliquando quinis uno pediculo donatis: quæ ex Creta ab Honorio Belli accepimus.

Anidem cum

Guanabano Scaligeri, Clus. in Garz. Lob. Lugd.

Fructus quidam ex Guinea, Guanabanus forte Scaligeri, Geln. hort.

XI. Arbor Chingensis fructu Angurix magnitudine.

Brusathæ, Scalig. Pigafetta & Lugd.

XII. Arbor fructu melonis forma pugni magnitudine.

Pepajos in India Hispanica, Linsc. 4. part. Ind. Or. 10.

Arbor folijs magnis latisq; quæ sterilis, nisi arbor arbori socia quasi matrimonio jungatur.

XIII. Arbor Indica fructu Cucurbitæ forma & sapore.

Higuero Oviedo, Clus. in Garz. & ex. l. 2. c. 2. Lugd.

Fructus Higuero apud Clusium, Lob. Lugd. qui fructum & folium pinxit.

Higuero forte, Taber.

Hujus feminibus Cambales flum trajiciunt, erubibus aligant, & pro tintinabulis utuntur.

XIV. Arbor America folijs pomifera fructu triangulo.

Ahovay Theveti, Clus. in Garz. Lob. Tab. Lugd. qui arborum & fructum separatim pinxit.

Aovai lignum terribili odoris, cujus nucleus præsentaneum venenum, ex quo crepitacula Brasiliensi faciunt, Lerio 3.

part. Ind. Occid. c. 12.

XV. Fructus capitis magnitudine.

Locos fructus in Insula Magador. in arbore, ramis & folijs carente, cacumine, putamine fibroso, nucleo amygdalino.

part. 3. Ind. Occident.

XVI. Fructus Indicus tinctoribus expetitus.

Brindones, Garz. Frag.

Brindoy, Linsc. 4. part. Ind. Or. c. 10.

Ex cortice acetum conficiunt.

XVII. Arbuscula mali similitudine, lacteum succum fundens.

Pipinichi, Monardi, Cast. Lugd. Frag.

Ex ramis incis laeteus humor emanat, cujus tres vel quatuor guttæ potentissimè purgant.

MALUS CYDONIA.

Malus Cydonia, Græcis πυδία, πυδωνία, à Cydone Creta oppido, unde primum advecta, Plinio l. 15. c. 11. dicitur. Cotoneum malum primum Cato, dein Plinius nominavit. Fructus πυδωνίας, Latine malum cydonium & cotoneum: officini citonium.

Duum generum Diosc. & Galeno: vera ac germana (ait Dioscorid.) qualia parva & rotunda sunt: alia æstiva Struthia & magna, quæ minus utilia censentur: Theoph. 2. hist. 3. in γηγενίς πυδωνίω, ex Struthio cotonea degenerat: & Galen 6. tuend. san. quedam dulciora, majora ac minus acerba, quæ in Asia Struthia vocantur: at 2. alim. Cydonia à Struthijs, quæ etiam Struthiomela nominat, aperte distinguit, Cydoniorumq; succum minus esse suavem, & maxime adstringentem. Columell. l. 5. c. 10. tria genera facit, Struthia, Chrysomela, Mustea, Plin. l. c. plura ejus genera chrysomela incisuris distincta, colore ad aurum inclinata: quæ candidiora nostraria cognominata, odoris præstantissimi: est & Neapolitanis suis honor: minor (forte majora legendum) ex eodem genere Struthia, odoratius vibrant, serotino proventu, præcoci verd Mustea. Struthis autem Cotonea insita, suum genus fecere Mulvianum, quæ sola ex his vel cruda manduntur. Sunt præterea parva sylvestria & Struthis odoratissima, in sepib. nascentia. Gallis quoq; & Italia tria genera sunt, & minora Mala, majora Pyra cotonea vocant. Sic Persica arbore in malum Cydoniam insita, Cydonium malum enasci, scribit ex Monardi Gesbor.

I. Mala cotonea minora.
Malus cotonea, Brunf. Trag. Matth. Ang. (cui & Matthiolo triplex fructus) Fuch. Tur. Cast.
Malus cydonia, Gef. hor. Lac. Lon. Ad. Tab. Cam. cui fructus varij generis.
Cotoneus, Cord. hist. & fructus Mala cotonea minora five Struthia.
Cotonea & cydonia mala, Lob.

Mala rotunda minora, nonnullis γηγενίω ab exterioris cutis colore, Dod.
Poma cotonea in Insula Picco. Ind. Occid. par. 9. addit.
Ex his Genuenses suum delicatissimū Cydoniatum parant:
II. Mala cotonea majora.
Mala cotonea majora, Cord. hist. γηγενίω dici, in Dioscorid. monet, & majora malis similia, minora verò, pyri modo turbinata, asserit.

Coto-

Cotonea magna & Pyra cotonea, Gesn. hort.
Mala cotonea oblongiora & majora, Dod.
Pyra cotonea, Cæs. Pyrum cydonium, Ger.
Cotonea majora five Struthia, Cam. ep.
Struthia & Pyra cotonea, Cast.

III. Mala cotonea media.

Mala cotonea milviana five notha, quia proveniunt ex
Cotoneis quæ Struthis, vel e contra insita fuere, Matthiol.
Cast. Lugd.

Cydonia milviana, Tab.

Majores sunt primis: at secundis minores.

IV. Malus cotonea sylvestris: & Cord. in Diosc. & hist.

Hæc sativæ per omnia similis, ramis minoribus & fructu
minore, quod sponte sua in Danubij petrosi ripis in

colibus proveniat.

V. Cydonia exotica.

Cydonia e Bengala, Garz.

Serifolia, Fragol.

Marmelos de Bengala, Cast.

Mala cotonea five Mermelasta ex quo fructus, quem Capo-
tes five Chicocapotes nominant, par. 9. Ind. occ. l. 4. c. 15.
Chicocapotes eadem ferè cum Capotes facie in nova
Hispania, Idem.

Fructu est cotoneo simili, folijs verò persicæ.

VI. Arbor Indica cydonij facie fructu melonis effigie.

Melo corcopali, Scalig.

Arbor cydonizæ magnitudine & folijs, cujus fructus Corco-
pal, Theveto & Lugd.

MALUS CITRIA.

Malus Citria, Græcis *μυρτὰ μανθὺν* malus Medica & Assyria dicitur, utroque nomine à regionibus ducto,
ut habet Theoph. 4. hist. 4. Etenim Citrus apud Medos & Persas in primis frequens: dein Palady dili-
gentia in Italiam translata fuit: postea in Hispania in usum devenit, ut nemora & campos occupavit: fructus
μῆλα μανθὺν ἢ περὶ πῶμα, addit Dioscorides l. 1. c. 166. *ἢ νεδέσθοντα*. Latinis citria, citrea & citromela. Folium
habet (Theoph.) simile & penè aequale Adrachne (Portulaca Gaza) aculeos quales pyrus, aut spina acuta, sed
tenues & vehementer acutos & validos, Et Plinio lib. 12. cap. 3. Malus assyria quam alij vocant Medicam,
folium ejus est Unedonis intercurrentibus spinis: Pomum ipsum (idem & Theoph.) alias non manditur, &c.
Malum (Dioscoridi) oblongum est, rugosum, aureo colore, cum gravitate odoratum: semen habet pyri. Sanè
his pomis olim non vesciebantur, sed propter odorem tantum & medicamenta erant in usu, arbore nimirum
adhuc inculta, peramaros & acetosos fructus ferente.

I. Malus medica.

Citrum, Brunf. Citria, Trag.

Citrangula, Monardi.

Citrus, Ang. Tab. Cæs. Ind. orient. part. 9. lib. 4.

cap. 31. arbor, Cord. hist.

Malus medica, Matth. Tur. Lac. Cord. hist. Dod.

Lob. seu Citria, Eyst.

Malus citria, Dod. gal. Gesn. hor. Lugd. Lon. Cast.

Clus. hist. Cam. & Ind. occid. p. 3. & Ind. or. p. 3.

Citria & Mala Medica, Bellon.

Citrones, Rauvvolf.

Mala citrina & poma citria, Ind. occid. p. 8.

Cedrus Theophr. at Diosc. Medica malus, five

Cidromela, Adv.

Fructus magnitudine variant: quædam in
molem excrescunt Melopeponibus parem, ita
ut ad pondus librarum decem quandoq; perve-
niant, ut Cardanus & Gesnerus notant, quæ
nullo ferè succo sunt, & ex Liguria & Adriatici
maris insulis adferuntur: alia minora: alia Li-
monum magnitudine, aut paulo majora, & à
laci Benaco asportantur, quæ potissimum in ci-
bis expetuntur, & Pomcires, quasi Poma citri
vocari, Lugd. asserit: sic alia prælonga, alia ro-
tundiora. Etenim hominum industria, transla-
tione, insitione omni deniq; cultus mangonio,
Citria in plures formas digessit, ut remissiore

sapore & vehementiore: item dilutior, satura-
tiorq; colore differant, non multum tamen na-
turæ & viribus, veluti Limonia, Arantia, atq; ea
quæ Poma Adami vulgo nominantur. Quare
Monardes lib. de Arantijs scribit, Citriorum
genera multiplicia fuisse insitione: ita ut repe-
riantur tot genera Limonum & alia, quæ nec
Citro, nec Limonibus conveniant: quemad-
modum Zamboas Torongas, Limas, Limon-
es, quæ omnia nec prisce cognoverunt.

Sic citrum monstrosum maximum, calceum
Turcicum referentem, in horto Stutgardiano
natum, J. Bauhinus in suo l. de thermis pingit.

II. Malus medica maxima pulpa plurima.

Ponzires, Cæs. qui à citrijs melopeponis ma-
gnitudine distinguit, & Ponzires inter Limo-
nem & Arantium ambigere scribit.

Hæc gustui non ita placent, sed quia pulpæ
multò plus habent, officinis expetuntur, sac-
charo vel melle asservanda.

III. Malus medica fructu ingenti tuberoso.

Melangua quæ alijs Citrangula, Cæs.

Citrij mali genus quoddam in Provincia, hu-
mani capitis magnitudine, Cam.

Citranguli nomine volūt Monachi in Mestuen-
c. de oleo è pomis Citranguli, non solum Citria,
sed etiam Arantia & Limonia intelligenda esse

III 2

IV. Ma

IV. Malus medica ab Imperatore Carolo V. ex Ungaria in Hispaniam delata, quæ omnium mali Medici generum acidorum suavissimum, ut Clusius in sua hist. refert.

V. Malo Medicæ affinis Javanensis folio rotundiore. Samaca fructus citri magnitudine, acidus, fuculentus, granis nigricantibus, Linscot. part. 4. Ind. or. & fig. 14.

Malus Limonia.

I. Malus Limonia acida.

Malus limonia, Matth. Dod. Lon. Lugd. Cast. Tab. & Ind. occid. par. 3. & orient. par. 3. Limones, Dod. gal. Cord. in Diosc. Bellon. Rauvvolff. Tur. Adv. Lob. Cæs. Clus. hist. & Ind. occ. par. 9. l. 4. c. 31.

Limon arbor ex citrij genere, Cord. hist.

Tum facie, tum facultate Citria referunt: cujus plures differentiæ, quædam oblongiores, asperiores, cortice crassiore, Cucumeris aut Melonis effigie, & Limæ Adversar. dicuntur: alij cortice læviore tenuiore, succo acidior. Cordo quadruplex genus, 1. anserini ovi forma & magnitudine: 2. minus, globosum, utroque capite veluti umbilico insigne: 3. ovi gallinarum figu-

ra & quantitate: 4. tertio æquale, globosum superficie æquale.

II. Malus Limonia major dulcis.

Limones dulces, Cæs.

Limones dulces oblongis Limis similes, Clus. hist.

III. Malus Limonia minor dulcis.

Limones pusilli dulcissimi in Zeilan, Scaliger, Lugd.

an Limonis genus in Hispania, vix nucis amplitudine, Cæs.

IV. Malus Limonia folio serrato, fructu oblongo cortice tenuissimo.

Limas primum genus, Clus. hist.

V. Malus Limonia fructu rotundo orbiculato.

Limas alterum genus, Clus. hist.

VI. Limones prægnantes alium fructum

minorem in se continentes, Clus. hist.

VII. Limones variarum figurarum: toti ferè

carnei, Clus. hist.

VIII. Limones citrij mali grandioris magnitudinem æquantes, Clus. hist.

IX. Limonum syl. in Syria provenientium, Scalig. & Lugd. meminere,

Limones sylvestres non majores ovo columbino, circa Cairum, Bellon.

MALUS ARANTIA.

Aurantia, fortè à corticis colore, qui colore auri relucet, ut Aurea mala verè nominari possint: sive ab Arantia oppido dicta: veteribus ignota, insitione ad nos devenerunt. Citrus enim arbor, in Aurantio inserta, ad magnam proceritatem pervenit: Arantius verò in Citro, tam humilis, ut Aurantius unius cubiti magnitudinem non excedat.

I. Malus Arantia major.

Pomum Arantium, Trag. Eyst. sive Nerantium, Rauvvolff.

Aurantia mala, Matth. Lac. Cæs. Lon. Castor. Lugd. Tab. Cam.

Aurea & Aurantia mala, Bellon. & Ind. or. par. 1. Aureum malum, Ges. h. Dod. gal. (cui & malum hespericum) Clus. hist. & Ind. occid. p. 3. & p. 8.

Arangia, Cord. in Diosc.

Arangius sive Citrius arbor, Cord. hist.

Arantia, Tur. Lob.

Malus anarantia, Dod.

Aurantia: nonnullis in locis Indiæ integræ sylvæ sunt arborum aurantia ferentium: in part. 9. Ind. or. l. 4. c. 31.

Genera plura sunt ab insitione prodeuntia: hinc pleraque cortice amaro, crasso, aureo: alia

subvirente: alia cortice tenuissimo, subrubente, medulla dulci: aliqua & cortice dulci: aliqua in uno pomo duo genera botrorum habent: alia absque semine sunt. Sic & pulpæ sapore differunt, cum alijs acida, alijs dulcis, alijs vinosa, sive media sit.

Sic in regno Congiano habentur, quæ nec dulcia, nec nimis acra: & in insula Fayel, suavissima & sapidissima: par. 3. Ind. orient. c. 7. & in China poma aurea, quæ dulcedine saccharum vincunt, par. 2. Ind. or. c. 25.

Ex floribus aqua elicetur, quam Lansam vocant.

II. Malus Arantia humilis.

Aurea malus pumilio, Clus. hist.

Poma Aurantia Nana dicta, Eyst.

III. Malus Arantia cortice dulci eduli.

Arantia

Arantia in Indiæ insula Zeilan, cortice dulci & suavi, Scalig. & Lugd.

Aurea malus eduli cortice, Clus. hist.

IV. Malus Arantia unico grano.

Aurea malus *αυραία*, Clus. hist.

Malo Arantio similes exotice.

I. Malo Arantio parvis fructibus similis.

Aracinappil Indorum.

II. Arbor peregrina Aurantio simili fructu, Clus. exor. l. i. c. 13.

E Nigritarum regione delata, pulpa fungosa, nonnullis granis ut in ficulneis permixtis.

III. Coru folijs mali aureæ, flore luteo, Acoftæ: at Garzias & Fragofus, & Castor. folia mali persicæ, flores candidos tribuunt, uterque radicis cortices ad ventris profluvia commendat: Lusitanis Herba Maluarna, Castori.

IV. Carcapuli, Acoftæ, Lugd. append. Cast. fructu malo aureo æmulo.

Carcapuli, Linsc. 4. part. Ind. orient. cui fructus cerasi magnitudine: & fig. 17. iconem exhibet.

V. Guyabo pomifera Indica.

Guyabo arbor, at fructus Guyaba dicitur Oviedo.

Guajava, Scalig. Lugd. Clus. hist. app. 1.

Guayavas, Monardi, Lugd. app. Frag.

Guayavos, Gomaræ, & part. 4. Ind. occid. c. 28.

Alia sativa, alia sylvestris: sic alia pomis longiusculis aut rotundis, luteis aut viridibus: pulpa alijs rubra alijs candida.

Malus Adami.

Adami pomum vulgo dicitur, quia cortex rimis quibusdam exasperatur, ac si dentibus demorsus esset, quare pomum, quod Adamus in Paradiso degustavit, esse existimant.

Pomum Adami, Matth. Cord. in Diosc. Bellon. (qui à Citrijs sive Poncires distinguit) Rauv. Cast. Lugd.

Citrius altera, Cord. hist.

Malus Assyria, Dod. Tab.

Pomum Assyrium, Adv. Lob.

Poma Adami quæ Gallis Poncires, Clus. hist.

A Limonibus natura & viribus non multum differt, folijs Limonij, floribus Citrij fructu Arantij, sed duplo triplôve majore.

MALUS PUNICA.

Malus punica, Græcis *πόια*, Dioscoridi l. i. c. 151. & Theoph. *πόια*, quo nomine & fructus donatur. Hippocrates l. de nat. mulieb. *πόια* appellat. Plinio l. 13. c. 19. Africa circa Carthaginem punicam malum cognomine sibi vendicat, aliqui Granatum appellant. Communiter malum granatum, ab interiorum granorum multitudine: alijs à Granata Hispania regione, quod in ea copiose proveniat. Hanc Theoph. l. i. hist. 3. sic descripsit: radicem habet brevem & per summa terra adhaerentem: l. i. hist. 5. caudices multos: l. i. hist. 8. sed contortiores & breves: l. i. hist. 14. verum in ramos spargitur & molem superiorem, grandioverq; gestat: l. i. hist. 6. folia angusta sunt: l. i. hist. 17. fructus ex humore & cute constat: l. i. hist. 18. & acinos habet: l. i. hist. 22. verum super fructum ipsum florem insidentem emittit: l. i. hist. 23. & ex annotinis fructus gignit & c.

Genera: Dioscorides dulcia, acida & vinosa recenset: & Theoph. l. i. hist. 19. succus acidus est: & 2. hist. 3. & 4. in Aegypto acidam in dulcem quodammodo, aut vinolentam converti: in Cilicia omnes sine nucleo surgunt, neglecta vero in sylvestrem transit: l. i. caus. 15. nonnunquam etiam fructum secundum ostendit: 5. caus. 16. & punicea dulces magis putrescunt quam acida, & c. Plinius l. c. divisit in genera, Apyrinon vocando, cui lignosus nucleus adest: sed candidior ei natura & blandiores sunt acini, minusq; amaris distincti membranæ: alia structura eorum, ut in favis. Communium & nucleos habentium quinque species, dulcia, acida, mista, acida, vinosa. Samia & Aegyptia distinguuntur ex ythrococcis & leucococcis: vide & l. 23. c. 6. Verum cum plures partes hujus in usum medicum veniant, nominibus distinctæ, de his paucis.

Flores sativa punicea *νύκτοι* dicuntur Diosc. l. i. c. 152. & Gal. 6. simpl. at Gal. 6. nat. & *τόσσας*, Cyrtinus fructus rudimentum est, quod decido flore primum apparet & formatur: quæ Celsus, mali punici capitula vocat: & Plinio l. 23. c. 6. primus pomi hujus partus florere incipiens, Cyrtinus vocatur Græcis: & in hoc ipso Cyrtino flosculi sunt, antequam scilicet malum ipsum prodeat, erumpentes, quos Balaustia vocari diximus. Verum *βαλυστία*, sylvestris punicea flos est Dioscoridi l. i. c. 154. cujus complura sint genera, candidum, rutilum & colore rosaceo: & ex Cyrtino ac Balaustijs, velut ex Hypocistide succus ad eadem efficax elicitur. At officina citra distinctionem Balaustia nominant, quibus Cyrtinorum appellatio de sativis ignota est.

Mali punici putamen, quod tanquam corium sit, cortice durius, nucis involucrio tenerius, Malicorium vocant, quod Græcis nunc *οἰσός* Diosc. lib. 1. cap. 153. monente, nunc *τὸ τῶν ποικίλων ἀμυγδαλῶν τῶν λευκῶν* dicitur.

lii 3

Marcellus

Marcellus medicus, caliculos punici vocat. Plinio l. c. vulgus ex punice acerbis coria perficere novit, ob id Malicorium appellant Medici: Officinis, Psidion.

I. Malus punica sativa.

Malus punica, Trag. Matth. Dod. ut: Cord. hist. Geslor. Tur. Lon. Lugd. Cam. fl. simplici, Eyst. Mala punica seu granata, Cord. in Dios. Bellon. Malum punicum, Adv. Lac. Lob. Cast. Malus granata, Rauvvolff. Tab. Punica quæ malum granatum fert, Cæs. Poma sive malus punica, Ind. occid. par. 8.

Differunt potissimum in succo, alijs acidus, alijs dulcis, alijs mixtus, medio quasi sapore, quem vinosum vocant: & quæ medij saporis, Arabes Muza, voce *μυζα* corrupta, appellant. Mala punica majora in regno Congiano habentur.

II. Malus punica sylvestris.

Punica sylvestris, Cord. hist. Rauvvolff. Pomum granatum sylv. cujus flores Balaustia, Anguil.

Sativa per omnia similis, sed spinis horri-

dior in Syria circa Alepum, Africa & Hispaniæ regno Granatæ.

III. Balaustia flore pleno majore.

Malus granata sylv. flore pleno, Rauvvolff. Balaustium, Lob. belg. Tab. Eyst. Balaustium orientale, Cast.

Punica flore adeo multiplici folio, ut Rosæ videantur centifoliæ, colore saturato.

IV. Balaustia flore pleno minore.

Balaustium flore minore Romanum, Eyst. Folijs atrovirentibus, calice crassiore, flore minore, tristiore, saturata purpura punicante à priore differt.

V. Malus punica fructu maximo, granis aureis. Malus aurea, Dod. qui Palam Arienam Plinij suspicatur, quæ tamen potius Musa est, quæ nullo est intus nucleo vel semine. Illa verò grana Mali punici majora obtinet. Quid sit ignoro.

P Y R U S.

Pyrus, Græcis *πυρ*, & de arbore & de fructu, sed propriè de sativa dicitur: nam *πυρ* agrestis est (Pyrastrum Gaza reddit) Diosc. l. i. c. 167. & 168. & Theoph. pluribus locis: quæ tamen differentia non semper observatur. *Πυρ* autem dicitur Eustachio, quasi non habens *πύρρα* pinguedinem: alij ab Apia regione deducunt, quod ex ea primum hæc arbor allata fuerit. Sic Pyra multis à fructus figura, quod ad pyramidis similitudinem à lato in acutum spectet, & in mucronem turbinetur: & quemadmodum Mala, brevi pediculo annectuntur: sic Pyra longo pediculo pendent. Est autem Pyrus Theoph. l. i. hist. 5. natura fructificosa: l. i. hist. 16. folijs orbiculatis: l. i. hist. 21. floribus foliatis: l. i. hist. 18. seminibus congestis, quæ aliquo putamine & tunica continentur: l. i. caus. 23. quæ omnia sæpe pulpis plenioribus includuntur, quo plus temporis perdurare valeant, &c.

Genera pyrorum multa sunt, Diosc. l. i. c. 177. addit Theoph. 4 h. 6. majorem in modum, bonæq. frugis, præterquam si quæ ferotina. Plinio l. c. 15. sunt Superba, parva sed ocyssima: cunctis autem Crustumina gratissima: proxima hys Palerna à potu, quoniam tanta vis succi abundat: lactea, à candore vocantur: alia colore nigro donavit Syria: reliquarum nomina aliter in alijs atq. alijs locis appellantur. Sed consensu urbis vocabulis auctores suos nobilitare Decimiana: Dolabelliana longissimi pediculi: Pompejana cognomine mammosa: Liceriana: Severiana & quæ ex his nata sunt Tyranniana, longitudine pediculi distantia, Favoniana rubra paulo superbis majora: Lateriana, Anitiana post Aurunalia acidulo sapore jucunda. Tiberiana, quæ maxime Tiberio principi placere. Patrie nomina habent serenissima omnium Amerina, Picentina, Numantina, Alexandrina, Numidiana, Græca & Achæde spinosa arbore: & in hys Tarentina, Siguina, quæ alij à colore Testacea appellant: sicut Onychina à colore gemmae onychis, purpura. Ab odore Myrapia, Laureana, Nardina: à tempore Hordearia, quæ cum hordeo maturescunt: à collo Ampullacea & Coriolana &c. Multo plura sunt hodie, imo infinita in tota Europa Pyrorum genera, quæ magnitudine, figura, oblonga, rotunda, orbiculata: odore: sapore, dulcia & succulentia, acida: sic alia sicca, alia pinguis: colore, & tempore quo maturescunt, alia tempestiva, alia serò matura, alia subito pereunt, alia servari possunt, differunt: & à primis inventoriis, regionibus, alijsq. notis nomina invenere, quæ sigillatim explicari non possunt, cum qualibet regio sua habeat, & qualibet urbs peculiaria nomina hys tribuat. Apud Germanos enim quamplurima differentia occurrunt, ut videre est apud Tragum. Sic Val. Cordus quinquaginta, J. Bauhinus l. de balneo Bollenfi, supra quadraginta. Tabernamont. septendecim differentias proposuit. Nostri in primis magnificiunt ea quæ ab odore & sapore Moschatellina, quæ Superba Plinij videntur: dein quæ à forma ovi Ovata dicuntur: cum quæ Spectebiren/ id est, Lardina nominantur: tandem Regelsbiren/ sive Regalia (Regia & Regulana, Ges.) ex quorum succo Electuarium suavissimum paratur. Sic Galli sua habent, in primis Bonchristiana cognominata à Carol. Stephano & Lug. ut videre est apud Car. Stephanum, Rue juncum, & in historia Lugdunenfi, Itali sua, de quibus Matthiolus & Casalpini.

1. Pyrus

I. *Pyrus sativa*.

Pyrus, Brunf. Dod. ut: Cord. hist. Gef. hor. Lon. Cæs. Lugd.

Pyrus, Turn.

Pyrus, Mat. Ang. Cord. in Diof. Lac. Ad. Lob. Cast.

II. *Pyrophylla*, ad imitation. Plinij l. 15. c. 14.

Malorum genera recensens, Meliofolia nominat quibus folium unum aliquando geminum erumpit è latere medio.

Pyrus è quorum medio corpore folium exoritur, Dalech. in Plinium, Cam.

III. *Pyrus*, quæ comesta ventrem subducunt, Camerar.

IV. *Pyrus sylvestris*.

Pyra & *Pyra* dicitur: *Pyra* quidem à verbo *Pyra* strangulari, quod acerbitate sua propemodum stranguet: at tamen inter *Pyra* & *Pyra* sunt qui differentiam faciunt: Achradem pyri speciem quandam facientes ex Dioscoride (ut Cæs. Alp. & Lugd.) quæ spinis quidem agrestis modo, horrida sit, sed fructu pulcherimo & optimo.

Pyra verò, spinis armata, omnino sylv. fructu pusillo, nec eduli, aliquando mediocris altitudinis, sæpius humilis arbuscula. Quamvis *Pyra* Aristoteli 8. hist. 6. de pyro sylv. & *Pyra*, Homero etiam de pyro hortensi dicatur. Deducitur autem *Pyra*, ab *Pyra* privativo & *Pyra*, id est, usu: eo quod ejus fructus usus nondum esse coeperit inter alimenta humani corporis, nisi forte extrema fame urgente.

Pyra after Gazæ, *Pyra*, Theophr. 1. hist. 3.

Pyra sylvestris, Ang.

Pyra sylvestris major, Tab.

Pyra sylv. & pyra sylv. minima, Tab. Ger.

V. *Pyra sylv. Cretica*.

Pyra exigua à Cretensibus Achlades nominata, à nostris diversa: apud quos aliàs *pyra sylv. Agafuga* appellantur, Bellonio.

Pyro similes exotica.

I. *Pyro similis ex Guinea*.

Lata, fructus exotici Clus. ex. l. 2. c. 22.

II. *Pyro similis fructus in nova Hispania nucleo magno*.

Palto arbor cujus fructus benè maturus *pyrum majusculum* refert, qui maturus butyrum emulatur, in Insula S. Dominici: at in Peru grandiores sunt, cute duriuscula: in Mexico minores cuteteneriore, par. 9. Ind. Occid. l. 4. c. 24.

Melocotones seu *Pyra Indica* sunt Mameyen, Guayanen, & Platen, Idem.

III. *Pyro similis fructus alter in nova Hisp. Annona* five Guanavano pyri magnitudine, pulpa butyri modo, cui grana plurima nigricantia includuntur: Joseph. Acosta l. 4. c. 25.

Mangier blanco est Annona five Guanavana, p. 9. Ind. Occid. l. 4. c. 25.

IV. *Pyro similis fructus in Virginea*.

Metagufunaux, fructus pyriformis & magnitudine, impensè foris & intus rubens: part. 1. Ind. Occid.

V. Fructus in Insula S. Mariæ, *pyra* majora referens, intus muculentum: par. 3. Ind. Or. 10.

MALUS PERSICA.

Malus Persica: Græcis *Περσικὴ μήλον*: & *Persicus*, Palladio: & fructus *Persicum malum*, *Περσικὸν μήλον*, Diosc. l. 1. c. 164. At Theophr. 2. hist. 3. *Περσικόν* (*Persicum* Gazæ reddit) Aegypti sterile sit: 3. hist. 5. sed aliquando ibi & locis proximis fructificat: quanquā in Rhodo usq; florem dumtaxat devenit: sed distinguere oportet à *Persæa*, quemadmodum ex Theophr. 4. h. 2. colligere est: & Plin. l. 15. c. 13. apertissime distinguit: falsum est (quod Nicander & Sofrates prodidit) venenatam cum cruciatu in Persis gigni: id enim de *Persæa* diligentiores tradunt, quæ in totum alba est, myxus rubentibus similis, nec extra orientem nasci volunt, & c. semper autem solia habet & poma subnascentibus alijs. Et Rauvolfius commemorat, *Persis* etiam hodierna die *Persæam* à *Persico* arbore distinguere, quamvis etiam à *Persicorum* esu abstineant. Nimrodî veneficio infecta & noxia effecta opinantes, Plin. l. 15. c. 13. in totum quidem *Persica* peregrina etiam Asia Græciq; esse ex nomine ipso apparet, atq; ex Perside advecta: & mox: *Persica* arbores serò & cum difficultate transeunt, ut quæ in Rhodo nihil ferant, quod primum ab Aegypto earum fuerit hospitium: & l. 16. c. 28. *Persica* arbores in Rhodo florent tantum.

Genera: Plinio l. 15. c. 12. *Persicorum* palma duracini: nationum habent cognomen, Gallica & Asiatica. At *Persicorum* differentia plures sunt, quæ magnitudine (siquidem alia majora, alia minora sint) figura, quadam orbiculari, rimula quadam à latere, quadam in rotunditate oblonga, Cariot a cognominata: colore: sapore: dulcia, acida, vinosa, austera, amarinscula: maturationis tempore & ratione usus differunt. Sunt enim alia precocia, alia serotina: precocia, alia sapore mali Armeniaci, alia admodum dulci & suavi, Serotina alia majora, etiam pugni magnitudine, ut ungarica: alia minora: majora vel alba, vel flava, vel modico rubore aspersa.

aspera sunt, quæ Sole spectant, & intus in ossis contractu, vel buxea, & quidem pulpa candida, lutea rubea. Sic minora, vel rubra sunt, vel flava. Ratione ossis: sic in alijs integer & facile à carne recedit: in alijs à carne separari nequit, & quidem in aliquibus nucleis disruptus, in quibusdam per medium divisus reperitur. *Perfica Persiani Hel dicti, Rauvvolffius monet.*

I. *Perfica molli carna & vulgaris, vitidis & alba.* *Perfica cydoniaria, Tab.*

Perficus, Brunf.

(ba. *Perfica lutea, Ger.*

Perfica arbor & ejus primum genus, Trag.

V. *Perfica æstiva Armeniacis similia, sive*

Perfica, Fuch. Ang. Lac.

Perfica S. Johannis.

Perfica malus, Gef. hor. Ad. Lob. Lug. Tab. quæ alba, & Ger.

Perficæ quartum genus, Trag.

Malus Perfica, Dod. ut. Turn.

Perfica pumila, Cam.

Perfica viridia & alba, Matth. Cast.

Perfica præcocia, Tab. Perfica rubra, Ger.

Perficus alba & popularis, Lon.

an Perfica minima, Cord. hist.

Perficæ primum genus, Cæf. & vulgare, Lugd.

Saporem pene similem cum Armeniacis habent, sed ex eo genere non esse, nucleus scabert & striatus ostendit, &c.

II. *Perfica succo quasi sanguineo.*

VI. *Nuciperfica, quod nucum juglandium*

Perficæ tertium genus, Trag.

faciem repræsentet,

Perfica sanguineo succo madentia, Matth.

Nuciperfica, Matth. Lugd. Cast.

Perfica Ungarica sanguineo succo, Gef. hort.

Perfica nux, quæ Antiperfica Averrois, Ang.

Perfica in totum saturato colore rubentes, Dod.

Perfica præcocia, nuciperfica, Cæf.

Perfica Carota, Cast.

Hæc etiam nulla lanugine pubescunt, & colore & sapore *Perfica cotonea* referunt.

Perfica rubra, Lon. Tab. seu sanguinea, Cam. ep.

VII. *Perfica Amygdaloides.*

Perfica præcocia, Ger. ico.

Perfica amygdala, Matth. Lugd. Cast.

Hæc duæ species lanatæ sunt, carnem succo-

Amygdalus perfico insitus, Gef. hor.

sam & flaccidam habent, quæ communiter à

Amygdaloperficus, Cam.

nucleo tota recedit: & alia sunt magna, alia

Pulpa Perficum, nucleus Amygd. dulcem sapit.

parva: quædam prorsus viridia, quædam alba:

Perfica similes exotica.

quædam maculis rubris picta: alia carne alba fla-

I. *Perficæ affinis in Taprobana.*

vescente: alia rubra, ut sanguinolenta videatur:

Arbor Gehuph Indis Cobban, Thev. Lugd.

& hæc nucleo est alias foris rubente, alias nigro.

Fructu est rotundo, in quo nux Avellanæ par,

III. *Perfica dura, carne candida, aliquando*

nucleo amaro: gummi ex arbore utiliss. manat.

ex albo subrubente.

II. *Perficæ similis putamine villosa.*

Rhodacina, Ægin. Aëtio.

Mangas, Garz. Cast. Frag. Acoftæ, Linsc. par. 4.

Perfica duracina, Matth. Ang. Bellon. Gef. hort.

Ind. Orien. c. 7. fig. 14. item 5. & 8. par. Ind. Orien.

Lon. Cast. Cæf.

Rauvvolff. Manga, Scalig.

Perficorum tertium genus sive duracina, Lugd.

Manges, par. 7. Ind. Orient.

Duracina alba, Tab.

Exoticus fructus 4. Mangas, Clus. ex. l. 2. c. 16.

Duracina ob carnem duriores sic nominata,

an Mangenas fructus: par. 5. Ind. Orient.

quæ *Rhodacina* dicta, aut ob odoris suavitatem,

Fructus verò Ambo & Amba vocatur.

aut quod plerunq; rubro colore alterna sui par-

Genera ejus plura, aliquando ab una arbore

te niteant: aliquando pugni magnitudine, &

colore diverso prodeunt, subvirides, flavi, ex

fructu anguloso, circa os rubente, quod aliquan-

viridi rubentes: sine nucleo ejus generis repe-

do per medium divisum, aliquando in partes

riri Acofta scribit: biferæ meminit Garzias.

disruptum reperitur, & à nostris *Perfica moscha-*

III. *Mangus aliud genus.*

ta dicuntur: Horum ut sequentium caro dura

Mangas Recheadas sive Mangas in Achar, Lin-

& nucleo tenacissime adhæret: quæ aliquando

scot. 4. par. Ind. Orient. 7.

etiam intus saturatè rubet.

IV. *Mangas fructu venenato.*

IV. *Perfica dura carne buxea.*

Mangas sylv. aliud genus, Acoftæ, Lugd.

Perfica cotonea, Matth. Cast. Lugd.

Mangas bravos, Palud. in Linsc.

Perfica Ungarica colore aureo, Gef. hor.

V. *Perfici*

V. Perfici oficulo fructus Malacensis.

Jambos, Garz, Frag, Acoftæ, Lugd. Linsc. par. 4. Ind. Or. c. 9. fig. 13.

Jambeir arbor, fructus Jambos, Lusitanis; Jambali, Malabarenfibus, Acoftæ.

Jambos, Arabibus: Tupha, Indis: Perfis, Tuphat: Turris, Almat, Palud. in Linsc.

Duum generum: unus obscure rubet; alter ex candido rubescit, oficulo ut in Perfico, Garzæ: at Paludano, alterius fructus completè rubet & nucleo caret: alter levius purpurascit, & rosam spirat.

VI. Goan arbor & fructus, ex cujus cineri-

bus Tuthia Alexandrina conficitur, Garzæ.

VII. Guajanos in Hispania nova; fructus granis duris, minora poma æquantibus, prægnans: ac in Peru hujus arboris facies diversa, par. 9. Ind. Occid. c. 24.

Perficorum genera omnia in nova Hispania & Peru, ut Melocotones, Albercokia & si miles: exceptis Ducafnos, qui è Perficorum genere sunt, par. 9. Ind. Occid. c. 31. Sic in Angra perfi ca copiosissima esse, scribit Linsc. par. 3. Ind. Or. c. 6.

VIII. Matos ex classe Guayanorum & parvi albicantes Guaynavilli, naturæ firi gidiusculæ: Joseph. Acofta l. 4. c. 24.

P E R S E A.

Arbor Persea *περsea* Græcis, quæ à Persia diversa est, licet Theophrastus utramque, *περsea* nominet: at Gaza loco priori Persicam, altero Perseam transfudit. Dioscoridi l. 1. c. 187. *περsea* arbor est in Aegypto fructum ferens cibo idoneum, quem aliqui prodiderunt in Perside exitiosum esse, translatam verò in Aegyptum naturam mutata edulem fieri. Et Theophr. 4. hist. 2. est in Aegypto alia arbor Persea vocata, aspectu magna & pulchra, sed maxime similis pyro, & folijs, & floribus, & ramis, sed folio perpetuo, &c. fructus pyri magnitudine figura oblongus, Amygdali speciei, colore herbidas, intus nucem habet quemadmodum prunum, sed multo minorem & molliorem, carnem valde dulcem, &c. Galenus 2. *νατὰ τὸν οὖν*, fructus est pyri aut mali magnitudine, noxia in Perside, vesca in Aegypto.

Persea, Matth. Lonic. Rauvvolf. cui Sepha Persianis.

Persea America Matthioli, Lugd.

an eadem cum Persea Plinij & Plutarchi?

Persea, Clus. hisp. & hist. Lob. Cast.

Persea America Clusij, Lug. hic fructum Cucio-

phoræ adpingit, quod Clus. in hist. non probat. Persea Plinij, Cæs. qui dubitat an Anacardium ejus fructus sit.

Hujus folia à Doct. Jo. Anatolio Privæo, insigni apud Vesuntinos Medico & Botanico, unâ cum quibusdam bulbis anno 1622. accepimus.

A M Y G D A L U S.

Amygdalus, Græcis *ἀμυγδαλέα*, & per contractionem *ἀμυγδαλὴ* vocatur: fructus *ἀμυγδαλὴν ἀμυγδαλὴν*: Latine amygdala & amygdalum. Amygdalam ideo Græcis nominari Herodianus ait, *περὶ τὸ ἐν τῇ περσικῇ ἀμυγδαλῇ* *ἀμυγδαλὴν* *πολλὰς*, quod post viride putamen nucleos scarificatos ostendat & in rimulas dehiscat, quas τὰς ἀμυγδαλὰς vocant, At heneo lib. 2. teste. Antiqui, nucibus (ob osseum corticem) adnumerant, quas Cato Noces Græcas vocavit, & Plinius l. 15. c. 22. tertio loco recensuit. Amygdalus Theophr. 7. hist. 12. inter arbores potissimum, vel sola ante folia flores emittit, vel unâ cum folijs: 1. hist. 21. flores foliati sunt: 1. hist. 23. & fructum ex furculis annotinus habet: 1. hist. 18. & ei semen protinus post tegmen ambiens subest: sed non nudum, verum ligno obductum. Idem ostendit, quomodo diminutione ex amaris dulces efficiantur: 2. hist. 8. 1. caus. 21. 3. caus. 23. 5. caus. 24. & Plinius l. 17. c. 17. sic etiam neglecta, ex dulci amara redditur, 2. caus. 20. Et Plinio l. 16. c. 25. floret prima omnium amygdala, mense Januario: Martio verò pomum maturat. Sunt autem duplices, dulces & amaras, ut ex Dioscor. l. 1. c. 176. Theophr. & Plinio locis citatis colligitur: hæc salubriores, illa suaviores creduntur. Naxia amygdala, à Naxo Insula veteribus Græcis maxime commendabatur: secundas partes Cypria sibi vendicabat, quæ præter cæterorum morem repando cacumine prodit.

I. Amygdalus sativa.

Amygdalus, Brunf. Trag. Dod. ut. Cord. in Diosc. (cui & Nux Græca) Cefn. hort. Lon. Ad. Lugd.

Cam. Tab.

Amygdala, Matth. Ang. Tur. Lac. Bellon. Lob. Cæs. Cast. Eyfster.

Amygdala sativa, Rauvvolf.

Sunt majores & minores: laudatur majores, quæ lanugine carent, idcirco Pruno inferuntur.

Amygdalas minores, tam amaras quàm dulces, & quidem alijs triplo minores, adhuc putaminibus suis inclusas, ex Asia afferri, testatur Cord.

Kkk

in

in sua historia. Sic Gesner. meminit Amygdali-
nucis rotundas ferentis. Nunc dulces habemus
duplices, vel duro, vel molliore putamine.

II. Amygdalus sylvestris.

Amygdalus syl. in sepib. Tripolitanis, Rauv.

III. Amygdalus Peruana.

Fructus exotici Hispanensis 2. Clus. ex. l. 2. c. 18.

IV. Amygdala Guyanenses, Clus. ex. l. 2. c. 6.

V. Amygdalo similis fructus Peruanus fu-
scus vel spadiceus, linea candida.

Fructus peregrinus 9. sive Pepitas del Peru, id
est, acini Peruiiani, Clus. ex. l. 2. c. 30.

Fructus peregrinus 9. in tab. 3. Lugd. Tab. Ger.

VI. Amygdalis similis Guatimalensis.

Avellana Mexiocana, cujus fructum indigenae

Cacao appellant, quae Palmarum naturam ob-
tinet, Guiland. pap.

Cacavate Benzoni, Lug. In. oc. p. 5. vel l. 2. c. 16. 17.

Cacao, Jos. Acoftg, vel Ind. Occid. par. 9. l. 4. c. 22.

Clus. ex. Lugd. Tab.

Fructus filiquis inclusus Amygdalarum spe-
ciem refert, cujus integrae naves plenae ex Gua-

timala afferuntur: cum hac in nova Hispania
mercatores negotiantur, cum ipsis monetae u-

sum praebeat & elemosynae loco pauperibus
distribuant: quare per universam Americam

multi usus: imò ex eo potum conficiunt quem
quem Chocolate nuncupant: Benzoni, Lugd.

VII. Amygdalis similis cortice spinoso.

Amygdalæ ex Andes: par. 4. Ind. Occ. l. 4. c. 26.

MALUS ARMENIACA.

Malus Armeniaca, *malus armeniaca*, & fructus *malus armeniaca*, Dioscor. l. 1. c. 156. Perseus subiungit: mi-
nora quae *armeniaca*, Romanis *negononua* dicantur: Latinis *præcocia*, quod ante alios fugaces fructus
maturefiant: nominantur & *Præcocia*: Galenus inter Persica reposuit, ut & Pl. l. 15. c. 12. inquit: post autu-
mnium (scil. Persica) maturefunt, æstate *præcocia*, intra triginta annos reperta, & primo denarii singula ve-
nundata. *Supernatica* & Sabinus veniunt: popularia undig: pomum innocuum expetitur agris. His verbis Plin.
duo *Præcocium* genera indicare, Dalechamp. voluit: alterum *Supernas*, amplum & magnum, quod & Sabinorum
locis advebebat, vulgo *Armenium majus*: alterum vulgare, parvum & strigosum, etiam *Armenium dictum*.

I. Mala Armeniaca majora.

Armeniaca, Ang. malus, Matth. Lac. Bellonio
ab Armenijs dicta.

Armeniaca majora, Cam. Tab. Eyft.

Armeniaca major Baracocca vulgo, Cæf.

Malus Armeniaca major, Matth. ep. Ad. Lugd.

Mala Armeniaca maxima, Gef. hor.

Hæc mole corporis & suavitatis præcellunt,
& sapore differunt à minoribus, quæ sapore au-
steriore sunt, quæ sine cultura & insirione exi-
gua sunt.

II. Mala Armeniaca majora, nucleo dulci.

Malus Armeniaca candicantia nucleo oblongo

dulci ut in Amygdalis, Gesnero.

III. Malus Armeniaca minor.

Præcocia, Brunf. Ang.

Persica minora, Brunf.

Persicus præcox vel Armenia, Gef. ap.

Persici quartum genus, Lon.

Armeniaca minora, Matth. Cam. Tab.

Malus Armeniaca, Dod. ut: Tur. Cord. in Dio-
scor. Lob.

Malum Armenium vel præcoquum commune,
Gefn. hort.

Malus Armeniaca minor, Ad. Lug.

Armeniaca, Cæfalp.

P R U N U S.

Prunus nominatur ex Dioscor. l. 1. c. 174. nota arbor est, cujus fructus esculentus est. Fructus nominatur a pruna di-
cuntur. Theoph. 3. h. 16. folia similia habet Arbutis & Andrachne, arbor parva: l. h. 18. semen habet carne
& nucleo interjacente: l. h. 29. succum dilutum: l. h. 22. super fructum ipsum florem insidentem emittit: 3. h. 7.
radice numerosa. At 4. h. 3. est & alia quadam arbor nonnulla magna, fructum ferens similem melleo, majo-
rem, nucleum habens rotundum, &c. Eidem 9. hist. 1. ægros (pruno Gaza) humor in lacryma modo gignitur.

Genera: Dioscorides Syriacorum, & eorum quæ Damasci nascuntur, meminit. At Plinio l. 15. c. 13. Pru-
norum ingens turba versicolor, nigra, candicans: hordeacea appellata: alia eodem colore majora a simina co-
guntur: sunt & nigra, ac laudatiora cerina atq. purpurea: nec non Armeniaca, &c. sic nucibus insita, ab
utroq. nucipruna appellata, &c. nuper in Batia malina appellari ceperunt, malis insita, & alia amygdalina,
amygdalis: his intus in ligno nucleis amygdala est: in peregrinis arboribus dicta sunt Damascena, &c. & pruna
omnia post Catonem capisse manifestum est.

Recentior

Recentioribus, pro diversitate regionum plures sunt differentie, & quidem inexplicabiles, vario cultu & studio inferendi (cum & nuci, & malo, & amygdalo inferantur, quæ faciem parentis, succum adoptionis, ut Plinius dicit, exhibet) inventæ: nam variant magnitudine, figura, colore, sapore: magnitudine, sunt magna, media, parva. Figura, longa, rotunda, acuminata. Colore, alba, viridia, lutea, cereæ coloris, rubra, ex puniceo rubentia, castaneæ coloris, cærulea, ex cæruleo nigricantia. Sapore acida, dulcia, mediæ saporis, austeriora: sic caro in quibusdam sicior facile ab osse separabili, alijs humidior & pertinacius adharens. Ita alia alvum solvunt, quæ dulcia: alia eam cohibent, quæ austera & acerba. Sunt carne Pruni & cute subviridi Pruni, sed nucleo Persici quæ Prunopersica, Adv.

I. Prunus, Brunf. Trag. Matth. Dod. ut: Tur. Massiniana, ijs grandiora.

Lon. Cast. Lugd. Prunus sativa, Fuch. domestica, Lob. Ger.

II. Pruna magna dulcia atrocærulea.

Brabylla, Theocrito.

Pruna Damascena, Trag. Matthiol. Dodon. gal. Cord. in Diosc. Lugd. Ger. desc.

Palma datur Damascenis, quæ ex Syria Venetias sicca adferuntur, quæ nucleo sunt longo & plano potius quam rotundo, Bellonio monente: secunda quæ ex Pannonia (Ungarica quæ etiam Damascena, Cord. in Diosc.) & Transylvania adferuntur, ex Matthiolo Lugd. at Dodonæus ex Thoma Jordano, Moravica magis ad alvum leniendam commendat. Pruna Ungarica & Moravica, Cam. quæ

Pruna Brunensis, Clus. hist.

Pruna Ungarica duplicia, majora & oblongiora, alia minora, rotundiora & dulciora, Matth. Gesn. hort. Lugd.

III. Pruna parva dulcia atrocærulea: hæc nucleum parvum, non multo Ceraso majorem habent, & à nostris Damascenula vocantur.

Pruna Damascena nostratia, Bellon.

IV. Pruna magna crassa subacida.

Pruna Ungarica præstantissima, Damascena fortè, Gesn. hort.

Huc referri possunt Pruna acida in insula S. Claræ, Ind. occid. p. 9. additam.

V. Pruna oblonga cærulea.

Prunidaçtyla, Trag.

Prunidaçtyla purpurea & ovata, Lugdun. qui Noberdiana & Juliana addit.

Hæc oblonga sunt, nucleo oblongo, aliquantum incurvo, quæ etiam condita Vesuntio, ubi Daçtyle vocantur, adferuntur.

VI. Pruna nigra carne dura.

Pruna Iberica & Pertigona vocata, Trag.

Pruna Hispanica, Dod. gal.

Pruna Perdigona, Lugd.

Pruna pernicon vulgo, Cæsalp. quibus addit

VII. Pruna coloris cereæ ex candido in luteum pallescente.

Pruna cerea & Ceriola, Trag. Dod. gal. Lug. Tab.

Pruna cerea, Cord. in Diosc. Gesn. hort.

Pruna amygdalina, Ger. ico.

Hæc duplicia; præcocia, quæ majora, & serotina, quæ minora, Camer. epit. Reperiuntur quoque magnitudine ovi gallinacei, aut etiam anserini, Gesn. hort. sic quæ juxta pediculum in longitudinem extenuantur, ut Damascena & Catelana colore subviridi, Cæf.

VIII. Pruna magna rubra rotunda.

Pruna asinina, Trag. (& Pedicularia) Dod. gal. Lugd.

Pruna asinaria, Cæsalp. quibus addit Gubia ingustabilia.

IX. Pruna rotunda, flava, dulcia, mali amplitudine.

Pruna à malis cognominata, Cæf.

X. Pruna Augusto maturefcentia minora & austeriora.

Pruna Augustana & Albanula, Cæf.

XI. Pruna parva præcocia.

Pruna præcociora, à tempore avenacea dicta, Gesn. hort.

Prunus avenaria, Tab.

XII. Pruna parva ex viridi flavescentia.

Pruna parva serotina, cereola, Gesn. hort.

an Pruna viridacia, Gesn. & Verdacea, Cam.

XIII. Pruna amygdalina Plinij.

an Coccimelea, Theoph.

Amygdalina pruna, Lob. belg.

XIV. Pruneoli albi, oblongiusculi, acidi.

Pruna Galatensis, sive Perani pruneoli, Clus. pan. & hist.

XV. Pruna ex flavo rufescentia mixti saporis gratissima.

Pruneola quæ Brignolæ in scatulis reposita copiosè reperiuntur, Rauvvolff.

Pruna de Brignioles dicuntur à loco natali in Gallijs,

Gallijs, unde enucleata (nucleo parvo sunt) & exsiccata adferuntur, & in officinis nostris habentur, & tam cruda, quam cocta comeduntur. Verum & in hortis nostris habentur.

XVI. Prunus fructu rotundo nigropurpureo dulci.

Prunus cognominata Myrobalanus, Clus. pan. & hist. Cam. Tab. Ger.

Prunus Myrobalanus rotundus, Eyft.

Est majore & minore fructu, hicque pulpam dulciorem habet.

Pruno similes exoticæ.

I. Pruna Congiana lutea.

Ogegha arbor fructu luteis prunis simili, Pigafetta de sc. reg. Congiani: vel Ind. or. par. 1. l. 2. c. 1. an Lanca fructus in Gilolo prunis cereis similis: part. 8. Ind. orient.

II. Prunus Brasiliiana.

Huourae Theveto, Clus. in Monardem.

Huourae Brasiliensis, Guajaci species, Lerio part. 3. Ind. occid. c. 12.

III. Pruno similis fructus Chinenfis.

Lechyas fructus prunis similis, 2. part. Ind. or. cap. 25.

IV. Pruno similis ovalis, cortice & nucleo cinereo.

Guayavenfis fructus 2. Clus. exot. l. 2. c. 6.

V. Pruno similis oblongus spadiceus pulpa alba.

Guayavenfis fructus 3. Clus. l. c.

VI. Pruno similis fructus subfuscus ex Guynea.

Fructus exoticus à Clutio, Clus. exot. l. 2. c. 23.

VII. Pruni figura fructus Guinenfis.

Fructus exoticus à Clutio, Clus. exot. l. 2. c. 24.

VIII. Pruno cereo similis fructus Africanus.

Ergen arbor folijs myrti, fructu pruni cerei, offe amygdali magnitudine lineis binis distincto: in Præfat. par. 1. Ind. or.

IX. Prunus Hiericonthica folio angusto spinoso.

Zaccon, quia in planitie Hierichontis non longe ab ædibus Zacchæi crescit, Cast.

X. Pruna infana spinosa.

Nux infana, ab effectu Prunula infana nautis Belgis, Clus. exot. l. 2. c. 26.

Fructus prunis nostratibus minoribus similis, mentem capiens, 4. part. Ind. orient.

XI. Pruno similis spinosa.

Jangomas, Garz. Frag. Lugd. Linscot. 4. part. Ind. orient. 10.

Jangomi, Acoftæ.

Fructus pruni facie, sed loco nuclei granulis turget.

XII. Pruno similis folijs, Laccam ferens: alij ex Sorbi vel Mespili vel Myrti ramis colligi volunt, Garz. Vide inter gummata.

Prunus sylvestris.

Prunus sylvestris, Græcis *ῥοιζοειδὴς ἀγρία*, sive *ῥοιζοειδὴς* dicitur, quod rotunditate & magnitudine Cocci, mala ferat; Virgilio 4. Georgic. Spinum dicitur: fructus Dioscorid. libr. 1. cap. 174. *ῥοιζοειδὴς*: & Galenus 2. aliment. testatur in Asia *ῥοιζοειδὴς* appellari, Latine Prunum sylvestre Prunellum & Prunulum vocant. At Theophrastum 3. histor. 7. *ῥοιζοειδὴς*, vel ut apud Athenæum libr. 2. legitur, *ῥοιζοειδὴς* vocari volunt. Spodias, inquit, velut sylvestris prunus habetur. Et Plinio libr. 15. cap. 13. pruna sylvest. ubique nasci certum est.

I. Prunus sylvestris.

Prunus sylvestris, Brunf. Matth. Fuch. Dod. ut: Turn. Cord. in Dioscor. Bellon. (cui & Spino) Gesn. hort. Lonic. Adv. Lobel. Cæsalp. Castor. Lugd. Tab.

Prunus sylvestris vulgaris, Trag.

Huic peculiare, quod deflorescens, simul ac imbres contigerint, fructus in oblongum & inane corpus convertitur, quos Itali Turcas vocant, Cæsalpino & Camerario monentibus.

Fructus alij sunt magni, alij exigui, nonnulli rotundi, quidam oblongi: cujus succus pro Acacia usurpatur, unde stirpi Acaciæ Germanicæ nomen factum.

II. Pruna sylv. præcocia.

Pruni sylv. altera species, Trag.

Hæc majora sunt & Augusto maturantur, quare Germanis *Häberschlehen* reliqua *Echlehen* simpliciter nominantur.

In sylvestri sativaque pruno reperitur limus arborum, quem Græci *Lichena* appellant, Plinius lib. 23. cap. 7. at Dioscorides *Gummi* vocat. Muscum qui innascitur, Chirurgi nostri magnificiunt.

MYRO-

M Y R O B A L A N I

Myrobalani, qui veteribus Græcis incogniti fuere (quâvis Bellonius Chrysobalanos Galeni velit) ab Arabibus verò inventi, & ex recentioribus Græcis, Actuário cogniti: hos Avicenna, generis nomine Dilegi, & Serapio Hartileg donavit: quorum interpretes, cum viderent quodammodo ad glandis formam accedere, improprie Myrobalanos venterunt. Officinis Myrabolani & Myrabulani.

Genera quinque sunt, quæ Actuário *myrob. & myra. f. & myra. d. & myra. i. & myra. o.* dicuntur: & arborum genera quinque, diversa, quæ in regionibus sexaginta aut centum leucis à se distantibus nascuntur, Garzia monente, quæ Pruni magnitudine sunt & omnes sponte nascuntur. Myrobalanos ex Palmarum genere esse, Cæsalpinus censet. At Cordus scribit Arabibus recentioribus tres tantum cognitas fuisse, Indas, Chebulas & Citrinas, quæ ab una eademq; arbore desumuntur: Belliricas ex peculiari arbore esse: & Emblicas peculiare genus dicit. Arabes fructibus Saccharo conditis utuntur, & Chebulorum major est gloria: & ad nos duo potissimum genera condita adferuntur, Chepula sive Kebula & Bellerica. At Clus. in Garziam, Chepula rarius ad nos adferuntur, & non nisi dura & male condita: Emblica verò copiose recentissima & optime condita. Sed de Myrobalanis inter Indicos scriptores consule Garziam, Acostam, Fragosum.

I. Myrobalani maximi oblongi angulosi

pituitam purgantes.

Arabibus Quebolia & Quebulgi.

Myrob. Cepula, Mesu. Clus. in cor. Chepula,

Actuario, Matth. Garz. Adv. Lob. Lugd.

Myrobalani Chebuli, Lac. Cord. histor. Gesn.

Lon. Cæs. Cast.

Myrobalani Chebulæ, Tab. Ger.

Myrobalani Chebuli vel Quebuli, Indis Are-

tan: Linsc. 4. part. Ind. or. 38. qui tab. 16. sub

Mirambolan majore, quæ alias Aretca vocite-

tur, figuram exhibet.

Arboris folia Persicæ similia.

II. Myrobalani teretes citrini bilem pur-

gantes.

Myrob. lutei, Actuário, flavæ, Garz. Lob. Lugd.

flava, Matth. & lutea, Clus. in cor.

Myrob. citrea, Mesu. citrini, Cord. histor. Lac.

Lon. Adv. Cæs. Ger.

Arabibus Azafar.

Myrobalani flavæ, citrinæ, luteæ, Tab.

Myrobalani citrini, Bellon. Cæs. an Chrysoba-

lanum A. lepiadis.

Myrobalani citrini, Indis Arare, Linsc. 4. part.

Ind. orient. 38.

Arbor Sorbi folio.

III. Myrobalani rotundæ belliricæ.

Arabibus Belleregi: bellileg: bellegu.

Myrobalani belliricæ, Matth. Cord. hist. Clus.

in cor. Garz. Adv. Lob. Lugd. Tab. Ger. bellirici,

Lon. Cæs. belerici. Lac.

Myrob. bellirici Gallæ modo rotundi, Cæs.

Myrobalanus belliricus, Cord. in Diosc. qui an

Acacalis sit belliricus, vel emblicus dubitat.

Myrobalani Bellirici, Indis Gut, Linsc. 4. part.

Ind. orient. 38.

Arbor est folijs laurinis subcinericeis.

IV. Myrobalani nigra octangulares.

Arabibus Asuar.

Myrob. nigra, Actuário, Mesuæo, nigri, Adv.

Myrobal. Inda & Damafonia & nigra, Clus.

in cor.

Myrobalani Indicæ, Lob. Tab. Ger. seu nigra,

Matth. Lon. Garz. Lugd.

Myrobalani Indi, Cord. hist. Lac. Cæs. Cæs. qui

addit: nullo intus nucleo (quemadmodum &

sequentes) manifesto.

Myrobalani Indici, Indis Resonalle, Linsc. 3.

part. Ind. orient. c. 38.

Arbor folijs est Salici similibus, fructus octo-

gono.

V. Myrobalani Emblicæ.

Arabibus Embelgi: Embleg: Ambegi.

Myrob. de Seni, Serapioni: Seniticæ Avicennæ.

Myrob. Empelica, Matth. empelica sive em-

blica, Clus. in cor.

Myrobalani emblici, Lac. Cord. hist. Lon. Adv.

Cæs. Cæs. qui addit, figura parvi mali, sed in

parva fragmenta dissecti.

Myrobalani emblicæ, Lob. Lugd. (qui inquit

potius fragmenta esse, quam integra pruna,

quadantenus triangula,) Tab. Ger.

Myrobalani Emblici Indis Amuate, Linsc. 4.

part. Ind. orient. 37.

Arbor est palmæ magnitudine, folijs minu-

tis incisus & nonnulli fructu minimo nascitur.

Duo posteriora genera Phœnicobalanos dici

posse Cæsalpinus existimat: siquidem nullo in-

tus ligno spectentur, & cum maturi sunt, nigres-

cant, ut Plinius l. 12. c. 22. testatur. Qui autem os

intus habeant, ad Thebaicos & Arabicos My-

robalanos reducendos: de ijs enim Plinius, in

totum

Kkk 3

totum arentes Thebaidēs & Arabicæ macro corpore, exiles & assiduo vapore torrentes, crustam verius quam cutem obducunt.

VI. Myrobalanis flavis similis fructus.

Hovos fructus in nova Hispania, Gomara, & Clusius in Garz. Fragofo.

Hobus sive Hovus, Benzoni part. 4. Ind. occid. c. 28. & Oviedo.

Fructus Myrobalano similes.

I. Fructus Myrob. ofsiculo similis niger acerb.

Fructus minor 10. Paludani, Clus. exot. l. 2. c. 20.

II. Fructus fuscus ferratus Myrobalani forma.

Fructus 11. Gareti, Clus. exot. l. 2. c. 16.

III. Fructus Myrobalani nigri ofsiculo similis, nucleo subfusco.

Fructus 10. è navigat. Batav. Clus. exot. l. 2. c. 15.

PRUNUS SEBESTEN.

Prunus Sebesten à Dioscoride & Galeno præteritur: at Aegineta, Aëtius & Actuarius frequenter meminere. Dicitur *μύξα*: fructus verò *μύξα*, *μύξα*, *μύξα* à pomi mucoso lentore: Græci enim mucum *μύξα* vocant. Arabibus & officinis Sebesten. Plinius lib. 13. cap. 13. simul dici possunt populares eorum Myxa, quæ & ipsæ nunc capere Romæ nasci inquit Sorbis. & lib. 13. c. 5. pruna in Damasco monte nata, & Myxa: utrumque jam familiare Italia: ex Myxis in Ægypto & vina facta.

I. Sebestena domestica: an *μύξα* Atheneo.

Sebesten, Trag. Lac. Bellon. Rauvvolf. domestica, Alpino.

Prunus Sebestena, Matth. Lugd.

Myxæ vel Sebastæ, Cord. hist.

Sebestena, Gesn. hort. Cast.

Myxa, Dod. Adv. Lob. Cæs. alp.

Sebesten, Myxæ sive Myxaria, Tab. Ger.

Myxos arbor, sive Sebestena nostra, Lugd.

Differt à sequenti folijs latioribus & crassioribus: fructu majore, perfectiore & meliore.

II. Sebestena sylvestris.

Sebesten sylvestris, Alpino.

ZIZIPHUS SEU JUJUBE.

Arbor, Ziziphus Columella l. 9. c. 4. dicitur: fructus verò Græcis recentioribus, ut Actuarius & Simeoni Serhi *ζίζυφα*, *ζίζυφα*, & *ζίζυφα*, Latinis Zizypha: officinis Jujube. Sunt qui *ζίζυφα* Galeni 2. alim. esse velint, & quidem primus Serapio: at Guiland. in suo Theone, Zizypha & Serica distinguit. aliqui Tuberum genus, à colore Sericum cognominatum, Plinij l. 15. c. 14. cum tamen Plinius à Zizypho distinxerit: inquit enim, æque peregrina esse Zizypha & Tuberes, quæ & ipsa non pridem venerint in Italiam: hæc ex Africa, illa ex Syria: & l. 17. c. 10. & Zizypha grano feruntur mense Aprilis: Alijs Paliurus Africanus & Lotus secundus Polybijs, Lobelio: Paliurus Theoph. sed non Africanus, forte Paliurus Dioscoridis & Plinij, Cæs. alpino.

I. Jujubæ majores oblongæ.

Jujubæ, Trag. Cord. hist. Lon. Adv. Cæs. Tab.

Jujubæ domesticæ, quas Lotum Athenæi, Lotum in Pharide Theoph. & Lotum ofseum Plinij Anguillara suspicatur.

Jujuba Paliurum Africanum Theophrast. esse propemodum certus sum: Lotus Homeri 9. Odyss. Guil. l. c.

Jujubæ Arabum, Lob.

Zizypha, Matth. Lac. Cast.

Ziziphus, Dod. ut: Gesn. hort. rutila, Bellon. (Græcis vulgo Ziziphia) Clus. hist. & hisp.

Ziziphus punicea, Lugd. rubra, Cam. Rauvvolf.

Jujubæ, Zinziphia Cretensibus, Bellon.

II. Jujuba sylvestris.

Jujubæ & Paliurus 2. Theoph. Ang. Adv.

Ziziphus sylvestris, Cam.

Zizypha, Cast. ap.

III. Jujubæ minores rotundæ.

Jujubæ minores, Tuberes Plinio, Cord. hist.

IV. Jujuba Indica: folia hujus subrotunda, ut vulgaris venosa, sesquiunciam lata, duas longa, per marginem crenis exasperata, parte a-versa molli rufescente lanugine tecta: hæc Boræ nomine, cum ejusdem ramulo, cui Lacca adnata erat, ex India Reverend. D. Terentius misit.

CORNUS.

Quæ Latinis Cornus, Dioscoridi l. 1. c. 172. *νεαία* arbor sortis, fructum ferens olivæ modo oblongum, primo viridem, maturum verò flavum, aut ceræum, esculentum, Theop. 3. hist. l. 2. & 5. h. 5. *νεαία*, quædam mas, quædam

quedam semina, quam *δανυρα* vocant: folium habet Amygdala (alijs Mali legunt) nisi quod pinguius crassiusq; corticem nervosum, & tenuem, caudicem non nimis crassum: femina virgas parvas, &c. Macedones ambas fructificare asserunt, sed femina fructum ingustabilem esse, &c. Plinio lib. 16. cap. 26. Cornus circa Solstitia, reddit primo candidum, postea sanguineum: ex eo genere femina post Autumnum fert baccas acerbis & ingustabiles cunctis animantibus: ligno quoq; fungosa, inutilis, cum mas ē fortissimis quoq; sit: tanta differentia ab eodem genere sit: vide & l. 15. c. 24. & 24.

I. Cornus hortensis mas.

Cornus, Brunf. Trag. Matth. Ang. Lac. Lon. Dod. Ad. Lob. Cæs.

Cornus mas, Dod. gal. Bell. Ges. hor. Tur. Lugd. Tabern.

Cornus sativa & mas, Cord. in Diosc.

Cornus vulgaris mas, Clus. hist.

Fructus maturus colore variat; nam communiter ruber, & ossiculo longiore est: aliquando ceræ colore: rarius albet: saturatius etiam rubet ossiculumq; habet crassius & brevius, & hoc est

Corni maris aliud genus, Clus. hist.

II. Cornus sylvestris mas.

an Cornus femina, Cord. hist.

Cornus sylvestris, Cam.

Cornus mas pumilio, Clus. hist.

Hic in sylvestribus Thuringiæ & Austriæ inferiores provenit, solum frutescit, sed cultura in arborem pulchram exurgit: fructus dulciores

sunt, quam urbanæ, Hermolao, & plerunq; etiam majores, Camerario monente.

III. Cornus femina.

δανυρα Theophr. quibusdam *δανυρα*, id est, falsa Cornus: Cornus femina, Plinio: quibusdam Virga sanguinea ejusdem, l. 24. c. 10. at nullas notas addidit.

Ligustrum, Brunf. ico.

Hartriegel. Trag.

Virga sanguinea, Matt. Ruel. Ges. hor. Dod. Cæs.

Cornus femina, Dod. gal. & (Opulus Columel-)

læ) Tur. Ges. hor. Ad. Lob. Thal. Lugd. Tab.

Cornus femina veteribus Macedonibus, San-

guineus frutex Gallis, Bellon.

Pseudocrania, Cord. hist. ico.

Sanguen vulgo, Cæs.

Sanguis & lingua sanguinea, Cæs.

Oslea, Lon. Cæs.

Cornus sylvestris, Lon.

L O T U S.

Lotus arbor triplex est Dalechampsio in Plinium: prima qua *λωτός* dicitur Dioscoridi l. 1. c. 171. quam dicit stirpem bene magnam fructum ferre pipere majorem, dulcem, edulem, stomacho aptum. Et Theophr. 4. hist. 4. *λωτός* (Celtis Gaza) magnitudine quanta pyrus, aut paulo minore, foliis incisuris habet, ut illex: cujus generis plura fructibus inter se discreti traduntur, &c. Plinio l. 13. c. 17. arbori lotum quam Celtim vocant, magnitudo qua pyri, folio ilicis, fructu dulci nunc exosse, nunc durum nucleum ambiente, colorem uve modo mutante, cum maturescit, de quo vinum exprimitur. Arbor Syrtica eidem l. 24. c. 2. Altera *λωτός* Theophr. l. 3. c. 13. (Jovis flamma Gaza) quam improprie Loton vocant, ob fructus dulcedinem Ceraso similem, nucleo duro, & Plinio l. 16. c. 30. lotos sive faba Græca, &c. & l. 24. c. 2. Tertia, qua Theophrasto secunda, qua *Λαυρα* Cerasus quibusdam: que sententia Clusio non placet. Adde potest quarta, ipsius Polybi apud Athenæum l. 14. Sunt qui Guajacanum, Tuberum alterum genus Plinij, quorum inter Mala meminit, velint.

I. Lotus fructu Cerasi.

(Dod. Cæs. Lob. (& Lotus vera Theophrasti) Ges.

Lotus, Mat. Ang. (& arbor del perlaro) Lac. Lon.

Lotus arbor, Bell. (Cacavia Cretenfibus) Ges.

hort. Ad. Lob. Cæs. Cam.

Lotus arbor sive Celtis, Tur.

Lotus Celtis arbor, Lugd.

Lotus domestica, Cæs. app.

Bagolarus Tridentinis, Guil.

II. Lotus Africana latifolia.

Diospyros, Theophrasti.

Lotus sive Faba Græca, Plinio.

Lotus Africana altera, Matth.

Guajacum Patavinum Fallopio, Ges. hort. Ad.

Guajacum, Cord. hist. ico. Lon. ico.

Guaicana, Bellon. cult. Fyit. vulgo, Cam.

Ermellinus, Cæs. qui Tuberum alterum genus

Plinij suspicatur.

Diospyros sive Faba Græca latifolia, Lugd.

Pseudolotus Matthioli, Tab.

Variat: nam in fructu Patavij, femina bina aut

terna plana & spadicei coloris observavimus:

at quæ Viennæ & Bononiæ coluntur, etiam ex

femine Italico natæ, fructus femine expertes,

sola pulpa constare, Clus. in sua hist. notavit.

III. Lotus Africana angustifolia sive femina.

Pseu-

Pseudolotus, Matth. Cam. Tab.

Diospyros sive Faba Græca angustifolia, Lugd.

Lotus Africana, Tab.

Ziziphus Cappadocica, Ger. ico.

IV. Loti Africanæ similis Indica.

Indiæ Occiduae palmæ sanctæ similis arbor, Ad. Lob. ico.

Palmæ sanctæ similis arbor, Lugd.

LIGNUM GUAJACUM.

Guajacan nomen est Indicum, quod nunc Guayaci sive Gajaci nomine, per universum orbem cognitum est, quod alij Ebenum esse dicunt; à quo sola summa nigredine disidere videtur: quæ in Ebena summo splendore nigricat: in illo vero albescit: alij Buxi speciem: Sed novum est arboris genus, quod ex America, sive India occidentalis affertur. Duplex est, magna matrice & propemodum sine matrice: non tamen diversarum arborum lignum esse censemus.

I. Guajacum magna matrice.

Guayacan lignum Indicum ex Insula S. Dominici, Monardi, Lugd. & par. 4. Ind. Occid. 29. sive lignum sanctum, par. 9. Ind. Occid. 1. 3. c. 22.

Guajaci primum genus, Monardo & Matth.

Guajacum, Bellon. Ad. Cæs.

Gayco & Gayacan, palus Indiæ Hispanis, Frag.

II. Guajacum propemodum sine matrice.

Guayacan genus alterum, quod lignum sanctum, illo præstantius, & ex Insula S. Johannis de portu divite affertur, quo maxime utuntur, Monard. Lugd.

Guajacum, Lac. Cord. in Diosc. & hist.

Palma aut palus sanctus Indiæ Occiduae, Penæ.

Guajaci 3. genus, Monardo & Matth.

Guajaci alterum genus, Cæs.

Hoc in plura genera ab aliquibus dividitur, eo quod non unum colorem habeat: quoddam enim nigricat: quoddam etiam spadiceo colore flavescit: quoddam præterea omnes istos colores discretos habet: Quare Manardus & ex eo Matthiol. tria genera notarunt, quæ licet colore, magnitudine & pondere inter se discrepent, unius

tamen esse arboris, contra quàm Fallopius credidit, Matthiol. statuit, & causam refert in ligni maturitatem, quò enim maturius, eò nigrius, & quò minus adoleverit, tantò magis albicare asserit: probatur maxime, quod rufum, spadiceum flavum, lividumque colores simul mixtos habet.

III. Guajacum folijs lentisci.

Guajacum cujus ramulum cum floribus & fructu pingit Clus. notis ad Monardem.

Lignum Ebenum sive Guajacum in Insula S. Helenæ, par. 1. Ind. Or. c. 1.

Fructus (quos copiosè cum suo gummi, Amstelrodano à D. Hofst. accepimus) variant, nonnulli loculamentis sunt geminis, quorum alterum plenum, alterum inane: alij tribus, in quibus ossicula dura, longiuscula.

IV. Guajacum Orientale.

Palma aut Palum sanctum, Ad.

Guajacum folijs plantaginis, Cæs. Frag.

Lignum sanctum, Cast.

V. Guajaco viribus similis Indica.

Maggai, Indi morbum Gallicum curant, ejus suffragio sudores movendo, Fragosus.

E B E N U S.

Ebenus, Græcis ἑβένος, duplex Diosc. 1. 1. c. 29. Aethiopica nigra, venarum pectinimve expers, cornu elaborato lavore similis, &c. Altera Indica, lineis candidis & sulvis intercurrentibus, idemque maculis prædit. Theoph. 4. b. 5. Ebenus Indiæ peculiaris est: cujus duo sunt genera, unum laudat a materie puriorumque, alterum ignobile, &c. Pl. 1. 2. c. 4. Hebenus rara arbor, Neroni principi allata, quam nullam aliam nisi palmarum generis esse docuerint, cujus duo genera esse scribit: & 1. 6. c. 40. spississima ex omni materie, ideo & gravissima judicatur: quæ neque cariem neque vetustatem sentit: quæ ut id. 1. 6. c. 30. Aethiopia sylva meridiano cardine maxime virent.

I. Ebenus Thevero in Indiæ Insula Palmo-

botere præstantissima & nigra, & in 9. par. Ind. Occid. 1. 3. c. 22. in Hispaniola.

Ebenus, Matth. Cord. in Diosc. Cæs.

Hebenum sive Xyloaloes officin. Ad.

Ebenus, Lugd. qui vult officinas pro Xyloaloe habere.

Valer. Cordus in Diosc. scribit, quosdam Guajacum lignum, Ebenum esse contendere: & Penæ censet officin. Ebenum speciem Guayaci esse. Ebenus, Castori, qui eandem figuram habet, quam pro Ligno sancto posuit.

Ex hac in Italia sphaerula præcatoria conficiuntur.

II. Li-

II. Lignum pice ferè nigrius & polito ebore
lavius: arbor crasso cortice vestita, in cævis in-
timis Ebenus clauditur: ejusdem generis ligna

rubentia, & alia ceræ modo flaventia reperun-
tur: in Insula Mauritiana, 5. par. Ind. Or.
Ebenum picis modo nigrum, 4. par. Ind. Or.

LIGNA DURISSIMA FERRI DU-

ritiem æmulantia.

I. Ebenus Indica.

Lignum de Mangles, ex quo navium malos &
antennas, ferri duritiem æmulantes, condunt:
part. 9. Ind. Occid. l. 4. c. 30.

an Lignum de Cochi, quod ejusdem cum ferro
ponderis, ex quo anchoras conficiunt, & à Lusit-
anis Paio di ferro, hoc est, lignum ferreum vo-
catur: par. 7. Ind. Or. c. 44.

II. Lignum Teixo dictum, adeo durum ut
ferum æquet, in Pico Insula, quod valde pre-
tiosum & utile, interius coccinum undulatum
expressissimè referens, ex quo instrumenta fi-

unt, Liscot. part. 3. Ind. Orient. cap. 6.

III. Angelina arbor apud Cachinum, ex cu-
jus continuo trunco naves Tonas vocatas ex-
truunt tam grandes, ut unâ viginti vel 30. dolia
aquatica vehi possint, cujus lignum adeo du-
rum ut ferrum atterat, Linsc. par. 4. Ind. Orient.
c. 14. & par. 7. c. 27.

An arbor cujus pars ima crassitie 24. orgyrum
in Guineæ Insula Formosa: part. 6. Ind. Orient.
tal. cap. 4.

an Angelina arbor, cujus solum nomen apud
Acoltam, cap. de ligno colubrino.

C E R A S U S.

Cerasus nigræ & Theophr. 3. hist. 13. fructus nigræ, Dioscoridi l. 1. c. 157. Cerasia & Cerasa. Dicta autem
à Cera sunt Pontico municipio: unde Lucullus Romanorum Imperator, Mithridate debellato, primum
in Italiam arborem detulit, & fructum gentilitio nomine Cerasum appellavit, Athenæo l. 2. & Plinio l. 15. c. 25.
auctoribus. Est autem Theophr. l. c. natura peculiaris arbor, magnitudine excellens, & c. flore candido, pyro &
mespilo proximo, & c. fructu rubente, saba magnitudine, & c.

Genera: Plinio l. c. Cerasorum, Aproniana maximè rubent: nigerrima sunt Actia, ut & Caciliana ro-
tunda. Julianus gratus sapor: principatus duracinis, qua Pliniana Campana appellat: in ripis etiam Rheni:
tertius is color è nigro ac rubenti viridiq, similis maturecentis semper. Minus quinquennio est, quod prodire
que vocant Laureæ, non ingrata amaritudinis, insita in Lauro. Sunt & Macedonica parva arboris, raroq, tria
cubita excedentis: & minore etiamnum frutice Chamæcerasi: hæc Plinius. Verum non solum apud Gallos &
Italos, sed etiam nunc apud nos magna Cerasorum varietas, que quotidie insitione & cultura augetur: nam
alia sunt sativa, alia sylvestria. Sativa, fructus forma colore & sapore variant. Sunt enim pomi figura turbina-
tiore, longiore, rotundiore, majore, minore, cordis etiam figura: & alia pediculo longiore, alia brevior: singulis,
vel pluribus unâ coccantibus, ita ut ex uno petiolo vel singula, & quidem communiter, vel terna quaterna, quina
dependeant: vel in racemi modum coacerventur. Colore albo sed rarius partim rubro, partim candicante, &
quædam in maturitate parum ex candido rubent, quædam magis: quædam planè ceræ, quæ pruno insita sunt:
rubro rufescente, nonnunquam in atrum vergente nigro etiam quædam nigerrimo & succo sanguineo, labia &
manus inficiente. Sapore dulci, acido, austero, ex dulci & acido admixto: alia amaritudinis quid retinent, non
tamen ingrata, Amarina dicta: sic alia nimia sua dulcedine fastidium pariunt: alia ob nimium acorem re-
spuuntur: alia ob aquei succi redundantiam insipida sunt. Similiter quædam carne sunt prædura, alia carne
molliore, sive teneriore & aquosa constant: & quibusdam caro pertinacius nucleos hæret, qui in alijs fragilior.
& nucleo non insuavi est. Sylvestria etiam variant, quorum quædam, licet in hortis à nostris colantur, sylvestria
tamen dicantur, quia in nemoribus & sylvis, nonnunquam in dumeris reperiuntur: & quidem in sylvis altissi-
mis, fructu parvo & exigua carne, avium porius quam hominum cibis, ob acerbum simul & amarum gustum.
Sed aliquas tantum differentias subjiciemus.

I. Cerasa sativa, rotunda, rubra & acida, quæ
nostris, Cerasa sativa.

Cerasa Aproniana, Plinij.

Cerasus acida, Brunf. Matth. Lugd. Tab. & alijs
vulgaris, Ger.

Cerasia acida & vulgaria, Trag.

Cerasa quæ Gallis Griottes, cujus arborem
Chamæcerasum dici, putat Ruellius.

Cerasa austera & majora, Cord. in Diosc.

Cerasia, Cord. Gesl. hor. Lob. Cast.

LII

Cera-

Cerasus, Ad. tertia. Dod.

Cerasa Agriotta appellata, Cæs. qui Macedonica Plinij suspicatur.

Hæc in mediocri arbore crescunt, brevique pediculo & carne satis dura donantur: colore communiter rubro, aliquando nigricante, quoddam & quasi albidum quod rarius est: at quæ in alia ejusdem generis arbore insita, magna admodum Cerasa, ex brevibus pediculis dependentia, gignunt.

II. Cerasa lativa majora.
Cerasia Hispanica, Lob. Tab. Ger.

III. Cerasa acidissima sanguineo succo, Cerasiorum primum genus, Trag.
Cerasa austera, Matth. (cui & acidorum tertium genus) Cast. Lugd.

Hæc in altiore arbore proveniunt, & longissimum pediculum habent, ex quibus communiter nostrates (qui Wicsheln vocant) Vinum cerasorum conficiunt.

IV. Cerasa crassa carne dura.
Cerasa duracina, Plinio.
Cerasa quæ primo maturitatem sentiunt, Ruel.
Cerasor. 4. genus, quæ forte Juliana Plin. Trag.
Cerasa maroba & duracina, Matth.
Cerasus altera, Dod.

Cerasa pulpa duriore, Duracina vocata, Cæs.
Cerasia Pliniana, Tab. præcox, Ger.

Nostri Grassion vocant, quæ vel rubent, una tamen parte albidior, vel nigricant.

V. Cerasa carne tenera & aquosa.
Cerasa Juliana, Plinio.
Cerasa aquea, Matth. Tab. Gasconia, Ger. ico.
Cerasa pulpa aquosa, Cæs.

VI. Cerasa alba dulcia.
Cerasia dulcia, Trag.

VII. Cerasus major ac sylvestris, fructu subdulci, nigro colore inficiente.

Cerasa Actiana, Plinio.
Cerasia nigra, Trag. Tab. Ger.

Cerasa Corbine, quod Corvorum modo nigricent, an Cæciliana Plinij, Matth.

Cerasus prior, Dod.

Hæc nostris sylvestria, & à Cordo in Diosc. Cerasa dulcia dicuntur, & duplicia habentur, rubra & nigra, ex quibus tam viridibus, quam exsiccatis, ossas conficiunt. Et in Florida Cerasa sylvestria reperiuntur, an his similia?

VIII. Cerasus paucissimis folijs donatus.
Cerasa sine folijs, Lob. ico.

IX. Cerasus hortensis flore roseo.

Cerasi species major pauciores fructus edens, Lob. icon.

Cerasus multiflora secunda, Tab.

Cerasus flore plenissimo instar parvarum rosarum, Cam.

Cerasus multiflora pauciores fructus edens, Ger.

X. Cerasus hortensis pleno flore.
Cerasus vulgaris duplici flore, Lob.

Cerasus multiflora prima, Tab.

Cerasus multiflora fructum edens, Ger.

Cerasus flore pleno, Eyst. ico.

XI. Cerasus folio laurino.
Cerasus Trapezuntina, Bellon. Ges. hor.

Laurocerasus, Eid. cult. Ges. hor. Clus. pan. & hist. Camer.

Lotus secundus Theophrasti, Lugd.

Variat: nam communiter sub pulpa ossiculorum durum continet: at in eo quem Clusius Byzantio, Tarbison curmash, id est, Trapezuntia dactyli nomine accepit, non nucleus, sed semina bina aut terna, plana, spadicei coloris, nullo putamine includuntur.

XII. Cerasus pumila.
an Cerasus Macedonica, Plinij.

Chamæcerasus, Matth. Lob. Dod. cui & Cerasus 4. Lugd. Clus. pan. & hist. Cast. Tab. Ger.

Chamæcerasus sylv. Cord. in Diosc.

Cerasus humilis, Ges. hor. cui & Chamæcerasus, vel Macedonica Cerasus Plinij.

Chamæcerasus urbana, Ges. ad Cordi hist.

In horto Sturgardiano, Cerasam pumilam, sesquicubitalem, fructu acidissimo, folijs quam in Austriaca à Clusio picta, majoribus & longioribus, observavimus, an hæc

Cerasus Macedonica, Clus. hist.

XIII. Cerasus racemosa hortensis.
Cerasus racemosa, Matth. Lugd.

Cerasi genus quintum, Dod.

Cerasa uno pediculo plura, Lob. Lugd. Ger.

Cerasa uno pediculo binos aut ternos fructus ferens, Cam.

Cerasiæ species i. pediculo plura producens, Cast.

Cerasia uno pediculo plura, Tab.

Aliquibus ab uno pediculo terna, quaterna, quinave poma dependent: quædam racematim uvæ modo propendent: hinc duæ figuræ in Lugdunensi historia proponuntur, sub

Ceraso ex uno pediculo plura, & Ceraso racemosa.

XIV. Ce

XIV. Cerasus racemosa sylv. fructu non eduli.

Cerasi folijs arbutula sylv. Gesn. hort.

Pseudoligustrum, à quibusdam Pseudoagnos, (id est Vitex falsa) Dod.

Cerasus racemosa, Adv. Lob.

Cerasus avium racemosa, Lob. ico.

Cerasia racemosa rubra & nigra, Tab. Ger.

Padus Theoph. Lugd.

Cerasus avium, Clus. hist.

Cerasus racemosa sylv. Eyft.

an Cerasus sylv. Cæs.

padus gaudet vehementer umbrosis,

Theoph. 4. hist. 1. nec plura habet.

XV. Ceraso affinis.

an Cerasus sylvestris, Trag.

Mahaleb, Matth. Cast. Lugd. Tab. Clus. hist. &

append. 2. lib. 1. Cam. qui addit Chamæcerasum

Petræam, aut Petrocerasum Gesnerum vocare.

Macalep Arabicum, Cerasi sylv. genus, Bellon.

cult.

Macholebum, Cord. hist.

Chamæcerasus Dalechampi, Gesn. ad Cordum

& hort. cui & Chamæcerasus Syriaca.

Macaleb, Ang. Lob.

Vaccinium Plinij, Lugd.

Aliquibus Theophrasti λανάρα (Lacara Ga-

zæ, aliqui Lacatham legunt) quam 3. hist. 4. in

Macedoniæ plana etiam descendere: & 3. ejus-

dem 7. auctu facillimam esse scribit. Sic & Plinij

lib. 16. cap. 18. Vaccinia, quæ scribit in aquo-

sis provenire, Italiæ in aucupijis satam: Galliæ

verò etiam purpurea, tingendi causa, ad servi-

tiorum vestes. Verum & Theophr. & Plinius

brevior est, quam ut aliquid statui possit.

Fructus ex Syria advehitur, quamvis in Gal-

lia, Bellonius: in Italia Anguillara: in Helve-

tia Gesnerus (apud nos rarius) observavit.

CHAMÆCERASUS SPURIA.

I. Chamæcerasus alpina fructu rubro gemi-

no, duobus punctis notato.

Chamæcerasus montana, Gesn. ad Cord. hist. &

hort.

Periclymenum rectum vel mas, Eid.

Chamæcerasus alpigena, Adv. Lob. Lugd.

Xylosteum alterum, Dod. Eyft.

Periclymenum rectum 3. Clusij hisp. (at 4. in

hist.) Lugd. Tab.

Chamæcerasus, Cast.

Idæa ficus nostra, vulgo Frangula, Lugd.

an Corno similis frutex in albis, quæ Cornus

femina Theoph. etiam dici posset, Cæs.

Fructus aliquando geminus in uno longo

pediculo rubens, aliquando ex toto coeuntibus

seminibus in bipartito conceptaculo, in quoli-

bet duo aut tria sine osse.

Ficum Idæam, videtur magis & hic Theoph. hist. 17.

& Plinij lib. 15. cap. 18. historia Lugd. censet.

Xylosteum alijs, quasi lignum osseum, ob ligni

duritiem dicitur.

II. Chamæcerasus alpina fructu nigro gemino.

Periclymenum rectum 2. Clus. pan. & hist. Lugd.

Periclymenum nostrum 2. Sabaudicum, Tab.

III. Chamæcerasus montana, fructu singu-

lari cæruleo.

Periclymenon primum, Clus. pan. rectum 3.

Eid. hist.

Periclymenum rectum 4. Tab.

IV. Chamæcerasus dumetorum fructu ge-

mino rubro.

Halimus, Trag. Lon.

Caprifolij tertia species, Dod. gal.

Periclymeno cognatus frutex, Gesn. hort.

Xylosteum, Dod. Thal. Cam.

Periclymenum alterum Allobrogum, Cornus

feminae effigie, Adv.

Periclymenon Allobrogum, Lob.

Peryclimenon rectum fructu rubro, Clus. pan.

rectum primum, Eid. hist.

Periclymenum rectum, Tab.

Periclymenum tertium, Lugd.

Xylosteum floribus albis vulgarijs, Eyft.

Fructus gemelli instar exigui Ceraforum,

plerumque æqualis magnitudinis: sæpe altero

eorum minore, eo tamen pleno remanente.

V. Chamæcerasus folio aceris.

Chamæcerasus montis Generosi, Gesn. hor. Lugd.

STYRAX ET NARCAPHTHON.

Σ Τύραξ Diosc. l. 1. c. 79. lacryma est arboris malo cotoneo similis: & Theoph. 9. hist. 7. Styrax ad unguenta utilis est: plura non habet: & Plinio l. 12. c. 25. proxima Judea Syria supra Phœnicem Styracem: gignit: arbor est eodem nomine cotoneo malo similis, lacryma & c. sed de lacryma inter resinas.

I. *Styrax folio mali cotonei.*

Styrax, Matth. Ang. Lac. Bellon. Lon. Adv. Lob.

Cast. Lugd. Tab. Rauvvolff. Cam.

Styrax arbor, Gefn. hort.

Styrax liquida, Cast. ico.

Serapio fructum tribuit candidum avellanae majorem, & ex interno nucleo oleum exprimi.

II. *Styrax folio aceris: in Prodro-mo de-*III. *Storax rubra officinarum.*

Styrax rubra, Græcis hodie Maurocapno, Bellon.

Nascaphum, Cord. hist.

Tegname, Italis: Bufuri, Siculis, Guil.

Cortex est arboris, quem Thus Judæorum &

Thymiama vocant, quo Judæi in suffimigijs frequenter utuntur.

an Νέοναφθον sive νέοναφθον Dioscoridis libr. 1. cap. 22. quod ex India deferretur corticosum, mori libro simile, quod jucundi odoris gratia suffitur.

Narcaphthon Dioscoridis, Lignum aquilæ Lusitanis dici, Amatus scribit.

Nucis moschatae extimum corticem, Narca-phthum Diosc. censet, Cæs.

IV. *Frutex rotundo argenteo folio Cyani*

flore.

Pulcherrimus frutex, Honor. Belli ep. 2. ad Clus.

a quo ex Creta accepimus.

Cyanus fruticosus Candia, Ponæ Ital.

ARIA ET HAMAMELIS.

Aria Theoph. 4. hist. 8. similis ex toto est Lauro: 5. hist. 4. materies durissima est, ut Roboris: 5. hist. 8. natura perpetua est: 5. hist. 10. carbones optimos ejus spississima materies facit.

I. *Alni effigie lanato folio major.*

Aria & Metallum Italarum, Ang. Lugd.

Sorbus torminalis Gallorum Alisier, Bellon.

Sorbus alpina vel pilosa, Gefn. hort.

Aria Theoph. effigie Alni, Adv. Lob.

Aria Theophrasti, Tabern. Cam. qui lanatam Cordi vocat.

Sorbus Aria cognominata, Clus. pan. & hist.

Sorbi torminalis alterum genus, Cæs.

II. *Alni effigie lanato folio minor.*

Α'μαμελις & ἡμαμελις, Athenæo.

Diospyros quæ Sorbis cognata videtur, Gefn.

Pyrafter Idæus vel petraeus, Eid. append.

Myrtomelis, Eid. in epist.

Codomalo Cretenfium, Bellonio.

Amelancher Galloprovincia montanae, Adv.

Amelanchier, Lob.

Vitis Idæa 3. Clus. pan. & hist. 4. Tab.

Hamamelis Athenæi, Lugd.

Bagolæ quasi bacculæ alterum genus, Cæs.

Duplex est, alia folijs obtusis & latioribus:

altera acuminatis & angustioribus.

COTONASTER ET CHAMÆMESPI-LUS.

I. *Cotonaster folio oblongo ferrato.*

an Agriomelea, Bellonij.

Cotonaster forte Gefneri, Clus. pan. & hist.

II. *Cotonaster folio rotundo non ferrato.*

Cotonaster & Cydonago, Gefn. in epist.

Epimelis altera, Lugd.

III. *Chamæmespilus Cordi, Thal. Cam.*

Chamæmespilum, Gefn. ad histor. Cordi, Adv. Lob. ico.

Chamæmespilus Gefneri, Clus. pan. & hist.

Epimelis, Lugd. qui Dioscoridis vult, & Me-

spilum Anthedon, Theoph. 3. hist. 12.

Forte eadem cum priore: quamvis illa folijs sit majoribus, nec baccis adeo rotundis.



CASP.

CASPARI BAVHINI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER DVODECIMVS.

SECTIO PRIMA.

MESPILUS; BERBERIS; GROSSULARIA ET RIBES; SAMBU-
CUS ET ERULUS; FICUS; SYCOMORUS; MORUS; ARBU-
rus; Laurus; Tinnus; Laureola; Chamelæa; Thymelæa:
Cneoron & Nerion.

MESPILUS.

Mespilus arbor, Græcis *μῆσπιλος* & *μῆσπιλον*: fructus *μῆσπιλον* dicitur. Cuius Dioscorides l. i. c. 169. & 170. duo genera facit, alterum quod à nonnullis *ἁγία* vocatur, spinosa est, folijs similibus *αἰσανάρις*: fructum fert exiguo malo similem, suavem, continentem tria officula, à quibus nonnulli *τρίκωκκος* appellant. Alterum genus in Italia nascitur, quod nonnulli *Setanium*, alij *Setanium* nominant: arbor est malo simili & folijs, nisi quod minoribus: habet verò fructum rotundum, esculentum, latiore umbilico. At Theoph. 3. hist. 12. Mespili tria genera, *αἰσανάρις*, *σατάνη*, & *ανθηδόν* (antheodon, satanea, gallica) ut idem dividere consuevere. Fert satanea fructum grandiore, candidiore, laxiore & qui nucleos habet molliores: reliquis minor est fructus, odorator, &c. flos omnibus Amygdalis, sed utcumque pallidus. Antheodon haud procera est arbor, in orbem comosa, folio valde fissis, Apio in extrema parte simili, majoribus incisuris rigido, &c. fructu ex longo ac tenui pediculo pendulo, qui antequam folia decidant vehementer ruber, &c. Plinio l. 15. c. 20. Mespilus tria genera, Antheodon, Setania: tertium degenerat, & nesci si Antheodon similis est, quod Gallicam vocant, &c.

I. Mespilus Germanica folio laurino non ferrato: sive Mespilus sylvestris.

Mespilus Setania sive Satania, Theoph. & Plin. Mespilus altera quæ Epimelis Dioscoridi, sic dicta, quod ubi sponte provenit semper malum agrestem vicinam habeat.

Mespilus, Brunf. Trag. (qui Cratægum Theop. censet) Tur. Ges. hort. Lon. Ad. Lob. Dod. Cæs. Mespilus altera, Matth. in edit. cum magnis figuris, Dod. gal.

Mespili altera species sponte proveniens, Cord. in Diosc.

Mespilus vulgaris, Clus. hist. Cam. ep.

II. Mespilus folio laurino major.

Mespilus fructu præstantiore, Trag.

Mespilus altera sativa, Cord. in Diosc.

Mespilus oxyacantho insita, Dod.

Mespilus domestica, Lob. ico.

Mespilus setanea, majoribus vulgari fructibus, Camer.

Mespilus setanea insitione mitior facta, Lugd.

Hæc insitione in Pyrum sylvestrem, maxime Cynosbatum, sive Oxyacanthum, mitescit,

perum majus edit, nec spinis horret: & singula mala, ut & prioris quinos nucleos continentur, nisi fortè interdum præter naturam, aut plures aut pauciores contineat.

III. Mespilus Italica folio laurino ferrato.

Mespilus altera, Matth. edit. 2. & ico. Lac.

Mespilus setania, Ang. Lugd.

Mespilus altera, Cast.

IV. Mespilus Virginiana colore rutilo.

Mespilus, qui colore est rutilo ut cerasa & valde dulcis, part. 1. Ind. occid.

V. Mespilus fructu albo.

Mespilus colore albo mali magnitudine, Scallig. Lugd.

VI. Mespilus Apij folio laciniato.

Mespilus Aronia, Dioscoridis.

Antheodon Theoph. & Plinij.

Paliurus Africana, Ruellio.

Mespilus prima, Matth. Lac. Cast.

Mespilus Aronia, Dod. ut: Ang. Bellon. Gesn.

hort. Adv. Lob. Lugd. Tab.

Mespilus propriè dicta, quæ tricoccos, Cord. in Dioscorid.

Paliurus Africana vinosa, Gefn. hort.

Azarolus, Cæs. Cast.

an Mespilus Gallica, Cam.

Hæc spinosa est, sed ubi magis domestica, spinis caret, etiam Theophrasto monente.

VII. Mespilus Apij folio sylv. non spinosa, sive Sorbus Torminalis.

Sorbi quartum genus, Trag. Cord. in Diosc.

Sorbus torminalis, Matth. Cord. hist. Gefn. hort.

Turn. Dod. Lon. Adv. Thal. Cæs. Tab. Cam.

Sorbus torminalis Plinij, Lob. Clus. hist.

Cratægus Theophrasti, Ang. Lugd. qui duplicem figuram habet, sub eodem titulo.

Mespili Aroniæ sylv. species, Gefn. hort.

Sorbi sylv. altera species, Cast.

Hypomelides Palladij, quibusdam.

Κράταγος ἢ κρόταγος, Theophrasto 3. hist. 15. folium habet Mespili (scilicet Aroniæ) rigidum, sed majus, latius, longius, ejus modo laciniatum: arbor est non admodum procera,

nec crassa: lignum varium, solidum, flavum, &c. fructus ejus est magna ex parte rotundus, qui maturescens flavescit & utrumque nigrescit, succo & gustu mespili: quare sylv. Mespilus videri potest. Plinio 15. c. 21. Sorborum 4. genus torminale appellant, remedio tantum probabili, assiduum proventu, minimumque pomo, arbore dissimili, folijs pene Platani: & 1. 27. c. 8. Theophrastus arboris genus intelligi voluit Cratægonon sive Cratæogona, quam Itali Aquifoliam vocant.

VIII. Mespilus apij folio sylv. spinosa sive Oxyacantha.

Ὠξυάνθη arbor est similis Pyrastro, minor

B E R B E R I S.

AN apud Theoph. 3. hist. 17. arbor circa Idam proveniens, quam *Colyteam* vocant, genus aliud fruticosum, ramosum, alosum, invenitur rarum, folio laurino, ulmeo simili, oblongius ramen: colore parte altera herbido, tergo autem albido, nervosum, cortice non levi, sed quasi vitis vestitur: ligno duro (spisso), radices majorem in modum flava, &c. Spina appendix est appellata, quoniam bacca puniceo colore in ea appendices vocantur. Plin. lib. 24. cap. 13.

I. Berberis dumerorum.

Berberis, Brunf. Dod. gal. Turn. Gefn. hort. Lac.

Lon. Adv. Lob. Cast. Lugd. Rauvvolf. Cam. cui

& Amirbaris Avicennæ.

Berberis vulgaris, Bellon. cult. Clus. hist.

Spina acida, Brunf. 4. Dod.

Oxyacantha, Hermolao, Ruël. (cui & Spini vincta) Trag. Fuch. Eyf.

Oxyacantha Galeni, non Dioscoridis, Cord. in

verò & spinosa valde: fructum fert Myrto similem, plenum, rubrum, fragilem, intus nucleum habentem, radicem multifidam & profundam, Dioscoridi, 1. 1. c. 122.

Mespili 3. genus Plinij videtur: interdum atque degenerat, tamen Anthedoni similis est, quod Gallicum vocant. Theophrastus Anthenoidem nominat, quasi speciem Anthedonis.

Cynosbatus Theophrasti, Trag. Lon.

Oxyacantha, Matth. Lac. Tur. Bellon. Ad. Lob.

Rauvvolf. Cæs. Lugd. Tab. Cam. Thal.

Oxyacantha Dioscoridis, Dodon. gal. Cord. in Diosc. (& Latinis veteribus simpliciter Spina) Gefn. hort.

Sorbus aculeata, Cord. hist.

Spina acuta quorundam, spina alba vulgo, Ang.

Spina appendix Plinij (& ejusdem Spina simpliciter) Gefn. hort. Clus. hist. cui & Oxyacantha vulgaris.

Mespilus sylvestris, Cast.

In hanc Mespilus optime inseritur.

IX. Oxyacantha Dioscoridis, sive Spina acuta pyri folio.

Oxyacantha legitima, Ang.

Pyracantha, Adv. Lob. Clus. hist.

Rhamnus tertius Diosc. Lob. ico.

Acuta spina, Cast.

Uva ursi Galeni, Lugd.

X. Mespilo similis fructus venenatus.

Arbusculæ in littore, quarum poma mespilis nostratibus similia, Lero part. 3. Ind. occid. c. 12.

XI. Mespilo similis fructus fuscus.

Fructus octavus ex navigat. Batav. Clus. exot. lib. 2. cap. 15.

Dioscorid. Tabernæm.

Crespinus, Matthiol. Cæs. alp. cui & Ribes Serapionis fortè.

Oxyacanthus Galeni, Cam.

II. Berberis sine nucleo.

Berberis *καροπ*, Clus. hist.

III. Berberis alpina Cretica.

Lycium Creticum, Hon. Belli epist. ad Clus. & Ponæ: hoc ab utroque accepi.

GROS-

GROSSULARIA ET RIBES OFFICINARUM.

Theophrastus 3. hist. 17. post Rhamnos, lo. (equum Gaza vertit) vel ut alij & os memorat, his verbis: Aequorum alia candida, alia nigra: & flos fructusq. utriq. pro ratione discriminis, alius candidus, alius niger: nonnulli etiam medij quodammodo sunt, quibus flos in purpura candicans: nec enim fulvus, nec exalbidus est, &c. Non candidum, nonnulli Uvam crispam existimant: hac ille. Uvam crispam ab intortu & veluti crispis folijs & acinis quos producit, vocant.

I. Grossularia simplici acino, vel spinosa sylvestris.

Uva crispa. Trag. Dod. ut. Fuch. Ges. hort. Lon. Ad. Lob. (cui Vitis precia Plinij) Tab.

Uva spina. Matth. Lac. Cæs. Cast. Grossularia, Ruellio, Bellon. Thal. alba, Lugd.

Crispina uva, Cord. in Diosc. Rocella Cardano l. 6. de var. rerum.

Ceanothus spina, Theoph. 4. hist. 11. vel Ceanothus asper, Ges. hort.

Grossularia vulgaris, Clus. hist.

Fructus maturus flavescit, nonnunquam subrubet.

II. Grossularia spinosa sativa.

Uva crispa fructu Cerasi magnitudine, Ges. hor.

Grossularia majore fructu, Clus. hist.

III. Grossularia spinosa sativa altera folijs latioribus, nigra.

Grossul. fructu obscure purpurascens, Clus. hist.

Est & fructu ex atro caeruleo, frutice leviusculis spinis armato, alia fructu hirsuto.

IV. Grossularia simplici acino caeruleo non spinosa, nunc in hortis habetur.

V. Grossularia multiplici acino sive non spinosa hortensis nuba, sive Ribes officinarum.

Ribes hortense, Frag. vulgaris fructu rubr. Eyst.

Ribes vulgaris domestica, Matth. Cast.

Ribes, Fuch. Lon. Lac. Tab. rubra, Ad.

Ribes vulgo, Ang. Bellon. Cæs.

Uva urti, Dod. gal.

Ceanothus levis, Ges. hort.

Ribesum fructu rubro, Dod.

Ribes Arabum, Lob.

Grossularia rubra, Lugd.

VI. Grossularia hort. majore fructu rubro.

Ribes rubro flore, folijs & fructu majoribus, Clus. pan. & hist.

Ribes baccis majoribus, Camer.

Ribes major fructu rubro, Eyst.

Cultura aliquando in arbusculam abit, & acinis avellana majoribus acidissimi saporis Florentiæ visam, Ges. horti lib. de hortis refert.

VII. Grossularia distinctis baccis.

Ribes monocarpus, Clus. hist.

VIII. Grossularia hortensis fructu margaritis simili.

Ribes vulgaris fructu albo, Clus. hist.

Ribes fructu albo, Eyst.

IX. Grossularia vulgaris fructu dulci.

Ribes candidioribus folijs, Lob. obs.

Ribes vulgaris fructu dulci, Clus. pan. & hist.

Ribes minor fructu rubro, Eyst.

X. Grossularia sylv. rubra.

Ribes sylv. Matth. Ges. app. Lon. Cast. Cam.

Ceanothus levis genus sylv. Ges. hort.

Grossulariæ rubræ genus sylv. Lugd.

XI. Grossularia non spinosa fructu nigro.

Ribes sylvestre, Trag. Thal.

Ribes nigrum, Dod. gal. nigra, Ad. Lob. icon. Tabern.

Amomum falsum & Pseudoamomum, Ges. hor.

Ribesum fructu nigro, Dod.

Ribes vulgaris nigro fructu, Clus. hist.

Ribes baccis nigris, Cam. fructu nigro, Eyst.

Frutex Ribi similis fructu nigro, an arbor Piperis in Italia Plinij, myrto similis, Cæs.

Grossularia nigra alijs Pipirella, Lugd.

Variat baccis minoribus & majoribus.

XII. Ribes Arabum folijs petasitidis.

Ribes Arabum cum suis ca preolis, Rauwolf. & Lugd. app.

Ribes legitima Arabum, Clus. hist.

Ribes Serapionis, Cam. hort.

An idem cum hac, Ribes Serapionis folijs oxylapathi, Bellonio de coniferis, Dodon. & Lugd.

XIII. Ribes Rauwolfij congener planta, Clus. ex. l. 4. c. 21.

S A M B U C U S.

Sambucus, quo Græci ἀνθε, sic videtur Hermolao, à Sambuca, musica instrumento, quod, alij pectida, alij Smagadin vocant: & hoc ab auctore cui nomen Sambyx fuerit: Sambucus Q. Sereno.

Genera

fructus, tam sativæ, quam sylvestris dicitur, & Latinis *Grossus* nominatur: ut *ficus sicca* in furno, aut sole exsiccat, quæ quibusdam passæ dicuntur, & *ædæ*, Latine *Carica*, nupèdi *Aeginetæ*: quamvis *Carica* ficu peculiaris species sit in Syria provenientis, ut ex Plinio colligere est. Sic ipsa grana in fructu, Græci *νυζαυιδας* frumenta Plinius l. 15. c. 19. alij sicaria vocant. Hujus & Mori folijs Antiochia Bombyces ali, & alba mori arbores & ficu pumiliones ejus nomine colit, Bellonius scribit.

I. Ficus communis.

Ficus, Brunf. Trag. Matth. Ang. Dod. ut: Cord. hist. Bellon. Gesn. hort. Lac. Tur. Lon. Ad. Lob. Rauvolf. Cæf. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Ficus sativa, Fuch.

Fructus forma & colore differunt, nonnulli longiores, alij breviores: alij pyri forma, alij sessiles sunt, alij inter hos medijs. Colore, albæ, pallidæ, virides, luteæ, purpureæ, subrufæ, ex cæruleo saturatè purpureæ, nigrae, aliæ deniq; vario colore spectantur. Sunt & albæ, quoad pulpam interiorem. Siccarum sive passarum, triplex differentia adfertur, prima in sportheis, magnisq; corbibus: secunda, in cistis & similibus sportis lauri folijs immixtis: tertia, in parvis & turbinatis corbibus è sparto contextis. Malsilienfium cognomento, cæteris magnitudine quidem inferiores, saporis verò generositate superiores. Sic in regno Congiano, eximiae magnitudinis, magnaq; copia: maximæ verò in Insula S. Helenæ. Tria Ficuum genera (ut rectè Scaliger in Theoph. 5. caus. plant. 1.) fert Ficus: unum, valde tempore præcoem, quem idcirco Græci *ἀπὸ τοῦ πρὸ* quasi præcurforem vocarunt, atque is edendo est, Bolas Veneti vocant, Galli Florones: Columella, communi voce, priorem fructum: Plinius, præcoces. Aliud genus eorum est, quod postea prodit, cujus duæ species sunt: una quæ maturatur, Ficum dicimus, Græci *σύνωρος*: altera semper cruda est, & prius cadit quam absolvatur: eos Plinius abortus vocat: alio nomine Grosfi dicuntur, Græci *δυσώρος* vocant.

Variant etiam Ficus in India pro regionum diversitate: nam in Provincia bonæ spei, fructus perperuò ferunt (part. 8. Ind. Occid.) & in Peru summa earum ubertas (par. 9. Ind. Occid. l. 4. c. 3.) Addit Josephus Acofta l. c. in India Occidentali diversas esse valles, quæ integro anno fructus promant: sed admiratione dignius esse quod in Peru arbores reperiantur, quæ uno semestri ex uno latere, altero ex alio fructus protrudant. Sic in Mala 13. miliariorum intervallo à civitate de Los Reyes, Ficus est, quæ parte dimidia, quæ Austrum spectat, frondes & fructus fert, quando in montanis æstas viget:

altera verò pars, contrario anni tempore, cum in planis æstas est, idem cap. 32.

Ficus arbores Monarde referente, ex Hispania in Peruanas Provincias delatæ, plurimos & optimos fructus gestant: & ut folia isthuc non deponant, Deus singulariter voluit, quo semper præsens remedium adesset contra insecta, quæ Araneæ appellantur, quorum icibus virulentis, lac ex folijs Ficus manans, bis terve in vulnus instillatum, remedio est.

II. Ficus humilis.

Ficus pumila, Matth. Dod.

Chamaeficus sive humilis ficus, Lob.

Chamaefyce arbor, Lugd.

III. Ficus sylvestris Dioscoridi.

Caprificus vocatur è sylvestri genere Ficus, inquit Plinius libr. 15. cap. 19. nunquam maturefcens, sed quod ipsa non habet alijs tribuens, &c.

Caprificus, Ang. Cord. in Diosc. & hist.

IV. Ficuum specie fructus Peruanus.

Papaie fructuum genus ficuum specie, 6. part. Ind. Occid. 18. qui & Ficuum exiguorum Tunne nominatarum meminit.

V. Ficui similis arbor fructu oblongo.

Ficus Nigritarum, Thevero. Lugd.

Est folio Ficus, fructu pedes duos instar Cucurbitæ longo, quem tanquam Melones esicant.

VI. Ficus prædictæ similis fructu magno Meloni par.

Chivef, quod Syriacè Ficum significat, in Insula Zipangu, Thevet. Lugd.

VII. Arbor Malacensis multis radicibus prædita.

Arbor contrarijs prorsus facultatibus donata: nam quæ solem orientem spectat, adversus omnia venena valet: quæ verò occidentem, venenum præsentaneum sunt. Ignatio Franciscano in itin. novi orbis: ex quo Clus. in Acoftam cap. 41.

VIII. Ficus Indica folijs Mali coronei similibus, fructu ficibus simili in Goa.

Ficus Indica Theophr. 4. hist. 5. Indica, ait, regio arborem Ficum vocatam sortitur, quæ è ramis radices demittit singulis annis, non ex novel-

Mmm

lis,

lis, sed ex anniculis, atq; etiam vetustioribus: illæ se terræ conjungentes, ceu sepem circa arborem faciunt, ita ut veluti tabernaculum condatur, quo etiam morari homines solent, &c. Plinio l. 12. c. 5. Ficus Indica exilia poma habet: ipsa se semper serens, vastis diffunditur ramis, quorum imi in terram curvantur, &c. & l. 7. c. 2. sub una Ficu turmæ conduntur equitum. Arbor Indica admirabilis, Straboni. Ficus Indica, Clus. ex. Lugd. Tab. Mangle forte, Oviedi. an Mangen, Ferd. Lopez. Arbor de rayz, id est, radice, Linsc. part. 4. Ind. Orient. 14. & fig. 12. Enzada, Pigafettæ, part. 1. Ind. Or. c. 4. Arbor Goa sive Indica, Ger.

Ex cortice vestes conficiunt.

IX. Ficus Indica folio spinoso fructu majore.

Ficus Indica, Matth. Dod. ut: Cardano, Lac. Ges. Lob. Cast. Cæs. Eyst.

Carduus Indicus & Ficus Indiæ, Cl. cor. ad Dod. Pala sive Ficus Indica, Bellonio.

Tunici fera Indorum, Ad.

Ficus Indicæ species, Tune Indorum, Frag.

Anapallus Bellonij, Cam.

Tunes, Oviedo, Card.

Tune, Opuntia, Lon.

Ficus Indica spinosa, Tab.

Tune & Tunas Indorum, Lugd.

Opuntia vulgo habita, Cam.

Tunal in nova Hispania, nonnullis locis Cardii: part. 9. Ind. Occid. l. 4. c. 23.

Tunales qui fructus bonos promunt; & magni qui in India æstimantur, Tunas vocari solent, Idem.

Arbor Nepal: fructus, Nucchi in Insula Cuba, Ferdi, Cortesio, Cardan.

Opuntiam nonnulli credunt, de qua Theoph. 1. hist. 12. sic: huic (Ficui Indicæ) similis est, vel potius quodammodo mirabilius, si qua ex folij radicem mittat, qualem circa Opuntem herbulam esse ajunt, quæ & esu suavis est. Plinio l. 21. cap. 17. item circa Opantem, Opuntia est herba etiam homini dulcis, mirumq; è folio ejus radicem fieri, ac siccam nasci: Alijs Pala Plinij, & Tala Arriano, Guil.

Colore fructus variat, virides internæ purpurei, cerei, albi variegati.

X. Ficus Indicæ grana.

Cochinillia sive Grayn vermiculus sub folio Tunal: par. 8. Ind. Occid. l. 4. c. 13.

Quidam Tunas (id est, fructus) nullos gignunt, sed sub folijs fructum alium Greyn dictum edunt, vermiculum scilicet folijs adhærescentem & tenui pellicula obductum, & hæc celebratissima Indiæ Cochinillia, qua Grayne colorantur, Idem.

Arbor Cochenille, Claud. Dureto.

XI. Ficus Indica spinosa sylvestris.

Cardis seu Tunades sylv. fructum nullum protrudentes: si verò proferant, meris spinis horrent, part. 9. Ind. Occid. l. 4.

XII. Ficus Indica folio spinoso fructu minore. Indorum ferruminatrix, Advers.

Opuntia ostocollos, quos artuum fracturis & luxationibus profer: de qua & Author hist. generalis Indiarum.

Arbor rupturas consolidans, Ovied. qui suspicatur Carduum Tunes in hanc arborem transmutari.

XIII. Mippi nonnullis Indis Caiahaba, quæ ossium fracturis alligata ea ferruminare solet, Clus. ex. l. 4. c. 14.

XIV. Cereus Peruanus spinosus fructu rubro nucis magnitudine.

Cardui species, quem Christiani Cereum appellant, Oviedo.

Euphorbij arbor Cerei effigie, Ad. Lob. ico.

Euphorbium, Cast. ico.

Cereus spinosus, Lugd. Ger.

Cereus Peruvianus, Tab.

Stipites spinosi hæc altitudine, Linsc. 4. part. Ind. Orient. fig. 21.

XV. Ficus Indica lævis pilosa: hæc ex Creta missa: eaq; duplex, altera folio rotundo, altera folio oblongo.

XVI. Ficus Indica humilis: hanc ex horto Doctoris Saltzmanni Poliatri & Profess. Argentinensis habeo, quæ pedem vix superat, ramis est reflexis & veluti repentibus, flore magno, luteo: de qua in historia.

Ficus Indica minima, alijs Lichen marinus, vel Opuntia marina, de Bry.

SYCO.

SYCOMORUS.

Sυνέμορον, aliqui etiam συνέμορον vocant, est arbor magna, fico similis, largo succo abundans, folijs Mori: fructum ter quaterve anno proferens, non è summi ramis, sed è caudice ipso *τερεσ* id est, caprifico similem, grossius dulciorem, sine granis interioribus, Diosc. l. i. c. 181. At Theoph. l. i. h. i. c. 23. συνέμορον & σύμμορον: peculiaris vel maxime ortus, si quoniam fructus caudici profiliat, ut Moro Aegyptia: hanc enim ex caudice ferre nonnulli affirmant: alij grandibus ex ramis eam fructificare: & 4. h. i. c. 2. & similis quodammodo moro nostrati est, quippe folio magnitudine aspectuq; proxima: pomum est magnitudine ficus, granis internis carens, & c. Plinia l. 23. c. 8. Mora in Aegypto & Cypro sui generis, largo succo abundant, summo cortice desquamato & c. & l. 13. c. 7. eadem fere qua Theoph. habet, Ficum Aegyptiam vocans.

I. Ficus folio Mori, fructum in caudice ferens.
Sycomorus, Matth. Dod. ut: Lac. Lon. Ad. (sive Moroficus) Lob. Cast. Lugd. Tab. Ger.
Sycomorus, Ficus Pharaonis, vocant, Bellon. Gesn. hort.
Sycomorus Giumetz appellata, Alpino.
Pothel Theveti, Lugd.
Sycamine Theoph. Casf.
Ficus Aegyptia, Rauvvolf.

II. Ficus folio Sycomori, fructum non in caudice gerens.
Συνή & *νύμφη* gignitur, arbor specie differens, quippe quæ Ulinus cum sit, folia Sycamini refert: fructum verò gerit prunorum magnitudine, & quam pruna ipsa dulciorem, Dioscorides, lib. i. cap. 82.

Ficui Aegyptiæ similis quadantenus, quæ vocatur Cypria ficus in Creta: nam & illa in caudice ipso fert pomum, & ramis cum in crassitudine adolevere: sed hæc germina emittit sine ullis folijs radice similia, & c. Plin. l. 13. c. 7.
Ficus Cypria in Sycomori genere, Matth.
Sycomorus in Cypro, Cord. in Diosc.
Ficus cypria, Dioscoridis, Sycomorus Græcorum, Mumeitz Arabum, Rauvvolf. Lugdun. append.

III. Sycomorus folijs minoribus.
Sycomoro similis fructu flavesciente sine granis in Mayo insula: 4. part. Ind. or. fig. 19.

IV. Ambulon, Scalig. Lugd. Arch. in insula fert arborem, cujus è cortice fructus exit candidus, saccharite specie, & magnitudine coriandri, Ambulon ei nomen est.

MORUS.

Quæ arbor *Μορέα* à *συνάμωρον* Latinis Morus, fructus *μείζων* à *συνάμωρον* Morum dicitur. Diosc. l. i. c. 180. arbor est nota: at Theoph. l. i. h. i. c. 15. Sycaminos (Morus Gaz. c.) serotina germine esse solet, sed nihilo tardius quam alia folia deperdit: l. i. h. i. c. 19. succus vinosus est: l. i. h. i. c. 21. flores sunt lanuginei, & c. Plinio l. 15. c. 24. nec alio modo quam pomi magnitudine differunt mora Ostiensis & Tusculana: & l. 16. c. 22. arborum dicta sapientissima, quia novissima urbanarum germinat, nec nisi exacto frigore: quare l. 18. c. 27. cum germinare videris Morum, injuriam postea frigoris timere nolito.

I. Morus fructu nigro.
Morus, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dod. ut: Lac. Turn. Lon. Rauvvolf. Adv. Casf. Lugd. Tabern.
Ger. vulgaris, Cam.
Morus arbor fructu nigro, Gesn. hort.
Morus nigra, Cord. in Diosc. Bellon. Cast.
Morus rubra, Ang.
Morus cella officinis, Lob.
Celsa quasi excelsa dicitur, ad differentiâ Rubi, cujus fructus etiam Mora, sed bati, dicuntur.

II. Morus fructu albo.
Morus alba, Matth. Ang. Gesn. hort. Lac. Adv.

Cast. Lugd. Cam. Tab. Ger. Rauvvolf. cui Tut Tripolitanis.
Morus alba, Gallis perperam Sycomorus, Bell.
Morus candida, Cord. in Diosc. Dod. Lob.
Morus primum ex Hispania in Indiam propter bombyces illata: part. 9. Ind. occid. l. 4. c. 32.
Hæc non solum colore & magnitudine, sed etiam sapore à nigris differunt. Folia in hac quando adhuc humilis est, laciniata & altius insecta habet, & non secus in nigra, quæ Chamæmorus augmenti tarditate tantum à vulgari discrepans, Cam.

A R B U T U S.

Arbutus Dioscoridi l. i. c. 175. *ἀρβυτὸν*, arbor est cydonia a similis, tenui cortice, fructum habens pruni magnitudine, nuclei expertem, quem *μυρύνωρ* vocant, qui ubi maturuit subfulvus, aut rubicundus est. Theoph. 3. hist. 16. Comarus, quae nemecylum cibo idoneum ferat, magnitudine non nimium prestat: corticem tenuem tamarici similem habet: folium inter ilicem & laurum: flores singulari appendice parte postrema racemati coherent, specie quisque myrto oblongo similis, non foliatus, concavus, tanquam ovum exsculptum ore aperto, &c. Plinio l. 15. c. 24. pomum duobus nominibus appellant Graeci, Comarum & Memecylon, & apud nos alio nomine Arbutus, &c. & l. 23. c. 8. Arbutus sive Unedo, fructum fert difficilis concoctionis.

I. Arbutus folio ferrato.

Arbutus, Matth. Dod. ut: Bellon. Cord. in Dioscorid. Gesn. hort. Lac. Turn. Lon. Rauvvolff. Clus. hisp. & hist. Cæsalp. Castor. Lugd. Tabern. Camer. Gerard.

Arbutus Theophrasti, non Dioscoridis, Ang. Oinarum & Conarum sive Arbutus & Unedo Theoph. Guil. pap.

Arbutus sive Unedo, Adv. (Galeno perperam Epimelis) Lob.

Arbor vastae magnitudinis in Creta, cum alibi fruticet, Bellonio monente: & in fructu differentia, quidam parvi mali magnitudine, rubore magis nigricante, mollior & suavior in mediterraneis: quidam avellanæ magnitudine, flavior & asperior, in maritimis tractibus, Cæf.

II. Arbutus folio non ferrato.

Andrachnes, Bellonio.

Ἀδράχνης Cretenesium, Hon. Belli apud Clusium. Adrachne Theophrasti, Clus. hist.

Ἀδράχνης (Portulaca aliquando, potulaca

Gazæ) folio Arbuti similis est, magnitudine non nimium prestant, cortice albo circumrumpi solito, fructum arbuti similem parit, Theophrast. 3. hist. 16. Adrachne sylv. arbor est, similis Unedoni, folio tantum minore, & nunquam decidente, cortice non scabro quidem, sed qui circumgelatus videri possit, Plin. l. 13. c. 22.

Arbuti folio exotica.

I. Jambolones, Garziæ.

Jambolins, Acoftæ, Frag. Lugd.

Jambolyn, Palud. in Linsc. 4. part. Ind. or. 10.

Arbutum simile Myrto, Garz. Frag. folijs Arbuti (folijs oxyacanthæ Paludano) fructu olivæ Cordubensis simili, qui muria conditur.

II. Carandas, Garziæ.

Caranda, Frag.

Auzuba, Oviedo, Frag. at Clusius, Carandæ ferè similem Oviedum describere, ait.

Fructu est exiguo malo persimili, gratissimo uvarum sapore, qui muria, etiam aceto, tum in continente, tum in Balagate conditur.

L A U R U S.

Ladonem, Ladoniam filiam formosissimam fuisse, Poëta fabulantur, quam cum Apollo deperiret, & ut potiretur celeri cursu fugienti instaret, ab eo tandem capta, matrem tellurem precatur, ut in sinum se suum reciperet. Voris de precibus tellus excitata, confestim arborem edidit. Re confecta deterritus Apollo, arborem gentili nomine donavit, & vulso ramo sese coronavit. *Ἰαφύς* ipsa arbor, & bacca *λαυρίδης* Dioscoridi lib. 1. cap. 106. dicuntur, qui aliam folio tenuiore, alteram latiore scribit: & Theoph. (qui hinc inde multa de Lauro habet) 3. hist. 12. alia est tenuifolia, figura similis Sorbi: & 3. hist. 13. latifolia, folium molle atque oblongum habet, sicut Sambucus: & 3. hist. 8. Laurus uvam producit & fructifera est, quanquam non omnis sed genus quoddam, verum sterilis copiosius, quam masculam nonnulli appellant. Plinius lib. 15. cap. 13. Lauri genera tradens, meminit ejus quam Muscæon vocat, folio maximo, flaccidoq; & albicante. Delphica, quæ aequali colore, viridior, maximis baccis è viridi rubentibus. Cypria, quæ folio brevi, nigro, per margines imbricato, crispâ. Tini, quæ aliquibus sylvestris Laurus, cerulea bacca. Regia, quæ amplissima & arbore & folio. Baccalia, quæ vulgarissima est, baccarumq; fertilissima. Sterilis, quæ triumphalis sit. Affert & alia genera, nomine potius, quam generis societate communicantia.

I. Laurus latifolia *μαυρίφη* Diosc.

Laurus regia amplissima, Plinio.

Laurus latiore folio, Matth. Cast. Lugd.

Laurus latifolia, Cord. in Diosc. Bellon.

Laurus regia folijs ad Malum Medicam accidentibus, Cæsalp.

Laurus latifolia mas (quæ sterilis & fœmina)

II. Laurus vulgaris.

(Tab. Laurus, Brunf. Trag. Dod. gal. Gesn. hort. Lac.

Lon. Lob. Eyft.

Laurus tenuifol. Matth. Cord. in Diosc. Lugd.

Cast. Cam.

Laurus

Laurus altera species, Dod.

Laurus vulgarior baccifera, Adv.

Laur. mas (que sterilis & femina) Tab. & Ger.

Præter has Tabernæmontanus pingit

Laurum tenuifoliam marem.

Laurum tenuifoliam bacciferam, quæ Laurus mas, Gerard.

Laurum angustifoliam marem.

Laurus quædam florēt tantum flore copioso racemoso, uvam Theoph. vocat, & fructum non fert: alia fructum fert, in quo etiam differentia: alterius, in rotundo modicè oblongus est: alterius oblongus, gracilis & utrinque ovato mucrone turbinatus. Lauros alibi frutescentes, in Achon monte ingentes arbores fieri Bellonius scribit, qui in Græcia quinque genera notavit. Et in Indiæ occidentalis insulis Nicaragua, & nova Hispania Lauri venustæ & editæ exurgunt.

Laurus sylvestris.

Laurus sylvestris *Διόσκ. & γλ. x* Theoph. 1. hist. 15. inter perpetuè virentes è sylvestribus: Plinius 15. c. 30. huius inter Lauri genera meminit, inquit: Tinus, hanc sylvestrem Laurum aliqui intelligunt, nonnulli sui generis arborem, cui cærulea est bacca: & M. Cato lib. de re rust. 8. Lauri sylvatici nomine intelligere videtur.

I. Laurus syl. Corni feminae folijs subhirsutis.

Tinus primus, Ang. Cl. hisp. & hist. Cam. Tab.

Laurus sylv. five Tinus, Gefn. hort. Cam.

Laurus tinus cærulea bacca, Adv. Lob. ico.

Tinus, laurus sylv. Cam. ep.

Laurus tinus Dalechampij, Lugd. (Lob.)

Tini aliud genus Corni feminae proceritate, Lentago, Cæsalp.

II. Laurus sylv. folijs venosis.

Tinus secundus Clus. hisp. hist. Lugd.

Tinus, Laurus sylv. Dod.

Tinus Lusitanica Clusij, Lob. Tab.

Thinnus, Cast. append.

Laurus tinus Lusitanica, Ger.

III. Laurus sylv. folio minore.

Laurus sylvatica, Ang.

Tinus five Laurus inodora & Italarum Lentago, Bellon.

Tinus tertius, Clus. hisp. & hist. Lugd.

Laurus regia, Cast.

Tinus alter, Tab.

Laurus tinus, Ger.

Lauri folio exotica.

I. Laurifolia Magellanica cortice acri.

Cortex Winteranus, Clus. Lugd. Tab.

Lauro similis arbor, cortice piperis modo acri

in Pinguinum insula: 9. part. Ind. occid.

Cortices acerrimi: in 9. part. Ind. occid. addit.

Magellanica aromatica arbor, Clus. exot.

II. Laurifolia Americana, pomis capitis magnitudine.

Cohyne in America Theveto, Lugd.

Maraka & Tamaraka fructus, Cl. notis in Garz.

Arbor fructu Scruthiocameli ovum adæquante,

Lerio par. 3. Ind. occid. c. 7. & 12. arbor Choyne.

Fructus instar Cucurbitæ, per quæ baculū figunt,

& Tamaraka instrumentū fit, Stad. in def. Brasil.

Ex fructu non eduli pocula conficiunt: Brasiliiani perforato, lapillis aut milio inditis, pro crepitaculo utuntur, quod instrumentum Maraca nominare, Lerus cap. 15. refert.

III. Laurifolia Javanensis.

Mangestans folijs laurinis fructu exigui mali

aurei suavissimi, Garzie & Clus. qui addit folia

mali formam magis referre.

Mangostans prunorum sylv. modo crescit: 4.

part. Ind. or. 6. sed figura, quæ tab. 15. habetur est

Ligustri Ægyptiaci.

IV. Laurifolia Guinenensis.

Arbor peregrina ex Guinea, Clus. exot. 1. 1. c. 9.

Fructus instar mali magni ex flavo spadiceus,

nigro polline plenus.

V. Laurifolia Guinenensis altera.

Arbor peregrina Laurocerasi folio, an Bravas,

Clus. exot. 1. 1. c. 12.

VI. Laurifolia Terenatenensis.

Beretinus fructus, Clus. exot. 1. 2. c. 17. Tab.

Beretinus arbor, Lugd.

LAUREOLA.

L aureola à similitudine cum Lauri folijs dicitur, quæ mas est & femina, & à Dioscoride 1. 4. c. 148. & 149. sub Chamædaphne & Daphnoide proponi à multis creditur. *Χαμαδάφνη* virgas promit singulari ramulo constantes, cubitales, rectas, tenues, ac leves: & huic folia similia Lauro, at leviora multo & tenuiora. & viridiora: fructus verò rotundus rubens folijs annexus. *Δαφνοειδής* fruticulus est cubitalis, ramos multos habens à medio sursum modo flexiles & foliosos: cortex verò circa virgas viscosus valde: folia Lauro similia, at molliora, validiora & fractu contumacia, mordentia & accendentia os & fauces: flores candidi: fructus verò nigri.

Mmm 3

ubi

ubi ematuruit: radix supervacua. Plinio l. 15. c. 30. est & Chamædaphne sylv. frutex: & l. 24. c. 15. Chamædaphne unico ramulo est, cubitali fere folio tenui, lauri similitudine: semen rubens. At Daphnoidem Lauri genus fecit: sic enim l. 15. c. 30. Daphnoides frutex est ramosus, crassiore ac molliore quam Laurus folio, cuius gustatu accenditur os atque guttur: baccis nigro rufis: & l. 23. c. 8. Daphnoides sylvestris Laurus est.

I. Laureola semper virens flore viridi, quibusdam Laureola mas.
Thymelæa folijs viridibus, Mesuæo.
Laureola, Brunf. Gesn. hort. Dod.
Thymelæa, Trag.
an Chamædaphne, Matth. Lac. Lon. Cast. cui & Laureola minor.
Daphnoides, Dod. gal. Ang. Gesn. hort. Tab. cui & Daphnoides alterum genus.
Daphnoides five Laureola, Adv. Lob. Lugd.
Daphnoides Dioscoridis, Cef. cui & Mezereon, Arabum.

Baccis rubris dicit Matthioli: nigris in Silesia Camerarius.

II. Laureola folio deciduo flore purpureo: officinis Laureola femina.
Chamælea five Mezereon, Trag.
Chamælea Germanica, Dod. ut: Cam. Thal.
Daphnoides, Fuch. Turn. Cam. ep. flore purpureo, Tab.
an Daphnoides, Matth.

CHAMELÆA.

Xαμelaia, quæ Latinis etiam Chamelæa, quasi humilis olea, à similitudine cum Olea, & Oleago, & Oleastella: Mauritanis & hac Thymelæa, & præcedens Laureola, Mezereon dicitur. Dioscoridi l. 4. c. 172. ramos habet dodrantales, frutex est è cremiorum genere, folia habet olea similia ac tenuiora & densa & amara, quæ gustum mordent, & arteriam abradunt. At Plinio l. 15. c. 7. Chamelæa frutex furculosus, non altior palmo, folijs Oleastri baccisq. & l. 24. c. 15.

I. Chamelæa tricoccus.
Thymelæa folijs magnis & tenuibus, Mesuæo.
Chamelæa latifolia vel alba, Serapioni.
Chamelæa, Matth. Dod. ut: Lac. Cord. in Diosc.
Bellon. Gesn. hort. & app. Lon. Clus. hisp. tricoccus, in hist. Lob. Cef. Cast. Lug. qui figuram Matthioli & Dodonæi exhibet.
Thymelæa, Ang.
Mezereon Arabum, Ad. Lob. ico. tricoccus, Tab.

Chamelæa vera, Cam.

Flores pallidi, aut lutei: Hispanica candidior & brevior ipsa Gallica.

II. Chamelæa alpina folio inferne incano.
Chamelæa, Cneorō Galeni, Alypias Aëtii, Ang.
Chamelæa alpina incana, Ad. Lob. ico. Lugd.
Chamelæa incana Bononiensium, Lob.
Chamelæa altera, Clus. hisp. & hist.
an Chamelæa altera folio duro, Cef.

THYMELÆA.

Θυμelaia, quæ & Latinis Thymelæa, quasi Tithymelæa, ex Tithymalo & olea mixta facie, quam aliqui Diosc. lib. 2. cap. 173. scribente, Chameleam aut Cneoron vocant, ex quo Gnidium granum, quod ipsum semen est colligitur: hæc, ut idem, virgas edit speciosas, numerosas, tenues, bicubitales: folijs Chamelæa sed angustioribus & pinguioribus: floribus candidis, ac inter ipsos fructu ceu myrti parvo rotundo, &c. Plinio lib. 13. cap. 21. & in quo nascitur granum Gnidium, quod aliqui linum vocant: fruticem verò Thymelæam, alij Chameleam: est similis oleastro, folijs angustioribus, gummosi si mordeantur, myrti magnitudine semine, colore & specie saris, ad medicina tantum usum.

I. Thy-

I. Thymelæa folijs lini.

Thymelæa folijs parvis, Mesuæ.

Chamelæa tenuifolia & nigra, Serapioni.

Thymelæa, Matth. Dod. ut: Lac. Bellon (cui & coccum gnidium) Lon. Clus. hisp. & hist. Lob. Cæf. Cast. Lugd. qui tres figuras apposuit.

Thymelæa, Matth. ep. quoad folia, non fructum qui Chamelææ est.

Thymelæa vera, Gesn. hort.

Thymelæa grani Gnidij, Ad. Lob. ico.

Thymelæa 1. & 2. Tab. nam Matthioli & Clusij figuram exhibet.

an Thymelæa folijs lini, Cam.

Keruep. (Casiam Gaza vertic) Theophr. 6. hist. 2. esse, cuius duo genera proposuit, Guilandinus voluit, alterum Chamelæam, alterum Thymelæam.

II. Thymelæa folijs acutis capitulo Succisæ, five Alypum Monspeliensium.

Alypum montis Ceti, five herba terribilis Narbonensium, Adv. Lob.

Alypum Penæ, Lugd. Tab.

Empetron phacoides, Lugd.

Hippoglossum Valentinum, Clus. hisp. & hist. Tabernæm.

an Alypum, Matth. Lac. Cam. Lugd. & Alipia, Lon. quia Pena dicit apud Matthiolum picturam corruptam esse.

III. Thymelæa folijs polygalæ glabris.

Sanamunda viridis vel glabra, in Prodomo. Thymelææ species Myconi, Lugd.

IV. Thymelæa folijs Chamelææ minoribus subhirsutis.

Sanamunda prima, Clus. hisp. & hist. Rauvolf. Lob. Cast. Tab.

V. Thymelæa folijs Kali lanuginosis falsis.

Empetron, Ang.

Sanamunda 2. Clus. hisp. & hist. Lob. Cast. Tab.

Cneoron, Cæsalp.

Cneoron nigrum Myconi, Lugd.

Sesamoides minus Dalechamp. Lugd.

Phacoides Oribasij quibusdam, Eid.

VI. Thymelæa folijs candicantibus serici instar mollibus.

Tartonnraire Galloprovinciæ Massiliensium, Adv. Lob. ico.

Sesamoides majus multorum Dalechampi, Lug.

Sesamoides majus Scaligeri, Tab.

Sunt qui cum sequenti eandem velint.

VII. Thymelæa tomentosa folijs Sedi minoris.

Sanamunda 3. Clus. hisp. & hist. Cast.

Cneoron Pantij.

Erica Alexandrina, Lob. Tab.

Sanamunda vocat Clusius, Granatenses Mauritanos imitatus, quia his ad corpus purgandum frequenter utuntur: & quia Thymelææ facultatibus pollent, huc retulimus.

C N E O R O N.

Cneorum de multis plantis dici, non modo Plinius lib. 13. c. 21. testis est, qui Thymelæam Cneoron à quibusdam appellari scripsit: & lib. 21. c. 9. Casiam ab Hygino vocari: & mox, Cneori duo genera sunt nigri atq. candidi, hoc & odoratum, ramosa ambo, florent post æquinoctium Autumni: quæ ex Theophr. translata. Sed recentiores alij ad Laureolam, alij ad Chamelæam & Thymelæam: alij ad Rosmarinum, alij ad alios referunt. Theophr. 6. hist. 2. Cneoron (Casiam vertit Gaza) inquit genera duo, unum album, alterum nigrum: albo folium est cutaneum, oblongum, figura oleæ quod immo simile: nigro, quale tamarici, carnosum. Album supra terram minus se attollit, & parum quid olet: nigrum valde odoratum est: radix utriusq. in profundum descendit magna: rami multi, breves & lignosi, qui à terra, vel paulo supra dividuntur, lenti admodum. &c. Et Guiland. Cneorum utrumq. Chamelæam & Thymelæam esse, ex Aretæ, Dioscoridis, Galeni, Aetij & Plinij traditione statuit.

I. Thymelææ affinis facie externa.

Cneoron, Matthiolo cap. de Cinam.

Cneoron alterum Matthioli } Lugd.

Oleander sylv. Avic. Myconi }

Cneoron Matthioli, Clus. pan. & hist. Cam.

Casia Matthioli, Chamelææ species, Tab.

Thymelæa minor, Cord. hist.

II. Cneoron album folio oleæ argenteo molli.

Cneoron album Dalechampi, Lugd.

Dorycnium, Imperati.

Dorycnium ex Sicilia, Cæf. em. bo. pisti.

Dorycnium verum Plateau, Clus. hist. ap. i.

Dorycnium quorundam seu potius Convolutus rectus Creticus, Ponæ Ital.

III. Cneoro albo affinis.

Dorycnium forte Dioscoridis, Ponæ Ital.

NERI-

N E R I O N

N *Ἡριον ἢ ποδὸς ἀνδρῶν* Græci vocant: alij *πόδος ἀνδρῶν*, à flore rose simili & folijs laurinis: quare Apuleio, Rosa laurea. Rhododendros, inquit Plinius l. 24. c. 11. quia ne nomen quidem apud nos Latinum invenit, Rhododaphnen vocant, aut Nerium. Dioscor. l. 4. c. 82. frutex est folijs amygdalini longioribus & crassioribus, flore roseo & siliqua fructui amygdalino proxima, quæ debescens lanosa natura, acanthi pappos repræsentante plena reperitur, &c. Plinio l. 16. c. 20. Nerion sempiterna fronde, rosea similitudine, caulibus fruticosum.

I. Nerion floribus rubescentibus.
Nerion, Trag. Cord. in Diosc. Ad. Lob. Tab. flore rubro, Eyll.
Nerium, Matth. Fuch. Dod. gal. Turn. (qui 1. & 2. habet) Gesn. hort. Lac. Lon. Cast. Lugd.
Oleander flore rubro, Ang.
Oleander, Deste circa Tripolim, Rauvvolf.
Rhododendron, Bellon. Gesn. hor. Dod.
Oleander, Laurus rosea, Lob. ico.
Rhododaphne, Gesn. hort. Cæs.
Nerion five Rhododaphne, Cam.
In nonnullis Cretæ Insulis ad ædicularum

trabes conficiendas aptum est, cum alibi parvum sit, Bellon.

II. Nerion florib. albis: & Lob. Lug. Tab. Cam. Nerion candidis floribus in montis Idæ con-

vallibus, Bellon.

Oleander flore albo, Ang.

Nerium five Rhododendron flore albo, Eyll.

III. Nerio similis arbor: & Tab.

Nerij facie arbor, Ad. Lob. Lugd. apud quem ti-

tulus transpositus est.

IV. Fructus Nerij filiquæ figura.

Kaye Baka, Clus. exot. l. 3. c. 19.

S E C T I O S E C U N D A.

CISTUS; CHAMÆCISTUS; LEDUM; LEDUM

ALPINUM.

C I S T U S.

K *ἱστὸς, ἡλὸς ἢ ἡλὸς ἀνδρῶν*, Latinis similiter Cistus & Cisthus dicitur sorte quod ejus species aliqua nior, id est, Hedera, folijs rotundis sit.

Genera duo: Cistus non ladanifer, & Cistus ladanifer, qui Ledum dicitur. Cistus Dioscoridi lib. 1. cap. 126. frutex est ramosus, foliosus, non altus: folia habens rotunda, nigra, hirsuta: flores masculo, veluti mali punice, femina vero albi. Plinius l. 24. c. 10. sic ait. Græci vicino hedera vocabulo, Cisthon appellant fruticem majorem. Thymo, folijs ocimi. Duo ejus genera, flos masculo rosaceus, femina albus. Verum Plinius Cisthum cum Cisso, id est, Hedera, confundit, Theophrasti 6. hist. l. lectione immendata, ubi nior pro nigrs habetur, deceptus: & Galen. Hederam pro Cisto reddidit.

Cistus mas.

I. Cistus mas folio rotundo hirsutissimo.

Cistus mas, Matth. ep. Ang. Tur. Lac. Lon.

Cistus, Cæs. mas 4. Clus. hisp. & hist. Lugd.

Cistus mas folio rotundiore Matthioli, Lugd.

II. Cistus mas folio oblongo incano.

Cistus mas, Gesn. hor. Ad. Lob. Cam.

Cistus, Dod. mas 1. Clus. hisp. & hist. Lugd.

Cisti alterum genus, Cæs.

Cistus mas latifolius, Tab.

Flos colore rubro est, eoq; nunc saturatiore, nunc dilutiore.

III. Cistus mas angustifolius.

Cistus mas 2. Clus. hisp. & hist. Lugd.

Cistus mas angustifolius 2. Clusij, Lob.

Cistus mas angustifolius, Tab.

IV. Cistus mas folio breviori.

Cistus mas 3. Clus. hisp. & hist. Lob. Lugd.

V. Cistus mas folijs Chamædrys.

Cistus mas 4. Clus. hisp. & hist. Lob. ico. Lugd.

Cistus mas supinus sinuatis & fimbriatis folijs,

Lobel.

Cistus mas tertius, Tab.

Cistus femina.

I. Cistus femina folio Salviæ.

Cistus, Cord. in Diosc. Cæs.

Cistus

Cistus fœmina, Matth. Dod. ut: Ang. Gef. hort. Lacun. Turn. Lonic. Adv. Lob. Clus. hisp. & hist. Castor. Camer. & Lugdun. qui & Matthioli & Clusij figuram exhibet, ut & Tabernæmontanus.

Cistus flore albo, Rauvvolf.

Variat: est enim clarior & rectis virgis: est & supinus humi sparsus: in utroq; flos candidus, quandoq; luteus ochræ colore.

II. Cistus folio plantaginis.

Tuberaria major Myconi, Lugd.

Majorem & minorem Lugdunensis pingit.

III. Cistus fœmina portulacæ marinæ folio, latiore obruto.

Cistus folio halimi primus, Clus. hisp. & hist.

Lugd. Tab.

Cistus fœmina folio portulacæ marinæ, sive Cithmi, Lob.

IV. Cistus fœmina portulacæ marinæ folio angustiore mucronato.

Cistus folio halimi secundus, Clus. hisp. & hist. Lob. Lugd. Tab.

V. Cistus folio spicæ.

Cistus folio lavendulæ, Clus. hisp. & hist. Lob. Lugdun.

Cistus, Tabern.

VI. Cistus folio Sampfuchi incano.

Cistus folio Sampfuci, Clus. hisp. & hist. Lob. Lugdun.

VII. Cistus folio Stechadis citrinæ.

VIII. Cistus folio Majoranæ.

Cistus folio majoranæ defluxis floribus, Adv. Lob. icon.

Helianthes species Penæ, Lugd.

IX. Cistus folio Thymj: & Clus. hisp. & hist. Lob. Lugd. Tab.

X. Cistus folio Salicis.

Cistus annuus primus, Clus. hisp. & hist. Lugd.

an Hydrophyllon herba Athenæi, Clus.

Cistus annuus folio Salicis, Lob.

Cistus annuus, Tab.

Variat: primò folijs amplioribus, floribus majoribus: secundò folijs angustioribus, floribus minoribus.

XI. Cistus flore pallido punicante macula insignito.

Cistus annuus secundus, Clus. hisp. & hist. Lugd.

Cistus annuus guttato flore, Ponæ.

Helianthemum flore maculoso, Colum.

Variat: est enim flore maculoso, macula ex nigro rufescente, sive puniceo: vel non maculoso.

XII. Cistus Ledi folio.

Cistus annuus folio Ledi, Lob. Tab.

Cistus annuus alter Lobelij, Lugd.

Alyssum trigonum, Eidem.

XIII. Cisti folio arbor exotica.

Arbor exotica Cisti folio, Ad. Lob. ico.

Cisti vel Ledi arbor peregrina Penæ, Lugd.

Arbor cisti folio, Lob.

Cisti folio exotica arbor, Tab.

Cistus exotica, Ger.

H Y P O C I S T I S.

Cum è Cisti radicibus, veluti germen quoddam expullulet, id quod Hypocistis dicitur, de eo paucis, Cisti, inquit Diosc. l. c. 127. radicibus adnascitur, quod ~~arboris~~ dicitur, nonnullis ~~pocistis~~, à ~~neris~~, & mali puniceo cyrino simile est: quædam rufa: altera herbacea, tertia candida cernitur.

Hypocistis sub Cisto.

Hypocistis, Matth. Dod. gal. Ang. Cord. in Diosc. Lon. Cast. Cæs. Clus. hisp. & hist. Ad. Lob. Lugd. Tab. Gerard.

Limodori genus, quod Hypocistis, Dod.

Succus qui extrahitur, etiam Hypocistis & officinis Hypocistidos, dicitur.

Sub Cisto Hispanico, rubram: sub Cisto folio halimi, luteam: & sub Ledo quem octavo loco recensuimus, varij coloris, pallescente, lineis purpurascens & nonnihil virescentibus distincto Clusius notavit: & hanc posteriorem ~~apocistis~~ sive Cynomori genus nuncupat.

C H A M Æ C I S T U S.

I. Chamæcistus vulgaris flore luteo.

Hyssopus campestris, Trag.

Panax Chironium, sive flos solis, Matth. Cast. Lugdun.

Panax Chironium quorundam, Ang.

Gratia Dei, Dod. gal. Gefn. hort. cui & Hyssopoides.

Helianthemum, Cord. hist. Lob. Thal. flore luteo, Eystet.

Consolida aurea Chirurgis, Cordi schol.

N n n

Hyssop-

Hyssopus montanus sive *sylv.* Lon.

Flos folis, Dod. (cui & *Cisti* & *Ledi* quædam species) Cast. Cam.

Helianthemum vulgo dictum, Clus. hisp.

Helianthemum Plinij, Clus. pan.

Chamæcistus primus, Clus. hist. qui ad *Cisti* formæ tertiam classem reducit.

Helianthemum Germanicum secundum, Tab.

Helianthemum sive *flos folis*, Lugd.

Chironia, Cæs.

Hoc quibusdam *Panax Chironium* Dioscor. creditur. *παύανος χαρίωνος* folia habet amaraco similia, flores aureos, radicem tenuem, neq; altam, gustu acrem: sic Dioscorid. lib. 3. cap. 37. Ab alijs *Helianthe* Plinij lib. 24. cap. 17. censetur: *Helianthen* scribit vocari in Themiscyra regione, & Ciliciæ montibus maritimis folio myrti, sed quid in hac brevitate pronunciare licet?

II. *Chamæcistus vulgaris* flore albo majore.

Helianthemum albis floribus, Lob. ico. Eyf.

Chironia flore candido, Cæs.

Helenium minus Dioscoridis, Lugd.

A priori differt floris colore albo, ejusq; magnitudine, *Ladani* specie.

III. *Chamæcistus Friscus* folijs *Nardi Celricæ*.

Hirculus Friscus *Dortmanni*, qui *Chamæcisti* genus, Clus. cyr. post.

Hunc à *Dortmanno* quoq; accepimus.

IV. *Chamæcistus* folijs minoribus & incanis.

Flos folis, Lob. Dod. utriq; quoad iconem.

Cistus humilis primus, Clus. hisp.

Helianthos sive *Flos folis*, Ad.

Cistus parvus Clusij, Lob.

Chironiæ aliud genus, Cæs.

Chamæcistus quintus, Clus. hist. ico. at 4. descr.

Helianthemum secundum sativum, Tab.

Helianthemum Anglicum luteum, Ger.

V. *Chamæcistus* folijs *Thymi* incanis,

Panax chironium minus, Cam. ep.

Chrysanthemis, *Erica minima*, Ad.

Cistus humilis angustifolius, } Lob.

Erica chrysanthemus minor, }

Cistus humilis secundus, Clus. hisp. Lob. ico.

Chamæcistus quintus, Clus. hist. desc. at quart. icone.

Helianthemum peregrinū angustifolium, Tabern. Ger.

Huc referatur

Helianthemum Germanicum 3. Tab.

Helianthemum album Germanicum, Ger.

VI. *Chamæcistus quadrifolia*.

Helianthemum Sabaudicum, Tab. Ger.

VII. *Chamæcistus* folijs myrti minoris incanis.

Chamæcistus secundus, Clus. pan. 3. Eid. hist.

Cistus humilis latifolius, Tab. Ger.

VIII. *Chamæcistus angustifolia*.

Chamæcistus primus angustifolius, Clus. pan.

Chamæcistus sextus, Eid. hist.

Cistus humilis angustifolia, Tab. Ger.

IX. *Chamæcistus* serpillifolia floribus carneis.

an *Rosa alpina* altera folijs minimis, Ges. hor.

Alpina altera, Ad.

Anonymus altera, Clus. pan.

Chamæcistus septimus, Clus. hist.

X. *Chamæcistus hirsuta*.

Chamæcistus quartus, Clus. pan. 8. Eid. hist.

Cistus humilis Austriaca, Tab. Ger.

XI. *Chamæcistus repens* serpillifolia lutea.

Chamæcistus tertius, Clus. pan. 2. in hist.

Cistus humilis serpillifolia, Tab. Ger.

XII. *Chamæcistus ericæ* folio luteus.

Cori similimus frutex in maritimis, Cæs.

Erica chrysanthemus, Lugd.

Coris Dioscoridis *Guilandino* dicebatur.

Hujus duæ species altera brevioribus folijs & humilior, altera quadruplo longioribus & elatior.

CISTUS LEDUM

Cisti alterum genus, inquit Dioscorides l. 1. c. 128. à nonnullis *λᾶδον* appellatum, frutex eodem quo *Cistus* modo nascens, sed folijs longioribus ac nigrioribus, quæ pingue quidpiam verno tempore contrahunt, ex quo *λᾶδον* conficitur. Plinio l. 12. c. 17. sunt qui herbam in Cypro ex qua *Ladanum* fiat, *Ledon* appellant: etenim illi *Ledanum* vocant, huic pingue insidere, &c. *Ladanum* esse cespitem hircorum barbis genibusq; villosis inherens, &c. *Ladani* colligendi rationem Dioscorides & Plinius l. c. referunt: quomodo vero in Creta colligatur, *Ballanius* l. 1. observ. c. 7. & ex eo Clusius descripsit.

I. *Cistus*

I. Cistus ladanifera Monspelienſium.

Ledum, Matth. ep. Lac. Caſt. Lugd. Tab.

Ladanum, Matth. Ang. Caſt. Tab.

Cifti ſpecies ſecunda, Dod. gal.

Cistus ladanifera, Turn.

Lada & Ladon cisto ſimilis frutex, Cord. in

Dioſc. & hiſt.

Ledon alterum cifti genus, Geſn. hort.

Laudanum, Lon.

Ladanum latifolium, Rauvvolff.

Cistus ledon, latifolium, Adv. deſc.

Ledum latiore folio Italicum, Cam.

Cistus ledum Matthioli, Ger.

II. Cistus ladanifera Hiſpanica incana.

Cistus ledon, Dod.

Cistus ledon primum, Cluſ. hiſp. Lob. Lugdun.

Gerard.

Ledi ſpecies Bauhini, Lugd.

Ledon Cluſij 1. Tab.

Cistus ledon primum anguſtifolium, Cluſ. hiſt.

III. Cistus ledon folijs laurinis.

Cifti ledi 1. altera ſpecies, Cluſ. hiſp. & hiſtor.

Lobel.

Ladanum alterum, Caſt.

an Cistus maritimus, Lugd.

IV. Cistus ledon folijs populi nigrae major.

Ledon 2. Cluſ. hiſp. Lugd. Tab.

Ledon latifolium 2. majus, Cluſ. hiſt.

Cistus ledon 2. Cluſij, Lob. Ger.

V. Cistus ledon folijs populi nigrae minor.

Cifti ledi 2. altera ſpecies, Cluſ. hiſp. Lugd.

Ledon 2. latifolium minus, Cluſ. hiſt.

Cistus ledon populnea fronde alter, Lob.

Cistus ledon 3. populnea fronde, Lugd.

Cistus ledon populnea fronde, Tab. Ger.

VI. Cistus ledon Cretenſe.

an Cistus mas, Matthioli, in magnis figur. & Lugdun.

Cistus è qua Ladanum in Creta colligitur,

Bellon.

Ledon 3. Cluſ. hiſp. Lob. Lugd.

Ledon 3. Cyprium, Cluſ. hiſt.

Plantæ ex qua Ladanum Cretenſes colligunt

folijs & floribus cifti ſœminæ, Alp.

Ledon à Græco diverſum & longè majus in

monte Olympo, Bellonius notavit.

VII. Cistus ledon folio myrti.

Cistus ledon latifolium, Adv. ico.

Cistus ledon Ruſci aut Myrti folium, Lobel. icon.

Cistus ledon aliud latifolium Penæ, Lugd.

Cistus ledon myrtifolium, Tab. Ger.

VIII. Cistus ledon hirsutum.

Ledon 4. Cluſ. hiſp. & hiſt. Lob. Lugd. Tabern. Gerard.

Ledon alterum anguſtiore folio, Cam.

IX. Cistus ledon folijs oleæ ſed anguſti-
ribus.

Ledon 5. Cluſ. hiſp. & hiſt.

Cistus ledon, Adv.

Ledon Narbonenſe, Lob.

Cistus ledon Narbonenſe, Tab.

Cistus ledon Lobelij, Ger.

Cistus flore albo, Eyſt.

Huic ſimilem ſub

Cisto adulterino pingunt, Tab. & Ger.

X. Cistus ledon anguſtis folijs.

Ledon 6. Cluſ. hiſp. & hiſtor. Lob. (qui in iconi-
bus hunc cum priore junxit) Lugd.

Ledum quintum, Cluſij, Lugd. Ger.

Ledon Cluſij nonum, Tab.

XI. Cistus ledon folijs roſmarini hiſpidis.

Ledon 7. Cluſ. hiſp. & hiſt. Lob. Lugd. Tabern.

Gerard.

XII. Cistus ledon folijs roſmarini ſubtus
incanis.

Ledon octavum, Cluſ. hiſp. & hiſt. Lob. Lugd.

Ladani ſpecies folijs Roſmarini, Rauvvolff.

Ledum Cluſij quintum, Tab.

Cistus ledon ſextum, Cluſij, Ger.

XIII. Cistus ledon folijs roſmarini ſed
non incanis.

Ledon nonum, Cluſ. hiſp. & hiſt. Lob. Lugd.

Ledum Cluſij ſextum, Tab.

XIV. Cistus ledon folijs Thymi.

Ledon decimum, Cluſ. hiſp. & hiſt. Lob. Lugd.

Gerard.

Ledum Cluſij octavum, Tab.

XV. Cistus ledon folijs roſmarini ferru-
gineis.

Roſmarinum ſylv. Matth. Caſt.

Chamaepeuce, Cord. in Dioſcor. & hiſtor. deſc.

Lugdun.

Ledum folijs roſmarini alterum, Lob.

Ledum Sileſiacum, Cluſ. pan. & hiſt. Tab. Ger.

Ledum roſmarini folio, Tab. Ger.

Roſmarinum ſylv. five Bohemicum Matthioli,
Lugdun.

Rosmarinus sylv. Dod. belg.

XVI. Cistus ledon folijs salicis angustifoliae.

Chamaerhododendros montana Allobrogum

lentiscifolia, Adv. Lob. ico.

Rosmarinum sylv. minus, Cam. ep.

Rosmarinum sylv. *hoqua* } Clus. pan. & hist.

Cistus Silefiacus

Chamaerhododendros alpina angustifolia, Tabernæm.

Chamaerhododendros montana, Ger.

XVII. Myrtocistus Pennæi, Clus. pan. & hist. Gerard.

Myrtocistus Clusij, Tab.

Ledum alpinum.

I. *Ledum alpinum* hirsutum.

Alpigenæ Chamaerhododendri varietas, Lob.

Balsamum alpinum Gesneri, Lob. ico. Tabern. Camer.

Ledum alpinum, Clus. pan. & hist. Tab.

Cistus ledon alpinum, Ger.

II. *Ledum alpinum* folijs ferrea rubigine nigricantibus.

Frutex in alpihus roseo flore, Gesn. ad Cordum cap. de Chamaenerio.

Rosa alpina, Gesn. hort. & Fracto, potius *Ledum alpinum*.

Nereum alpinum, Gesn. de lunar.

Chamaerhododendros alpigena odora, Adv. Lob.

Ledi alpini genus alterum, Clus. pan. & hist.

Rhododendron alpina quibusdam, Cæs.

Evonymus Theophrasti, hist. 18. Lugd.

Chamaerhododendros alpina latifolia, Tab.

Chamaerhododendros alpigena, Ger.

Hujus ramis tubercula gallarum instar adnascuntur: & floris colore variat, communiter dilute rubentis: at in Pyrenæis, flore tantum albo reperitur.



SECTIO TERTIA

MYRTUS; RUSCUS; VITIS ET RADIX IDÆA; BUXUS;
OLEA; SALIX; AGNUS CASTUS; SPIRÆA;
Ligustrum & Phillyrea.

M Y R T U S.

MYRTUS & MURTUS Latinis: Græcis *μυρτιν* & *μυρτιν* nominatur, à Myrsine Atheniensis puella, pulchritudine & robore insigni, amica Palladi, quam juvenis ab ea cursu & palestra superatus interemit, invidia ductus, quod elegantia, ceterisque naturæ dotibus, reliquis virginibus præstaret: arbuscula in demortui locum successit, semper Minerva, ut olea chara. Græcum ei nomen remanet, ut Plinius lib. 15. cap. 29. scribit, quo peregrinam esse appareat. At quibusdam sic dicta, propter amulam Myrrhæ quandam odoris gratiam, quæ in ejus bacca recentioribus, observatur. Et Theoph. Myrti pluribus in locis meminit, nulla tamen descriptione addita.

Genera Myrti multa sunt: est sativa & sylvestris: sativa aut nigra aut candida: sylvestris alia levis alia spinosa: illa, qua sativa opponitur, itidem vel nigra, vel candida. Dioscoridi haud dubie cognita, ut cui lib. 1. cap. 155. *μυρτιν* sativa nigra, medicina utilior candida: quæ & Plinius lib. 23. cap. 9. habet. Theophrastus non videtur differentiam agnovisse, siquidem lib. 6. caus. 27. scribat, Myrtum Aegypti odoratam esse, quanquam ceteræ inodoratae sint; verum hoc propter loca servida evenire. Plinio lib. cit. alia patricia alia blebeia: addens: Catoni tria genera, nigra, candida, conjugalis: nunc & alia distinctio, sativa aut sylvestris & in utraque latifolia: in sylvestri propria oxymyrsine: sativarum genera roparij faciunt. Tarentinam folio minuro, nostratem parulo, exoticam densissimo, senis foliorum versibus: ramosa utraque alia: conjugalem existimo nunc nostratem dici: hac ille. Bacca *μύρρα* Græcis, Latinus Myrta & Murtæ, officinis Myrtilli dicuntur.

I. Myrtus communis Italica.

Myrtus, Matth. Ang. Cord. in Diosc. Gesn. hort.

append. Lon. Cæs. Lugd.

an Myrtus alba, Adv.

Myrtus communis Italica, Cam.

Alia est nigra, colore tantum fructus differens.

II. Myrtus latifolia Romana.

Myrtus nostras cum conjugali eadem, Plinio.

Myrtus

Myrtus Romana, Matth.
Myrtus major, Dod. gal. Adv.
Myrtus altera, Dod.
Myrtus sativa, Cast.
Myrtus laurea maxima, Lob.
Myrtus latifolia, Bellon. Clus. hisp. & hist.
an Myrtus exotica Plinij, Cæs.

Hanc & sterilem & fructiferam Bellonius notat.

III. Myrtus latifolia Bœtica 1. vel folijs laurinis.

Myrtus Bœtica latifolia domestica 2. Clus. hisp. & hist.

Myrtus Bœtica latifolia domestica, sive laurea secunda, Lob.

Variat: hæc enim folijs est minoribus & paulo densioribus: alia majoribus & paulo tenuioribus.

IV. Myrtus latifolia Bœtica 2. vel folijs latius confertim nascentibus.

Myrtus Bœtica latif. exotica, Clus. hisp. & hist.

V. Myrtus latifolia Belgica.

Myrti classis altera sive latifolia triplex, & Myrtus media, Clus. hist.

Varietates hujus sex Lobelius proponit.

VI. Myrtus angustifolia Bœtica.

Myrtus exotica, Matth. Cast. Lugd.

Myrtus tertia, Dod.

Myrtus Bœtica angustifolia exotica, Clus. hisp. & hist.

Myrtus exotica Plinij pluribus foliorum versibus, Lob.

an Myrr. baccis magnis cinereo cæruleis, Raul. (vvolff.)

VII. Myrtus sylvestris folijs acutissimis.

Myrtus sylv. Matth.

Myrti majoris quinta species, Lob.

Myrtus Bœtica sylv. Clus. hisp. & hist.

Myrtus latifolia, Eyst.

sub Myrti ramulo cum flore ac semine pingitur apud Dodonæum.

VIII. Myrtus folijs minimis & mucronatis.

Myrtus albis baccis in Asia, Bellon.

Myrtus domestica fructu albo, Clus. hisp. & hist.

Myrtus prior, Dod. ico.

Myrtus nona angustifolia, Lob.

Myrtus Hispanica angustissimi folij, Cæs.

Myrtus minima angustifolia, Lugd.

Hujus & altera species, folio per omnia tene-riore, exiliore & angustiore.

IX. Myrtus minor vulgaris.

Myrtus Tarentina (à Tarento Apuliæ urbe) Matth. Cast. Lugd. Cam. Clus. hist. Eyst.

Myrtus minor, Dod. gal. Adv.

Myrtus minor & Tarentina, Clus. hisp.

Myrtus minor vulgaris, Lobel. qui differentias quatuor facit.

Myrtus, Tab.

Myrtidanum ^{Myrtidanum} Dioscoridi l. 1. c. 156. est quod Myrto adnascitur, inæquabile, verrucosum & concolor: & perinde quasi manus Myrti caudicem amplectitur. Sed Plinio l. 14. c. 16. & l. 23. c. ult. Myrtidanum est vinum, ex sylvestris

Myrti baccis factum.

Myrti coccus.

Myrti excrementum sive granum kermesinum, ejusdem ferè cum Cocco baphica naturæ, Myrti minoribus ramis adnascens, unico animali vi-

vo vesiculæ incluso, Bellon.

X. Pseudomyrtus, frutex myrto admodum similis Bellon. quid?

XI. Myrtus Indica.

Avacari, Garz. Frag. Cast.

In India orientali, in montibus Malavar.

Myrto similes exotica.

I. Myrto similis Indica fructu racemoso. Coca, Ciecæ, Monard. Lugd. Clus. in Garz.

Coca herba, Benzoni part. 6. Ind. occid. l. 3. c. 10.

& part. 9. l. 3. c. 20. & l. 4. c. 22. ubi habetur, Indis

hujus folia pro pecunia esse.

Coca occidentalis, Fragoso.

Arbor pumila folijs Myrti, vel ut alij Rhoiscoriariorum, cujus in tota Peru usus est, folio ore

detento, famem & sitim aliquandiu inter peregrinandum levantes.

II. Arbor tristis myrto similis.

Arbor tristis, Garz. Acoftæ. Frag. Clus. ad Garz.

Lugdun. (qui & Acoftæ & Clusij figuram licet

diversim exhibet) Tab.

Arbor tristis, in Malacca Singady alijs parifati-

co pul, quart: Turcis, gul: Linscor. part. 4. Ind.

orient. 15.

Arbore triste de Dia, part. 8. Ind. orient.

Arbor folijs Myrti Clusio: pruni alijs: cujus

flores singulis noctibus renascuntur, qui albi,

pediculo luteo aut rubeo firmati, quo Indi Cro-

ci loco utuntur, & ex floribus aquam extillant,

quam Aquam de Mogli appellant.

De arbore tristis Garzias & Fragosus agentes,

cum ejus flores gratissimi odoris sint, duorum

adhuc florum meminere, & Linscottus pecu-

liare genus exhibet.

Nnn 3

I. Mogo-

I. Mogori priores dicti, mali aureæ floribus odoratiore, quarum stillaticius liquor eundem apud istos usum obtinuit, quem apud Hispanos aqua florum mali aureæ.

II. Champe dicuntur alij flores, quorum etiam magnus apud illos usus est, odore graviore, quam Liliū album, Garz. Frag.

III. Fulle, flosculorum genus apud Indos ex arbore quadam toto anno durans, suavissimi odoris, Lin. Scot. 4. part. Ind. or. 10.

IV. Flos Indicus arboreus liliorum specie. Floribundio, ex arbore quæ solum flores, fructus nequaquam gignit, Joseph. Acoſtæ lib. 4. cap. 27.

R U S C U S.

Ruscus Dioscoridi l. 4. c. 146. *ῥοῦς* & *ῥοῦς*, myrtus sylvestris dicitur: alijs *ῥοῦς*, acuta myrtus & Myrtacantha. Plinius l. 23. c. 9. inquit, Castor Oxymyrſinen myrti folijs acutis, ex qua sunt ruriſcope, Ruscum vocavit. Theophrasto 3. hist. 17. *ῥοῦς*. Hujus fructum Arabes Cubebas vocant, existimantes Carpesium apud Galenum 7. simpl. & 1. de Antidot. esse, quia nihil de Carpesio apud Dioscoridem, ut nec de Rusco apud Galenum inveniat: sed revera Rusci fructus à Cubebis differt, ut rectè Leoniceus notavit.

Ruscus, Trag. Matth. Cord. in Diosc. Gesn. hort. Bellon. Lac. Adv. Lob. Cæf. Lugd. Castor. Cam. Tab. Eyst. Ger. five Bruscus. Ruscus verus, Lon.

Ruscum, Dod. ut. Centromyrini Theoph. & Oxymyrſine, Ang. Myrtus sylv. Turn. Myrtacantha, murina spina, Lob. ico.

VITIS IDÆA SIVE MYRTILLUS,
& Idæa Radix.

A *ῥοῦς* & *ῥοῦς* Idæa, sive Vitis ea parte Idæa, quam vocant Phalacras, nascitur: est fruticosa, virgula parvulis & ramulis cubitalibus penè exporrigitur, quibus acini ad latera adherent, nigri, saba magnitudine, dulces, vinaceorum instar aliquid continentes: folium rotundum, individuum, parvum. Idem pene Plinius l. 14. c. 3. Myrtilli autem dicuntur à forma baccarum, quæ Myrti baccis similes sunt.

I. Vitis Idæa folijs oblongis crenatis, fructu nigricante.

Myrtillus, Matth. Lon. Cast.

Vaccinia nigra, Dod. ut: Adv. Lob. Ger.

Radix Idæa fructu nigro, Ang.

Vitis Idæa nigris acinis, Gesn. Fracto.

Myrtillus Germanica, Lugd.

Vitis Idæa vulgaris baccis nigris, Clus. pan. &

hist. Theophrasti, Eid. hist.

Vitis Idæa nigra, Cam.

Vitis Idæa 1. Tabern. & Vitis Idæa 2. major,

Eid.

Bagolæ 1. genus, Cæf.

Fructus exigui, Gallis Bleuete: part. 2. Amer.

II. Vitis Idæa folijs oblongis albicantibus.

Myrtillus grandis, Trag.

Vitis Idæa nigra major, Thal.

Vitis Idæa 2. Clus. pan. & hist.

Vitis Idæa 3. Tab.

Vaccinia Pannonica, Ger.

III. Vitis Idæa folijs oblongis acuminatis

baccis rubris insipidis.

Vitis Idæa rubra Bavarica, Cam.

IV. Vitis Idæa folijs subrotundis non crenatis baccis rubris.

Myrtillus exiguus, Trag.

Vaccinia rubra, Dod. gal. Adv. Lob.

Radix Idæa fructu rubro, Ang.

Vitis Idæa species altera acinis rubris, Gesn. hort.

Vitis Idæa rubra sive Vaccinia rubra, Dod.

Rhus Plinij minor, Æmilij, Thal.

Idæa vitis, Lugd.

Vitis Idæa rubra, nonnullis Rhus minor Plinij,

Cam. ep.

Vitis Idæa buxeis folijs, Clus. hist.

Folij est buxi interdum levissimè ceu ferratis marginibus.

V. Vitis Idæa folijs subrotundis exalbidis.

Vitis Idæa altera, Clus. pan. & hist.

Vitis Idæa Gesneri major, Cam.

VI. Vitis Idæa folijs carnosiss & veluti punctatis, sive Idæa radix Dioscoridi.

Uva urſi Galeni, Clus. hisp. & hist. Lob. Tab.

Vaccinia urſi, Ger.

Diosc. l. 4. c. 44. *ῥοῦς* *ῥοῦς*, oxymyrſine (id est Rusco) folia similia habet: juxta ipsa verò capreoli

VII. *Viris Idæa palustris.*
Vaccinia palustris, Dod. ut: Ad. Lob.
Oxycoccum, Cord. hist. Cl. pan. Cam. Th. Eyf.

Ceraforum ferè sapore, fructus est non arboris
sed plantæ, coloris mori non satis maturi: par.
8. Ind. Occid.

Genera tria Pl. & c. 16. Gallicum, quod in metas emittitur, amplius uineę, prociore, Oleastrum in omni
usu damnatū, gravem præfert odorem. Tertium genus nostrates vocant sylvestre, ut credo mitigatū [sic] diffusi-
us & densitate parietum virescens semper at consue. Sic apud nos quædam frutex tantum est, quæ ad in arborem
magnam assurgit : & ex ejus radice ob varias maculas, & interortus linearum discursus, coëhærit, cultellorum
manubria, & iminguale in monte Fura ad S. Claudium conficiuntur : Sunt qui florere negent, sed male.

Hoc ad areolas horroꝝ muniendas frequenter utuntur.

Variat floris colore & odore: colore, quia

velcunt, vel ex purpura rubelcunt: odore, quia
in odori majori ex parte, nonnulli odori sunt.

Olea, Græcis ὀλεα dicitur, quod à τὸ λεῖον h. e. Lave vel lubricum deducitur: aut à λεῖν, id est, lavigo, lubrico, quod producat id quod levigat, lubricatq; videlicet oleum, cuius quævis lubricitas vis est. Sic & bæcca, arboris nomine in ætâ, Latine olea vocantur: quæ cum nigrescere incipiunt Drupæ, Græcos Drypetes vocant, Plin. l. 15. c. 1. scribit: & Druppæ l. 12. c. 27. Arborem Dioscori non descripsit: at Theophr. multa hinc inde habet, inter quæ hæc placent: Olea arbor est multifida, i. hif. 5. medullam parvam & incertam gerit ut buxus, i. hif. 9. nodosa est, gongros (γόνγρος) à quibusdam vocatos habet. i. hif. 13. vivit perpetuo, sed non semper eadem durat folia, sed alia proveniunt, alia exarescunt, i. hif. 15. & angusta sunt, i. hif. 16. semen carnosum & nucleis interjectæ, caro enim in nucleis est, i. hif. 8. fuccus pinguis, i. hif. 19. flores foliati, sed pusilli, i. hif. 21. & circa fructum ipsi producantur, & prostrati perforati spectantur, i. hif. 2. Oliva aliæ fructum nullæ carne, sed oleo uberenter producantur, aliæ carnosum sine oleo præstant, 2. cau. 4. Genus alterum, quod ægyptiorum appellamus, ubertate ac magnitudine fructus excellit. Tandè 4. h. 8. Olea maritime minuit, quæ folia similima Arta habet, fructum proximum his olivis, & lachrymam emittere, ex qua Medici medicamentum sistendi sanguinis component.

Genera: Dioscorid. *Olea sativa* & *olivarium colymbadum*; *Olea sylvestris* & *Olea aegyptiaca* L. c. 137. & seq. meminit. At Virgilio, etiam Plin. l. 15. c. 1. referente, *Olivarium tria genera, Orchites, Rhadios & Pausias*: nec plura genera Hieronymum agnoscere, inquit Matthioli. Plin. l. 15. c. 3. prima colligitur *Pausia*, cui plurimum sarnis: mox *Orchites*, cui oly. post *Rhadios*: subjungit *Liciniam, Cominiam, Contiam, Sergiam*, quam *Sabini* regiam

regiam vocant: & mox: regia ab alijs majorina, ab alijs phaulia, grandissima, alioquin minimo, succo. & in Aegypto carnosissima, olei exiguum: Decapoli verò Syria per quam parva, nec Cappari majores, carnet amen commendantur. Colymbades si anguntur, eodemq; herbarum viridium succo conduntur (ut in Gallia Narbonensi, fanticulo) Sunt & praulces, per se tamen siccatæ, visq; passu dulciores, admodum rara in Africa & circa Emeritam Lusitania. Sic Columella decem genera, Pausia, Licinia, Sergia, Radius, Nevia, Culminia, Orchites, Algiana, Murtea, Circites. Sane Olearum differentia ex fructu magis quam arbore spectantur, scilicet magnitudine, pinguedine, probitate & colore. Et Bellonius de cult. notat, in vallibus Insulae Corcyrae in Grecia, Olea esse semper virentes, quæ in Quercus altitudinem excrefant.

I. Olea sativa, *ἡλιάδα*.
Olea, Brunf. Trag. Tur. Cord. hist. Ang. Bellon.
C. Chor. Lon. Dod. Ad. Lob. R. uvvol. Cæf. Cam.
& Ind. Occid. par. 9. l. 4. c. 32.
Olea sativa, Matth. Dod. gal. Cord. in Dioscor.
Lacur. Cast. Tabern. (cui & domestica) Lugd.
Clus. hist. Ger.

Nodos qui in caudice sunt, Theoph. l. hist. 13.
ῥύζος vocat: rustici in Hetruria (Cæsalpino auctore) ova olearum vocant, eò quod sata numerosa sobole germinant. Ad nos adferuntur Hispanica, Genuenses, Narbonenses five Malsilienses & Comenses.

In Virginia tria baccarum genera inter se differentia habentur, quarum forma glandibus similis, à quibus bonum oleum elicitur, Thomas Hariot in def. Virgin. Ind. Oc. p. l. sed quid sunt?

I. Olivæ maximæ Hispanicae.
Olivæ Sergianæ regiae, phauliæ, Plin.
Olivæ magnæ & carnosæ, Clus. hist.
Olivæ superbæ nucis ferè magnitudine, Cæf.

2. Olivæ minor. & Genuens. & ex Provincia.
Olivæ Lusitanica, Narbonenses, Boetica, Clus. hist. ex quibus plus olei exprimitur.

3. Olivæ oblongæ atrovirentes ad lacum Comensem natae adferuntur, quæ carne dura nec succulenta ossi firmiter hærent.

4. Olivæ albæ.
Pl. l. 23. c. 3. olivarum albar. & nigrarū meminit.
Olivæ alba circa Hisp. & Ulyssiponam, Cl. hist.

In Hetruria habentur:
1. Minores rotundiores, plurimum olei habentes, quæ Olivellæ vocantur, Cæf. quas Matt. secundo loco recenset, & eas prægrandes arbores Juglandium modo ferre, quas Olivastrea rurali Senensia vocitant.

2. Majusculæ & oblongæ oleum parcius sed dulcissimum reddentes, quæ nomine à radijs desumpto, Raggiariae dicuntur, Cæf. hæ primæ sunt Matth. quas oleæ minores proferunt, quibus in cibis utuntur.

3. Majores & pulposiores ad conditura tan-

tum quæsitæ, quas Regias Cæsalp. vocat.

4. Sunt quædam, quarum caro ab osse recedit cum franguntur, virides, quæ conditæ gratissimæ sunt, quas Colimbades Cæsalpin. censuit.

Colymbades quas *ἡλιόβιδες* Diosc. l. 1. c. 139. nominat, aliqui volunt esse olivas muria conditas, ab innatando sic dictas: quamvis Plinio l. 15. c. 3. (quem Cæf. imitatur) distinctum genus fuisse videatur; quarum etiam l. 23. c. 3. meminit. Condiuntur autem plerumq; immaturæ per Hispaniam & Galliam Narbonensem: interdum etiam maturæ & nigrae, præfrectim in Lusitania. Olivarum feraces arbores, sed insuavi odore & sapore pejore, in Brasilia, reperiri, Benzo libr. l. cap. 28. scribit.

II. Olea sylvestris folio duro subtruncato incano. *ἡλιόβιδες ἡλιόβιδες* Diosc. l. 1. c. 137. & cap. 141. scribit Æthiopica olea lacrymam Scamionio similem fulvam esse, &c. quod Gummielemi esse Cæsalpinus suspicatur.

Olea sylvestris, Matth. Lac. Tab. Ger.
Olea sylvestris five oleaster, Ad. Lob. ico.
Oleaster vel sylv. olea, Cast.

Oleaster, Lon. Cæf. Clus. in hisp. & hist.
Hanc aliqui cum aculeis, alij sine ijs, pingunt: alij in descriptione aculeorum meminere, ut Matth. Dod. alij præterire: sane fructu est multo minore & à sativa cultura differt: hinc & sativa si negligatur, in sylvestr. abit: & ut Theoph. 2. hist. 3. ex nucleo oleæ, *ἡλιόβιδες* nascitur.

III. Olea sylvestris folio molli incano.
Olea Bohemica, Matth.
Elæagnus, Matth. ep. Cam. ep.
Salix Amerina, Amato.

Chales, Bellunensis.
Ziziphus Cappadocica Plinij, Bell. Dod. Lugd.
Ziziphus alba, Gef. hor. Clus. hisp. & hist.
Ziziphus alba Columella, Bellon. (cui & Oleaster perperam,) Cam.

Oleastro species quibusdam, Gef. hort.
Olea sylvest. Septentrionalium; five Eleagnos
Theophyl. folio Viticis, Lob.

Oli

Oliva Bohemica, Lugdun.

Seisefun, Rauvvolf.

Alij Elæagnum Theoph. alij Ziziphum Cappadocicam Plinij, alij ejusdem lib. 6. c. 18. Jovis barbam esse volunt.

Plinius lib. 21. cap. 9. de Coronis agens, duo

earum inquit genera, quando aliæ flore constant, aliæ folio: florem dixerim esse Genistas, namque & ijs decerpitur luteus, item Rhododendron, item Zizipha quæ & Cappadocica vocatur, his odoratus, similisque olearum fioribus.

S A L I X.

Salix, *irēx* Græcis, καπὸν τὸ ἰῆμα, quod citò in altum excrestat, inter primas etiam germinans: & Latinis, quod celeritate crescat ut salire videatur, dicitur. *irēx* arbor est vulgo cognita, Diosc. l. 1. c. 136.

Genera: Theoph. 3. hist. 13. Salix multigena est: nam alia nigra dicta, quod cortice nigro, aut puniceo tegatur: alia candida, quod candido: virgas pulchriores & ad texendum commodiores nigra profert: candida spissiores. Est tam nigra, quam candida genus quoddam parvum: hanc Arcades non *irēx*, sed *irādū* vocant, existimantq; fructum secundum eam parere. At Plinio l. 16. c. 37. Salicis plura genera: nam quædam & in proceritatem magnam emittunt, jugis vinearum perticas præbent, pariuntq; baltheo corticis vincula: & alia virgas sequacis ad vincituras lenticis. Alia prætenues viminibus texendis spectabili subtilitate. Rursus alia firmiores corbibus, ac plurimæ agricolarum suppellectili: candidiores ablato cortice lavestrastratu, molliorib; vasis quam si è corio fiant, atq; etiam supinarum in deliciis cathedrarum aptissimæ. Finditur Græca rubens Amerina, ut & candida, haud paulò flexilior, ideo solido ligans nexu. In Asia tria genera observant, nigram utiliorem viminibus: candidam, agricolarum usibus: tertiam quæ tenuissima est Helicem vocant. Apud nos quoq; multi tordem generibus nomina imponunt: vimineam vocant, eandem purpuream: alteram nitelinam à colore, quæ sit tenuior: tertiam Gallicam, quæ tenuissima. Et l. 17. c. 20. perticalis & viminalis meminit: hæc Plinius. Quare veteres Salices distinguere colore primum, dein usu: colore, albo, nigro seu purpureo, sive phæniceo, sive rubente & vitellino, qui in cortice spectatur. Usus, quod alia sit perticalis, alia viminalis: alia fissilis, alia ex qua vincula fiunt: alia ex qua virgæ fiunt, vel tenues & invalidæ, vel firmiores & crassiores, ad varia opera.

I. Salix vulgaris alba arborefcens.

Salix alba Theophr. & Plinio.

Salix ex qua perticæ fiunt, Matth.

Salix perticalis, Cord. in Diosc.

Salix prima vel major, Dod.

Salicis quartum genus, Lon.

Salix, Ad. Dioscoridis, Lob.

Salix alba perticalis, Lugd.

Ex hac pali ad vitium pedamenta, & stipites ad sepes firmandas fiunt.

II Salix vulgaris nigricans folio non serrato.

Salicis primum genus, Trag. Fuch. Tur.

Salix Gallica, Cord. in Diosc.

Salix nigra seu punicea, Lon.

Salix nigra seu rubens, Thal.

Salix phæniceophloeos sive phænicea, Lugd.

III. Salix vulgaris rubens.

τὸ *ἰῆμα* nomine (Salicem Amerinam Gaza vertit) Theophr. l. 6. c. 2. designasse aliqui volunt: verum hæc Salix fructus non habet: cum in Oe-

so fructus sit, vel niger, vel candidus.

Salix Amerina nigra & rubens, Plinio.

Salix colore rufescente, quæ Græca vocatur, Matthiol.

Salicis tertium genus, Fuch. Tur. I. genus, Lon.

Salix viminalis, Amerina & Sabina Columella, Dod. gal.

Salix minor, viminalis & Gallica, Dod.

Salix Amerina, Lugd.

Salix Sabina sive Amerina, Thal.

Ex hac vincula quibus in aqua maceratis vitæ & doliorum circuli vinciuntur: & alteri cortex magis rubet, alteri nigricat.

IV. Salix sativa lutea folio crenato.

Salix tertia, Trag. Cæs.

Salix vitellina, Dod. gal. Cord. in Diosc.

Salicis alterum genus, Fuch. Lon.

Salix angustifolia sylv. Tab.

Salix aquatica, Ger.

V. Salix folio amygdal. utrinq; virente aurito.

Salix *μυλανόφλοιος*, id est, cortice nigro, Theoph.

3. hist. 13.

Salix purpurea, Plinio.

Salix, Matth. in fig. major, Ger.

Salix sylv. latifolia, Tab.

Salix purpurea nigra viminalis, Lugd.

Hæc virgas tenues præbet, ad corbes, sportas, fiscinas, & similia conficienda: huic peculiare, quod singulorum foliorum exortibus alæ duæ adpositæ sunt.

Ooo

VI. Sa-

VI. *Salix folio longissimo, angustiss. utrinque albedo.*

Elæagnus (Zenigole Patavinorum) Ang. Cast.

Elæagnus Dalechampi, & *Salicis* 6. genus, Lugd.

Elæagnus nomen, ex *elæa* nōi *elæo*, ex olea &

vitice compositum est: nam ut Theop. 4. hist. II.

Elæagnus fruticosa planta est Agno similis, folio, figura eidē simili, molli, lanuginoso, ut *Mali*

cydoniæ, fl. albæ populi minore, fructu nullo.

VII. *Salix humilis angustifolia.*

Salix humilis, Dod. ico.

Salix humilis repens angustifolia, Lob. Lugd.

an *Chamaitea*, Tab. & Ger.

VIII. *Salix oblongo incano, acuto folio:*

quæ 2. loco in Prodomo describitur.

IX. *Salix fragilis.*

Salix 2. candido cortice, Trag.

Salix candida vel Græca, Dod. gal.

Salicis tertium genus, & *Salix alba*, Lon.

Hæc ad ligamenta planè inutilis est: com-

munitur cortice albo, rarius rubro, de qua sub

Salice 1. in Prodomo:

Salicis 4. genus, quam vulgo Vitricem vocit-

ent, quod vitri modo frangatur, Cæs. propo-

nit, sed folia lata subrotunda & hirsuta tribuit.

X. *Salix folijs glaucis & per ambitū hirsutis.*

XI. *Salix humilis capitulo squammoso.*

Salix Helice Theop. 3. hist. 13. Lugd.

Salix angustifolia, Cl. pan. Pannonica, Eid. hist.

Sæpè folijs vesicæ subrubentes, & furculis,

pilulæ quædam scabræ insident.

Salix latifolia.

I. *Salix latifolia rotunda.*

Siler arbor, Ang.

Salix lato folio, Gesn. hort.

Chaleb Syrorum, Ges. quia fl. est odoratiss. Cam.

Salix platyphyllos, Adv. alia, Thal.

Salix latifolia, Cam. Clus. hist.

Salix platyphyllos sive *leucophlecos* & *Elæa-*

gnos quibusdam, Lugd.

Salix caprea rotundifolia, Tab. Ger.

De *Silere* Plinius l. 16. c. 18. hæc habet: non nisi

in aquis proveniunt *Salices*, alni, populi, *siler*,

lignū trā resarū utilissimū: &c. 21. *Silerifolia*

non decidere scribit, nulla alia nota addita:

deque ejus viribus l. 24. c. 10. egit.

Hujus carbo citissimè ignem concipit, quare

ex ejus cinere, sulphure & aphronitro pulvis

tormentarius conficitur: hujus carbonibus pi-

ctores ad delineanda opera utuntur.

II. *Salix folio ex rotunditate acuminato.*

Salicis quartum genus, Trag. Lon.

Salix aquatica, Lob. ico.

Salix platyphyllos, Thal.

Salix caprea latifolia, Tab. Ger.

III. *Salix latifolia minor.*

Salicis platyphyllæ species alia, Thal.

IV. *Salix subrotundo argenteo folio, quæ 3.*

in Prodomo.

V. *Salix maritima ostrearum testis innascens.*

Salix marina, Lugd.

Salix pumila latifolia.

I. *Salix humilis latifolia erecta: quæ 4. in*

Prodomo.

II. *Salix latifolia repens.* (ep.

Salix pusilla humilis, seu *Salicula repens*, Cam.

Salicis pumilæ genus 2. Clus. pan. & hist.

Salix pumila, Tab. humilis, Ger.

Salix pumila, folio latiore, Dod. belg.

Salix leucophlecos palmum alta, Lugd.

III. *Salix alpina pumila rotundifolia re-*

repens, infernè subcinerea.

Salix pumila latifolia prior, Clus. pan. & hist.

IV. *Salix pumila folijs utrinque candican-*

tibus & lanuginosis.

Salix abortiva, Lugd.

V. *Salix saxatilis minima, quæ 7. in Prodr.*

Salix pumila angustifolia.

I. *Salix pumila linifolia incana.*

Salix pumila angustifolia prior, Cl. pan. & hist.

Salix pumila folio angustiore, Dod. belg.

II. *Salix pumila brevi angustoque folio in-*

cana.

an *Salix humilis repens*, Adv. Lob. ico.

Salix pumila angustifolia altera, Cl. pan. & hist.

Hæc variat: nam paulo latioribus folijs quæ

in sabulosis Hollandiæ aggeribus Oceano ob-

jectis nascitur, Clusio monente.

III. *Salix alpina Pyrenaica: quæ 6. in Prodr.*

IV. *Salix alpina angustifolia repens, non*

incana, quæ 5. in Prodomo.

Salix exotica.

I. *Salix Syriaca folio oleagineo argenteo.*

Zarneb vel *Zarnabum*, Rhafi cap. 353. & *Avi-*

cennæ cap. 749.

Zurumbeth Serapioni, cap. 26.

Elæagnus Theophrasti.

Saffas Syrorum, Rauvv. & Lugd. app.

Calaf seu Ban, Alpino.

Verūm Rauvv. folijs angustioribus, at *Alpi-*

nus

nus latioribus pingit : hanc sub nomine arboris magnæ virtutis, ab insigni Pharmacopæo D. Jo. Pona Verona hoc anno accepimus.

Ex floribus incolas aquam cordialem elice-re, Rauvvolffius scribit : & quidem in Ægypto, quam Macahalef vocitant, Alpino monente.

II. Salix Arabica folijs Atriplicis.

Garb Arabum, Avicen. cap. 326. & 686.

Salix exotica, Garb incolis, Rauvv.

Garab Maurorum, Lugd. app.

Ex hac apud ipsos Aphronitru optimum fit, ad ignariu pulverem conficiendū, Rauvv. monete.

AGNUS CASTUS SIVE VITEX.

Vitex, Græci ἀγνός, Dioscoridi lib. 1. cap. 135. ἀγνός, id est Castus, quod ab ijs à quibus estur, aut bibitur, aut subternitur, castitatem conservet, Gal. 6. simplicium auctore : quare matrone in Thesmo-phorijs Atheniensium ἀγνοῖσαι, id est, castitatem custodientes, folia hujus arboris sibi sternebant, Dioscoride & Plinio referentibus. Cui & λυγός (quasi vimen) propter invictam ferè virgarum flexibilitatem : officini, Agnus castus : cujus semen quibusdam à Piperis similitudine, Piper vocatur. Est Diosc. frutex in arborem assurgens : virgulta gerit fractu contumacia & longa : folia verò olivæ, sed teneriora atque majora. Theoph. ἀγνός (Amerinam Gaza vertit) cultura arbor efficitur, cum frutex sit, 1. hist. 5. verum super fructum ipsum florem insidentem emittit : virgas parvas sicut cornus semina suo latere profert & fructuosior est, nodos tamen geminatos, tum invicem congruos habet, 1. hist. 21. Plin. lib. 24. cap. 9. non multum, inquit, à Salice vitilum usque distat Vitex, foliorum quoque aspectu, nisi odore gravior esset.

Genera ejus duo : est quæ album florem, cum aliquatenus purpureo mittat, altera purpureum profert, Diosc. ac Plinio l. c. major, in arborem Salicis modo assurgit : minor, ramosa, folijs candidioribus, lanuginosis : prima album florem mittit in purpureo, quæ & candida vocatur : nigra, quæ tantum purpureum.

I. Vitex folijs angustioribus cannabis modo dispositis.

Vitex, Trag. Dod. ut : Ang. Cord. in Diosc.

Gefn. hort. Lac. Tur. Lon. Cæs. Lugd. Cam.

Vitex sive Salix Amerina, Matth.

Agnus sive Vitex, Bellon.

Agnus castus, Gefn. hort. Cast.

Elæagnon Theophrasti, Adv. Lon.

II. Vitex latiore folio.

Vitex latiore ferrato folio, Lob. Lugd.

III. Vitex trifolia minor.

Agni casti species multo minor cæteris, tribus tantum firmis folijs donata, Rauvvolff. Sed quid?

S P I R Æ A.

DE Spiræa hæc habet Theophrastus 1. hist. 25. plura ex alijs fructum cacumine ferunt, quam ex arboribus, ut frumentorum quæ spicam pariunt, & fruticum ἐπένης νὰ ἀσπερία (aliqui ἀσπερία legunt) & ἀγνός, & ἄλκα : erica, spiræa, amerina, ut Gaza vertit, qui omittit ἄλκα, id est, & alia quedam.

Frutex spicatus folijs salignis ferratis.

Spiræa Theophrasti forte, Clus. hist.

L I G U S T R U M.

Ligustrum Græci λυγός. Cyprus Diosc. lib. 1. cap. 124. arbor est folijs circum virgulta oleæ similibus, sed latioribus, mollioribus & virtutioribus : floribus candidis muscosis, odoratis : semine nigro, sambuci fructui simili : & Plinio lib. 12. cap. 24. Cyprus in Ægypto est arbor Ziziphi folijs, semine coriandri, flore candido odorato : & mox, quidam hanc esse dicunt arborem, quæ in Italia Ligustrum vocatur : & lib. 24. cap. 10. Ligustrum eadem arbor est, quæ in Oriente Cyprus.

I. Ligustrum Germanicum.

Ligustrum, Brunf. Matth. Lacun. Fuch. Cord. in

Diosc. Bellon. Gefn. hort. Turn. Lob. Rauvvolff.

Cæs. Cast. Lugd. Thal. Tab. Ger. Eyst.

Ligustrum vulgare, Trag.

Ligustrum majus, Lon.

Phyllirea, Dod. ut : Ang. Gefn. hort.

Hulimus, Lac.

Ligustrum Diosc. nostras, Adv.

Ligustrum Italicum, Alpino.

Sunt qui Cyprum Dioscoridis volunt, ut Tragus, Matth. Cerd. in Diosc. Cæs. & alij : negant alij, ut Anguillara, qui Ligustrum Latinorum facit : alij Phylliream volunt, ut Dod. & Ang.

Flore est albo, Tragus & subluteo notavit, & Ligustri aliam speciem nominat : & Lonicerus majus & minus facit.

II. Ligustrum myrtifolium Italicum quod 1. in Prodomo : quod etiam nomine Myrti ligustri folio, accepimus.

Ooo 2

III. Ligu-

III. Ligustrum folijs laciniatis, quod 2. in Prodomo, & Ligustri nigri nomine ex Italia primum, dein pro Syringa laciniatis folijs ex horto Nobil. Contareni habemus.

IV. Ligustrum Ægyptiacum latifolium. Cyprus Græcorum, Alcanna vel Henne Arabum, nunc Græcis Schenna, Rauvvolf. & Lug. append.

Cyprus Plinij sive Alcanna, Belli ep. 4. ad Clus.

Henne in Ægypto aliàs Alcanna, Bellonio.

Alcanna Arabum, Clus. ad Bellon.

Alkanna, Adv.

Flore est pallide subflavo.

V. Ligustrum Ægyptiacum angustifolium. Ligustrum Ægyptium, Elhanne seu Tamaharendi, vel Alcanna Avicennæ, Alpino.

Figura enim ab Alpino proposita diversa, à Rauvvolfij figura, quod & Clusius in cor. posterioribus monet: & Alpinus florem subcinereum Sambuci floribus minorem tribuit: quare an diversæ considerandum: ramum solum baccis minutis seminibus refertis onustum, sed sine folijs, ex Creta ab Honorio Belli habemus. In hist. orient. part. 4. figura tab. 15. sub Mangostans proponitur.

PHILLYREA.

Phylirea Dioscor. lib. 1. cap. 125. arbor est Cypri magnitudinem æquans, folijs oleaceis, sed latioribus & nigrioribus, fructu lentisci nigro, subdulci, & quasi racemato.

I. Phyllyrea latifolia levis.

Phyllyrea arbor Galloprovincia, verior Macaleb Serapionis, Adv. Lob. ico.

Phillyrea, Cam. ep. * notata.

Phillyrea, Mahaleb Serapionis, Lugd.

Philyca Dalechampi, Eid.

Mahalepum Serapionis, Tab.

II. Phyllyrea latifolia spinosa.

Phillyrea prima, Clus. hisp. & hist.

Phillyrea prior Clusij, Lugd.

III. Phyllyrea folio leviter serrato.

Phillyrea 2. Clus. hisp. & hist. Lugd.

Phyllireia serrata, Ger.

IV. Phyllyrea folio Ligustri.

Phillyrea, Matth. Lac. Rauvv. Lugd.

Phillyrea Bellonij, Gesn. hort.

Cyprus latiore folio, Dod.

Phillyrea major, Adv. Narbonensis, Lob.

Phillyrea tertia, Clus. hisp. & hist. Lugd. Tab.

Phillyrea media, Cam. ep.

Alaternus major Dalechampi, Lugd.

Phillyrea Penæ major,

latrum, Cæs. & Phillyrea, Theoph.

Phyllireia latiore folio, Ger.

V. Phillyrea angustifolia prima.

Cyprus, Dod.

Phillyrea quarta, Clus. hisp. & hist. Tab.

Phillyrea angustifolia, Lob. Cam. ep. Ger.

Phillyrea minor, Adv. Penæ, Lugd.

Alaternus minor Dalech.

VI. Phillyrea angustifolia secunda.

Phillyrea quinta, Clus. hisp. & hist.

SECTIO QUARTA.

PHILYCA; CELASTRUS; OENOPLIA; RHAMNUS; LYCIUM; RUBUS; CHAMÆRUBUS; CAPPARIS; ROSA

Sativa, sylvestris, & Hiericuntica.

PHILYCA.

Philyca Theophrasto 1. hist. 15. ex sylvestribus perpetuo viret: 3. hist. 6. ineunte Vere germinat: 5. hist. 7. candor ei Celastri modo, semper fronde abundat. Plinio 1. 16. c. 26. Alaternus dicitur, qui inter arbores fructum nullum ferentes, hoc est, ne semen quidem, refert, cui folia inter Ilicem & Olivam.

I. Philyca elatior.

Alaternus, Ang. Portæ, Cam.

Philyca Theophr. Alaternus Plinij, Elæprinos

Cretenfium, Bellonio.

Alaternus Plinij (& Spina cervina quorundam) Lobel. icon. Gerard.

Alaternus prima, Clus. hisp. & hist. Lugd. Tab.

Celastrus mas Theophrasti, Cæs.

Bourgespine Monspeliensium, Adv. Lob. ob.

Apharxa Theophrasti, Lugd.

phillyrea

Phillyra mas Theophrasti, Cæf.

Alaternus Turneri, Tabern. qui duas figuras adposuit.

Αραβικὴ Theophrasto 1. hist. 15. ex sylvestribus arboribus perpetuò viret: 3. hist. 6. fructum primum cum uva nigrescit & varia sit, maturant: alterum cum vitis floret: bis enim ambæ

fructum ferre videntur.

II. Philycæ humilior.

Alaternus alter, Clus. hisp. & hist. Lugd. Tab.

Alaternus alter humilior, lato folio, Lob.

Ilaturum folio ad Illicem accedente, Cæf.

Celastrus fœmina Theophrasti, Lugd.

Alaternus humilior, Ger.

C E L A S T R U S.

K *Κηλάρη* Theophrasto 1. hist. 6. cultum nullum patitur: 1. hist. 15. folia nunquam demittit: 3. hist. 6. & tardissime fructum perficit: 5. hist. 8. ad baculos idonea est.

Celastrus Theophrasti, Clus. in cur. post. hanc ex horto Leidenf. accepimus.

O E N O P L I A.

I. Oenoplia non spinosa.

Sudar Serapioni.

Oenoplia seu Napeca Bellonij, Connarus Alexandrinorum fortè apud Athenæum, Clus. hist.

Hanc una cum fructu & floribus, ex Creta ab

Honor. Bellij accepimus.

II. Oenoplia spinosa.

Nabca, Paliurus Athenæi credita, Alpin.

Oenoplia spinosa, Honor. Belli, Clus. histor. & ep. 5.

R H A M N U S.

Rhamnus *ῥάμνος* Dioscoridi lib. 1. cap. 119. frutex est circa sepes nascens: virgas rectas & spinas aculeatas, ut Oxycantha habens: folia verò parva, oblonga, subpinguia, mollia: est & altera candidior. De terra, vide sub Paliuro. Et Theoph. 1. hist. 15. *ῥάμνος* frutex est perpetuò virens: 3. hist. 17. & alia candida, alia nigra, fructusq; diversus, amba verò aculeigera: 3. hist. 18. peculiare racemis, quod per latera caulium sepiunt: postremoq; caulis racemus omnium maximus propendet. Plinio lib. 24. cap. 14. inter genera Ruborum, Rhamnus appellatur à Græcis, candidior & fruticosior: is floret ramos spargens rectis aculeis, non ut ceteri aduncis, folijs majoribus. Alterum genus est sylv. nigrum & quadantenus rubens: fert veluti folliculos.

I. Rhamnus spinis oblongis, flore candicante.

Rhamnus candida, Theophrasti.

Rhamnus primus, Matth. Ang. Lac. Lon. Clus. hisp. & hist. Dod. Rauvvolf. Lugd. Cast.

Rhamnus candida, Cord. in Diosc.

Rhamnus alter Dioscoridis Monsp. Adv. Lob. Lugd.

Rhamnus, Bellon. Cæf.

an Rhamnus circa Tripolim ipsis Hauset, Arabibus.

Hausetgi five Rhamnus primus, Rauvvolf.

II. Rhamnus alter folijs fassis flore purpureo.

an Rhamno altero similis, Bellon.

Rhamni prioris altera species, Clus. hisp. & hist. Lob.

Rhamnus primus alter, Dod.

Rhamnus alter Clusij, Lugd.

Rhamni species quæ Spina sancta, Colum.

III. Rhamnus tertius flore herbaceo baccis nigris.

Rhamnus niger Theophrasti.

an Rhamni genus baccis nigris in Græcia, Bellon.

Rhamnus tertius, Clus. hisp. & hist. Dod. Taber. Gerard.

Rhamnus primæ speciei tertius, Lob.

IV. Rhamnus Salicis folio angusto fructu flavescente.

Rhamnus secundus, Matth. Dod. ut: Lac. Lon. Clus. hisp. & hist. Lugd. cum figura Matthioli & Dodonæi.

an Rhamni genus baccis rubentibus, Bellon.

Oleaster Germanicus, Cord. in Diosc. & hist.

Oleastri peculiare genus, Cord. ob.

Rhamni species, Cam. ep. & hort.

Rhamnus primus Diosc. Adv. creditus, Lob.

Rhamni alterum genus, Cæf.

Hippophaë Dioscoridis fortè, Colum.

V. Rhamnus folio subrotundo fructu compresso.

Rhamnus tertius Diosc. quem scribit nigrioribus, latioribusq; folijs & quadantenus rubentibus:

Ooo 3

tibus: virgaltis oblongis, quinque ferè cubitorum & spinosioribus quidem, at minus firmos, & rigidos aculeos habens: fructus verò latus, albus, tenuis, folliculi figura, fructu verticilli. Sunt qui Rhamni 3. Dioscoridis descriptionem ad Paliuri ejus historiam revocandam velint: de quo lib. 1. cap. 121. sic: *πάλυρος* frutex est vulgo notus, aculeatus, solidus, cujus semen pingue, & lini seminis æmulum reperitur. De quo Theoph. 1. hist. 5. frutex est: 1. hist. 8. spinosus: 1. hist. 6. folia cum extremorum lateribus sinuata concidunt: 3. hist. 6. & post Occasum Vergiliarum fructum reddit: 3. hist. 17. habet quoque nonnullas differentias: omnes autem fructiferae, &c. & 4. hist. 4. in Africa plurima est & fruticosior, folio nostrati (id est Jujubis) simili, fructu diverso, fructum ferens latus instar folij, &c.
 Spina Judaica, Crescentio.
 Rhamnus tertius, Matth. Ang. Lac. Gefn. hort. Lon. Cast. Cam. Colum.
 Rhamni tertia species, Dod. gal.
 Rhamnus niger, Cord. in Diof.
 Paliurus & Apaliura Græcis vulgo, Bellon.
 Paliurus frutex, Gefn. app.

Paliurus, Dod. Adv. Lob. Rauvvolf. Lugd. Cast. Cam. Eyst.
 Jujuba sylvestris & Spina Marruca, & Paliurus Africanus Theoph. Cæs.

VI. Rhamnus catharticus.

Rhamni alia species, Trag.
 Spina infectoria, Matth. Bellon. Adv. Lob. Cast. Clus. hist. Tab.

Spin merlo, Cast. ap.

Rhamnus solutivus, Dod. ut: Thal. Ger.

Cervispina, Cord. hist.

Spina cervina vulgo, Gefn. hort.

Spina alba, Lon.

Spina cervicalis vulgo, Cæs.

Rhamnus catharticus, Lugd.

Communiter frutex est: aliquando arboream altitudinem adipiscitur.

VII. Rhamnus catharticus folio oleæ.

Hippophaes, Ang.

an Hippophæstum quorundam, Lugd.

VIII. Rhamnus catharticus minor.

Spina infectoria pumila prior, Clus. pan. & hist.

Rhamni solutivi minor species, Cam.

IX. Rhamnus folijs oblongis serratis.

Rhamnus Bavaricus, Lugd.

L Y C I U M

LYUOR, à Lycia in qua magnus hujus proventus fuit: & *νυγάνωρος*, id est Buxus aculeatus, à similitudine quadam cum Buxo dicitur. Est Dioscoridi l. 1. c. 132. arbor spinosa, virgis trium cubitorum, aut etiam longioribus, circa quas folia sunt buxo similia, densa: fructum habet instar piperis nigrum amarum, densum, levem: corticem verò pallidum Lycio densato similem, & radices numerosas, obliquas, lignosas: & mox fertur & Lycium Indicum fieri ex frutice Lonchitide appellato: est is è spinarum genere, virgas habens rectas ericubitales, aut etiam majores, à fundo transversas & Rubo crassiores: ruptus cortex rubescit, folia verò olea similia. Et Plinius l. 12. c. 7. fert & spina piperis similitudinem, præcipua amaritudine, folijs parvis densissq; Cypri modo, ramis trium cubitorum, cortice pallido, radice lata, lignosaq; buxei coloris: & l. 24. c. 14. Modum consuecendi docet: addens spinam ex qua Lycium fiat, in Gracia pyxacanthem chironium vocari.

I. Lycium buxi folio.

Lycium, Matth. Tab. Ger.

Lycij nomine ostenditur, quæ tamen verum non est, Ang.

Pyxacantha, Dod. ut: Lon.

an Lycium seu Pyxacantha Narbonensium, Ad.

Lycium alpinum, Lugd.

II. Lycium facie pruni, sylv. five Italicum.

Lycium Italicum, Matth. Lugd. Tab.

Spina infectoria pumila altera, Clus. pan. & hist. Ponæ.

Lycium Hispanicum, Ger.

III. Lycium Hispanicum folio oblongo.

Lycium Hispanicum, Lob. Lugd.

IV. Lycium Hispanicum folio buxi.

Lycium quorundam, Clus. hisp. & hist.

an Tamaio, Lycium verum, Frag.

V. Lycium latifolium.

Paliurus alter peregrinus, Adv. Lobelius in iconibus titulum habet, sed figura subiecta non convenit, quæ sub Rhamno 3. repetitur, & est

Oxyacanthæ Dioscoridis.

VI. Lycium Gallicum.

Lycium Dalechampi, Lugd.

Grana luteo colore tingunt.

VII. Lycium Indicum folijs pruni.

Frutex spinosus peregrinus, Arabibus Hadhadh, incolis Zaroa, Rauvv.

Lycium

Lycium legitimum Rauwolfij, Clus. hist.

Lycium in Libano proveniens, Belli epistola prima.

VIII. Lycium Indicum alterum.

Uzeg, Lycium Indicum creditum, Alpina.

IX. Lycium folijs ericæ.

Cate five Lycium, Garz. Acost.

Lycium cujus succus Cate dicitur, Frag.

X. Lycio affinis Ægyptiaca.

Agiahalid, Alpino.

XI. Frutex exiguus foliolis confertus.

Tamaxo, Clus. hisp. & hist.

R U B U S.

Rubus *βάρ* & *Græcis*: notitia vulgaris est Dioscor. l. 4. c. 37. At Theoph. l. hist. 5. frutex est: 2. hist. 16. cujus folia cum extremo, tum lateribus sinuata concidunt & spinosa cuncta redduntur: 6. hi. 1. imò etiam caulibus & rami: 1. cauf. 21. fructum racematim gerit, & non solum serò, sed etiam particulatim maturefcit.

Genera: Theoph. 3. hist. 18. plura esse scribit: & trium meminit: quadam erecta quæ *βάρ*: quadam deorsum vergens, quæ *χαυδαία*: & tertia *νωόβα* dicitur. Et à Dioscor. l. c. *βάρ*: & cap. seq. *βάρ* & *ιδάα*: & l. 1. c. 123. *νωόβα* proponitur. Plinio l. 16. c. 37. Rubi mora serunt: & alio genere similitudinem rosa, qui vocatur Cynosbates: tertium genus Idæum vocant Græci à loco. Sic l. 24. c. 23. duorum priorum meminit: & cap. seq. Cynosbati, rubi Idæi, & Rhamnum inter Rubi genera recensuit.

I. Rubus vulgaris, five rubus fructu nigro.

βάρ & *Græcis*: Senticis, Latinis dicitur: & fructus mora rubi, *βέρνα* Galeno: quibusdam Vac-

cinia: officinis, mora bati.

Rubus Dioscoridi & Plinio.

Rubus excelsa, Theophrasto.

Rubus, Brunf. Matthiol. Fuch. Dod. ut: Cord.

in Dioscorid. Lac. Turn. Lon. Lob. Cæsal. Cast.

Lugdun.

Rubus grandis & secundus, Trag.

Morus five Rubus, Ang.

Rubus vulgaris, Ges. hor. Thal.

Rubus Batis, Adv.

Rubus arvensis, Taber.

Rubus Idæus, Ger. icon.

II. Rubus repens fructu cæcio.

Chamæbatos Theophrasto, humirubus Gazæ.

Rubus humilis & primus.

Rubus minor, Dod. ut:

Rubus reprans, Ad.

Rubus humilis Belgicus, Clus. pan. & hist.

Rubi alterum genus, Cæsal. Lugd.

Fructu est communiter cæcio, modo cæruleo,

modo nigro & minore.

III. Rubus Idæus spinosus.

βάρ & *ιδάα* appellatur, quoniam copiosius in

Ida nascatur: est autem longè tenerior priore,

exiguus spinis præditus: quanquam & sine spi-

nis inveniatur: hæc Dioscorid. l. 4. c. 38. Et Plinio

l. 16. cap. 37. Tertium genus Idæum vocant

Græci à loco: tenuius quam cætera, minoribus-

que spinis & minus aduncis.

Rubus Idæus Dioscoridis & Plinij.

Rubus Idæus, Trag. Matthiol. Ang. Dodon. tu-

Bellon. (qui in Ida monte invenire non po-

tuit) Ges. hort. Turn. Lon. Adv. Lobel. Cast.

Thal. Ger. desc. & part. 3. Ind. Orient. & 2. part.

Ind. Occid.

Rubus Idæus major, Lac. desc.

Rubus Idæus exilibus spinis, Cord. in Diosc.

Rubus tertius montibus proprius, Cæsal.

Rubus Idæus spinosus, Lugd.

Rubus Idæus vulgaris, Clus. hist.

IV. Rubus Idæus lævis.

Chamæbatos, seu Rubus Idæus alter, Trag.

Rubus tertius, Cord. in Diosc.

Rubi alia species, Ges. hort.

Νοκσβέρ id est, baccæ hircinæ, Lon.

Rubus hircinus, Tab.

Rubus Idæus non spinosus, Lugd.

Rubus Idæus Placæ, Clus. hist. desc.

Rubus, Ger. ico.

V. Rubus Idæus fructu albo.

Rubus Idæus leucocarpus, Cam.

Rubus Idæus fructu candido, Thal. Clus. hist.

VI. Rubus exoticus.

Rubi facie senticosa planta, Ad. Lob. ico.

Arboris truncus spinosus, Lugdunenf. descr. at

figura sub titulo Nerei facie secundo loco ha-

betur.

Chamarubus spinis carent.

I. Chamærubus saxatilis.

Rubus alpinus humilis, Ges. hor.

Rubus Idæus, Eid. Fractio.

Rubus saxatilis, five petrus, five alpinus, Clus.

pan. & hist.

Rubus parvus saxatilis alpinus, Cam.

Rubus minimus, Thal.

Acinj

Acini huic bini, terni, quaterni, ad summum quini sunt.

II. Chamærubus folijs Ribes.
Chamæmorum Norvvegica, Clus. hist.
Fructus rubeus aut pallidus.

III. Chamærubus folijs Ribes Anglica.
Chamæmorus, Clus. pan. & hist.

IV. Chamærubus folijs Vitis.
Chamæmorus altera Norvvegica, Clusio in
historiarum rariorum.

C A P P A R I S.

K *απαρης* Dioscorid. l. 2. c. 204. frutex est aculeatus per terram in orbem stratus, spinas aduncas ut Rubus habet, folia rotunda, malo cydonio similia: fructum ut Olea, quæ cum debescit album florem promit, quo delapso quiddam glandis oblongæ figuræ reperitur, quod apertum grana tanquam punica habet exigua, rubentia: radices lignosæ, magnæ ac numerosæ. Theoph. 6. hist. 10. ramis aculeatis constat: 6. hist. 3. & non solum caule aculeato, sed etiam folio hispido: 1. hist. 6. & 3. hist. 13. quæ cultura deterior redditur, ut natura sylv. dixeris: sic 3. caus. 1. ubi Gaz. a vocem *απαρης* Inturim verit, ut & 6. hist. 5. & 7. hist. 8. alibi verò Capparium reddidit. Plin. l. 13. c. 23. Capparis, quidam & Cynosbatum vocant: alij Ophiostaphylon: vide & l. 19. c. 8.

Genera: Dioscorid. habet Africam, Marmaritam, Apulam, & quæ è rubro mari & Arabia desertur: quæ qualitatibus variant: idem & Plinius lib. 13. cap. 23. refert:

I. Capparis spinosa fructu minore, folio rotundo.

Capparis, Trag. Matth. Dod. gal. Ang. Cord. in Dioscor. Gesn. hort. Lac. Lon. Ad. Cast. Lugd. Rauvvolf. (qui & sylvestrium meminit) secunda, Tabern.

Capparis spinosa, Bellon.

Capparis retuso folio, Lob.

Capparis Italica, Cæs.

Capparis rotundiore folio, Ger.

II. Capparis folio acuto.

Capparis, Dod. prima, Tab.

Capparis folio acuto, Lob. Lugd. Ger. Eyst.

Capparis aliud genus, Cæs.

Plinio l. 19. c. 8. laudatiss. in Caria, proximum Phrygia. Verum Alexandria Ægypti Venetias præstantiss. adferri, Lugdun. scribit. De cultura Capparum Quiqueranus de laudibus Provinciae legendus.

III. Capparis non spinosa fructu majore.

Capparis non spinosa, Bellon.

In Arabia arborescit & hyeme folia retinet.

Cappares Alexandriæ majores esse, quàm alibi, quas Cappar appellant, Alpinus auctor est.

IV. Capparis arborescens fructu Juglandis magnitudine.

Capparis Arabica fructu ovi magnitudine, semine piperis instar acris, Bellon.

Capparum arbor, Rauvvolf, qui fructus magnitudinem non expressit.

Cappares plurimum ab his quæ in arbores adolecunt & quæ in Græcia proveniunt, diffidentes in Tauri montis saxorum fissuris, Bellonius notavit.

V. Capparis portulacæ folio.

Capparis leguminosa, Lob. Tab.

Capparis Fabago, Dod. Ger.

Capparis sylv. live fabaginea, Cam. ep.

Morgfani, Syrorum: Andirian, Rhafis: Ardi-frigi, Avicennæ, Rauvvolf. & Lugd. ap.

Fabago Belgarum, Lugd.

Telephium Dioscoridis & Plinij, Colum.

Peplios Petri Quith pharmacopæi Luteriani in cuius horto anno 1579. collegimus.

VI. Capparibus similes baccae in Virginea. Sacquennumener baccae plantæ, quæ in stagnantibus aquis reperitur, part. prim. Ind. Occident.

R O S A.

Rosam vetustas ex sanguine Veneris: & Turcæ ex sudore Mahometis, ortam sibi persuadent, cuius nomine folia Rosarum bumi jacere non patiuntur: hæc Græcis *ρόδον* dicitur, quasi *ῥόδον* pro *ῥόδον* Etymologico: At Plutarcho 3. simpl. qui *ῥόδον* πάλιν τὴν ὁσμὴν ἀγρίαν, quod largum odoris effluviū emittat. Theophrasto 1. hist. 15. Rosa inter suffrutices est, & perpetuo cacumine viret: 1. hist. 21. flores bicolores sunt, quod in his alterum florem insidentem medium gerit: 1. hist. 22. verum flos ipse super fructum est: 6. hist. 2. ramus aculeatus sunt. Et Plinio libr. 21. cap. 4. Rosa nascitur spina verius quàm frutice, in Rubo quoque, proveniens, illic etiam jucundi odoris, quàmvis angustij. Germinat omnis primo inclusa granoso cortice: quo mox intumescit & in vi-

in virides alabaftros fastigiato, paulatim rubescens debiscit ac sese pandit, in calicis medio sui stantis complexu, luteos apices.

Differentia Theophrasto 6. hist. 6. permulta sunt, foliorum multitudine, paucitate, asperitate, levitate, colore, odore: cum plurimis quina folia sunt, quibusdam duodena, videnag, alijs longe plura: sunt enim quae Centifolias vocant, sed folia interna parva admodum sunt: ita enim oriuntur, ut alia intus alia extra emicent, non tamen jucundi odoris, odoratiores inter amplas quibus pars ima scabra: & 6. caus. 29. urbana rosa odoratiores est sylvestri. At Plinius genera nostri fecere celeberrima, Prænestinam & Campanam: addidere alijs Milefiam, cui sit ardentissimus color, non excedentis duodena folia: proximam ei Trachiniam, minus rubentem: mox Alabandicam viliores albicantibus folijs: vilissimam vero plurimis sed minutissimis Spineolam, &c. & mox: inter has media quam Coroneolam vocant: omnes sine odore, præter Coroneolam, & in rubro natam: addit adhuc alias, quæ a quoque potius Rose appellatae sunt: addit & ea quæ ex Theophrasto adscripsimus. Sane Rosa variant floribus colore, qui varius est, albus, candidus, pallidus, carneus, rubens: sic differentia est in foliorum numero, magnitudine & odore: fructus quoque, aliqua differentia pro magnitudine & parvitate, asperitate & levitate. Sic in India Occiden. rosis omnia plena passim: & præter rosas ex Hispania importatas, species earum plurimæ alia nascuntur, quarum alia rubra, alia crocea, nonnulla cerulea, quadam candida videntur: quæ cristarum specie capitibus suis gestant: part. 9. Ind. Occid. l. 4. c. 27.

Rosa sativa.

I. Rosa rubra.

Rosa Milefia, Plinij.
Rosa sativa rubra multiplex, Brunf.
Rosa domestica punicea, Marth.
Rosa hortensis rubra multiplex, Trag.
Rosa hortensis, Fuch.
Rosa, Tur. Lac. Lon. rubra, Cord. in Diosc. Lugd.
Ad. Tab. Ger.
Rosa rubra urbana, Gef. hort.
Rosa sativa rubra, Ang. Cast.
Rosa sativa 3. quæ Provincialis Gallis, Dod.
Rosa Damascena, Lob.
Rosa rubens multifolia, Cæf.
Rosa intensè rubens, Cam.

Est simplex & multiplex, colore magis minusque rubro: huc referre oportet, ex Eystett. hort.

1. Rosam Milefiam flore rubro pleno: vulgo Rosa fina.

2. Rosam Milefiam flore simplici rubro, &

3. Rosam ex rubro nigricante flore pleno, &

4. Rosam rubicundam Saccharinam dictam, Græcula Plinij, Camer.

II. Rosa rubra pallidior.

Rosa sativa quarta quæ francha Gallis, Dod.

Rosa holosericea, Lob. ico.

Rosa rubicunda, Cam.

Rosa tertia, Cæf.

Rosa Damascena rubra, Lugd.

Alijs Trachinia, Prænestina alijs, alijs Græcula Plinij: hæc priore minus rubet & flore simplici plerumque est, & folijs latissimis, cujus fructus spinis communiter caret.

III. Rosa saturatius rubens.

Rosa prima Prænestinæ similes, Clus. hist.

Rosa purpurea, five in rubro nigricans, Cam.

Folijs est quadragenis amplioribus, saturatius rubentibus, ad nigredinem vergentibus & alabaftro crassiore.

IV. Rosa purpurea.

Rosa trachynia, Plinio.

Rosa hortensis ex purpura albicans, Trag. Gef. ner. hort.

Rosa domestica carnis colorem referens, Matt.

Rosa incarnata, Ang. Cam.

Rosa sativa secunda five incarnata, Dod.

Rosa rubra five carnei coloris, Bellon.

Rosa pallida, Ad.

Rosa roseo colore, Cæf.

Rosa sativa purpurea, Cast.

Rosa minus rubens, Lugd.

Rosa provincialis major, Tab. Ger.

Rosa provincialis fl. incarnato pleno, Eyst.

Rosas purpureas five rubeas, colore carni similes Pharmacopœis Zebedenas dici, Joannius in tractatu de pilulis Aloës scribit.

Quibusdam Alabandicæ similis, alijs Prænestina, alijs Campana Plinij.

V. Rosa versicolor.

Rosa prænestina versicolor, Clus. hist.

Variat: nam flos media ex parte candicantibus, altera purpurascens folijs, vel venis similis coloris aspersis constat. Vel folia quædam integra alba, quædam integra rubra, inter se commixta sunt.

VI. Rosa maxima multiplex.

Rosa centifolia Batavica rubra, Clus. hist. Eyst.

Ppp

an

anCentifolia veterum, quam inodoram dicunt, cum hæc odora sit.

Variat: communiter flos ex albo rubet: habetur & alba, quæ

Rosa alba major Provincialis, Clus. hist.

Rosa centifolia Batavica alba, Clus. hist.

Rosa provincialis flore albo, Eyst.

VII. Rosa multiplex media.

Rosa centifolia Batavica secunda, Clus. hist.

VIII. Rosa major Prænestina, Clus. hist.

Rosa prænestina variegata, Eyst.

IX. Rosa alba vulgaris major.

Rosa Campana Plinij.

Rosa fativa alba, Brunf. vel 1. Dod.

Rosa hortensis candida, Trag. alba, Gef. hor.

Rosa domestica alba, Marth.

Rosa alba, Ang. Cam. Lugd. Tab. Ger.

Rosa candida, Ad.

Rosa quarta candida, Cæf.

Hæc quibusdam spineola, alijs Alabandica Plinij censetur: foliorum numero flores variant: hinc

Rosa flore albo pleno; & Rosa alba flore simplici, Eystet.

X. Rosa alba minor.

Rosa lacteola quæ centifolia Plinij videtur, Camer. Eystet.

XI. Rosa moschata simplici flore.

Rosa moschata & Damascena, Marth.

Nesfrim (vel Nesfrim) Serapionis, Ang.

Rosa fativa quinta, Dod.

Rosa muscata simplex, Gef. hort. flore simplici, Lob. Gerard.

Rosa muscatula, Cæf.

Rosa alba Damascena flore simplici, Cast.

Rosa Damascena (quasi de Sceni apud Arabes) simplici flore, Cam. Eyst.

Rosa coroneola, quam Damascen. vocant, Lug.

Rosa muscata alba, Tab.

Hæc minor est & major, quæ

Rosa muscata major, Lob. ico.

Hæc alba est, nonnunquam ex albo ad puniceum nonnihil vergit.

Rosæ moschata cum syl. tum domesticæ, rubræ, albæ & virides, Bellon. 1. de cult. meminit.

XII. Rosa moschata flore pleno.

Rosa coroneola, Plinio.

Rosa muscata multiplex, Gef. hort. Ger.

Rosa muscata, Damascena, Alexandrinæ, Eid. append.

Rosa fativa quinta multiplex, Dod.

Rosa muscata, Adv. Lob. icon, alba multiplex, Tabern.

Rosa muscatula multifolia, Cæf.

Rosa alba Damascena flore pleno, Cast. Eyst.

Rosa coroneola altera, Lugd.

Rosa Damascena sive muscata pleno flore, Cam. Alijs Prænestina Plinij.

XIII. Rosa moschata semper virens.

Rosa semper virens flore albo, Clus. hist. append. alt. auct.

XIV. Rosa spinis carens flore majore.

Rosa sine spinis prima, Clus. pan. at secunda in histor.

Rosa sine spinis, Cam. Tab. Ger.

Colore est inter Prænestinas & rubras media: sunt qui & albo observant.

XV. Rosa sine spinis flore minore.

Rosa sine spinis altera, Clus. pan. & hist.

Colore fecem vini ferè refert.

XVI. Rosa subviridis.

Si in teneras Agrifolij arbusculas Rosæ inferantur, flores subvirides producuntur, Cameraarius. Quamvis interdum anni constitutione frigidior & humidior, herbacei coloris rosæ, sine calyce proveniant, cujus causam Costæus de natur. stirp. explicat.

Si Brassicæ antiquo stipiti aut Quercui germen tenellum Rosæ inferas, virides sed inodora Rosæ nascuntur, Carolus Stephanus.

In hortis Italiæ, cæruleas reperiri, in historia Lugdunensi habetur, ex Advers.

XVII. Rosam folio subrotundo & crispo, in horto Montembelgardico ante plures annos, sed absque flore observavi, cujus ramulum exsiccatum asservo.

Rosa sylvestris

Rosam sylvestrem Dioscorides l. 1. c. 123. vocat, quam aliqui Oxyacantham appellant: frutex est (inquit) rubo longè major, arborecens: folia fert multò latiora quam Myrtus, aculeos verò circa virgas robustos: florem candidum, fructum oblongum, olivæ nucleo similem, qui dum maturefcit, fulvus, intus verò lanuginosus conspicitur. At Theoph. 3. hist. 18. Cynosbatos (cani rubus Gazæ) fructum subrotundum parit, malo puniceo similem: est inter fruticem & arborem, puniceæ non absimilis folio amerinæ. Plinio l. 8. c. 4. radix sylv. rosæ, quæ Cynorrhodos appellatur: & l. 25. c. 2. Cynorrhodo

rhodo una medicina erat, spongiolæ quæ in medijs spinis ejus nascitur.

I. Rosa syl. vulgaris flore odorato incarnato.

Cynosbatos Dioscoridi, Lon. Adv.

Cynorrhodos Plinij: & Barbaro.

Sentis canis & Cynosbatos, Brunf.

Rosæ syl. primum genus, Trag.

Rosa syl. Math. Ang. Gefn. hort. Dodon. Tab.

odora, Ger.

Cynosbatos procerior & Cynorrhodos, Cord. in Diosc.

Cynorrhodos seu Rosa canina, Thal.

Rosa syl. vulgaris, Lugd. Cam. ep.

Rosa canina odorata & syl. Lob.

Rosa syl. altior, Cæf.

Rosa canina, Cam.

Cynosbatos & Rubi tertium genus, Lugd.

Rosa syl. odorata incarnato flore, Eyft.

Flores ex purpura dilute albicant.

Huic, ut & tertiæ, Spongiola adnascitur,

quam Plinius in Cynosbato, pilulam Castaneæ

similem: in Cynorrhodo, spongiolam vocat.

Rosæ syl. spongia dicitur Cynorrhodon, Ang.

Spongiola syl. rosæ, Dod.

Spongia Bedeguaris, Adv.

Bedeguar officinis perperam.

II. Rosa syl. flore majore & rubente.

Rosa syl. flore rubro, Eyft. colore & majoribus

folijs à priore differt.

III. Rosa syl. flore pleno.

an Rosa Alabandica, Plinij.

Rosa syl. odorata flore multiplici, Lob. ico.

Rosa canina duplicato flore, Cam.

IV. Rosa syl. folijs odoratis.

Englanteria, Ruellio.

Rosa syl. altera, Trag. Gefn. hort.

Rubus canis, Esplanterium, Turn.

Cynosbatos & Cynorrhodos altera, Cord. in

Diosc.

Cynosbatos, Lac.

Rosa 10. Cynorrhodi vel caninæ rosæ odorata

species, Dod.

Rosæ syl. species altera, Lugd.

Rosa eglanteria, Adv. Tab. Eyft.

Rosa canina, Ger.

Flos ex purpura satura candicat.

V. Rosa syl. odoratissimo rubro flore.

Rosæ syl. tertium genus, Trag.

an Cynosbatos quarta, Cord. in Diosc.

Rosa syl. Gefn. hort.

VI. Rosa syl. odorata albo flore.

Rosa syl. humilior, Cæf.

Rosa quarta an Græcula Plinij, Clus. hist.

VII. Rosa odore Cinamomi simplex.

Rosa cinamomina & 7. vel syl. 2. Dod.

Rosæ de canelle, Lob. ico.

Rosa cinamomea, Adv. Lugd. simplex, Cam.

an Cynorrhodos seu Rosa sylvestris, Thal.

Pro Lychnide Plinij Gefnerus habet: & in

Albio monte, majorem & minorem nasci tra-

dit: illam foeminam, hanc marem faciens.

VIII. Rosa odore Cinamomi flore pleno.

Rosa cinamomea pleno flore, Clus. pan. & hist.

Eyftett.

Rosa cinamomea altera, Cam.

Spermoniam Plinij, sic enim, non Spineolam

aut spinosam legendum, Barbarus vult: quàm-

vis alij Sycibicum legendum putant, Cam.

Flos dilute purpurascit & in medio suave

rutilat.

IX. Rosa rubra præcox flore simplici: exi-

guo odore & folijs latioribus à prædicta discer-

nenda, Eyft.

X. Rosa minor rubello flore, quæ vulgo à

menfe Majo, Majalis dicitur.

Rosa cinamomea altera, Cam.

Rosa provincialis minor, Tab. Ger.

XI. Rosa lutea simplex.

Rosa lutea, Ang. Adv. Lob. Cæf. Cast. Lugdun.

Cam. Tab. Ger. flore simplici, Eyft.

Rosæ citrinæ, Gefn. hort.

Rosa syl. tertia, vel Rosa octava, Dod.

Meminit Gefnerus Rosarum, quæ moschum

fragrant & luteæ sint: tales non vidimus, sed

fruticis folia odorata observavimus.

XII. Rosa lutea multiplex.

Rosa flava plena, Clus. hist. & app. 2. & cur. post.

Rosa lutea maxima flore pleno, Eyft.

Hæc duplex, altera florem totum expandit:

altera verò semiclanfo flore permanet.

XIII. Rosa campestris spinosissima flore

albo odoro.

Rosa campestris odora, & quinta, Cl. pan. & hist.

Cynorrhodon polyacanthos, Lugd.

Rosa campestris odorata Clusij, Cam.

Rosa Dunensis, vel species nona, Dod.

Rosa præcox spinosa fl. albo, Eyft. (rubeat.

Flos albus, fructus maturus niger, cum aliorū

XIV. Rosa syl. pumila rubens.

Rosa quarta, Cl. pan. at in hist. sexta & pumila.

PPP 2

Fructus

Fructus maximus & pyri in modum turbidatus.

XV. Rosa sylv. pomifera major: hæc sequente altior, ramosior, paucissimis aculeis, folijs majoribus, pallide virentibus, & apud nos locis humidis in Alnetis provenit.

XVI. Rosa sylv. pomifera minor.

Rosa sylv. pomifera. Adv. Lob. Lugd.

Cynorrhodi species, Thal.

Rosa arvena, Tab.

Rosa pimpinella, Ger.

Hanc Lobelius spinis carentem, at Tabernamontanum spinosam pingit: utramque habemus.

XVII. Rosa arvensis candida.

Rosæ sylv. quarta species, Trag.

XVIII. Rosa campestris repens alba.

Cynosbatus sive Cynorrhodos, Cord. in Diosc.

XIX. Rosa campestris spinis carens biflora.

Rosa Græca & Cynorrhodon læve, Lugd.

Flore est languide rubro, vere & autumnoprodiens, quæ duplex, alia odoris expers, alia folijs exiguus suavissimi odoris, in monte Pilati Lugdunensium.

Rosa Hierichuntica dicta.

Nominis hujus authorem fuisse Monachum,

Bellonius refert, cum tamen circa Hierichonunquam reperiatur, sed in Arabia deserta, ad littora maris in fabulo: & Rauvvolius, in Syriæ tectis & rudibus, ejus sylvestrem speciem invenit: hanc à pluribus nunc annis in hortulo meo colo, cum facile & crescat & floreat: de qua Joh. Sturmius Lovaniensis professor, libellum superstitionibus plenum, scripsit.

I. Rosa Hierichuntea vulgo dicta.

Amomum, Cord. in Diosc. & hist.

Amomis Diosc. & Plinij, Cæs.

Rosa Hiericontea, Turn. Lon. Lob. Garz. Cast. aperta & conclusa, Eyst.

Rosa de Hiericho & Rosa Mariæ monachis, Lugdun.

Rosa Hiericonthina 1. & 2. Tab. major, Ger.

Duplicem fecit Cordus, alteram inspidam inodoram, quæ Amomis: alteram aromaticam odoratam, quæ Amomum fit. Sed de Amomo vide suo loco.

II. Rosa Hiericonthea sylvestris.

Rosæ Hiericonthis sylv. species, Rauv. Cam.

III. Rosa Hiericonthica exsiccata similis. Blatterlos Holandis, fruticulus ad Scorbutum, Indiæ orient. part. 4. fig. 21.



SECTIO QUINTA.

MYRICA SIVE TAMARISCUS; ERICA; SABINA;
CEDRUS BACCIFERA; CUPRESSUS; JUNIPERUS;
Asparagus & Corrua.

MYRICA SIVE TAMARISCUS.

Myrice (Gaza modo Myricam, modo Tamariscum vertit) arbor nota est, fructum veluti florem ferens compage muscosum: in Aegypto & Syria quedam nascitur sativa, cetera sylvestri similis, fructum ferens Galle proximum &c. Sunt qui de caudice calices conficiunt, quibus splenetici poculorum vice utuntur: Diosc. l. 1. c. 116. Et Theoph. 1. hist. 16. Myrica folia carnosia sunt ut Cupressi, & inter frutices numeratur: 5. hist. 6. in Tylo Arabia insula ferunt Myricæ lignum, non ut apud nos imbecillum esse, sed validum sicuti Ili-gneum, &c. Plinio l. 13. c. 21. Myricen & Italia, quam alij Tamaricen vocant, Achæia autem Bryan sylvestrem: insigne in ea, quoddam sativa tantum ferat Galle similem fructum: & l. 24. c. 9. Myricen quam & Tamaricen vocat Lenæus, similem scopis Amerinis dicit, &c. & l. 16. c. 24. Tamarici folia carnosia sunt: & l. 16. c. 21. quæ non decidunt: & c. 26. fructum nullum fert, ne semen quidem, scopis tantum nascens.

Genera duo sunt Dioscoridi, sativa & sylvestris: & Plinio l. 24. c. 9. sylvestris plane sterilis, altera mitior: hæc fert in Aegypto Syriaque, etiam abundanter lignosum fructum, majorem galla, asperum gustu, quo Medici utuntur vice Galla. Et Cordo rectè monente, etiam in Germania duplex invenitur, alterum solidiore ligno, medulla exili, folijs tenuibus, ad Rhenum: alterum ligno non adeo solido, medulla ampliore & folijs latiusculis ad Danubium. Et procerior Tamarix, & humilior, quæ diminutiva forma Tamariscus dicitur.

I. Tama-

I. Tamarix fruticosa folio crassiore : sive Germanica.
Tamariscus, Brunf. Lon. femina, Cord. hist.
Myrica, Trag. Turn. Geln. hort. Lac.
Myrica sylv. sive Tamarix, Matth. Cast.
Myrica humilis, Dod. gal.
Tamarix sylv. femina, Fuch.
Tamarix humilis, Cord. in Diosc.
Myrica, Geln. hort. panonica, Clus. pan.
Myrica sylv. altera, Clus. hist.
Myrica altera in Germania, Cam.
Tamarix, Dod. Tab. Germanica, Lugd.
Tamariscus Germanica, Adv. Lob. Ger.

Ex hac ad Rhenum nata, doliola sextarium dimidium capacia, confecta, Francofurtum deferuntur.

II. Tamarix altera folio tenuiore sive Gallica. Tamariscus, Ang. Narbonensis, Adv. Lob. Ger. Tamarisci aliud genus, Rauv. Myrica circa Monspelium, Geln. hort. Tamarix Narbonensis, Lugd. Tamarix Gallica aut Hispanica, Clus. pan. Myrica, Cæs. sylv. prima, Clus. hist.

Myrica sive Tamariscus Gallica, Cam.

Tamarisci sylv. genus, Alpino.

Hæc in arbores quoque in Hispania excre- scit, ut hominis ulna vix amplecti possit.

III. Tamarix Ægyptia arbor.

Myrica ingentis magnitudinis in Alexandria, Bellon.

Tamarix gallis onusta ad Nilum, Eid.

Tamarix fativa & procera in Ægypto, Cord. in Diosc.

Tamariscus Rauv. & 1. part. Ind. or. 1.2. c. 1.

Tamariscus Atle vocata, Alpino.

Myrica domestica in Ægypto, Cast.

Myrica fativa Diosc. cum gallis mihi non visa, Clus. hisp. & hist.

Galla myricæ.

Chermæf Arabibus, Bellon.

Myricæ Ægyptiæ galla, Clus. hisp. & hist.

Fructus nucum magnitudine, figuræ inter se diversæ longi, breves, rotundi, lati, crassi, graciles, Alpino.

In Ægypto tã in humidis quàm siccis nascitur, ita ut utrobique sylvulæ reperiantur, Bellonius.

E R I C A.

Erica arbor est fruticosa, similis Myricæ, at multo minor, Diosc. lib. 1. cap. 117. & lib. 3. cap. 174. Coris frutex est folio Erica, sed minore, pinguiore & rubente. Erica cacumine fructum fert sicut Pyrea & Amerina, Theoph. 1. hist. 23. Ericam Græci vocant fruticem, non multum à Myrice differentem, colore rorisinarini & pœu folio, Plin. lib. 24. cap. 9. qui lib. 11. cap. 16. mellis sylvestris erica meminit.

Erica folio Myricæ.

I. Erica vulgaris glabra. Erica vulgaris, Trag. Thal. Erice, Fuch. Dod. gal. Erica prima, Matth. Lac. Dod. Lugd. Erica, Cord. in Diosc. Bellon. Lon. Cast. def. Tab. Erica, Turn. Erica Myricæ folio, Ad. Lob. Clus. pan. & hist. Erica vulgaris sive pumila, Ger.

Flos communiter colore dilutioris purpureæ:

& aliquando & autumnus & vere floret: ali-

quando etiam flore albo est, hinc

Erica alba, Tab.

Erica pumila alba, Ger.

Erica flore albo minor, Eyst.

II. Erica Myricæ folio hirsuta.

Ericæ Myricæ folio similis, Clus. hisp. & hist.

Selago Plinij quibusdam, lib. 24. cap. 11. similis

herbæ huic Sabinæ est Selago appellata.

III. Erica genus, quod tota Græcia vulgo

Phana dicitur, Bellon. sed quid?

Erica folio Coridis.

I. Erica maxima alba.

Erica prima, Clus. hisp. Lugd. Tab.

Erica coris folio prima, Clus. hist.

Erica major floribus purpurantibus, Lob. Ger. descr.

III. Erica maxima purpurascens longiori- bus folijs.

Erica secunda, Matth. Dod. gal. Cast. Lug. Tab.

Erica Coridis folio altera, Clus. hisp. & hist.

Erica Juniperifolia dense fruticans Narb. Lob.

IV. Erica frutescens peregrina.

Erica peregrina Brancionis, Lob.

V. Erica major floribus herbaceo purpureis.

Erica tertia, Clus. hisp. Lugd. Tab.

Erica coris folio tertia, Clus. hist.

Erica major floribus herbaceis purpurantibus, Lob.

Erica cruciata, Ger.

Hujus altera species, cujus flosculi herbacei racematim & spicatum coherent.

VI. Erica major scoparia folijs deciduis.

PPP 3

Erica

Erica quarta, Clus. hisp. Lugd. Tab.
 Erica scoparia flosculis herbaceis, Lob.
 Erica quarta Monspelienfium, Lugd.
 Erica coris folio quarta, Clus. hist.
 Erica pyramidalis, Ger.
 Selago Plinij, Piræa Theophrasti, Guilandino dicebatur.

Hæc biflora est, & ex hac scopæ apud Monspelienfes conficiuntur.

VII. Erica ex rubro nigricans scoparia.

Erica tertia, Dod. gal. Lugd.
 Erica nona, Clus. hisp. Lugd.
 Erica pumila altera Belgarum, Lob.
 an Erica tertia, Dod.
 Erica decima tertia, Clus. hist.

Ex hac scopæ ad vestes purgandas conficiuntur.

VIII. Erica humilis cortice cinericeo arbuti flore.

Erica sexta, Clus. hisp. Lugd. Tab.
 Erica pumila calyculato unedo. flore, Adv. Lobel.

Erica coris folio sexta, Clus. hist.

Erica tenuifolia, Ger.

IX. Erica hirsuta Anglica.

Erica octava, Clus. hisp. Lugd. & Tabern. sub septima pinxit.

Erica juniperifolia altera, Lob.

Erica coris folio duodecima, Clus. hist.

Scopa, Cæf.

Erica tenuifolia caliculata, Ger.

X. Erica ternis per intervalla ramulis.

Erica quinta, Clus. hisp. Lob. Lugd. Tab.

Erica coris folio quinta, Clus. hist.

Erica procumbens.

I. Erica procumbens ternis foliolis carnea.

Erica quarta, Clus. pan.

Erica coris folio nona, Clus. hist.

Huic sæpe capitula viridia è foliolis compacta, capitulorum Thymi modo adnascuntur.

II. Erica procumbens herbacea.

Erica quarta altera, Clus. hisp.

Erica tertia, Clus. pan.

Erica coris folio octava, Clus. hist.

III. Erica procumbens dilute pupurea.

Erica altera, Clus. pan.

Erica coris folio septima, Clus. hist.

Erica baccifera.

I. Erica erecta baccis candidis.

Acacalis Dioscoridis, Amato.

Erica septima, Clus. hisp. Lugd.

Erica baccifera, Lob. Cast. ico.

Erica coris folio decima, Clus. hist.

Erica baccifera tenuifolia, Tab. Ger.

Frutex Lusitanis Camarinnas dictus, Linscot.

Indiæ orient. part. 4. fig. 21. lit. C.

II. Erica baccifera procumbens nigra.

Erica baccifera, Matth. Cast.

Erica baccifera Matthioli, Lob. Lugd. Thal.

Erica prima, Clus. pan.

Erica coris folio undecima, Clus. hist.

an Coris, Cord. in Diosc.

CAMPHORATA.

Camphorata dicitur, quod herba digitis friata, odorem camphoræ nonnihil referat: quam aliqui Selaginem Plinij l. 24. c. 11. quam Sabina similem dicit: alij ejusdem l. 24. c. 15. Chamæpeuce, quam Laricæ folijs similem scribit: quidam Cincorum nigrum esse volunt.

I. Camphorata hirsuta.

Chamæpeuce, Ang.

Camphorata Monspelienfium, Adv. Lob. Camer. Taber.

Selago Plinij sive camphorata, Lugd.

II. Camphorata glabra.

Camæpeuce & Camphorata minor, Lugd.

III. Camphorata congenet.

an Anthyllis altera, Ang.

Anthyllis altera Italarum, Lob. Lugd.

Camphorata altera, Tab.

Anthyllis lentifolia, Ger. ico.

SABINA.

Sabina spæbus, nonnullis spæbus Dioscoridi lib. 1. cap. 104.

Genera duo Dioscoridi l. c. unum folijs simile Cupresso, at spinosius & graveolens, acre ac fervens. curia verò est arbor, & in latum magis se fundens. Alterum genus est folio Myrica simili. Plinio l. 24. c. 11. herba Sabina brathy appellata à Græcis, duum generum est: altera Tamarici similis folio, altera Cupresso: quam quidam Creticam Cupressum dixerunt: & l. 17. c. 13. Sabina herba propagine seritur & avulsione.

I. Sabina

I. Sabina folio Tamarisci Dioscoridis.
Sabina, Brunf. Trag. Fuch. Dod. ut: Bellon. Gef.
hor. Tur. Lob. Cæf. Portæ: vulgaris, Cam.
Sabina sine baccis, five sterilis, Matth. Cast.
Sabina miti folio, Cord. in Diosc.
Sabina altera, Ang.
Sabina vulgator, Ad.
Savina, Lon. mas, Tab.
Sabina Tamarisci similis, Lugd.
Sabina sterilis, Ger.

II. Sabina folio Cupressi.
Sabina baccifera, Matth. Rauvvolf, Cam. Ger.
Sabina altera, Dod. ut:
Sabina, Lac. prima, Ang. qui Thyam Theophr.
cenfet.
Sabina major, Gef. ap.
Genuina sabina baccifera atrorubra, Lob.

Sabina Cupresso similis, Cord. in Diosc. Lugd.

Sabina vera, Cæf.

Sabina fructifera, Cast.

Cum in arborem excrevit, quotannis baccas
juniperinis similes producit,
Sabina foemina minor, Tab.

III. Sabina folijs Cupressi altera.

Sabina baccata altera, Lob. Lugd.

Sabinae alterius altera icon. Dod.

Savina foemina major, Tab.

Ramulorum exilitate & foliorum lenitate
tantum à priore differt.

Differt autem à Cedro, quod Sabinae gravis
odor sit, & Sabinae extremi rami in acuta folia
desinant, & baccæ minores sint & nigrescant:
cum Cedrus Junipero odoratior sit, folio obtu-
so, & baccæ majores phœnicei coloris sint.

C E D R U S.

Cedrus alia est conferta, alia baccifera: de baccifera sic Dioscor. l. i. c. 105. dicitur & altera Cedrus parva,
spinoſa Juniperi modo. fructum ferens magnitudine myrti rotundum. Kide & Theophr. i. hift. 15. perpe-
tuo viret: i. hift. 16. folia habet rari extremitate pungente: 3. hift. 12. quidam binam affirmant, alteram, Aviaev,
alteram pœvulv (puniceam Gaz.a) alij ſimplicem dicunt ſcilicet qui idam incolunt, eſt Junipero non diſſimi-
lis, ſed folio maxime diſtat: quippe Cedro durum, acutum ſpinoſumq; Junipero mollius: excelsior quoq; Jun-
iperu naſci videtur: alij nominibus non dividunt ſed ambas Cedros appellant: Cedrum cum additioe cœvndev
nuncupant, & c. Plinius l. 13. c. 5. Junipero ſimilem habent. Phœniceſ & Cedrum minorem: duo ejus genera,
Lycia & Phœnicia: differunt folio: nam qua durum, acutum, ſpinoſum habet, Oxycedros vocatur, ramoſa &
nodis infeſta. Altera odore præſtat: fructum ferunt Myrti magnitudine, dulcem ſapore.

Cedrus baccifera.

I. Cedrus fol. cupressi major fructu flavescente.
Juniperus major seu Cupressus syl. Dioscoridis,
in Codice Hermolai.
Cedrus Phœnicia, Plinij.
Cedrus Lycia, Matth. Gef. hor. Cast.
Cedrus pumila folijs obtuſis & Phœnicia, Bell.
Cedrus minor, Cord. in Diosc. Portæ.
Oxycedrus Lycia, Dod. Ger.
Juniperus major, Cluſ. hiſp. & hiſt.
Cedrus phœnicea, Ad. media vel ſecunda, five
Oxycedrus folio cupressi, aut Sabina major
Monſpel. Lob.

Thuiæ genus quartum, Lugd.

Cedrus phœnicea ſecunda, Tab.

II. Cedrus folio Cupressi media majoribus
baccis.

Cedrus Lycia, Bellon.

Cedrus minor altera, Diosc.

Cedrus phœnicea altera, Plinij & Theophr. vel
prima, Lob.

Thuia Maſſilienſium, Lugd.

III. Cedrus folio cupressi minor.

Cedrus phœnicea minor vel tertia, Lob.

Hæ tres ſola magnitudine differunt: verum
& duę priores ratione ætatis variare cenſemus,
ita ut Matthiolus adoleſcentem, at Lugdunen-
ſis hiſtoria adultam exprimere videatur. Sic &
ratione ætatis in folijs differentia: primò enim
prodeuntia, Juniperi vulgaris folia emulantur,
quæ paulo breviora & acuta: at adultæ, inſtar
foliorum Cupressi rotundantur, ita ut rami in-
feriores folijs pungentibus & acutis, ſummi ve-
rò, obtuſis & rotundis veſtiantur: hoc expri-
mit figur.

Sabinae bacciferae, Adverſ. & Lob. ico.

T H U Y A E T B R U T A.

Thyas five ðva Theophrasto 5. hift. 5. forma Cupresso similis, cum ramis cum folijs, candice fructuq; vel potius
seu Cupressus sylvestris: & i. hift. 15. ex sylvestribus perpetuo viret. Plinius l. 13. c. 16. Thyas ex Theophrasto
memi-

Juniperus vulgaris celsior & arborefcens, Cluf. hisp. & hift.

Juniperus major fativa, Caft.

Juniperus urbana in arborem affurgens, Lugd.

Tales Thufcia alit, frequenter in agro Senenfi, ut Matthiolus & Lugdunensis monent: & in Hispania, ita ut ex ea trabes & ædium contignationes, multi fabricent, Clufio referente.

III. Juniperus minor montana folio latiore fructuque longiore.

Juniperus minima, Gefn. hort.

Juniperus alpina, Cluf. pan. & hift.

IV. Juniperus major baccâ cæruleâ.

Junip. maximus Illyricus cærulea baccâ, Lob.

an Juniperus alter, Cæf.

Juniperus major, Lugd.

Juniperus major Illyrica, Tab.

Juniperus maximus, Ger.

V. Juniperus major baccâ rufefcente.

Oxycedrus Theoph. & Galeni.

Cedrus phœnicea, Matth. Tab.

Oxycedrus, Dod. gal. Bellon cui & Juniperus, ruber, Cluf. hisp. & hift. Lugd.

Cedrus, Lac. Lon. minor & Cedrula, Gefn. hort. Cedrus magna five Juniperus peregrina, Cord. in Diofc.

Cedrus minor, vel phœnicea, Caft.

Oxycedrus phœnicea, Dod. Ger.

Juniperi prima species, five Diofc. Juniperus, Ang.

Juniperus major Monfpeliensium, Lob.

Oxyarceutis five Juniperus acuta, Adv.

an Juniperus montanus fructu flavo, Cæf.

Etalch Scalig. grandior Juniperus, Lugd.

an Juniperus major Italica baccis rubris, Cam. Alijs Cedrus Lycia Theophrasti.

VI. Junip. major fructu nucis magnitudine.

Juniperus major in Cupressi altitudinem affurgens, fructu dulci, Gallæ quodammodo simili eduli, nucleo olivæ nucleis simili, Bellon. quid?

VII. Arbor Americana oxyacanthæ similis.

Lignum exoticum, Cluf. exot. l. i. c. 6.

an affinis arbori Etalch in Africa nascentis, cujus Joh. Leo in def. Africæ meminit, dubitat Cl.

Incolæ igne refinam eliciunt, qua picis loco utuntur.

ASPARAGUS ET CORRUDA.

Etsi Ἀσπάργος vel ἀσπάργος Galenus 2. alim. omnes propemodum teneros caules & tenera germina, seu ex oleribus & herbis, seu ex suffruticibus, seu ex fruticibus, arboribusq. vocitet, attamen peculiari generi planta etiam tribuitur, qua sic dicta, quod cauliculos hos, qui prima germinatione è terra prodeunt, præcipuos habeat.

Genera duo Dioscoridi lib. i. cap. 152. petraea & fativa: & Galeno Βασίλειον regium & ἰδαίων palustre, sic enim Dioscorides, ἀσπάργος πτερόειρος, quem μυκησίδαν (id est murinam spinam) vocant, vulgaris est nota: & paulo inferius: Asparagus altitil, frutex est ramosus, folia habens multa, longa, fœniculo similia, radice rotunda, grandi, tuberculum habente. Et Theophrastus 6. hift. i. ἀσπάργος (hanc solam vocem per geminam Asparagum corrudam Gaza vertit) ex toto aculeata est, & nullum juxta aculeum folium gerit: & 6. hift. 3. juxta aculeos pusillum quiddam clava simile producit, ex quo flosculus tandem ipse erumpit: radice larga, alta, numerosa, eademq. tam crebra innititur, ut pars superna radicum tota connexa & continua reddatur, ex qua vel ipsorum caulium proventus faciliatur, &c. Plinius lib. 19. cap. 8. omnium hortensium lautissima cura Asparagis, &c. Est & aliud genus incultius asparago, mitius corruda, pasim etiam in montibus nascent, resertis superioris Germania campis non infaceto Tiberij Caesaris dicto, herbam ibi quandam nasci similitam asparago, &c. & paulò infra: indicavimus & Corrudam: hunc enim intelligo sylv. asparagum, quem Græci orminium aut myacanthon vocant: & lib. 19. cap. 4. sylvestres fecerat natura corrudas, ut quisque demeteret pasim &c. altiles spectantur asparagi: & lib. 20. cap. 10. Asparagi vires ubi recensuit, subiungit: sylv. asparagum, aliqui Corrudam, aliqui Libycam vocant: Attici orminium hujus efficacior vis & candidiore major: & lib. 21. cap. 16. in totum spina est Asparagus.

Asparagus folio molli.

I. Asparagus fativa.

Asparagus, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dod. gal.

Cord. in Diofc. & hift. Gefn. hort. (qui majoris

& minoris meminit) Turn. Lon.

Asparagus altitilis, Fuch. Tab. domestica, Bellon.

Asparag. Diofc. idè cum sativo & hortensi, Ang.

Asparagus sativus, Lac. Caft. Lugd. Ger.

Asparagus hortensis, Dod. Adv. Cam.

Asparagus domesticus, Eyst. vulgaris, Lob.

Asparagi alterum genus, Cæf.

Hic cum in pratis Alfatia nobis vicina, & in

pratis ad Danubium sitis, & in Burgundia circa

Vesuntium spontè proveniat, hunc Plinium

Q99

intelli-

intelligere censemus, cum in superioris Germaniæ campis provenire scribit, & hic dicitur Asparagus mitior sponte nascens, Cl. his. & hist.

II. Asparagus sylvestris tenuissimo folio. Asparagi tertium genus sativo simile, qui Palatium leporis, Cæs.

Sola transplantatione & cultura a sativo differt.

III. Asparagus maritimis crassiore folio.

Asparagus *halæ* sive palustris, Galeno.

Asparagus palustris, Matth. Ang. Tab.

Asparagus marinus, Clus. his. & hist. Cam.

Asparagus maritimus Dioscoridis, Ad. Lob.

Asparagi alterum genus, Cæs.

Asparagus sylvestris, Ger.

Asparagus Corrua dictus.

Corrudam nonnulli dictam volunt, teste Ruellio, quod ubi adolevit, facile corruat decidat: sic & Horminum, *ἀνδρὶς ὀξύς*, quod est ruo.

I. Asparagus folijs acutis.

Asparagus petraea Dioscoridi & Galeno.

Corrua & sylv. Asparagus, Plinio.

Aspar. petraeus & Corrua, Matt. Tab. in ic. Ger.

Corrua, Dod. gal. Cord. hist. Rauvv. Bello. Ad.

Lob. ico. Lugd. cui & Corrua Penæ.

Asparagi prima species, Ang. Cæs.

Asparagus sylvestris, Ges. ap. Lac. Dod. Cam. ep. sive Corrua, Bellonio.

Corrua prior, Clus. his. & hist. Tab.

II. Asparagus aculeatus alter, tribus aut quatuor spinis ad eundem exortum.

Asparagus sylv. alter, Dod. Ger.

Corrua altera, Clus. his. & hist. Lugd. Tab. at in ico. Corrua Hispanica.

Corrua Hispanica altera, quæ Lusitanica, Lob.

at in icon. Corruæ varietas.

Asparagi quartum genus, Cæs.

III. Asparagus aculeatus spinis horridus.

Polytricha Bellonio.

Asparagus sylv. tertius, Dod.

Corrua tertia, Clus. his. & hist. Lob. Lug. Tab.

Corrua Hispanica altera, Tab. in icon.

Asparagus sylv. spinosus, Ger.

Asparagi Theophrasti nomine, cui spina pro folio, ex Creta ab Honorio Belli accepimus.

IV. Asparago acul. affinis triplici semper spina. Echinopoda Cretica, Hon. Belli ep. z. ad Clusium, & Ponæ Ital.

Chenopoda Plinij suspicatur Hon. Belli.

Sic autem Plin. l. ii. c. 8. ceras ex omnium arborum satorumq; floribus consingunt, excepta Tumice & Chenopode: plura non habet. Verum aliqui Echinopode legunt, quam quidam Tribulum, alij Echion, alij spinæ genus interpretantur. Sic Dalech. ad Athenæum per Echinopoda, Cardui Chij genus intelligit.

SECTIO SEXTA.

CEDRUS CONIFERA; PEUCE SEU PINUS; PINASTER; LARIX; PITYS SEU PICÆA; SUCCI SIVE HUMORES PLANTARUM; GUMMATA;

Resinæ; Abies; Taxus; Draco arbor; Palma Dactylifera; Palma squamoso fructu; Palma nucifera; Noces exoticæ & Arbores admirandæ.

CEDRUS CONIFERA.

KE Ap. Diosc. l. i. c. 105. arbor magna est, ex qua Cedria dicta colligitur: fructum verò habet uti Cupressus, at grandiore multo: At Serapio, minorem legit. Et Guilandinus com. de Papyro vult eum esse arborem, quam sub Cupresso altera proposuimus. Theophr. 4. hist. 6. & 5. caus. 8. Cedrum Syria gignit, eaq; ad trivemes ætatur: 5. h. 5. ex Cedro simulacrum sculpere solent. Plin. l. 13. c. 5. Et majoris Cedri duo genera, quæ florent fructum non fert: frugifera non floret, & in ea antecedente fructum occupat novus: semen ejus Cupresso simile: quidam Cedrelaten vocant: & l. 24. c. 5. Cedrus magna quam Cedrelaten vocant, dat picem quæ Cedria vocatur.

Cedrus conifera folijs laricis.

Cedrus major, Matth. Dod. gal.

Cedrus arbor conifera, Ges. hort.

Cedrus Hebræorum non Græcorum, forte Ce-

drus Syriæ Theophrasti, Ang.

Cedrus Diosc. & Sacrarum literarum idem, Ang.

Cedrus, Bell. (cui & Libani & Syriæ & in Ama-

no) Rauvv. Cæs. Tab. Libani, Ger.

Cedrus

Cedrus Libani quæ neque Dioscoridis neque Græcorum Cedrus est, Guil.

Cedrus magna, Dod. Portæ.

Cedrus Libani & Palæstinæ præcelsa, Ad. Lob.

Cedrus phœnicia Matthioli, Lugd.

Cedrus phœnicia nostra, Lugd.

Coni non dependent, sed sursum spectant, ut rectè Bellonius, Dodonæus & Dalechampi in hist. Lugdunensi, pingunt.

In regno Congiano tanta copia, tantæque magnitudinis, ut inde naves conficiant: part. 1. Ind. or. l. 2. c. 1. & in insula Tercera scaphæ, curus, rhedæ, & hujus generis alia opera extruunt: part. 3. Ind. or. c. 6.

Sic in Andes nova Hispania, summa copia, ubi alia alba, alia rosea & fragrans: Joseph. A. cost. l. 4. c. 3. ubi de Cedro admiranda, verba facit. Provenit etiam in Virginea & Florida.

DE PEUCE SEU PINU.

Etsi πόνος ἢ πίνος, à Gaza Pinus & Picea vertatur, ab alijs tamen contrario modo sit, & πίνος Picea fortè ob nominis similitudinem redditur: nec mirum, cum ut Dioscorides lib. 1. cap. 86. habet, πίνος, vulgo nota arbor est, ejusdemq; generis est quæ πόνος dicitur, siquidem hæc ab illa specie tantum differat: ita ut tam picea quam pini fructus, qui in conis reperitur πίνος, eodem cap. 87. monente, appelleretur.

Genera: πόνος Theophrasto 3. hist. 10. alia urbana, alia sylvestris: sylvestris duplex est, alteram Idæam, alteram maritimam vocant: harum rectior, celsior, materiq; crassior Idæa: folio teneriori, imbecillioriq; maritima, & cortice leviori, utiliq; ad coria. Quod altera minus. Nux maritima rotunda, brevior, debilis, & Idæa oblongior, viridis, minusq; hircens, tanquam sylvestrior, &c. Idæa ramosior crassiorq; & picem copiosius præbet, &c. Macedones genus quoddam πόνος simile dicunt, & marem brevior, folioq; durior: seminam verò prociorem, folijs pinguem, mollem, proclivior, &c. Mari lignum circumcincta medulla durum & operi fabili versatile: semina tractu omnino facile atq; molliora, quod quidem omnium ferè marium seminarumq; publica differentia est, ut casores materie asseverant, &c. (Plinius lib. 16. cap. 10. lignum maribus durum, & in fabili opere contortum: semina molliora, publico discrimine in securibus) Igitur πόνος genera, urbana atque sylvestre: sylvestris mas & semina, ac tertia sterilis. At Arcadiæ incolæ, nec sterilem nec urbanam πόνος appellant, sed πίνος, &c. Plinio l. c. in Europa sex genera cognatarum arborum ferunt (pinus, pinafter, picea, larix, abies, tæda, taxus) ex ijs pinus atq; pinafter, folium habent capillamenti modò prætenue, longumq; & mucrone aculeatum, &c. Pinafter nil aliud est, quam Pinus sylv. mira altitudine & à medio ramosa, sicuti pinus in vertice: copiosior, pino dat resinam. Sic lib. 15. cap. 10. nucum pinearum genera quatuor recenset, 1. grandissimas, 2. Tarentinas, 3. Sapineas, & picea sativa, 4. pitydas, & pinastris.

I. Pinus sativa.

Pinus urbana folio perpetuo, Theophrasto.

Pinus, Brunf. Trag. Dodon. ut: Bellon. Cord. in Diosc. Lac. Turn. Lon. Cæs. Cast. Portæ: arbor, Gesn. hort.

Pinus domestica, Matth. Tab.

Pinus sativa, Ang. Lugd. Ger.

Pinus vulgarissima, Adv. Lob.

Pinus Italica, Cam.

Nucem πόνος Theophrastus, alij πόνος nomen & novæ quæ vocant: & in hoc genere marem nucem rotundior, seminam longior ferè volunt.

II. Pinus sylvestris.

Pinus sylv. montana Theophrasti.

Pinafter, Brunf. Trag. Tur. Gesn. hort. Lob. Cæs. Thal. Portæ.

Pinus sylvestris, Matth. Cast. seu Pinafter, Dod.

Picea φλόγιος, Ang.

Pinus sponte proveniens, Cord. in Diosc.

Pinus sylv. fructifera, Lugd.

Pinus sylv. montana, Tab.

Pinus sylv. mugo, Ger. ico.

an Pinafter i. vel Austriacus major, Clus. hist. qui duplicem facit album & nigrum.

III. Pinus sylv. montana altera.

Pinus tubulus, Plinio l. 16. c. 10. easdem, inquit, arbores (scilicet Pinum & Pinastrum) alio nomine esse per ora Italiæ, quas Tibulos (strubulos Hermolaus legit) vocant, pleriq; arbitrantur, sed graciles succinctioresque & enodes, liburnicarum ad usus, penè sine resina.

Pinus sylv. Mugo, Matth. Adv. Lob. Tab.

Pinus sylv. altera, Dod. ut: sed edit. lat. tertia descriptione.

Picea altera sive sylvestris, Ang.

Pinus tubulus, Lugd.

Pinus montana minor, Ger.

IV. Pinus sylv. montana tertia.

Teda, Brunf. arbor, Lugd.

Pinus sylv. cembro, Matth. Adv. Tab.

Pinus sylv. tertia, Dod. gal.

Pinafter, Bellonio.

Pinus sylv. altera species, Dod.

Pinus sylvestris, Ger.

Plin. l. 6. c. 10. sextum genus est Teda proprie dicta, abundantior succo, quam reliqua, parrior liquidiorque quam Picea, flammis ac lumini sacrorum etiam gratia.

V. Pinus maritima major.

Pinus maritima prima, Matth. Tab.

an Pinus marina, Ang.

Pinus sylv. quinta, Dod. gal.

Pinus maritima, Lugd. major, Dod.

Pinus maritima Theophrasti, Lob.

Pinus sylv. montana, Ger.

Huc refer sequentem, modo eadem non sit,

Pinus sylv. altera, Lob.

Pinafter 2. & Pinus marina Theoph. Clus. hisp.

Pinafter alter Hispanicus, vel minor Hispanicus, Eid. hist.

Pini maritimæ majoris ramulus, Dod.

Pinus sylv. five sterilis, quia nucleus edules non sunt, Lugd.

Pinus montana Theophrasti, Tab.

Pinus maritima major, Ger.

VI. Pinus maritima altera, Matth. Tab. Lug.

Pinus Idæa Theophrasti, Lob.

Pinus sylv. quarta, Dod. gal.

Pinus sylv. minor, Ger.

an Pinafter primus, Clus. hisp. & hist.

Hæc ab Austriaco majore, fortè tantum ratione soli distat, Clusio monente.

VII. Pinus maritima minor.

an Piceæ genus alterum, Bellon.

Pinus maritima minor, Dod.

Pinafter tertius, Clus. hisp. Lob. Lugd.

Pinafter tertius Hisp. vel pumilo alter, Cl. hist.

an Pinafter alterum genus parvum in maritimis, Cæf.

VIII. Pinafter conis erectis.

Pinafter pumilio, Clus. pan. Cam.

Pinafter quartus Austriacus, Clus. hist.

IX. Pinafter latifolius julis virentibus aut pallescentibus, Clus. pan.

Pinafter secundus Austriacus, Eid. hist.

X. Pinafter tenuifolius julo purpurascens, Clus. pan.

Pinafter tertius Austriacus, Eid. hist.

Thæda, Tab.

Tæda five Pseudopinus, Ger.

Hujus arboris ramos solent nostrates Oenopolæ ante ædes suas proponere, ut Viennenses Abietis teneriores ramos, & aliarum regionum incolæ Hederam.

XI. Pinus Indica nucleo purgante.

Pinei nucleus Malucani, Acostæ, Monardi.

Pinei nucleus cathartici, Lugd.

Pinea purgativa, Cast.

Pinei nucleus Indici, Fragoso.

an Pinioen five Nuces pineæ ex Puna, Joseph. Acost. l. 4. c. 29.

XII. Pino similis Orientalis.

Cibage, Cam.

XIII. Pineos nucleos duros referens fructus. Fructus peregrinus 8. Clus. exot. l. 2. c. 30. & in tab. 3. Lugd. Tab. Ger.

XIV. Pineæ nucus nucleo simile semen flavo spadiceum Brasilianum.

Fructus miscellaneus 9. Clus. exot. l. 2. c. 15.

XV. Arbor spinosa fructu pineæ simili.

Cachi arbor spinosa, cujus fructus Ciccara, forma pineæ nucus, Scalig. Ludovico Romano, Nic. Costino, & ex his Lugd.

L A R I X.

Quæ Larix aut Lavex, etiam Græcis λάρικς nuncupatur, an à Theophrasto descripta fuerit dubitatur: licet hæc vox in Gaze versione reperitur: Gaze tamen Larix nihil aliud est, quam nitrus Theophrasti, quam vocem plerumque Piceam interpretatus est: attamen interdum nitru & vocem, per Piceam & Laricem simul expressit: ut videre est 9. hist. l. ubi legitur τριγυρδov, nitru & λάρικς Gaze reddidit, terebintus, larici, picea, amygdala, &c. Sic Plinius de Lavice agens, ea quæ Theophrastus nitru tribuit, omnia illa Larici adscribit: sic l. 16. c. 10. scribit: quinto generi situs idem, eadem facies, Larix vocatur, materies præstantior, longè incorrupta, vix emori contumax, rubens præterea & odore acrior: plusculum huic erumpit liquoris, melleo colore atque lentore, nunquam durescentis: & mox: Larix nec ardet, nec carbonem facit, nec alio modo ignis vi consumitur quàm lapides. Verum experientia Plinio contrariatur, & ipsius propria verba, dum inquit: in Macedonia Laricem masculam urunt, femina radices tantum. Et l. 16. c. 21. ei perpetuam comam tribuit, cum tamen in nostra larice contrarium contingat. Quare Gaze Larix, est nitrus Theophrasti: at Plinii Larix, est nitrus Theophrasti. An fortè hæc nostra Larix, sit Pinus urbana folio deciduo Theophrasti: siquidem scribat Pini

Pini urbani genus quoddam folium habere perpetuum: sylvestri autem omni id perpetuum esse: ex quibus colligere licet, urbani quoddam genus esse, cui folia decidant, quod in sola Larice animadversum est.

Larix, Brunf. Matth. Bellon. con. Dodon. ut: Ex hac colligitur resina laricea, de qua inter Fuch. Gesn. hort. Lac. Turn. Lon. Adv. Lob. Cast. Resinas. Fungus etiam adnascitur qui Agaricum dicitur, quemadmodum Larici adpungunt, Lob. Tab. Ger.

DE PITY SEU PICEA.

Pirus à πικρὺν differre videtur, Theoph. 3. hist. 10. quod (scilicet Pinus) pinguior sit, folio tenuiori, magnitudine minor, erectaq; minus assurgit: præterea quod conum breviorē horridiorēq; ferat, ac nucem magis resinosa. Ambabus folia capillata, sed Peuce materies candidior, similiorq; Abieti, atq; in totum minus spinosa. Et 3. hist. 6. quidam Pinum & Piceam florere existimant, quidam minime, sed Piceam uti exor, id est, nucamentum gignere, quod Grosius proportionē respondet. Plinius lib. 16. cap. 25. Pinum Piceamq; ullo flore ex hilarari negat: experientia tamen refragatur. Et ut lib. 16. cap. 10. Picea plurimam resinam fundit, interveniente candida gemma, tam simili tburis, ut mista, visu discerni non queat, &c.

Genera duo ex Plinio colligimus, sativam & sylvestrem, illam Sapinum, hanc Piceam nominat. Nam Sapinus inferiorem & enodem Abietis partem significat: sicut superiorem partem nodosam duriorēq; Fusterna, Plinio lib. 16. cap. 39. scribente: verum etiam arborem significat: hac enim lib. 16. cap. 12. habet: inter hac genera proprium quidam fecere Sapium (Sapinum Turnebus legit) quoniam ex cognatione earum feritur: ejusq; arboris imas partes Tedas vocant, cum sit illa arbor nil aliud quam Picea, feritate paulum mitigata satu: Sapinus autem materies casarum ē genere fiat. Sic Plinius ejus nucem Sapineam vocat: nam lib. 15. cap. 10. nucum Pinearum genera enumerans, tertium ait Sapineā, & Picea sativa, nucleorum cute verius quam putamine, adeo molli ut simul mandatur.

I. Picea major prima, sive Abies rubra.

Picea, Brunf. Matth. Ang. Cord. in Diosc. Gesn. hort. Lac. Lon. Adv. Lob. Cæs. cui & Tæda Plinij, Cast. Lugd. Thal. Tab. Ger.

Abies prima & rubra, Trag.

Abies, Dod.

Sapinus, Bellonio, Lac.

Picea Plinij & Abies mascula Theophrasti,

Clus. pan. & hist.

Hanc alij Abietem marem Theophrasti: alij

Piceam φειπέπορον ejusdem r. caus. 9. quam Gaza pediculiferam, Scaliger pediculariam interpretatur. Sic dicta Plin. l. 16. c. 10. quod totis paniculis minoribus gracilioribusq; minimos ac nigros nucleos pediculis similes gignat: alij Tædam Plinij (de qua sub Pino quarta) faciunt.

II. Picea minor.

Picea pumila, Clus. pan.

Pinum tubulum sive tibulum Plinij, Dalechampsius vocare videtur, Clus. hist.

DE SUCCIS SEU HUMORIBUS

Plantarum.

Quemadmodum multis animalibus pili & penna decidunt, & serpentes singulis annis exuvias deponunt: sic & plantis folia, flores & fructus decidunt, & ex earum aliquibus humor superfluous profluit, at Vitibus lacryma: Ceraso, pruno gummi: picea, terebintho, lentisco, resina: alijs alius liquor quantitate molestinus. Nam ut in animalibus sanguis turget, sic in plantis humor seu succus, qui si vel sponte profluat, vel arte educatur, ad earum conservationem facit: nam & plantæ suas venas & nervos habent, per se nomine carentes, ut habet Theophrastus 1. hist. 3. quæ similitudine quadam nomina partium animalium sortiuntur. Sanguis autem plantarum, earum succus proprius est, ut in Ficibus lac, secundum Aristotelem 1. de plantis: in Vite veluti humor: in quibusdam veluti oleum: in alijs pici liquida similis: in nonnullis, ut gummi. Et ut Theoph. l. c. humore plantarum deficiente, & ipse deficere incipiunt, eoq; exsiccat, tabescunt: quem humorem nonnulli simpliciter σάνδρ succum in cunctis appellant, quidam absque nomine relinquunt: in quibusdam verò σάνδρ succum, inq; alijs δάκρυον lacrymam vocant. Idem ferè habet Theophrastus 6. caus. 17. & hic pro coctionis diversitate, diversam crassitiem & colorem nanciscitur. Hinc si hujus humoris consistentiam consideres (ex Theoph. 6. caus. 17.) alijs callosiores lentioresq; sunt: alijs aquosi, minusq; lenti: hinc alijs densari possunt, alijs nequeunt: nonnulli etiam quod densentur atque concrecant, aliquid miscent. Quare succus plantarum, qui υἱός proprie,

is humor est, quo plantae nutriuntur, quique non sponte, sed praecedente expressione, aut alia preparatione elicitur: quique, semper, tenuior est, nisi calore exsiccat, induretur. Liqueor vero sive *ónos*, crassior est, qui interdum sponte, interdum incisione delabitur, & velut lacryma profluit, unde communiter *ἀνγύον* lacryma vocatur. Qui si oleaginosus & liquidus fuerit, *πύρρον* dicitur: si terrestrior, aqueus & in truncis arborum concretus, *ρόμα* gummi: quae vero naturam mediam inter gummi & resinas possident, & partim terrestria & aquea, partim oleaginea & pinguis sunt, *ρόμα* *πύρρον* gummi resina nominatur. Sed de succis inspissatis primum, dein de gummatibus, tum de Resinis, & tandem de Pice.

De succis inspissatis.

I. Ammoniacum, *ἀμμωνιακόν* Dioscoridi l. 3. c. 98. est Ferulae (*ῥόδον*) liquor, & totus cum radice frutex Agasyllis appellatur: Galen. 6. simpl. Ferulae lacryma. Plinio l. 12. c. 23. Hammoniacum lacryma, ab Hammonis oraculo nomen habet, juxta quod gignitur arbor, quam Metopion vocant, resinae modo aut gummi.

Ammoniaci lacryma, Matth.

Hammoniacum seu gutta Hammoniaca, Cord. hist.

Ammoniacum, Caes.

Armoniacum officinis & Gummi ammoniacum.

Probat Dioscorides l. c. bene coloratum (exterius flavum, intus candidum) ligni & calculorum expers, thuris glebarum granorumve similitudine, syncerum ac densum, nulla sordis purcatum, castorei odore, & gustu amarum: quod genus *θραυστή* (thrauston Plinio, quasi dicas fragmentum) appellatur: alterum, quod terrae calculorumve particeps est, *φύραμα* (Phryma Plinio, i. e. mixtura) dicitur: & hoc ad medicamenta in aqua resolvitur.

II. Galbanum *γαλβανόν* Diosc. l. 3. c. 97. liquor est Ferulae in Syria nascentis, quam nonnulli Metopion vocant: Gal. 8. simpl. *γαλβανόν* succus est plantae ferulae: hoc secundum eundem l. de Antidot. in Sagapenum convertitur. Plin. l. 12. c. 25. Galbanum dat & Syria in eodem Amanomonte, e ferula ejusdem nominis resinae modo, quam Stagonitin appellant, de qua & l. 24. c. 5. At Theoph. 9. hist. 7. Chalbani in Syria nascitur ex Paco vocato.

Galbanum, Matth. Cord. hist. Caes.

Probatissimum quod thuris effigiem praebet, colore maxime flavum (tale enim recens est) gummosum purum, pingue, minime lignosum, odore gravi, nec valde humidum, nec penitus aridum, & cum accenditur clarum, flammam nutriendum: hoc Dioscorides resinae & ammoniaci, Plinius vero Sagapeno, adulterari scribit.

III. Opoponax *ὀππωνάξ* Diosc. lib. 3. cap. 95. ex Panacis Heraclei radice concisa colligitur. Gal. 8. simpl. radicibus & caulibus: at Mesuæo, ex ferulaceo panace: nonnullis ex Chironio. Opoponacis Plinius lib. 20. cap. 24. in Theriaca meminit.

Opoponax five Opoponacum, Cord. hist. Lugd.

Opoponax, Caes.

Probatur amarissimum, intus candidum aut subflavum, foris ad auri colorem inclinans, laeve, pingue, Galbani instar lentescens, friabile, graveolens, & dum resolvitur propius ad lacteam liquorem accedens.

IV. Sagapenum: *σαγαπένον* Diosc. l. 3. c. 96. ferulaceae herbae liquor, quae in Media nascitur: Gal. 8. simpl. ex planta ferulae (panaci addit Clusius) alsimili. Sanè ipsa planta Sagapenum dicitur, at liquor abusive hoc nomen obtinuit, rectius Sagapeni succus diceretur. Plin. l. 20. c. 18. Sagapenum, Hammoniaci lacrymae simile. Sagapenum officinis Serapinum, Matth. Cord. hist.

Sagapenum, Caes.

Probatur quod sincerum, pellucidum, foris rufis, intus cum frangitur flavis aut candicantibus guttis compactum, inter digitos lentescens, medio inter Silphium & Galbanum odore, acrisque gustu: & ut Asa foetida resolvitur.

V. Meconium, *μικόνιον* Diosc. lib. 4. capite 65. succus est, ex papaveris nigri folijs & vasculis tuis expressus & exsiccat, quem privatim Graeci *μικόνιον* vocant, sed liquore viribus multo imbecillior est: propter aqueam & incoctam substantiam. Eidem l. 6. c. 17. *μικόνιον* dicitur. Plinio l. 23. c. 1. Meconium: licet eidem l. 20. c. 19. Mecon thymali species sit: & lib. 27. c. 12. meconion aphrodes, peplos est. Meconium, Lugd.

VI. Opium, *ὀπός* *τὸ μῆλον* Diosc. l. 4. c. 65. est liquor lacteus, qui ex papaveris nigri scapo leviter inciso colligitur: ubi colligendi modum docet.

Opium

Opium, Matth. Cæs. Lugd.

Opium nigri papaveris liquor, Cord. hist.

Opium, Osum Mauritanis, Garz. Frag. vide Acoftam.

Ambion five Opium, Linsc. par. 4. Ind. Or. c. 34.

Opium triplex est: album quod è Cairo adfertur, quod forte Thebaicum: alterum nigrum & durum, ex Aden: tertium flavescens magis ac mollius ex Cambaja & Decan, Garz. Linscot. lib. c. at Fragosus, albicantis & nigri tantum meminit.

Ex Papavere nigro elicitur, Plin. l. 20. c. 18. & Avicennæ: at apud Turcas ex papavere albo, qui totos agros, ut nos tritico conferunt, cum apud eos & Persas in quotidiano usu sit, at drachmæ unius pondus: ejus enim usu se animo-fiores fieri credunt, neq; belli pericula reformidare, Bellonio scribente: & ut Linscot. l. c. qui semel, sed sensim, assuevit, nisi indies iteret, brevi tabidus moritur: & si per dies quatuor aut quinq; intermittat moritur. Paludanus in Linsc. scribit, Turcis privato nomine Maslac vocari, & ab ipsis indies pisci magnitudine devorari.

Probatur candidum, vel leoninorum pilorum modo flavescens, in massam veluti ex granulis diversi coloris coactum grave, densum, solidum, sine fordibus existens, amarum, gustu calidum, odore gravi & viroso, somnum inducens & in aqua promptè liquefens, Bellonio & Paludano monentibus: & hoc in Asia minore in placentulas unciarum quatuor, vel selibre pondocogitur. Quis ergo nostrum adulteratum esse non animadvertit? Attamen ex eo quod adfertur, eligendum, purum, colore maxime rufum aut spadiceum, cum frangitur, splendore quodam nitens & quod facile dissolvitur, sed non ceræ instar lentescens.

VII. Αλοῦ, Aloë & de herba & ejus succo densato dicitur: ex Aloë, Diof. l. 3. c. 25. (ὀπίσθη) succus coactus ex India adfertur.

Genera duo (τὸ χυλίσμα) succi: alterum arenosum, quod veluti sæx & crassamentum purissimè esse creditur: alterum (ὀπασίον) ad jecoris imaginem vergit, Diof. l. c. Recentioribus illam Caballinam, quod equis & veterinarijs medicandis dicata sit: hanc Hepaticam, quod Hepatis modo coacta sit, nominat: quam etiam nonnulli Succotrinam, quasi succo citrina, quod ejus pulvis citrinus sit. Vel potius Socotrina (ut Linsc. p. 4. Ind. Or. c. 6. & p. 4. c. 38.) à solo natali

Socotra Insula, quæ alijs omnibus præstat, solida atq; compacta. Sunt tamen qui has differentias faciant, succotrinam, subcitrinam & optimam: alteram Hepaticam, nigriorem synceram tamen: 3. Caballinam, lividam, arenosam. Aloë, Matth. Cord. hist. Lugdun. Aloë ex India, Cæs.alp.

Eligenda pinguis, nitida, calculorum expers, sub flava, hyeme friabilis, æstate molliuscula, hepatis modo coacta, facile humescens, eximieque amara: nigra contrà, fractuque contumax, improbanda: lavanda quin etiam & quod arenosum substitit abjiciendum, pinguisimum & quod leve est recipiendum: hæc Diof. l. c. Apulam & Hispanicam succo faciendo inutilem Cordus scribit: at quomodo tam Hepatica, quam Socotera dicta, ex nostra Aloë elici possit, eleganter Doctif. Fabius Columna in sua plant. in præf. ostendit.

VIII. Succus Aloë facie.

Iraituch & Aiavve succus primus & America, Musæ folijs involutus, Clus. ex. l. 4. c. 7.

IX. Scammoneum σκαμμονία, Scammoneæ plantæ succus, qui ex radice lactei succi plena incisa & exsiccata reservatur: cujus modum Diofcorides l. 4. c. 171. docuit.

Scammonium, Plin. l. 26. c. 8. vocat: quem tantum usui esse, Theophrastus 9. hist. 12. scribit. Scammonium, Matth. Cord. hist. Cæs. Lugd.

Scammonea officinis ad Arabum imitationem hic succus dicitur, qui densatus in massas cogitur, & exsiccatus fuscus, aut lividus, aut cinereus, aut fulvus redditur.

Differentiæ hujus ratione loci apud Diof. & Plinium: ille, eum qui ex Mysia regione Asiæ deportatur, commendat: natione autem Syriacum & Judaicum deterrimum haberi, ervi farina & Tithymalo adulteratum. At Plinio laudatur Colophonium, Mysium, Priennense: adulterinum verò fieri ervi farina & Tithymali marini succo, in Judæa ferè, quod deprehendatur gustu, cum Tithymalus lingua excalefaciat, & c. Quod verò Scammonium nostrum, neras à Diofcorid. tributas non habeat, causa putatur, quod hoc tempore veterem parandi modum non observent, ac non ex radice incisa, ut Diofcorides docuit, sed prorsus dissecta, vel expressa, aut è stipitibus & folijs contusis paretur: alioqui tanta Scammonij copia quotannis vix afferri posset; vel etiam lacte Tithymali adulteratum.

Opti-

Optimum est quod ex Anthiochia defertur, dein Armeni, Europæum omnino prævum est. Probatum quod pellucidum, læve, rarum, spongiæ instar foraminosum, colore cum frangitur fulvum, taurini glutinis modo translucens: nec vehementer linguam excalefaciens (quod admisti Tithymali argumentum est) & cum linguæ affricatur, in candidissimum liquorem lacti similem se superficie resolvens: cito liquefcens, friabile, non valde ponderosum, nec tetri odoris. At glebæ ingentes nigræ & graves, aut adulteratæ sunt, aut succus est ex tota planta expressus.

Hujus vehementia corrigitur à quibusdam Aloë addita; sed rectius, si Malo cydonio excavato indatur, pasta circumdetur, & in clibano coquatur, dein contundatur, ut veteres fecere: aut ut alij, in succo Cydonio coquatur: melius verò si semina fœniculi, anisi, dauci adderentur. Sic correctum Diacrydium, quasi lacrymula dicitur, in officinis Diagredium, quod nimis recens, vehemens: antiquum imbecillum, quare tormina excitans: bimum optimum est.

X. Elaterium, *ἐλατήριον* Dioscoridi l. 4. c. 155. & Theophrasto 9. hist. 10. dicitur (Gaza agitatorium vertit, fortè quia motu turbatorio corpus exagitat) Elaterium Plinio l. 20. c. 1.

Hoc Dioscorides ex succo fructus, addito extrahendi modo: Theophrastus ex semine (fructum intelligens) liquato: Plinius ex succo è semine expresso fieri scribit. Hoc à bimatu ad decennium colore candido utile, Dioscoridi: Ægineta, quod anno antiquius non est, & quod virefcit probat. Theophrasto, omnium medicamentorum diuturnissimum, & optimum quod vetustissimum: hinc Plinius ex Theophrasto 9. hist. 14. ducentis annis servatum meminit. Hòc Hippocrates usus fuit, nunc verò ob ejus vehementiam, non facile usurpatur.

Elaterium, quod leve & candidum & igne instar pinguedinis accenditur, Bellon. Elaterium, Matth. Bellon. Cæs. Lugd.

Plinius l. 20. c. 1. meminit Cucumeris sylv. in Arabia nati, heliotropio simili, semine nucis juglandis, quod semine & Elaterio contra serpentes efficacissimum sit: hoc necdum novimus.

XI. Euphorbium *εὐφώριον*, succus est acerrimus, arboris ferulæ speciem gerentis, Diosc. l. 3. c. 96. qui & colligendi modum docet, ut supra, l. 10. sect. 6. ostendimus: At Dodonæo non arbor, sed herba potius est, cujus folijs incisus li-

quor acerrimus, facileque concrescens effluit: verum ætate arborescere videtur.

Euphorbium Plinio.

Euphorbium, Matth. Cæs. alp. Lugd. euphorbiæ nominatæ plantæ liquor, Cord. hist.

Genera duo sunt: unum Sarcocollæ modo pellucidum, flavum, pisi magnitudine in guttas æquales densatum, modicè cavernosum: alterum in utriculis quibus excipitur, in massam densatur, candicans, aut vitri colore: adulteratur Sarcocolla, aut gummi & tithymali liquoris admixtione. Eligendum est purum, translucens, candidum aut flavum & acre, quod levi linguæ contactu os accensum diu detinet: quare etiam non sine molestia tunditur, nisi naribus diligenter obturatis & munitis.

XII. Succus liquiritiæ: ex radicibus succus exprimitur, & in pastillos condensatur ex Cappadocia, Hispania, etiam Bambergæ ubi frequens est, adfertur.

XIII. Succus Acaciæ: ex Acacia in Ægypto (*ιχθυόσμη*) succus exprimitur, qui in umbra siccat, ex maturo quidem fructu niger, ex immatura subfervulus redditur: aliqui tamen è folijs una cū ipso fructu exprimunt. Eligendus modicè fulvus & odoratus: hæc Dioscorides l. 1. c. 133. Acacia legitima, Matth. Lugd.

XIV. Acacia Germanica: ex prunis sylvestribus costis succus exprimitur, infolatur & exsiccat, & ressulatim divisus, Acaciæ veræ loco asservatur.

Succus è syl. prunis. Acaciæ succedaneum, Matth. Acacia Germanica, Dod.

De Manna.

I. Manna.

Δροσόμελι & ἀνθήμελι, Galeno.

Melleus humor in Robore, Theophrasto.

Mel ex aëre, cui cœlestis natura, Plinio.

Men, Siracost & Terniabin, Arabibus.

Thereniabin & Trungibin, Serapioni & Avicennæ.

Manna purgatoria, Matth.

Drosomeli, Cord. hist.

Manna & mel roscidum, Cæs.

Manna, Persis Xercest, five Xerkest, id est Lac arboreum, Linscot. part. 4. Ind. or. 29.

Est autem Manna seu Mel aëreum vapor teræ succosus & optimus, ætatis calore elevatus, & in aëre in dulcem liquorem excoctus, noctis frigore coactus, & roris modo supra arborum & fruticum folia decidens.

II. Man-

II. Manna liquida.

Cedrium mel Hippocr. Ros Libani Græcis, Bel. Terniabin Arabibus & Turcis, Eid.

Manna mellis instar liquida, Linscot.

an Manna Germanica liquida flava, ceu Syrupus folijs insidens, liquidum permanens, dum ab apibus auferatur, Cord. hist.

Hæc in monte Sinai colligitur, & instar mellis in fœtibus, Cairum venalis defertur.

III. Manna officinarum.

Manna nostra laricea, Rauvvolf.

Manna durior & concreta, quæ Mannæ nomine Cairi officinis reperitur.

Hæc communiter Calabrica nominatur, quia in Calabria circa Canis ortum ex Fraxino & Orno, ab incolis in usum medicum colligitur: quæ duplex in officinis.

Granata, quod minoribus granulis constet.

Masticina, quæ majoribus & masticis guttis propè æqualibus.

Vel Manna foliorum, quæ minutioribus micis constat, quia ex folijs colligatur: & Manna corporis, quia ex ramis arboris habetur, Cæf.

Eligenda candida, recens, anno non vetustior: ruffa enim & fusca, in veterata est: adulteratur saccharo penidio, herbarum folijs circumvoluto: & quæ Sennæ folia granis suis amplectitur, factitia est.

In Apennino quoque aliquando in canicularibus promiscuè in pluribus arboribus, sed præcipuè in Quercu & Salice colligitur, nunc concreta similis Calabriensi, nunc liquidior melli similis, Cæf.

IV. Manna Persiana granis Coriandri.

Transchibil, mannæ species, quæ ex spinoso frutice, quem Arabes Agul & Alhagi vocant, colligitur, forte Manna Israëlitarum, Rauvv.

Mannæ genus aliud, Tiriam Jaby, seu Trumbibyn dictum, quod ex floribus alijs quoque & folijs legitur, magnitudine seminis cannabini, colore rubro: cujus in Ormo & Persia, non verò India, usus est, Linsc. part. 4. Ind. Orient.

Ex Syria longè candidior Italica adfertur duplex: Masticina, quæ translucida Mastiche similis: Bombycina, minimè translucida, candore Gossipij, Matth. Cæf.

V. Manna Calabrinæ similis Persica.

Mannæ tertium genus, cujus fragmenta folijs adhuc cohærentia advehuntur, Linscot.

VI. Manna Armeniaca.

Manna frustis pugni magnitudine, fusci colo-

ris fortè Manna Alhagiezi Avicennæ, Rauvv.

Succi exotici.

I. Succus laxativus est flavo rufescens.

Succus undecimus qui Ghitta jamaui dicitur, Cluf. ex. l. 4. c. 8.

Gutta Gamandra: gummi gotta: gutta gemau: gummi Peruanum alijs: alijs succus Gambici, vel Crambici.

Cattagauma, vel genu, Burgraf. in Achille.

Hic ex Sinarum regione adfertur: & aliqui Euphorbij succum censent, sed arbor tanta non est: alijs Rhamni solutivi: alijs Cataputiæ succus: alijs ex Scammonio & Tithymallo compositus nonnulli compositum ex Chelidoniæ majoris succo Scammonea & Croco suspicantur: alijs ex succo corticis mediani Frangulæ. Quid si fortè succus è floribus Ricini Indici expressus, & exsiccat, cujus in Hydropicorum serolis humoribus ducendis insignis usus. an Gummi ad podagram ex novi orbis continente, quo isthic podagrici se purgant, Monardi, Lugd.

II. Succus splendens Anethi odore.

Ufuc & Gyp succus 2. ex Amer. Cluf. ex. l. 4. c. 7.

III. Succus Aspalatho similis Anethi odore.

Succus primus concretus à Gareto, Cluf. exot. lib. 4. cap. 8.

IV. Succus colore albo, flavo & rufo mixtis

Anethi odore.

Succus quintus à Gareto, Cluf. l. c.

V. Succus cinericeus fœniculi odore.

Succus nonus, Cluf. l. c.

VI. Succus aspalatho similis ater micis albis aspersis odor.

Succus tertius à Gareto, Cluf. l. c.

VII. Succus aspalatho similis inodorus.

Succus ater à Gareto, Cluf. l. c.

VIII. Succus atrorubescens inodorus.

Succus decimus, an Bixa Oviedi, Cluf. l. c.

IX. Succus flavus albis granis commixtis, gravi odore.

Succus quartus à Gareto, Cluf. l. c.

X. Succus visco similis colore vario.

Succus circa bacillum concretus, Cluf. l. c.

XI. Succus masticinæ resinæ non absimilis. Succus sextus à Gareto, Cluf. l. c.

XII. Succus Succino non absimilis.

Succus septimus Anime similis, Cluf. l. c.

XIII. Succus Sanguini draconis affinis.

Succus duodecimus, Cluf. l. c.

Rrr

XIV. Suc-

XIV. Succus camphoram redolens ex radice Canellæ vulneratæ, Garz.

Canellæ liquor è viridi cortice præsertim radicem inciso, Acoftæ.

D E G U M M I.

Gummi (νόμμι Græcis) lacryma est, in truncis arborum ipsum producentium coagulata & concreta, Galeno 7. simpl. cuius substantia magis aquea est, ut Resina oleaginosa: quare Gummi aqueus facile, oleaginosus difficilime miscetur: contra Resina, quæ etiam flammam facile concipit, cum Gummi in igne crepitat, etsi calidum stillando procedat, ubi tamen aërem contigerit, coagulatur & aqua simile est, ut Aristotelis 2. de plantis, verbis utar: quare id prunis ardentibus injectum, fragorem edit. Verum, ut idem Aristot. quadam quomodo conche & lapides coagulantur, alia molliuscula: quadam pellucida, aureo colore flavescentia, alia obscura, pallidiora. Nunc ad specialia.

I. Gummi Arabicum: à Serapione sic dictum, quia ab Arabia regione Ægypto contra-mina importabatur.

Κάμμι in τῷ ἀνακρίβῃ, Diosc. l. 1. c. 133.

Gummi ex spina Ægyptiaca, Theoph. 4. hist. 3.

Gummi ex Ægyptiæ spina, Plinio l. 13. c. 11.

Gummi Acanthinum, Celso, l. 5. c. 1.

Gummi Thebaicum, Galeno, nonnullis Baby-lonicum, quod Gummi est à Græcis simpliciter sic dictum, Matth.

Gummi Acaciæ, diversum ab Arabico vulgaris usus.

Gummi Arabicum & Acaciæ gummi, Bellon.

Gummi quod Arabicum cognominatur, Cord. hist.

Gummi Arabicum, Lugd.

Probat Diofcoridi vermiculatum, vitri modo pellucidum, ligni expers: proximum est candidum: at resinofum ac fordidum inutile est.

II. Gummi tragacanthum: quod ex radice plantæ spinosæ ejusdem nominis vulneratæ effluit, Diosc. l. 3. c. 13. qui *ἀδανύων* vocat, quamvis Theoph. 9. hist. 8. sponte profluere asserat.

Τραγάκανθη, Gal. 8. simpl.

Tragacantha lacryma, Matth. Lugd.

Dragagantum officinarum.

Gummi Tragacanthæ, Bellonio.

Tragacanthum, Cord. hist.

Probat Diofcorides pellucens, læve, gracile, purum ac subdulce: Vel eligito candidissimum, purum, æqualiter translucens, & cujus minima portio, maximam aquæ copiam coagulet: & hoc non nisi pilis & pistillo calidis lævigatur.

III. Sarcocolla.

Σαρκοκώλλα (*ἀδανύων*) lacryma arboris in Perside nascentis thuri tenui similis, subfulva, gustu amariufcula, quod *νόμμι* & admixtione adulteratur, Diosc. l. 3. c. 99. Sic Galeno 8. simpl. lacryma arboris Persicæ. Plinio l. 13. c. 10. fit & ex Sarcocolla, ita vocatur arbor, gummi utilissimum, simile pollini thuris, & ideo candidum quam rufum melius: & l. 24. c. 14. sunt qui Sarcocollam spinæ lacrymam putant, pollini thuris similem, cum quadam acrimonia dulcem.

Sarcocolla, Matt. Lac. Cord. in Diosc. & hist. Cæf.

IV. Gummi Hederæ.

Κισσὸς ἡδανύων, Diosc. l. 2. c. 210. Galen. 7. simpl. Lacryma hederæ, Plinio l. 24. c. 10.

E majore Hederæ trunco vulnerato, & interdum sponte lacryma quædam, & gummeus succus exit, ex flavo rubescens, odore gravis, sapore acer.

V. Cancamum.

Κάμμιον, lacryma est Arabicæ arboris (folia Myrti habentis, Amato) myrrham quadantenus referens, virosi gustus, quæ tanquam thymiamate, id est, suffimento utuntur, Diosc. l. 1. c. 23. Et ut Plin. l. 12. c. 20. ex confinio Casiæ, cinamigi & Cancamum ac Tarum invehitur. Verum illud Anime, hoc Agallochum sylv. Dalechampi in Plinium, credit.

Cancamum Diofcoridis, Laccam dicunt Serapio, Ægineta, Matthiolus: at Brassavolas, Garzias, Clusius, res diversas faciunt: aliqui non modò diversum, sed & incognitum putant: quidam Cancamum Diofcoridis, Benivi esse volunt. Anijmum, Amato.

Anime (quod ex Æthiopia Arabiæ finitima in Lusitaniam advehitur) Monard. Frag. & par. 9. Ind. occid. l. 4. c. 29.

Anime vulgo, quasi Aminea Myrrha, Cæf.

Anime triplex habetur: 1. fulvescit & pellucidum est: 2. nigricat & taurinò glutini sive Colophonis fere simile, vel Myrrhæ, quam & Minæam, à terra ubi præcipue nascitur, Diofcorides appellat.

Aminea Serapioni, unde Lusitanis corruptè pro Minea vel Aminea, Anijmum & Hermolao Myrrha

Myrrha Aminea : 3. pallidum & retortidum, Clus. & Lugd.

Sic alia ex Hispania nova sive America, quæ Monardi Orientalis : alia candidior orientali, de qua Garzias & Cancamum Græcorum esse vult : licet aliqui Succini speciem suspicentur.

VI. Lacca officinarum.

Lac legitimum nomen, sic dicitur, quod hoc medicamentum, cum ejus usus est, in Loc sive mellis crassitiem dissolvatur : & ubi præstantissimum nascitur, Trece nominatur.

Myrrhæ similis Avicenna.

Chermes Arabum quorundam.

Formicarum alatarum sterus, Amato.

Formicæ enim hanc Laccam elaborant, materiam ex arbore exsurgentes (unde plerunque formicarum alæ permixtæ conspiciuntur) & hos ramulos arbore avulsos in umbra siccant, Garzia monente. Fortè rectius dixerimus, lactymarum & reliquorum Gummi modo, sponte exudasse & concrevisse. Verum & in arbore Benifera reperitur. Cancamum, officinarum

Lacca, Matth. Cord. in Diosc. & hist.

Lacca Arabum & officinarum, an Cancamum Dioscoridis, Lob.

Lacca, Garz. Acoftæ, Frag. Clus. Lugdun. (qui Cancamum esse negat) Tab.

Gummi Laccæ, legitimum est Cancamum, Cæsalp.

Lacca à Malaijs Cajulacca dicta, ex qua ceram Hispanicam conficiunt, Linscot. part. 4. Ind. or. c. 24. & fig. 18.

Duplex habetur : ea quæ cum bacillis, vix enim sine ijs adfertur, quam Laccam Sumetri vocant, quia ex Sumetra insula, id est, Taprobana habetur : ut eam quæ in glebis sine fureculis affertur, Laccam Comberti nominant : & altera factitia, qua insectores uruntur, quæ & suas differentias habet.

VII. Sanguis draconis officinarum.

Αἷμα δράκοντιν, Diosc. l. 5. c. 109.

Cinnabari seu sanguis draconis, Cord. hist.

Sanguis draconis, Matth. Cadamusto, Theveto, Monardi, Cæf.

Sanguis draconis verum est Cinnabarum Diosc. Cast. Cæf.

Est arboris exoticæ lacryma, nam stato anni tempore arbores ferro sauciantur, quæ anno sequenti gummi emittunt, quod coctum & defœctum hoc gummi efficit : in Africa, in parva

quadam insula Atlantici Oceani propè Mederam : nunc laudatissima ex Carthagine Peruana adfertur. Arborem hanc primus Clusius, arboris Draconis nomine exhibuit. At Acoftæ, in India arbor Ber, sive Malus Indica dicta, æstate alaris formicis perpetuè onusta conspicitur, quæ in ejus ramis Laccam elaborant.

Cinnabarum Dioscoridis, Solinus & alij censent, (at Clusius subdubitat) fortè quia Diosc. l. c. scribit, Cinnabarum altè & abundè coloratam esse, & eam ob causam quosdam αἷμα δράκοντιν appellasse.

Duplex habetur, nativum & quoddam factitium, panibus coactum, ex rubrica & pice colophonia, quo potissimum veterinarij utuntur, Cæf. Frag.

VIII. Asa foetida.

Asam aliqui duplicem faciunt, aliam dulcem sive odoratam, aliam foetidam : hanc Altit Arabum : illam Belzoinum officinarum esse, & utrumque è Laserpitio profluere volunt. Hic de Asa foetida, quæ gummi est Laseris sive Laserpitij plantæ ferulaceæ, quæ αἰσχροῦ Dioscoridi l. 3. c. 94. dicitur, ex cujus radice atque caulibus incisis (σπῆς) liquor hic colligitur.

Altit, Avicennæ : Anjuden, Indis.

Asa, officinis, sed rectius Asa, quasi Lasar, fortè voce ex Lasar corrupta.

Asa foetida, laserpitij species, Cord. histor. Lugd.

Succus Lybicus, interdum Medicus & Syriacus, alias Cyrenaicus, à loco natali vocatur.

Duplex Theophr. 6. histor. 3. alter ex caule, quem νεωλίαν Scaparium : alter ex radice, quem ρίζαν, radiceum vocabant : & Plinio lib. 19. cap. 3. duo sunt nomina, Rhizias, atque Caulias villior illo : & lib. 22. cap. 23. Silphium venit primo è Cyrenis : nunc ex Syria importatur, deterior Parthico, sed Medico melior, extincto omni Cyrenaico, &c. In officinis sæpe duplex : una pura & translucens : altera impura & turbida, cui Sagapenum (quo adulterari Diosc. scribit) cujus odorem refert, permiscetur, unde Germani Diaboli sterus nominant : utraque tamen gravis odoris est. Cujus si usus esse debeat ad medicamenta liquida, aqua aut aceto, aut vino injectum supra prunas resolvenda, & quod in fundo manet rejiciendum : vel per colum cui adhærebit, transmittendum.

IX. Gummi ex Molle fœniculi odore.

Gummi album ex cortice arboris Molle, Lugd.
a Succus oſtavus, Cluſ. exot. l. 4.

X. Gummi caryophyllorum, ſimilis facultatis cum reſina Terebinthina, Garz. Frag.

Gummi ex atro ruſcens, inter Caryophylla interdum reperitur, Cluſ. in Garz.

XI. Camphora officinarum.

Capur & Caſur Arabum, Garz.

Camphora ex genere bituminis, Cæſ.

Caphura, Matth. Caſt. (qui arborem adpingit) Lugd.

Camphora, vulgo Alcanfor, Frag.

Eſt gummi-reſina pellucida, candida, ex rimis arboris peregrinæ, juglandi nuci ſimili, folijs ſalignæ ſimilibus, Garziæ: Dioſcoridi & Græcis veteribus incognita: è recentioribus Aërio & Serthi cognita.

Inſula Borneo, arboribus camphoriferis reſertiſſima eſt, nec preciſior in Oriente camphura habetur, Linſc. part. 2. Ind. or. c. 24.

Differentiæ duæ: 1. Caphura de Burneo, quæ raro adfertur, & omnium nobiliſſima: (part. 9. Ind. occid. additam) altera ex Sina in Europam adfertur, Garz. Acoſtæ, in panes orbiculares coacta: Et Arabes genera quatuor conſtituunt, in caput, pectus, crura & pedes dividentes, Garziæ & Fragoſo monentibus: hicque alteram dicit Chyneam, à Chyna unde advehi ſoleat: vel Chnichen, Linſc. part. 4. Ind. or. c. 36. Sicalia rudis eſt, alia elaborata: rudis eſt ignem non

experta: elaborata, quæ ſolis aut ignis calore excocta atque purgata, album colorem contrahit, Matth. (odora.

Eligenda inſtar cryſtalli ſplendens, ſyncera, XII. Chonideros gummi quoddam Succino crudo perſimile, quod Caphuræ quæ ex Burneo adfertur, ſæpe permixcet, Lugd.

Gummi Chamderros vocatum, Garz. Frag.

XIII. Gummi Juniperi.

Gummi Juniperinum, Plinio l. 13. c. 11.

Sandarax Serapioni, Cord. hiſt reſina majoris juniperi arida, dura, flava, Maſtichi ſimilis.

Vernix Latinis & Vernilago, ab anni tempeſtate, quaſi Veris ros.

Gummi Juniperi, Sandaracha & ſiccus Vernix, Matth. Juniperi lacryma, Vernix, Lugd.

Gummi eſt reſinoſum ex Junipero; ſed ne quis vocatione deceptus, Sandaracham Græcorum, quæ metallicum eſt, & Auripigmentum cognatum, & exitioſum venenum, ſubſtituat.

Ab hoc differt Vernix liquidus, qui ex prædiſto eoque ſyncero & oleo ex ſemine lini expreſſo fit, quo ad picturas & tabulata illuſtranda utuntur. Sandaracha verò Ariſtotelis (*ὀνυχα*) 9. hiſt. 40. & Plinii lib. 11. cap. 7. eſt apud dum operantur cibis, qui ſæpe invenitur in ſavorum inanitatibus ſepoſitus, amari ſaporis vel ceruginofi mellis genus.

XIV. Gummi Ceraſorum, Matth.

XV. Gummi Ulmi, vide in notis noſtris in Matth.

DE RESINIS.

Reſina *πριτω* lacryma ſeu liquor eſt pinguis ac oleagiноſus, ex arbore ſæpius ſponte, interdum eâ vulneratâ deſluens: qui ſponte deſluit *ἀνρόππι* & *ἀντροππι* dicitur. Eſt autem ratione conſiſtentia duplex: liquida quæ Græcis *ῥεσά*, h. e. humida ſeu fluxilis, ut Terebinthina: altera durior & ſocior, quam *ἐσνάρτι*, id eſt, ſcictam ſeu roſtam nominant, ut Colophonia recentiorum.

Reſina humida.

I. Terebinthina vera.

Τερεβινθιν, Dioſcoridi.

Gluten Albotin, Avicennæ.

Terebinthina vera ex Cypro adfertur, Lugd.

Terebinthina reſina, Matth. Cord. hiſt.

Eſt liquor pinguis ex Terebinthi trunco & ramis deſluens, quæ omnes reſinas antecellit, Dioſc. l. 1. c. 91. teſtimonio: quæ pro ratione loci magis commendatur, ut prima ſit Chia, dein Lybica, tum Pontica: tandem Cypria, Syriaca, Judaica, Arabica. Hæc liquida deſtillat, dein paulatim areſcit & ſæpe cum Thuæ adfertur, &

in templis cum eo ſuffimigatur, & ineptè Incenſum, ipſum verò Thuſ, Olibanum appellant.

Probatur alba, pellucida & vitreo colore & in cæreum vergente odorata & acris.

Et ut Dioſc. l. 1. c. 91. & 92. reſinas omnes antecellit Terebinthina, proxima huic lentifcina: dein pinea & abiegna: poſt hæc picea & ſtrobylina. Verùm Terebinthina Veneta, ex novellis Abietibus colligitur.

II. Reſina laricea.

Λαρίκη & *πριτω* *λαρίκη* Dioſcoridi.

Reſina larigna, Matth. Cord. hiſt.

Terebinthina officinarum Germaniæ.

Hæc

Hæc ut Galenus 2. compos. med. secundum genera, 4. scribit, pro prima sæpe venditur (etiam nunc, non solum illius locum, sed etiam cognomentum sibi vendicat, Matth. & Lugd., quoque monentibus) quæ illa humidior & acrior est.

Optima quæ purissima, odoratissima, aliquantum translucida, & quæ ab intincto digito contumaciter & æqualiter diffluit.

III. Resina lentiscina five Mastiche: & Matth. Gluten Romanum Arabibus. (Lugd.

Masticha seu Mastiche, hodie Mastix, Cord. hist. P^{ri}ncip^{al}ius Dioscor. l. i. c. 90. (resina lentiscina Plinio) cui & *μαγνη*: ex lentisco effluit, & inter Gummi-resinas reponenda videtur. Et cap. 92. Terebinthinæ proportionem respondere scribit. Galenus verò 3. compos. med. secundum gen. 6. Terebinthinæ præfert. Idem 2. ad Glaucon. Egyptiæ mastice meminit: nunc solos lentiscos in Chia, non autem in Gallia nec Italia (vel saltem exigua) licet similes sint, mastichen proferre, Bellonius asserit.

Mastiche etiam in Brasiliæ dumetis nascitur, Leriò, Ind. occid. part. 3. c. 12.

Probatum candida, splendens, odorata, & friabilis: quæ in Chio nata: deterior virescens & nigra bitumini similis Egyptiæ, aut Ponticæ. Hæc thure & resina mista adulteratur.

Duplex est, propriè & impropiè dicta: propriè quæ ex lentisco effluit: quæ vel alba, vel viridis Diosc. vel ut Galenus, alia alba quæ Chia: alia nigra, Egyptiæ: habetur & Cretensis, quæ flava est & amara. Impropiè dicta est ea quæ ex spinosa planta emanat, Theoph. 6. hist. 4. vel ut Plinius, ex humili spina quæ Chamæleon est Dioscoridis: hæc est Acanthice mastiche Theoph. Gaza spinalem vertit.

IV. Thus five Olibanum officinarum.

Albanum Diosc. lib. i. c. 81. sic dictum quibusdam, quod è monte Libano deferatur: vel potius à *libano* stillo: Thus verò, à *θεῖον* sacrificio.

Thus, Matth. Cord. hist. Cæs. Lugd.

Lovan Arabibus } Garziæ & Linscot, part. 4. Conder Avicennæ } Ind. or. c. 28.

Liquor est arboris Thuriferæ, quæ in Arabia thurifera cognominata, provenit Diosc.

Primas tenet masculum *gayonias*, natura rotundum, candidum: at Indicum subulvum, & arte rotundum factum, quod *θεῖον* aut *οὐν* II. *οὐν* *οὐν* *οὐν* orobium, quod in Amelo nascitur, quod *nononon* vocant, minus est & fulvius.

III. *Amorpatrus* cognominatum, quod candidum & dum mollitur, mastiches more digitos cedit, Diosc. l. c. Ex his colligitur veteres aliud Arabicum, aliud Indicum fecisse, cum tamen in India non nasci Garzias affirmet.

Et nunc plures species habentur, etiam Cordo in sua historia monente, colore & magnitudine granorum tantum differentes: 1. est Indicum dictum, quod maximis & inæqualibus glebis constat, lividum nigricansque candicantibus aut flavis maculis varium. 2. mammosum, oblongis grumis mammarum forma compositum. 3. masculum, parvis, rotundis, candicantibus aut flavis grumis, interdum singulis, interdum geminis velut testiculis constans. 4. Orobæum, minimis grumulis, ervo æqualibus, odore masculo simile.

At hujus pollen & farina ex crebra in faccis concussione, Manna dicitur: nonnunquam & cortex adhaerens adfertur.

At Theveto aliud candicans, nitidum, quod æstate: aliud rubescens & vilius, quod vere colligitur: Et ut Garzias, Frag. & Lug. quæ ex montanis fluit, laudatissima Melato, nobis mascula dicitur: quæ ex ijs quæ in planis, nigrum improbum, & cum aliarum arborum resinis permixtum, quæ naves, ut nos pice oblinunt.

V. Resina Cupressi.

Κυπαρισσίου *πικρῆς*, è cupresso etiam resina liquida fluit, Diosc. l. i. c. 92. Matth. Lugd.

VI. Resina Cedri five Cedria.

Κεδρί Diosc. l. i. c. 105.

Cedrus dat picem quæ Cedria vocatur, Plin. lib. 24. cap. 5.

Cedria five Resina ex Cedro, Matth. Lugd.

VII. Myrrha.

Μύρρα Diosc. Theoph. Gal. 8. simpl.

Bola Indis, Garziæ & Linsc. par. 4. Ind. or. c. 28.

Myrrha, Matth. Cord. in Dioscor. qui in histor.

quinque dicit genera, & sextum adulterinum.

Myrrha, Theveto, Garz. Frag. Cæs. Lugd.

Myrrha & Opocalpasum, lacryma est ex unius arboris trunco manans, Guil. the.

Myrrha suo furculo spinoso hærens, Ad. Lugd.

Lacryma est (seu gummeus succus concretus)

arboris nascentis in Arabia, Egyptiacæ spinæ

similis, quæ incisa, in substratas tegetes destil-

lat, pars verò circa caudicem concrevit, Diosc.

l. i. c. 77. quæ & Theoph. 9. hist. 4. habet & scribit,

Arborem esse minorem Thuris arbore & fruti-

Rrr 3

cosiorem,

cosiorem, caudice duro, contorto, cortice lævi: alijs, Thuris folium laurinum & læve: Myrrhæ aculeatum non læve, Ulmeo simile, crispum extremo spina horridulum, Ilignei modo, &c. Alij, terebintho: Diodorus, lentisco æquat. Myrrhæ arborem spinosam, folijs Acaciæ, se vidisse testatur Bellonius.

Differentiæ: alia *πυρροειδής*, id est, campestris, quæ expressâ *σάκκῳ* excipitur: Nam Staete (quæ quibusdam Styrae liquida) ut habetur apud Dioscor. l. i. c. 73. pinguitudo est recentis myrrhæ cum aqua pauca contusæ & organo expressæ, & ex qua unguentum factum.

Staete nominatur: & Cord. hist. Staete liquor ex Myrrha. Alijs tamen Staete stillatitius ros est, qui ante corticem ferro solutum, sponte & sine plaga, sed veluti cutis poris hiantibus, quasi saliva quædam exudat. Alia *γυβίρεα*: primas tenet *πρωτογενής*, à loco natali denominata, quæ subviridis, pellucida ac mordax: 2. tenuis, bdellij modo lentescens: 3. *νεανώδης*, nigra & retorrída: 4. demum *εργασίμῃ* dicta, quæ aspectu gummi refert. Improbatur etiam quæ *ἀμυγδα* nominatur: adulteratur gummi, Dioscor. l. c. Hanc esse Anijnum nigram Lusitanorum, Amatus vult. Ex Arabia & regione Alexim, quæ Æthiopia est, adfertur, Garzia auctore, Myrrha animinea, Dioscoridi.

Anime occidentale, Hermolao, Lugd. Anijnum nigrum Lusitanorum, Amato.

Adversariorum auctores fulvam, albescentem & viridem se vidisse testantur.

Eligenda friabilis, levis, undiquaque concolor, quæ contracta intrinsecus lineas candidas inter currentes habet, unguium speciem præseferentes ac læves, quæ minutis glebis, amara, odorata, & acris: at ponderosa & quæ pice coloris, innutilis est.

Myrrhæ Boeoticæ etiam Diosc. lib. i. cap. 78. & Galenus meminere, quæ ex arbore quadam in Boetia nascente, è radice incisa stillat.

VIII. Styrae (sive Storax officinarum) quia striatim ex arbore extillat.

Στρίγξ lacryma est arboris malo cotoneo similis, Diosc. l. i. c. 79. & Plin. l. 12. c. 25. sive succus est gummeus resinofusq; Syriacæ cujusdam arboris concretus, nullus enim liquidus & fluxilis est, nam lacryma quæ extillat, mox in glebam densam, pinguem & resinofam, aliquot granis albicantem, suavissimè fragrantem, concrefcit.

Seplasiæ, Arabes secutæ, in liquidum & siccum distinguunt: liquidus est Myrrha Staete: siccus Storax calamita officinarum.

Styrae, Matth. Cord. hist. Lugd.

De hac Plin. l. i. c. 25. lacrymæ ex austero jucundiores, intus similitudo harundinis, succo prægnans: huc circa canis ortum ad volant pennati vermiculi erodentes: ob id in scobe fordescit.

Dicitur calamita, quod in calamis è Pamphilia ferebatur: nam & cætera odorata olim arundinibus recondabantur, ne expirarent & vires amitterent, quod & de Distamno Cretico Theophrast. 9. hist. 16. scriptum reliquit. Dioscoridi est *πυρροειδής*, *πρωτογενής* & *νεανώδης*: addit: inveniri & lacrymam gummi similem, translucentam, myrrhæ æmulam, quæ per pauca. Et Plin. l. 12. c. 17. ex Syria (& alibi ex Cypro, Sydona, & Psyllia) revehunt Styraem, acris odore, ejus vis foris abigentes suorum fastidium.

Præfertur flavus ac pinguis (ruffus & pinguis lentus: deterior furfurosus, & cano situ obductus) resinofus, albicantibus grumis, quidum mollitur, melleam humiditatem & odore perseverantem, ex se remittit.

Adulteratur arboris scobe, quæ vermiculorum erosione facta fuerit, & hunc Styraem ideo *συνδμητῆρ* quasi vermiculatum cognominant, quod imperiti tanquam syncerum admittunt, Diosc. At Plinio, cedri resinâ, vel gummi, alias melle, aut amygdalis amaris adulteratur.

Ex Styrae affato fuligo quoq; colligitur: & in Syria unguentum Styraeum conficitur, Diosc.

Styrae liquidus: & Cord. hist. Lugd.

Alij ex Styrae calamita, laricea resina, oleo & vino simul coctis conficiunt, & quod post menses aliquot tenuissimum & liquidum, Oleum Styraeum vocant ex decoctione quorundam furculorum in aqua fit: licet aliqui Styraem liquidam, è peculiari arbore à Styrae discrepante, manare velint: & sic Styrae liquidæ duæ species erunt. At Cæsalpino, qui ad nos adfertur, lariceæ resinæ est consistentiæ, cinereus, odore altero vehementiore.

Storax rubra officinarum, est cortex de quo inter arbores.

IX. Liquidambar, Monard. Mexiocan. hist. Cæf. Lugd. & par. 9. Ind. oc. l. 4. c. 29. resina est liquida, quæ ex India occidentali affertur: nam incisa arbore vastæ magnitudinis, quam Americi Ocosolt vocant, folijs hederæ, cortice crasso cinereo

cinereo, quo inciso aut excavato effluit, ut ex Monardi & hiftor. Mexiocanæ autore, Lugdunenſis refert: ex hac recenti, oleum odoratius per fe stillare ajunt: ex primi quoque, ut majorem quantitatem habeant, ſed minus perfectum, quo chirothecas inficiunt: & cum Stryracis odore ſit ad Stryracis genera referri poſſe, Cæſalpinus monet.

X. Bdelium.

Bdelium nonnullis *addendum*, alij bolchum appellant, lacryma eſt arboris Sarracenicæ, Dioſcor. l. i. c. 80. & Plinio l. 12. c. 9. vicina eſt Baſtriana in qua Bdelium nominatiſs. arbor nigra eſt, magnitudine oleæ, folio roboris, fructu caprifici, natura quæ. Alijs, ex arbore valde ſimili ei quæ Myrrham profert.

Duplex eſt: alterum quod probatur amarum, translucidum, taurino glutini ſimile, intus pingue & facile molleſcens, lignorum & ſordium expers. Alterum ſordidum ac nigrum, grandioribus glebis in oſſas convolutum, quod ex India adfertur, quod Adroba'lon nuncupatur & omnium peſſimum eſt.

Deſertur & jam à Petra, ſiccum, reſinoſum, ſublividum, Dioſc. qui Sarracenicum, quod eſt Saraca feliciſ Arabiæ civitate devehitur, laudat: Galenus verò, Scythicum. Plinius, Baſtrianum. Laudatur etiam quod in Media naſcitur, Parthicum nominatum. Adulteratur gummi admixto Dioſ. Sunt qui Anime, legitimum Bdelium eſſe putent, Cluſ. in Garz. monente. Bdelium, Matth. Lac. Cord. hiſt. (qui ſex ſpecies facit) Cæſ. Frag. Lugd.

Bdelij fructum Cortuſi Cluſius ad notas in Garz. pingit: Lugd. vide inter Palmas.

XI. Belzoinum officinarum.

Benzoinum, Laſerpitium non eſt, Matth.

Benzoum, benzoi & Aſa dulcis, Cord. hiſt.

Ben Judæum, Ruellio: forte nominum vicinitate lapſus, Ben jaoy, id eſt, filium de Jaoa, ubi plurimum naſcitur nominare debuit, Garzias.

Benivi, quod neq; Græcis, neq; Arabibus, neq; Judæis cognitum, Garz.

Belzoe vel Belzoinum, vel Belzuinum vulgo, Lugd.

Belzoi vulgo, lacryma ex Oriente, Cæſalp. qui Myrrham ſuſpicatur,

Benevinum, Linſcot. part. 4. Ind. Or. c. 27.

Eſt Beniviſera arbor vaſta, folijs citri aliquantum minorib. parte averſa candicantibus, ex cujus ramis vulneratis gummi effluit, Garz. Cujus

plura genera, præfertur Amygdaloides (hanc Myrrham Troglodyticam Dioſcoridis, Amatus cenſet) quod unguis ſeu maculas candidas amygdalarum inſtar admittas habet, & in Seylan provenit: aliud genus nigrum in Samaria & Jaoa, quod vilius: 3. quoq; nigrum eſt, & novellis arboribus profluens, quod priore odoratius, & ab odore grato Benive de Bonias, quaſi de floribus, vocant, Garz. Linſcot. part. 4. Ind. Orient. cap. 27. Quare aliud album, aliud nigrum eſt, Eidem part. 2. Ind. Oriental. cap. 22. commiſceri tamen ſolent, ut unâ commodius vendantur.

XII. Copal, Monardi, Cæſ. Lugd. & par. 9. Ind. Occid. l. 4. c. 29.

Copal aut Pancopal, Frag.

Reſina candida, diacitro valde transparenti haud diſſimilis, odorata, quæ ex Hiſpania nova adfertur.

Genera duo facit Gomara in hiſt. Mexiocana: alterum rugoſum, molle, thuri ſimile Xolochcopalli vocatum: alterum præſtantius Copal cahuiel, quod pleriq; Myrrham exiſtimant, Cluſ. notis in Monard. Lugd.

Copal & Suchi copal, altera Stryracis & thuris genera: part. 9. Ind. Occid.

XIII. Reſina abiegna Indica, Monard. Lugdunenſ.

Ex arboribus ſpurijſ, quæ neq; pinus, neque cupreſi dici poſſunt, in quorum cacumine veſiculæ, quibus contractis, liquor guttatim ſtillat, quo ut Baſſamo utuntur: ex novis Orbis continente adfertur.

XIV. Reſina è Pinu & Picea liquida quæque manat, quæ ex Gallia & Hetruria convehitur: dein è Colophone aſportabatur, hinc *nolaporia* appellata, Dioſc. l. 1. cap. 92. Sic etiam aliquando ex Populo profluat.

XV. Reſina Carthaginenſis, quæ à Carthagine novi orbis provincia mittitur, puriſſima, odorata, Terebinthinâ Venetâ multo præſtantior, Monard. Lugd.

XVI. Reſina Ambraë facie, Cluſ. exor. lib. 4. cap. 6.

XVII. Tacamahaca, reſinæ genus ex nova Hiſpania, odore gravi Galbani, Monard. Frag. Lugdun. & part. 9. Ind. Occid. l. 4. cap. 29. vide ſupra in Populo.

XVIII. Caranna, Monardi, Frag. & part. 9. Ind. Occident. l. 4. c. 29.

Caragna,

Caragna, Lugd.

Refina pinguis oleaginosa ex continentis parte interiore, colore & odore; sed graviore Tacamahaca.

Duplex est: nam præter illam, alia purior ex Carthagine crystalli modo limpida adfertur, quæ Caranna purior, Monard. Lugd.

XIX. Gummi Elemi officinarum.

Improprie Gummi dicitur, cum Refina sit, ut quæ flammam facile concipiat, & oleaginosi diluatur: Diofc. l. i. c. 141. monente: Oleæ Æthiopice lacryma, similis quodammodo Scammonio (ῥυμψῶ) fulva, ex parvis stillis conflata, mordax est.

Refina Elemi, aliquibus Gummi elemi, Cedri lacryma videtur, Cord. hist.

Gummi elemi officinarum, seu Oleæ Æthiopice lacryma, quæ in glebas concreta adfertur, quæ gustu iners, nec palatum ferit, Lugd.

Gummi elemi Æthiopice oleæ lacryma non est, Matth.

Similem ferè lacrymam, sed paucior, Oleæ & oleastri fundunt.

Refina sicca.

I. Colophonia officinarum.

Pix est quæ præ cæteris *ῥεσίνῃ* & aliquando *συμύμῃ* quasi confusa, nominatur, quod ex mul-

tis simul congestis in massam induruerit, quæ igne liquata & repurgata durior & sicciore vadit.

Hæc duplex est, alia veterum, Diofc. l. i. c. 92. *κολοφώνια*, quod ex Colophone olim advehebatur, & refina erat liquida, quam Cord. ejusdem arboris censet, à qua Elemnia refina profuit, Cedrus videlicet. Altera verò est recentiorum. Colophonia Hispanica & Græca, Matth. Lugd. Colophonia pix arida, quibusdam Pix Græca, Cord. hist.

II. Refina sicca, Græcis *ῥεσίνη* dicta, quæ absq; ignis ope cito concrescit, *ῥεσίνη κατὰ φύσιν*, quasi germinatio picæ, Galeno nuncupatur: hæc refina est confusa ex Abietina, Strobilina, & Pityna. Nam ut Diofc. l. c. ex siccis resinis alia est strobilina, alia Abiegna, alia Pineæ & Piceæ.

III. Strobilina *ῥεσίνη* Diofc. l. c. Gal. quam alij ex Pinu, alij ex Picea, alij ex Pineis nucibus, quas Strobilos vocant, profluere dicunt.

IV. Abietina *ῥεσίνη* Diofc. à quibusdam male Colophonia dicta, quæ diu liquida permanet. Lapidis quoque resinacei in India Occ. circa portum Tierra de Brea, tanta copia habentur, ut omnes totius mundi naves istis implere possint: hæc admodum bona pro navibus, nec ardore Solis liquefcit, part. 8. Ind. Occid.

D E P I C E.

Pix liquor est pinguis & resinofus, ex accensa tæda profluens. Tæda autem, etsi de arbore quoque dicatur, hic tamen pini arboris morbus intelligitur, ubi ea per senectutem nimiam pinguedine veluti strangulata est, quæ Tæda accensa, Pix nigræ effluit: hæc colitione purgata crassescit, sicciore duriorque reddita, *ῥεσίνη* nigræ sicca pix, & *ῥεσίνη* nigræ Diofc. l. c. quasi iterata & secundo cocta pix dicitur: & Matth. Lugd.

Extæda, picem nigram & Cedriam confici, Bellonius scribit.

Zopissa verò & Apochyma, nominatur pix à navibus maritimis derafa, Diofc. l. c.

Pix navalis, ab illa secundum aliquos distinguitur, eam significantes, quæ picandis navibus apta, & non ab ijs abrafa est.

Differt autem Pix à Refina, quod hæc sponte effluerit, illa verò ignis beneficioeducta, & est

veluti Refina cocta: & ea quæ primo extillat, Pix liquida officinis, Pisselæon Dioscoridi, Cedria Plinio dicitur.

Pix sive Bitumen, resinæ in Siruam non procul à Moluccis, quod ex Samatra advehitur, quæ picandis navibus utuntur, aliqui falsò Anime esse credunt, Garz. cap. de Lacca.

Sic Americani, ex arbore Oxyacanthæ simili, igne resinam eliciunt, quæ picis loco utuntur.

A B I E S.

Abies, Græcis *ἰξ* Theophr. l. hist. 7. procera est & longo caudice, cui cortex tunicis multiplex: l. hist. 9. una tantum radice eaq; nervosa consistat: l. hist. 16. folia habet rara, eadem multifida & quasi serrata: l. hist. 6. flos Cocci colore, &c. Plinio l. 16. c. 10. Abies & cunctis amplissima est, materies præcipua trabibus, nec Abieti forma alia quam Picea.

Genera

Genera Theoph. 3. hist. 10. est quedam mas, quedam femina: mari folia acutiora, magis pungentia ac magis flexa, quare aspectu crispior tota arbor videtur. Materia candidior in femina, mollior operiq, facilior & toto caudice procerior est: mari magis varia, latior, durior, medulla plenior & aspectu minus pulchra: comus maris, paucos nucleos habet in priore tantum parte: femina conos nullos omnino, ut Macedones dixerunt. Plinio l. c. femina prolixior, materie mollior utiliorq, arbor rotundior, folio pinnata, densa ut imbres non transmittat, atque hilarior in totum: & lib. 16. cap. 24. folia insecta pectinum modo pungentia. Verum Theoph. 4. hist. 7. marinam habet, quæ supra lapides patellarum modo adheret, &c. Sic in insula Virginia Abietes magna & præaltæ ad malos navium reperiuntur.

I. Abies conis sursum spectantibus sive mas. Abies, Dod. gal. Lac.

Abies legitima vel mas, Bellon. con.

Abies altera, Dod.

Abies Pilati, du Choul, Lugd.

II. Abies alba sive femina.

Abies, Brumf. Trag. Matth. Cord. in Diosc. Gefn.

hort. Adv. Lob. Thal. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Abies femina, Ang.

Picea, Dod. ut:

Abies Plinij & femina Theophrasti, Clus. pan. & hist.

In hac Viscum, quod Stelin Plinius l. 16. c. 44. ex Theophr. 2. caus. 23. appellat, albis baccis præditum, Clusius observavit.

Inter cortices abietum novellarum, quæ tuberculis scatens, liquor præstantissimus, sed paucus, continetur, ita ut unumquodque tuberculum sæpe aliquot duntaxat guttas contineat, qui Italici lacryma dicitur: forte apud Galenum 3. compos. medic. secundum genera, liquida Piceæ resina, quam Terebinthinæ loco institores vendebant: & hæc Abiegna lacryma sive resina liquida, in quibusdam Italiæ locis, Oleum Abiegnum nominatur: officinæ Terebinthinam Venetam vocant. Verum ex gemmis quoque, more Populi, lacrymam fundit. Sic ex Abiete, veluti ex Pinu ac Picea resina etiam sicca & candida colligitur, quæ thus ementitur, ac pro eo à vulgo usurpatur.

T A X U S.

Taxus etiam si resinam non fundat, inter resiniferas tamen, propter similitudinem quam cum folijs habet, relata est, quæ uia & Theophrasto: quia & Nicandro: Dioscoridi l. 4. c. 80. quia & quibusdam & quædam Romanis taxus arbor est similis Abieti & folijs & magnitudine. At Theoph. 3. hist. 6. perpetuo rivet ex sylvestribus: 3. hist. 10. unius generis est, proceræ, aucta facilis, similisq, Abieti, sed non tam alta & alis magis sinuata: folio quoque Abieti similis, sed pinguiore & molliore: quæ in Arcadia crescit, ligno nigro aut puniceo constat: quæ autem in Ida, flavo & Cedro simili, quare aliqui emptores decipiunt, pro Cedro vendentes, &c. in Macedonia fructum abunde profert rotundum, sabâ paulo majorem, rubrum, tactu mollem, &c. si ab aliquibus hominibus manditur, suavis est & innoxius. At Matthiolus apud Tridentinos perniciosum scribit: contra Pena, ejus baccas à pueris in Anglia innoxie estimari, refert. Plinio l. 16. c. 10. Similibus (scilicet Abieti & Piceæ) etiamnum aspectu est Taxus, minus virens graciliq, & tristis ac dira, nullo succo, ex omnibus sola baccifera: mas noxio fructu: lethale quippe baccis in Hispania præterea venenum inest, &c. Sunt qui & Taxica hinc appellata dicant venena, quæ nunc Toxicia dicimus, quibus sagittæ tinguntur.

Taxus, Matth. Ang. Dod. ut: Gef. hor. Lac. Tur. Milax arbor, Cord. in Diosc.

Lon. Adv. Lob. Cæf. Lugd. Cam. Thal. Portæ.

Smilax arbor, Cam.

D R A C O A R B O R.

I. Draco arbor, Clus. hisp. & hist. Lob. Cast. Lugd.

Arbor Gadenfis Posidonij forte apud Strabonē.

Draco, Tab.

Arbuscula Dragonalis, Frag.

Fructum ferre Cerasi magnitudine, Cadamu-

stus, Thevetus & Clusius, & ex hoc, alij scribunt:

& Dragonal nomine fructum missum, Clusius an Algæ similis grande folium, Cæf.

in notis ad Monardem refert. Verum Monardes scribit, si à fructu, pellis qua integitur aufertur, Dracunculi effigiem apparere (ut apud Monardem, Lugd. pingitur) à quo fructu procul dubio arbor denominata sit: Vide Fragulum. Hujus lacryma Sanguis draconis dicitur.

II. Prægrande folium, Adv. Lob. ico.

Sff

Folium

Folium arboris Draconis ex Indijs delatum, Lugd.

Folium palmæ filamentis & textura, Tab. III. Draconi arbori affinis Americana.

Tacori in Kayua & Wiapack nascentia folia, Clus. exot. l. 2. c. 21.

Incolæ ex folijs maceratis & in tenuia stamina deductis, funes conficiunt.

P A L M A.

Arbor quæ solius Græcis, Latinis Palma dicitur, fructus verò *Ἀειθαλὸς* *φῶνιν*, Græcis: Latinis *Palmula* & *Dactyli*: Arabibus, *Tamar*: at ut Dioscorides l. 1. c. 148. *φῶνιν* in Aegypto gignitur: (at in tota India non reperiri, Guiland. de pap. scribit) ex ea verò fructus in medio Autumni vigore colligitur, Arabia Myrobatalano similis ac *ῥῶμα* dicitur, viridi colore, referens mali cydonij odorem: si verò integrè maturuerit, *φῶνιν* *φῶνιν* fiet. Et in fine seq. cap. postquam de Palmis Thebaicis egit, Aegyptiacos nucleos, in *ῥῶμα* *φῶνιν* *φῶνιν*, id est ex humilibus decerpi scribit. Idem cap. 150. involucrium fructus palmarum adducit florentium, etiam *Palmam* *ἰνδὴν* *καὶ* *αἰθῶν* (*Palmitem* Plinius) nominat: & fructus qui sub ea continetur, similiter elaten, quæ à nonnullis *βέλας* appellatur. Sic quod in trunci superna parte includitur, *ἐνὶ* *καλῶ* *θεοφραστο*, Galeno (cui etiam *νοῦπον* vertex 2. aliment.) & alijs Græcis dicitur: at Diosc. *ἐνὶ* *καλῶ* *θεοφραστο* *ῥῶμα*, medulla trunci improprie dicitur. Sanè *Palmæ* vitæ vis in vertice, ea contra pondus resurgit, & in ea uterq; sexus maximè elucet, in cuius quoque folijs scriptis arum, ut Guiland. de pap. exposuit. Plinius l. 13. & medullam & cerebrum vocavit: Serapio verò *Cestionem*.

Ex Theophrasto seqq. sufficiant (quæ pleraque & Plinius l. 5.) *Palma* cortice scabro constat. 1. hist. 8. medullam omnino nullam habere videtur, 1. hist. 9. quæ ad longitudinem tantum apta augeri, 1. hist. 14. folia arundinacea habet, 1. hist. 6. semina protinus post tegmen ambientia subeunt, ut nuci & amygdala, sed cavitatem nullam habent, sed tota plena atque persulida sunt: tamen humor quoq; quidam, calorq; inest, 1. hist. 18. mas florēt, semina minimè, sed protinus fructum promit, 1. hist. 22. & quodammodo cacumine gignit, 1. hist. 23. Verum 4. hist. 7. *Palmam* *πελαγικὰ* scribit esse caudice admodum brevi, virgiferè rectis, quæ subitus exeunt, & c. folijs spinarum acanitarum, erecti tamen, nec circumflexi, & c.

Genera: Theophrasto 2. hist. 8. aliæ fructifera, aliæ steriles: illarum aliæ mares, aliæ femina: sic in fructu differentia: alij nucleum habent, alij eo carent. quidam durum, nonnulli mollem: sic colore, alij candidi, alij nigri, alij flavi sunt: magnitudine, quidam rotundi, veluti mala: alij parvi, cicerum magnitudine. Et Plinio l. 13. c. 4. *palmæ* genera undequingenta sunt: at clarissima omnium quas Regias appellavere: quia Regibus tantum Persidæ servabantur, Babylone nata: plura videantur ibidem: at quas in *Caryotarum* genere *Nicolaos*, in honorem *Nicolai* *Peripatetici* Philosophi, ab Augusto ita nominatas *Athenæus* voluit, harum & *Aegineta* meminit.

I. Palma major.

Palma, Trag. Matth. Dod. ut: Ang. Lac. Turn.

Cord. in Diosc. Gefn. hort. Adv. Lob. Cæs. Cast.

Acostæ, Lugd. Cam.

Palma five *Dachel*, Alpino.

Palma major, Bellon. (quæ in Aegypto cellisissima) Tab.

Palma *Tamara*, in insula S. Thomæ, Roëlsio in ep. ad Clus.

Palma *dactylifera*, Linscot. 4. part. Ind. orient. figur. 14.

Pingunt arborem, dein fructum cum floribus & *Spatha*.

Spatha, Ang.

Dactyli cum *palmæ* elate, Matth.

Palma elate, Cord. in Diosc. Lugd. Tab.

Palmarum fructus, & flores & elate, Dod.

Caryotæ, *Carotides*, fructus *palmæ* *dactyli*, Cast.

Palmarum fructus five *dactyli*, Lob.

Fructus *dactyli* in Italia, *Caryotæ* verò Dioscoridi & Plinio, Cæs.

Palmarum excellens sylva, in Arabiæ deserto *Rauvvolius* transivit, & tres species *Dactylorum* observavit: 1. quales ad nos adferuntur: 2. penitus rubros: 3. flavos, primis minores sed sapidiore, qui à Serapione Hayron nominantur.

Palmæ cerebrum five medullam, *ἐνὶ* *καλῶ* *θεοφραστο* Græci vocant, quæ vesciebantur, ut etiamnum in Alexandria & quidem cruda, cinaræ etenim saporem refert: solent Aegyptij rustici *palmas* abortivas requirere, quarum cacuminibus excisis, candidam medullam eximunt & venalem proponunt. Varia *palmarum* genera sunt, spinosum in Creta, differens à *Cephaloni* five *pumila* *Palma*, Bellon.

II. Palma minor.

καρυωτῆς

Χαμαίριπες, Theoph. 2. hist. 8.

Chamærops, Plinio l. 12. c. 4.

Palma humilis, Matth. Cæs.

Cefaglioni, Ang.

Palma minor, Gesn. hort. Tab.

Chamæripes, Dod. Adv. Lugd.

Palmites, Lob. Garz.

Palma Chamærops Plinij, Lugd.

III. Palma humilis exotica.

Chamarriphe peregrina: & ejus fortè folium,

Clus. exot. l. 4. c. 12. & 13.

IV. Palmæ sylv. in Cambaya similis, Garz.

V. Palma Americana fructu racemoso.

Palma Yuri dicta, Lerio in part. 3. Ind. occid.

Palmarum in America quatuor aut quinque genera reperiuntur: inter quæ frequentissima ea, quam Gerau, alia quoque quam Yri vocant: hæc fructu est rotundo ad effigiem racemi, tanti ponderis, ut ægrè una manu subleuetur, sed nucleus tantum Cerasi crassitudine edulis, &c. Lerius.

VI. Palma manicam Hippocraticam referens.

Palma faccifera, Clus. exot. l. 1. c. 2.

Ex insula maris Atlantici faccifera dicta, quia forma illi colo seu sacco, quale vinum aromatis percolare solent: in quibus nuces orbiculares durissimæ continebantur.

VII. Palma Americana spinosa.

Hairi Theveti, Lugd.

Ayri Brasilianis, Lerio in desc. Brasil. five Am. part. 3.

Ebenum esse multi existimant: quia lignum ferri modo in aqua fidit, ex quo Barbari enses & sagittas, qua ferreas loricas penetrare possunt, conficiunt: fructu est rotundo, pilæ lusoriae magnitudine (cui nucleus ut nix albus, minime tamen edulis inest, Lerio) simili facie, nomine Kayama Oviedus descripsit.

VIII. Palma vinifera Theveti, ex qua incisa succus effluit, qui vasis terreis excipitur, & in quotidianam potionem, quam Mignol appellant, in promontorio Aethiopum (nunc promontorium Viride nominatum) reponitur: quæ suavisissimi gustus, quamvis ejusdem arboris fructus, qui parvi sunt dactyli, acerbi sint nec facile edi possint. Sic ex palma Cichorin similis succus elicatur, Lugd.

IX. Palma cum grandibus folijs, ut unum viro contra pluvias regendo satis sit, quæ pertere-

brata & tubulo immisso vinum copiosum, gustu Hispanico simile profundit, quod Vinum Palmitem Hollandi vocant: par. 5. Ind. or. fig. 2.

IX. Palma vinifera fructu ex arboris trunco spinoso.

Palmitas, cujus fructus pineæ nuci similes, Linsc. part. 3. Ind. or. c. 10. & part. 4. fig. 16. & part. 5. fig. 2. num. 7.

Palmites arbores vinum exstillantes non secus ac arbores Cocos, part. 4. Ind. or.

Palmites arbores ramis & frondibus carentes, fructu ex stipite Ananas non dissimili, grana plurima instar punice alicujus continente, par. 6. Ind. or. c. 38.

X. Arbor fructu nuci pineæ specie.

Melenken Theveti in Necumere maris Indici insula, Lugd.

Huc referri possunt

Palmæ aliæ, quarum fructus Cola dicitur, nuci pineæ majori similis, pulpa quadruplici, intus colore rubicundo castaneæ forma continens: Pigafet. desc. regni Congiani l. 2. c. 1.

XI. Palma humilis longis latisque folijs.

Palma, quam in Cypro crescere Theophr. 2. hist. 8. scribit, quibusdam: quod Guil. in The. refutat, quia hujus fructus sapidus non sit, cum Musæ longè suavisissimus sit.

Pala Plinio l. 12. c. 6. major alia pomo & suavitate præcellentior, quo sapientes Indorum vivunt: folium alas avium imitatur, longitudine trium cubitorum, latitudine duum, &c. arbori nomen Palæ, pomo Arienæ.

Musa, Maum & Amusa, Serapioni, Avicen. Indis, Quelli, & Guinenfibus Bananas.

Musa, Matth. Dod. gal. Bellon. Guil. Ad. Rauv. Cæs. Cast. Frag. Tab. Lugd. Garz. cui & Ficus Martabanis.

Palmæ species pumila quæ Musas fert, Gesn. hor.

Musa Serapionis, Lob.

Musa five Ficus Indica, Acoftæ, Lugd. app.

Poma paradysi, Lud. Romano, hujus enim arboris fructum Adamum comedisse voluit.

Dudaim in Biblijs: Phyximilon Æschylo: Margraita Græcis & Latinis: Muž & Gemez, Mauritanis: Ficus Pharaonis, Kafi: Melapolanda, Indis orient. At Indis occid. Platanus: Abella, insulæ D. Thomæ inquilinis dicitur, teste Guil. in The.

Mauz, Alpino.

Mauze Theveti, Lugd.

Huc referri debet,

Paquohere Americanorum, Theveti.

Musa pacouere Lugd. qui figuram Theveti à priore diversam exhibet.

Hujus folijs gummi Elemni, aliquando & Sacchari panes involvuntur.

XII. Musæ affinis in regno Catay.

Photel, nonnullis Ficus Pharonis, Thevet. Lugd.

XIII. Musæ affinis altera.

Banam, fructus in regno Congiano, forma & gustu Musæ Ægyptiæ: par. 1. Ind. or. l. 2. c. 1.

XIV. Palmam referens arbor farinifera.

Zagu, Ferd. Lopez.

Sagu, Pigafetta, & ad Clus. cur. post.

Arbor vasta in regno Fanfur, Polo Veneto.

Arbor farinifera, Clus. exot. l. 1. c. 3, & 16. Lugd. & Claudio Dureto.

In Ternate insula Equatori proxima provenit, cujus summum fastigium in caput orbiculatum instar Brassicæ capitatae extuberat, in cujus meditullio farina, ex qua panes fiunt: sicut etiam apud Amboënses, & panes & alia cum lacte fercula conficiuntur.

Arborem quandam in insula Ternate detruncant, findunt, ligna fissa tamdiu tondunt, dum farina decidat, quam Sagge nominant, ex qua panes candidos quadrilateros conficiunt: par. 5. Ind. orient. At parte 8. panis Sagu Moluccensium, ex radicibus arborum confectus dicitur: quare Lerus in descript. Brasiliae, putat farinam non ex ligno attrito, sed ex radicibus Aypi & Maniot confici.

XV. Arbor exotica fructu dactylis simili.

Arbor tinctoria, Theveti, Lugd.

In regno Senegæ, arbor ex cujus nucleis oleum expressum cum aqua mixtum, pocula & pileos croceo colore tingunt.

XVI. Genus fructus palmulis simile, sed ut piper linguam exurens, Linsc. part. 3. Ind. or. 10.

XVII. Arbor folijs amplissimis fructu cucumeris forma.

Bonannas part. 7. Ind. or. fig. 4. & part. 5. c. 7.

Bannana: part. 6. Ind. or. & part. 8.

Folia tantæ magnitudinis, ut virum aliquem cooperire possint.

Huc referri potest

I. Ficus Indica fructu racemoso folio oblongo. an Uva quam ex benedicta terra Moyfi attulerunt?

Platanus, Oviedo: & part. 4. Amer. c. 28.

Platanus Indica: part. 9. Ind. occid. l. 4. c. 21.

Darach, Moris ipsa arbor dicitur: Avicenna, Serapio, Rhasis meminere, Paludanus notis in Linscot.

Ficus Indica, Linscot. 4. part. Ind. or. 11. & fig. 11. Pacoaire frutex, (ad Musam Matthioli accedere cenfer) Lero 3. part. Ind. occid. 12.

Platanus sive Bonannas, part. 9. Ind. occid.

At fructus dicitur

Bavanas, Patan, Prian, Quelli Indis, pacona Brasilianis, Linscot. l. c.

Paco, Lero l. c.

Pacona, part. 3. Amer. ep. 1. de Brasil.

Poma Paradyli, Brocardo ter. sanct. desc.

Davanas fructus, part. 2. Ind. or. 4.

Vannanas seu Ficus Indica, in Sumatra, part. 4. Ind. or. c. 4.

Arbor Vannanas: part. 8. Ind. occid.

Genera plura: 1. cæteris crassius, Figos Dorta, Fici aulici Lusitanis dicuntur: 2. minus Seneryn dictum: 3. Cadolyn: 4. ficus nobilissimi Chyncapoloyn nuncupantur, Linscot. l. c.

Folia hujus, quæ ulnam longa, tres Spithamas lata (laphathij aquatici sex pedes longa, duos lata, Lero) in variam supellectilem frondis in Goa cedunt, quibus & Turcæ papyri loco utuntur. Sarculus sæpè 200. scibus prægnans est, uvarum modo in se compressis: acini ex quibus dependent, sæpè in tantam molem grandescunt, ut à binis bajulis transversa pertica vix gestari queant: Toto anno fructifera est, & Indis commeatum quotidianum largitur: Linsc.

Ex folijs in insula Capul, supparum conficiunt, quo corporis partem inferiorem & pudenda tegunt: part. 9. Ind. occid.

Aliæ Platanæ adhuc in India reperiuntur, exiles & candidi, quas in Hispaniola Dominicos vocant: alibi etiam crassiores, & rubentes proveniunt: Joseph. Acosta l. 4. c. 21.

II. Ficus Indica fructu racemoso altera. an Ficus Indica circa Acesinum amnem nascentis, Theoph. 1. hist. 12. 4. hist. 5. & 2. cauf. 14.

an Fructus arboris Gaguey, Oviedo.

Arbor peregrina fructum similem ficui gerens, Clus. exot. l. 1. c. 11.

Huc referre oportet

Fructum exoticum tertium, Clus. l. 2. c. 19.

Palma nucem ferens.

I. Palma Indica coccifera angulosa.

Jausial Indi, id est, nux Indica, Avicennæ.

Nux

Nux Indica, Matth. Adv. Lob. Cæs. Cast. Lugd.

Nux Indica grandis, Cord. hist.

Palma in India nascens, Theophr. Arnano, Straboni, Guil.

Coccus Indica, Lac. Frag.

(ap.

Palma Indica Garziæ, quæ & Elephantis, Lug.

Nux Indica 1. & 2. Tab.

Palma nux Indica Coccus dictas ferens, Pigafetta in desc. regni Congiani, sive part. 1. Ind. orient. lib. 2. cap. 1.

Palma Indica sive Cocos, par. 9. Ind. occ. l. 4. c. 26.

Palma seu nucifera arbor Indica, quæ Arabibus Maro, Indis Tengamaran & Lanha: at nux, Arabibus Narel, Indis Tenga, Lusitanis Coquo, Linsc. part. 4. Ind. orient. c. 12. & fig. 11.

Palma Indica Coco vocant ut & fructum: part. 9. Ind. occid. additam.

Cocos sive nux Indica: part. 8. Ind. occid.

Coques nuxes, ex cujus corticibus, corbes parant: part. 9. Ind. occid. additam.

Palma Cocoichne, palma indica nucem Indicâ ferens, quas Linscottus rotundas pingit, cum ex Guinea triangulares advehantur, nisi forte succo plenæ rotundiores sint, Roëlius in ep. ad Cl. ubi Linscotti figura à Clusio reprehenditur.

Fructus Lusitanis Coco & Coquen dicitur, ob tria foraminum vestigia, quibus Cercopitheci caput representant: & nucleus inclusus siccatus, Copra nominatur, qui fructus & vitum & amictum Indis suppeditat, & omni tempore nuxes fert, Linsc. l. c.

In Caryotarû genere, quas Plinius Nicolaos appellat, aut quod Pateton vocat, esse voluit.

Liquorem colligunt ex nuce, quem Suram nominant: & Ambonenses Vinum de palma: & quomodo vinum ex his fiat, ostenditur ad Clus. cur. post. Ex hoc spiritum eliciunt, qui incolis Arack, alijs Fula, sive Mype, id est Vinum sublimatum dicitur: sed & alio modo distillata Sura, Uraca fit. In summa ex hac Palma, fructus, oleum, lac, mel & acetum colligunt: ex cortice ligneo pocula, ex paleaceis nucum integumentis, funes ad naves, foliorum denique quoque usus existit.

Genera Cocos seu Palmæ Indicæ quatuor sunt: 1. nucum jam dictarum, ex quibus Indi universi omnem suum victum quærent: 2. Lusitanis Arraquo: quæ Areccam fert: 3. dactylifera, Tamar: 4. Lantor dicta, ex quo Indi papyrum suum quærent: 4. part. Ind. or. c. 3.

II. Palma coccifera figura ovali. (Garz. Coccus de Maldiva, Garz. Acoftæ, Frag. Clus. ad an Nucum genus peculiare contra venena, in insula Melandyna, Linsc. part. 2. Ind. or. c. 15.

Fructus argento includuntur, ut & priores: aliquando prægrandes admodum, interdum exigui in littus ejecti reperiuntur.

III. Palma Javanensis longissimofolio. Lantor, è Coquos seu Nucum Indicarum classe, folia viri longitudine proferens, part. 4. Ind. or. c. 3. & 6. fig. 15.

Fructum fert pusillum Cerasi magnitudine, qui nucleum carnos dictum continet: hanc Palmam aliqui primæ feminam existimant.

IV. Palma coccifera ex Guinea.

Avellanæ Indicæ species, Matth. Lugd.

Avellana Indica, Lob. Tab.

(Garz.

Fructus 1. cum Cocco affinitatem habens, Cl. ad Palma Ady Roëlius in epist. ad Clus. quia sit Palmæ Caryotides Diosc. & Galeni, dubitat.

Fructus Abariga incolis, Caryoces & Carcoso Lusitanis, Citrij mali magnitudine, ex cujus pulpa oleum exprimunt, id edulij miscentes: ex germinibus succum colligunt, quo ut Vino inebriantur.

V. Palma coccifera Brasiliæna.

Sabucæj pomo est ambobus pugnis ampliore, forma calycis, in quo nuclei amygdalinis similes, etiam sapore, Lerio 3. part. Ind. occid. c. 12.

VI. Avellana angulosa villis oblita si modo à priori diversa sit.

Fructus peregrinus 3. cum priore magnam similitudinem habens, Clus. exor. 1. 2. c. 29. Lugdun. Tab. Ger. hujus nucleus pro

Fructu peregrino 5. proponitur à Clus. Lug. Tab.

VII. Palma coccifera minor.

(Ger.

Palmitas quarum aliquas femellas dicunt, quæ vinum nullum proferunt, sed fructibus abundant, quorum nucleus juglandis magnitudine, cujus cortice aperto, tres in eo nuxes, avellanis similes: part. 6. Ind. or. c. 12.

VIII. Palma cujus fructus Cucu.

Κυτιοφόρον inquit Theoph. 4. hist. 2. similis Palmæ, similitudinem in caule & folijs representans: quæ cum aliquantulum increverit bifida fit, iterumque horum utrumque pari modo dividitur: virgas breves nec multas profert: fructum fert magnitudine qua manum impleat, rotundum & oblongum, colore flavicante, succo dulcem & gratissimum, non congestum ut

SSf 3

Palmæ,

Palmae, sed per singula discretum, nucleo magno vehementerque duro, &c.

Cuci Plinio l. 13. c. 9. qui eadem ferè quæ Theophrasti, habet.

Cuciophera, Matth. Cam. ep. Lugd. ap. Tab. Ger. Cuciophoron, Ang.

an Nux Indica minor, Cuci Theophrasti, Cord. hist.

Bdellij fructus Cortusi, Clus. hist. Lugd.

Perseæ, hunc fructum adpinxit, Lugd.

Cuci fructus, suo pulvino nudatus, Clus. hist.

Cuci fructus, Linsc. part. 4. Ind. or. fig. 18.

IX. Nuci Indicæ majori affinis fructus Brasiliæ.

Fructus exotici quintus binis foraminibus parte anteriore, Clus. exot. l. 2. c. 16.

X. Nucula Indica ex Guinea.

Nucula Indica, Adv. Lob. ico.

Nux altera, Clus. exot. l. 2. c. 26.

Nucula Indica secunda, ad Clus. cur. post.

Ex folijs liquor exprimitur, aut ea in aqua decoquuntur, eoque pro potu utuntur: at ex fructu panem suavem conficiunt.

XI. Palma cujus fructus sessilis Fauſel dicitur. Fauſel Serapioni: Filfel & Fufel, Avicennæ.

Avellana Indica, Matth. qui una tabella triplices fructus pingit, ut & Lugd. hic tamen & nucem ex Clusio adposuit.

Fauſel, id est Avellana Indica, Cord. hist. Frag. Fauſel sive Areca, Garz.

Areca sive Fauſel, Clus. in Garz. Lugd.

Avellana Indica cujus fructus Areca, Acoſtæ.

Areca palmæ species, Scalig. Vartomanno, cui fructus Coffol, & Lug. Romano Chofola, Lugd.

Areca, Cast. Tabern. Ger. hi duo & arborem & fructum, tam hujus quam sequentis, una tabella proponunt.

(Lob. Fauſel cum suo involucrio & eodem exutu, Adv.

Nuci Indicæ affinis fructus, Areca, Cæſ.

Palma Indicæ altera species, quæ Lusitanis

Arequiero, quæ fructum Areca seu Fauſel parit, Linsc. 4. part. Ind. or. c. 5. & fig. 11.

Areca & Arrequa, Supary, Arabibus Fauſel fructus dicitur, Linsc. 4. part. Ind. or. c. 16.

Genera tria: 1. latere uno presior, altero latior & major: 2. minus, nigricantius, durius, Checanyn dictum 3. à cujus masticatione homo ac vino inebriatur, Linsc. l. c.

XII. Palma cujus fructus oblongus Fauſel similis,

Avellana Indicæ genus oblongum, Clus. in Garz. Lob.

Nux oblonga quæ Fauſel cum suo involucrio magnitudine æquat, Lugd. cui Avellana Indica 4. ordine in tabula.

XIII. Palma fructu nuce juglandis minore & rotundiore.

Alia species Coquillo dicitur, in Chile fructu suaviore, part. 9. Ind. occid. l. 4. c. 26.

XIV. Fructus exotici Fauſel affinis.

Fructus exotici 2. à Clutio, Clus. exot. l. 2. c. 23.

XV. Fructus Javanensis quadrangulus cortice reticulato spadiceo.

Peregrinus fructus *terpox* prægrandis, alterius Palmæ fructus forte, Clus. exot. l. 2. c. 5.

Hunc cum pluribus alijs à D. Hoofft Guillemi, Amstelrodamo accepi.

XVI. Nuci de Coulcul quæ gemini pugni magnitudine sit, quæ parvis granis esui aptis, atque Avellana instar dulcibus plena sit, meminit Bellonius obs. l. 1. c. ult.

XVII. Courou, fructus Brasiliæ, ex quo oleum exprimitur curandis vulneribus præstantissimum: Leriis, vel 3. par. Ind. occid. 10.

Palma squamoso fructu.

I. Palma conifera ex Guinea squamis ad pediculum converſis.

Palma pinus sive conifera, Adv. Lob. ico.

Palmapinus sylvestris, Lugd.

Peregrinus fructus squamosus, Clus. in auctar. ad exot.

Fruticis aut arboris exoticae ramus cum fructibus squamosis, Clus. cur. post.

Includitur nucleus durus, venosus, qualis interdum pro insigni aliquo lapide obtruditur.

II. Palma conifera squamis sursum cõverſis. Fructus peregrinus abiegnae nuci similis, Clus. exot. lib. 2. cap. 3.

III. Palma conifera squamis à prioribus differens.

Palmapinus sive conifera Penæ, Lugd.

Palmapinus, Cast. app.

Palma conifera, Tab.

IV. Fructus squamosus orbicularis major juglandis magnitudine.

Fructus peregrinus squamosus tertius, Clus. exot. lib. 2. cap. 3.

V. Fructus squamosus orbicularis minor, avellanae magnitudine.

Fructus peregrinus squamosus secundus, & fructus

fructus Canne de Bengala creditur, Cl. ex. l. 2. c. 3.

VI. Fructus squamosus orbicularis fulcis rectis, obliquis & transversis.

Guayauæ fructus elegantissimus, Cl. ex. l. 2. c. 4.

Guanavæ, part. 9. Ind. occid. c. 28.

Variat fructu cordis effigie viridi: item orbiculari crocei coloris.

VII. Fructus squamosus pyriformis.

Fructus aspero cortice ex Baly insula, Clus. ex lib. 2. cap. 4.

VIII. Palma fructu aculeato ex arboris trunco prodeunte.

Jaca, Garz. Acoft. Frag. Lugd.

Jaca minor, Cast.

Jaceros in Calecut, Ludov. Romano.

Jaaca & Jaqua, Linsc. 4. p. Ind. Or. c. 6. & fig. 16.

Fructus melonis magnitudine: quoddam genus adeo auget, ut ab uno homine ægrè attolli queat: Duplex est, alter & præstantior Barca: alter Papa aut Girafol appellatur.

IX. Arbor fructu Ananæ ex caudice emergente, nucleis turgente.

Arbor sine folijs seu ramis, in Insula minore S. Mariæ part. 4. Ind. Or. c. 6.

X. Arbor Indica fructu racemoso erinaceo.

Erinaceus Lusitanorum, Linsc. p. 4. Ind. Or. fig. 16.

Fructus in Baly Insula pomi ferè magnitudine, aspera & spinosa cute tectus.

XI. Fructus cortice squamoso.

Fructus ex Bally pyri magnitudine, cortice instar piscis squamarum aspero, nucleo uno vel altero, Linsc. par. 3. Ind. Or. 39. & par. 4. c. 6.

Nuces exotice.

I. Nuculæ saponariæ non edules.

Arbores, quæ à precarijs sphaerulis & à saponæ cognomen acceperunt, folijs filicis, Oviedo histor. Ind. Lugd.

Sphaerulæ saponariæ Oviedi, Monardi.

Fructus exotici 16. Clus. ex. l. 2. c. 16.

In Hisp. fructu integro cum aqua pro saponæ utuntur: ex officulis sunt corollæ ebenis similes.

II. Nux vomica in Officinis.

Nuces vomice Sepalsijs, quas Methellas genuinas crediderunt, Matth.

Nux vomica communis, nec vomica est, nec metella, Ang.

Nux vomica, Cord. hist. (cui & canina) Cast. Lugd. Tabern.

Nux metella, Lac. vulgò & Fungus orient. Cæs.

Nux metella vera, Vomica officinarum, Lon.

Vomica officin. falso Metella, Guil.

Tithymali myrsinitis fructus, Fuch. comp.

Nux vomica, fortè Curschula, Rauvolf.

Homini noxiam dicit Matth. innoxiam Milichius & Renodæus: poriones somniferas ex his se parasse, Brassavolus scribit.

III. Nux metel officinarum oculata.

Nux metel communis, Vomica non est, sed potius Metel verum, Ang.

Nux vomica, Lac. vera, Metella officinar. Lon.

Nux methel sive methela, Lugd.

Hippomanes Cratevæ quibusdam, Eid.

Fructus peregrinus sextus, Clus. exot. l. 2. c. 30. & in altera tabula, Lugd. Tab. & Ger.

Nucum genus gallis tum forma tum magnitudine simile, Ind. Or. part. 4. c. 8.

IV. Cocculæ Officinarum.

Baccæ cotulæ Elephantinæ Germanis pharmacop. Matth. epist.

Solani furiosi fructus, Cord. in Diosc.

Cuculi fructus Solani furiosi in Ægypto, Eid. h. Coco de levanti, quidam fructum Tithymali paralij esse putant, Lac.

Grana orientis, Cornaro.

Nux vomica fortè, quæ officinis Galla orientalis, Cæs.

Cuculus Indicus, Cast.

Cocculæ orientales, Doam Sames in Halepo, Rauvolf.

Coco orientalis, Frag.

Cocci orientales, Tab. Ger.

Baccæ orientales & piscatoriæ, Condroncho.

Hæ sæpe racematim pediculis hærentes, hederæ corymborum modo ex Alexandria adferuntur. Pro pediculis nullum præstantius remedium inventum, Condronchus peculiari de his baccis tractatu scribit.

Quidam Solani manici, quidam Tithymali, quidam Clematidis fructum opinantur.

V. Anacardium: fructus hic veteribus Græcis incognitus censetur, quem recentiores Græci *αναναδίου*, à cordis cum primis resiccati, tum similitudine, tum colore nominarunt. Baladar Arabibus, ut Serapioni.

Anacardium, Matth. Lac. Cord. hist. Lon. Cast.

Garz. Acoftæ, Frag. Lugd. Tab. Ger.

Anacardium, Arabibus Balado, Lusitanis Faba

Malaccana; ex qua viridi Achar conficiunt, id

est, sale & aceto maceratum condiunt, Linscort. part. 4. Ind. Or. c. 29.

Anacar-

Anacardus sive Anacardium: Persea forte Plinij Cæs.

Variat: nam quod in Malavar, oblongiore porrecto collo est, eo quod in Sunda prodit.

VI. Anacardij alia species.

Acajon, Theveti, Lug. Lerio 3. par. Ind. occ. c. 12.

Cajous Acoltæ, Clus. ad Garz. Lugd. Ger.

Cajos, Linc. part. 4. Ind. or. 9. & fig. 17.

Castaneæ quæ ex Indijs adferuntur: Rondil. cap. de memoria deperdita.

Anacardij aliud genus, quod Cajous, Frag. Tab.

Fructus peregrinus 7. Clus. ex. l. 2. c. 30. & in tab.

altera, Lug. Tab. Ger. nux est Cajous immatura.

Fructu ovi anserini forma, cujus extremo nux leporini renis figura (cujus nucleus suavis-
simus) adnascitur: ex fructu Canibales potio-
nis genus conficiunt.

Arbores venenata.

I. Arbor fructu orbiculari venenato.

Penoabfou Theveti, Lugd.

Arbor in America portulacæ folijs, & in fru-
ctu quolibet nuces senæ amygdalis similes, in
singulis singuli nuclei, ad vulnera sananda, ut
& oleum ex ijs expressum, utile.

II. Arbor fructu pilæ magnitudine.

Arbor venenata I. Theveti, Lugd.

Hujus succo Canibales sagittas imbuunt.

III. Arbor succo venenato, radice esculenta.
Arbor venenata alia, ex qua scarificata succus
mortifer emanat, radice tamen esculenta, ex
qua farinam, qua vescuntur, faciunt, Thev. Lug.

IV. Arbor fructu venenato, radice veneno-
rum antidoto.

Arbor Baxama, cujus & umbra & fructus suffo-
cant: cum tamen radix in alijs regionibus, ve-
nenorum antidotus sit, ut & fructus qui Raba-
xit vocatur, Theveto, Lugd.

V. Arbor brassicæ folio excelsissima Ame-
ricana.

Uhebebasou fructu pedis longitudine, quo a-
pum examina nutriuntur, Theveto, Lugd.

HERBÆ ET ARBORES admirandæ.

I. Planta sanguineos sudores excitans, in
epist. ad Monard.

II. Herba mortem aut vitam in morbis præ-
nuncians, Monard. Lugd.

III. Baharas in Judæa radix colore flammæ
assimilis, circa vesperam veluti jubare fulgu-
rans: quæ accedentem & evellere cupientem

tam diu refugit, nec prius fugam sistit, quam
urina muliebri, aut menstruo sanguine con-
spersa fuerit, Joseph. de bello Judaico.

cum Aglaophotide sive Cynopasto terrestri
Æliani: marmaritide Democriti: Cynocephala
& Osiritide Apionis: moly, Homeri: &
pæonia non Dioscoridis, sed Galeni, nisi fal-
lor, convenit. Guil. pap.

Baaras aut Babras Josephi, ex loco natali, Cast.

IV. Frutex Tartaricus.

Agnus Scythica, Borametz, Sigisf. Baroni ab
Herberstein in hist. Moscovitica, Scalig. Lugd.
Borametz Tartarica, Claud. Dureto, qui eum
pingit.

Ex semine Melonis magnitudine crescit fi-
gura agni, quem omnibus partibus repræsen-
tat & pro carnibus pilos gerit singulari cornu
specie, & radix ad umbilicum furrigitur.

V. Arbor venereos stimulos domans: in
epist. ad Monard.

VI. Arbor folijs ambulantibus, Pigafetta.

Arbor in insula Cimbabon, Costæo, Guil. pap.

Arbor mira cujus frondes repunt, Scalig.

Arbor folijs virentibus & ambulantibus, Du-
reto, qui eam pingit.

In insula Cimbabon, arbor folijs Mori mul-
tùm similibus, parte utraq; binos pedes breves
& acutos habens, quæ ubi tanguntur, diffugiunt.

VII. Arbor Malavarensis folijs tactu se con-
trahentibus.

Arbor in provincia Pudefetan in Asia, Nicolao
Conti, Poggio Florentino, Cardano.

Arbor pudica, Scal. Dureto, qui arborem pingit.

Arbor verecunda in Pudefetaniam, Costæo.

Planta in Peru nascens, cujus folia contactu sic-
cantur, Francisco Lopez: quam tamen Acuan
verum aliqui putant, Clusio monente.

Herba pudica, Lugd.

an Arbor circa Memphim, Theophr. 4. histor. 3.
nascitur peculiaris quædam arbor circa Mem-
phim, non folijs, vel ramis, vel tota forma pecu-
liare quid fortita, sed eventu: facies enim ejus
spinosa, folium filicibus (pennis Plinius) non
abimile: sed cum ramulos quospiam cõrigit,
folia veluti arefcentia & languescentia cõtrahit
ajunt, deinde paulo post ad vitam redire. Idem
fere Plinius l. 17. c. 10. Huic arbori affinis herba,
quam l. 10. f. 2. sub Herba viva proposuimus.

II. Arbor aquam fundens.
Arbor perennes aquas è folijs exudans, Benzoni
in insul.

in Insul. Canar. descr. vel Ind. Occid. par. 6. ubi & figura habetur.

Arbor mediocris magnitudinis in Insula Ferro, cui similis in toto orbe non invenitur, Linsc. part. 3. Ind. Or. c. 5.

Arbor in Ferro Insula, quæ incolis Garoë: Hispanis Sancta: veteribus historicis Til vocatur, par. 8. Ind. Orient.

Vide & Cardanum 6. variet. rer. 22.

Ombria sive Pluvialia Plinij & Solini, hanc Insulam suspicantur. Plin. l. 6. c. 32. in Insula Ombria vocata, arbores similes Ferulæ, ex quibus aqua exprimitur: ex nigris amara, ex candidioribus potui jucunda. Verum Benzo & Linscortus, arbori folia Juglandis, quamquam paulo majora & perpetuo viridia, tribuunt, quæ fructum habet in cortice glandis instar pendentem, cum nucleo suavissimo & valde aromatici gustus, par. 8. Ind. Oriental.

In tota Insula nulla aqua reperitur, præter eam quæ ex illa arbore manat, quæ perpetua ac densa nebula, ubi solis æstus non flagrat, circumdat.

IX. Abores quibus ædiculæ superstruuntur. Ceibas sive Cerbas arbor maxima in Ind. Occident. quam homines quatuordecim simul complecti nequeunt, Oviedo, Cardano, Francisco de Bello foret.

Cerbas arbor in Nicaragua, quam quindecim complecti non possunt. Tantæ crassitie, ut Indi ædiculas supra construant, Petrus Martyr: pingit Claudius Duretus: vide & part. 6. Ind. Occid. 61.

Ceyba arbor, Lero de Bras. c. 12.

Ceyuas arbor grandis in India, ex quibus Indis suas Canoas fingunt & excavant, 9. par. Ind. Occident. l. 4. c. 30.

Ligno est fungoso ut Suberis: fructu lana referto & semine bombacis.

Quomodo Indi in arboribus domicilia habeant, duabus figuris exprimitur, in parte 6. Americæ: & istorum ædificiorum meminit etiam Petrus de Cieca part. 1. Chronica Peruana c. 12. & 27. & 29. quæ valde capacia esse scribit, ut plures etiam integras familias capere possint.

X. Arbor in summo cacumine saltem frondes minimas parturiens, ex cujus trunco integro, Canoas suas exstruunt, Linsc. p. 4. Ind. Or. fig. 21.

XI. Licondo, arbor tantæ magnitudinis, ut sex viri brachijs expansis vix possint circumdare, & tantæ magnitudinis, ut 200. viros cum ar-

mis & remis capere possint, ex cujus trunco excavato scaphas faciunt in regno Congiano, part. 1. Ind. Orient. c. 4.

XII. Rattiak arbor, ex qua in Virginea lintres fabricant, 1. part. Ind. Orient.

XIII. & XIV. Yga, Yuvera, arbores in Brasilia quas integras decorticant, cortice illæso, ex quo scapham parant, quarum singule triginta armatos vehunt: nam cortex pollicaris crassitudinis, quatuor pedes latus, quadraginta longus: par. 3. Ind. Occid. l. 3. c. 25.

Sic ex arboris Yuire vocatæ cortice, tilia per similia, funes faciunt: Lero de Bras. c. 14.

Lintres singuli, ex cortice arborum detracto constant, quos Ygat nominant, tantæ amplitudinis, ut singuli quinquaginta homines capiant: idem capit. 13.

XV. Gelsomoro arboris ab incolis dictæ cortex, in quibusdam Indiæ locis pecunia est: Pigafetta in desc. regni Congiani lib. 1. c. 4.

XVI. Pindo herbæ caules aut Palmarum ramos, ad januas ædium Brasiliiani adponunt, Lero de Bras. c. 13.

Arbores anatiferae.

I. Arbor ex cujus ligni putredine vermes, & ex his Anates viventes & volantes generantur, Claud. Duretus arborem pingit.

Hector Boëtius in descr. Scoræ in Insulis Hebridibus, Klaki avem nominant, in quibus vim procreandi potius, quam arboribus inesse, &c. quæ citantur à Cardano l. 6. de Var. rerum, dubitatione prorsus digna dicens. Polydorus Virgilius pro fabula habet.

Olaus Magnus scribit, è lignis putridis fungos primum nasci, ex his aves maritimas, quæ piscibus vivunt. Idem confirmat Cornelius Scribonius in epit. hist. de gentibus Septentrion. Alexander ab Alexandro de diebus genialibus: Antonius Torquemada in suo Hexamero: Joh. Baptista Porta in phytognom. Abraham Ortelius in suo theatro. Sic Syl. Giraldo in hist. Hierniæ, Bernacæ dicuntur, quæ anatis palustribus similes, sed minores.

Bernacles, Ad. & Lob.

Britanniæ conchæ anatifera, Lob. belg.

Anatifera concha, Lon.

Ex furculis arborum conchæ anatifera, Lugd.

Conchæ anatifera ex arbore dependentes & trunco adhærentes, Aldroand. de avibus, & lib. de testaceis.

Ttt

Con-

Conchæ vulgo anatiseræ, non sunt fructus terrestres, neque ex ijs anates oriuntur, sed Balani marinæ species, Colum.

In navigat. tertia Hollandorum per Norvegiam in Chinam Ann. 1596. five in par. 3. Ind. Or. hæc habentur: hoc loco Anserum rubentium ova magno numero collegimus: cujus generis anseres quodannis magna copia in Hollandia ad Wiringam capiuntur: qui quo loco sua ova excluderent, hætenus nemini adhuc compertum fuit, cum multi eosdem in Scotia arboribus nasci, frustra contenderint.

II. Arbor ex cujus fructibus in aquam delapsis anates prodeunt, Claud. Dureto, qui ejus figuram proponit.

Arborem in Scotia apud Orcades Insulas reperiri audio, cujus fructus avem Anatum formam habens, producant, Æneas Sylvius in descript. Europæ.

Arbores in Scotia quarum fructus folijs involutus, si in aquam decidat, in avem transmutatur, quam avem arboream vocat, Seb. Munsterus in Cosmogr. Saxo Grammaticus etiam meminit. Arborum quarundam fructus similes conopini, si in mare decidant, in aves transeunt, quibus etiam in Quadragesima uti licet, Joh. Boteerus in sua relat. De his etiam Pierius Valerianus in suis Hieroglyphicis, & Andreas Thevetus, in sua Cosmographia.

Fructus ostracets non dissimilis arboribus nascens, in tanta copia, ut folium vix cerni liceat: par. 8. Ind. Occid. descr. navig. 1. ipsius Drake. In Guajana, Ostrea in arboribus, & non in terra crescent, quod in India Occidentali & alijs lo-

cis frequentissimum est: quam arborem Thevetus in sua Gallia Antarctica c. 26. describit, addita imagine peregrini cujusdam fruticis: describitur etiam à Plinio l. 13. c. 25. par. 8. Ind. Occid. in hist. Raleigh.

III. Arbor cujus folia si decidant super terram, in aves volantes, si verò in aquam, in pisces mutantur, Claudio Dureto, qui figuram fingit.

Cornu plantabile.

Coronidis loco de Cornu plantabili quædam ex Hugonis Linschorani historia Indica, quæ par. 4. Ind. Or. habetur, qui cap. 17. hæc refert, in Goa Insula, ad hujus nominis civitatem, juxta murorum terminos, locus quidam discretus est, quo omnis generis pecudes mactare solent, in quo animalium caëtorum cornua passim objecta jacent, non solum ceu nullius apud Indos usus, sed præcipue hanc ob causam longius obijciuntur, quod Indis haud exigua contumelia sit, si ei cornu ostendatur, ædibusve objiciatur: ita ut cornu ostendenti, à magistratu pena constituta sit. Hæc cornua, si illo loco aliquandiu jacuerint, radices in terram defigunt, medulla ejus in plurima quasi filamenta dissecta & protuberante, & hoc modo in solum se immittente: radix brassicæ similis: sicut plures meis manibus evulsi, duas tresve spithamas elongatas, id quod nullo uspiam terrarum angulo similiter fieri compertum est. Hujus causam veram & immotam qui scrutaretur & assequeretur, nemo quod sciam, uspiam comparuit: nam & terra, in omni illo confinio, valde saxosa & lapidosa est, &c.

SOLI DEO GLORIA.



CON-

CONCLUSIO.



Cum ad huius Operis in quo DEI Opt. Max. admirandam sapientiam, clementiam ac bonitatem, in tot millibus PLANTARUM creandis, velut digito solum demonstrare voluimus, finem pervenerimus, Tibi DEVS, qui solus immortalis es, tibi inquam, TRINITY & UNITRINO Hygie & Panacee Parenti, sit honor & gloria in secula, quod pro ineffabili tua misericordia, inexplicabili clementia, inexhausta bonitate (ut qui solus ipsa Bonitas & Sapientia es) mihi misero peccatori tua gratia adfuisisti, tuoq; auxilio, ut ea quae nunc supra quadraginta annos, in Plantarum historia adeo admiranda, suspicienda, vaga, Oceanog. imperscrutabili simili, in qua potentiam tuam, sapientiam & bonitatem declarasti, partim varijs & laboriosis peregrinationibus, partim diligenti Botanographorum lectione, partim optimorum virorum communicatione, observavi, & observata Veterum & Recentiorum lectione comprobari cognovi, in hunc Indicem conferre potuerim. Tibi aeternae DEVS, quod me vita & beneficijs, toto vitae meae tempore adeo clementer affeceris, mihiq; tuâ curâ spiritum servas, sit laus in secula. Insuper devoto pectore & supplex rogo, ut porro & mentem & intellectum meum illumines, manum meam regas, ut ea quae solum nomine in hoc opere attigi, & quorum historiam in THEATRO BOTANICO, (cujus Operis hic solum Index est) fideliter tradere & absolvere possim, quod ea ad altissimi tui Nominis gloriam, ad humani generis utilitatem vergant, cum sine Tuo auxilio à nobis nihil, at Tua ope omnia praestari possint. Largire quæso tuum S. Spiritum, ut miracula tua in Arborum & Herbarum creatione, explicare queam. Tuo enim jussu, ut cum Sancto tuo Propheta loquar, terra, tertio Creationis die STIRPES creavit, Herbas frugiferas, & Arbores fructiferas, quae suo quaque in genere fructum ederent, & in quibus suum semen inesset in terris: tradidisti sexta die homini omnes Herbas, quae sunt in omni terra solo frugiferae, omnesq; arboreo fœtu praeclitas Arbores semen parientes, quibus ad alimoniam uteretur. Sic bestijs terrestribus omnibus, aërisq; volucris, & quaecunque vitali spiritu animata in terris moventur, his omnem Herbarum viriditatem ad pastum dedisti. Quare ô S. TRINITAS meo instituto clementer adesse digneris, quo opus, à multis annis inchoatum, ad felicem finem perducere queam: siquidem

*Nullius sit felix conatus, & utilis unquam,
Consilium si non detq; juvetq; Deus.*

F I N I S.

ΤΤΧΗ ΚΑΙ ΠΟΝΩ.

Ttt 2

APPEN-

APPENDIX.

ALIQUOT PLANTARUM DESCRIPTIONES ADPONERE

LUBET:

Ad pag. 75. post Allium Pyrenaicum ponatur.

ALLIUM five Moly Virginianum: folijs est gramineis angustis, palmaribus, nervosis acuminatis, per margines nonnihil asperis, & cauliculos superantibus: cauliculis semipalmaribus, umbella ceu in Moly luteo infidet, quam flores plures purpureoærulei oblongis pediculis donari, ijq; trifolij insident: at umbellæ folia bina oblonga, ut in Allij five Moly montani speciebus, sed latiores, subjiuntur. Hoc Phalangij Virginiani nomine Luteria ex horto Jo. Robini, D. Georgius Spörlinus Basileensis, Medicinæ candidatus, in hoc studio versatissimus, unà cum alijs multis, Anno 1622. misit.

Ad pag. 138. lin. 21.

BOTRYS ambrosioides Mexiocana: radice est oblonga, fusca, capillaribus fibris cincta, intus candida: caule pedali, etiam altiore, sed cubitum non superante, eoq; subrubente quandoque, rotundo, striato, pilis levissimis & rarissimis aspersis: folijs pallide virentibus, Atriplicis sylvestris vulgaris forma similibus, oblongis, sinuatis, pediculis oblongis donatis & absque ordine caulem ambientibus: ad singulorum exortum, ramuli unciales, ut in Atriplice emergunt, pluribus velut capitulis alternatim dispositis, onusti, quibus singulis foliolum exiguum subjicitur, quibusq; apertis flosculi exigui, luteoli, ut in Botry conspiciuntur, hisq; semen minutum copiosumq; succedit. Planta annua est, ex semine deciduo sese propagans. Et licet tota planta primo intuitu Atriplicem referat, ita ut Atriplex Mexiocana dici possit: attamen propter odorem gravem quidem, sed non ingratis, & saporem aromaticum ad Cuminum accedentem, & propter florum & seminum copiam, ad Botrym referre maluimus: hocq; primum nomine Parote Mexiocani in horto Cl. Doctoris Plateri Anno 1619, crevit.

Ad pag. 141. lin. 34.

MILLEFOLIUM aquaticum cornutum minus: hoc priore longè minus, quod pro radice fibellas capillares tenuissimas habet: ex qua cauliculi palmares, pilo tenuiores quos foliola plura, etiam quovis pilo tenuiora & brevissima orbiculatim ambiunt, quæ simul juncta lentis magnitudinem non æquant: ex quorum medio pedicelli tenuissimi prodeunt: flores necdum observavimus. Hoc in fundo paludum Michelfeldensium D. Spörlinus, Anno 1621, reperit.

Ad pag. 184. inter Aconitum & Doronicum.

DORONICUM Americanum laciniato folio: folia habet atrovirentia nonnihil hirsuta & aspera, in quinas lacinias divisa, quarum quælibet uncias quinque vel sex longa, duas lata, in acumen desinit & per margines profundius incisa est: quarum tamen media in summitate trifida: caulis est rotundus, striatus, lævis, circa cutus summitatem folia ex rotunditate acuminata, non quidem laciniata, sed per margines profundius incisa: caulis summo flos magnus luteus Doronici forma, folijs luteis oblongis discum ambientibus, quare ad Doronicum retulimus: licet Aconiti Americani nomine Luteria D. Spörlinus miserit, (ex horto Vespas. Robini Botanici Lutetiani seduli, à quo multa nos expectamus) & ad viri altitudinem assurgere scripsit.

Ad pag. 242. lin. 28.

LYSIMACHIA lutea corniculata: planta est ramosa ad viri altitudinem assurgens, forma ad Lysimachiam latifoliam purpureâ filiquosam accedens: hæc ex radice oblonga alba, digitalem crassitudinem superante, paucis fibris capillata, caulis exsurgit initio rotundus, at supra medium, ob plurimos ramos angulosos, subcinereus, lævis, statim à radice in breviores, mox majores ramos, hicque in alios latè expansos, brachiatus, qui rotundi, paucissimis pilis donati,

nati, hinc inde maculis parvis rubentibus variegati, ex quibus tanquam ex poris pilus prodit. Folia statim ad radicem plura, oblonga, palmum superantia, latitudine unciam vix excedentia, quæ crassa, pallide virentia, lævia, in acutum delinientia: quorum inferiora quandoque laciniata, reliqua verò obscure sinuata, per quorum medium costa alba, ut in *Lyfimachia Chamænerion* dicta, excurrit: ex alarum finibus pediculus articulatus & rotundus prodit, cujus pars supra articulum triangularis fistulosa, cui flos magnus, flavus, quadrifolius, extra folia effertur: qui cum primo florere incipit, quadrangulus est, quo aperto, verum Sole tantum lucente, in ejus medio stilus conspicitur, qui viridis ad articulum usque descendit, & apicibus: quatuor sulphurei coloris, crucis in modum dispositis, donatus est, quem stamina octo circumstant, quorum quatuor singulis folijs adposita, alia quatuor ipsis interjecta sunt: hisque singulis capitulum oblongum albicans insidet: ipsi verò flori, calycis in modum, folia quatuor oblonga, angusta, pallida subiciuntur. Flos odoratus est, nonnihil ad Keiri, vel potius *Lilaphodeli* lutei odorem accedens, ultra diem non persistens: cum is qui sub vesperam aperitur, ad sequentis diei vesperam flaccescat, unde *Ephemerum* dici meretur. Flore, cum pedicello ad articulum delapso, altera pediculi pars sesquiuncialis, sensim ad uncias binas, etiam ternas oblongatur, & in siliquam sive corniculum abit, & propter semen copiosum, nigrum, parvumque quod continet intumescit: quod ubi maturuit, ipsa cornicula quæ utrinque ad caulis latera numerosa sunt, in quatuor partes dividuntur. Hujus semen, *Lyfimachia Virginiana* nomine anno 1619. Patavio accepimus, quod Vere satum, tota æstate & hyeme sine caule remansit: at sequenti anno, circa Veris finem caulescere, & Junio florere cepit: nunc verò ex deciduo semine (annua enim planta est) autumnum delabente, singulis annis in hortulo meo copiosè & usque in autumnii finem floret. *Matthioli Ephemerum* esse suspicatus sum, sed cum nullas, nisi *Dioscoridis*, notas adposuerit, nil pronuciare licet.

Ad pag. 258.

LITHOSPERMUM angustifolium umbellatum: cauliculo est palmo minore, rotundo, quem folia strictissima, oblonga, nonnunquam

utrinque bina, ambiunt, in cujus summitate flores quasi in umbella dispositi, cærulei, parvi, oblongi, cavi, per ora in quinque crenas divisi. Hoc ex horto Patavino, ante plures annos D. Heyl, nunc Dantisci medicus, attulit.

Ad pag. 268.

VIRGA aurea Mexicana: ex una radice caules plures, nonnihil tamen reclinati, asurgunt: circa quos folia palmaria, sesquiunciam lata, crassiuscula, splendentia, in summitate tamen multo breviora: ex foliorum alis ramuli prodeunt, quibus flores saturatè lutei, sursum spectantes & unam tantum caulis partem occupantes, insident. *Lutetia* in horto Robini D. Spörlinus collegit.

Ad pag. 299.

VITIS Virginiana: folijs est *Vitalbæ* nonnihil similibus, sed multo latioribus, rotundioribus & tenuioribus, viticulis suis alte scandens, & suis clavicularibus arbores comprehendens, cujus fructus corymbis hederaceis similes esse dicunt. *Lutetia* in horto Robini D. Spörlinus legit.

VITIS Canadensis nomine, ex eodem horto misit alterius fruticosæ plantæ folia, tria in uno pediculo, instar foliorum *Trifolij* disposita, pediculo longo glabro, folijs latis, crassis: quod si pediculis aculei additi forent, arboris *Coral*, quam *Clusius* in *Append. histor. suæ rar. plantarum* descripsit, pronuciarem.

Ad pag. 414. post lin. 37.

II. *Rhus Virginianum*: arbuscula est *Rhoë* vulgari major, folijs multo majoribus, acutioribus, mollioribus & viridioribus, quorum quælibet pinna, uncias quinque & sex longa sunt, & sequentis quod ex *Tupinambault* habemus, longiora, latiora, profundius crenata & viridiora: folia verò superiora *Jasmini albi* folijs similia sunt: rami ex stipite pullulantes, tenella cervorum cornua, ex cranio modo erumpentia, referunt: similiter enim hirsuti sunt, eundem colorem, eandem figuram habent: spicam, *Rhoë* vulgari multo majorem habet. Ex eodem loco habemus.

Ad pag. 444. b.

PRUNO Sylvestri affinis *Canadensis*: frutex est sesquicubitalis, caule lignoso, rotundo, atrobubente cortice vestito, in ramulos brachiato: folia habet *Rutæ Hypericoidi* similia: flores, *Pruni sylvestris* floribus similes, sed multo

Trr 3

mino-

minores, copiosos, candidos, pediculis oblongis uncialibus & capilli modo tenuibus; caliculis virentibus sustentati, insidentes; in quorum medio, filamenta plura exigua & tenuissima: flos nullo fructu succedente, Luteriæ in horto Robini decedit: qui Hypericum frutescens nominat, & è Canada allatum asserit.

Ad pag. 432.

RICINUS Americanus folio Staphisagriæ: hujus ramum habemus cubitalem ferè, lignosum, crassum, rufescentem & circa foliorum exitum hirsutum, quem folia pallide virentia, pediculis oblongis & hirsutie asperis donata, ambiunt: folia inferiora, ad foliorum Ficus formam nonnihil accedunt, & in lacinias quinque divisa sunt: superiora verò, quæ Staphidis agriæ folijs similia, in ternas lacinias secta sunt: omnia verò per circumferentiam crenis acutis exasperantur & nonnihil pubescunt, ita

ut attactu mollia sint: caulis summitas in ramulos aliquot villosos dividitur, quibus flores quinquefolij, ex intensa purpura rubentes (ut figura pictor expressit) insident. Plura non licet, cum solum ramum sicum, cum figura coloribus illustrata, Ricini Americi folijs Ficus nomine anno 1621. Verona ab insigni Pharmacopæo & Botanico, D. Johanne Pona, una cum alijs elegantissimis acceperimus: & quotidie, ex Illustr. & Magnifico Dn. Nicolai Contareni Senatoris Veneti, instructissimo viridario, multa pulchra & exotica, ipsius opera, accipimus: pluraque quotidie ab ejusdem filio Francisco Pona, Philosopho & Medico apud Veronenses clarissimo expectamus, & non solum plantas & semina; verum etiam Naturæ prædictæ Parentis sui, duplici Indice ab ipso complexum, veluti nuper ad nos perscripsit.

APPENDICIS FINIS.

LA V S COGNITIONIS SIMPLICIUM.

ORIBASII XV. COLLECTAN. CAP. I.

Simplicium medicamentorum & facultatum quæ in eis insunt, cognitio ita necessaria est, ut sine ea nemo rite medicari queat: ita enim magna nobis suppetit copia, & nos in quacumque temporis opportunitate medicamenta facile comperimus. Valet enim eadem notitia ad composita remedia consicienda: præterea verò ad eorum vires Universales invenendas, pertinet, & quod artis est apud omnes patefacit.

AETII TETRAE. II. SECT. IV. CAP. LI.

Omnium simplicium pharmacorum vires nosse oportet eum qui aliquod compositum est facturus: qui enim eas noverit, etiam eis, quæ ab alijs composita sunt, rectè utetur; maxime cum indefinitè descripta fuerint.

FERNELIUS IN SUA MEDENDI METHODO.

Simplicium cognitio, collectio, delectus, expurgatio, conservatio, preparatio, correctio & miscendi industria seorsim ad Pharmacopæos referuntur, ac pertinent: quorum tamen & Medicum imprimis gnarum, peritumque esse oportet, siquidem apud artis ministros auctoritatem, dignitatemque suam retinere ac tueri velit, quos docere hæc ipsa debet.

Μ Ο Ν Ω
Τ Ω Τ Ρ Ι Ε Μ Ε Γ Ι Σ Τ Ω
Θ Ε Ω
Τ Ι Μ Η Κ Α Ι Δ Ο Σ Α
Ε Ι Σ Α Ι Ω Ν Α

INDEX.



I N D E X.

Notandum ubi (a) habetur columnam primam, ubi (b) columnam secundam: ubi (a.b) utramq; : ubi neq; (a) nec (b) semper primam paginam columnam denotare.

	Bariga 509 b	Acetabulum Fuch. 127	nij	307 b	Alexander Turn. 154 b
Abavo 434	Acetosa ejusq; species 114	Æthiopis ejusq; species 241	Alfalsat Avic. 330		
Abelicea Ponæ 393 b	Acetofella Lon. 114 b	Agæ Cretensium 381 b	Alga Trag. 141 b. secunda 193 b		
Abella 507 b	Achanaca Thev. 111 b	Agallochum 393. sylv. 498 b.			
Abelmoluch 432 b	Achaovan Alpin. 131 b. 134 b	quibuldam 392	Alga angustifolia 364 b		
Abelmulch Ponæ 317 b	Achillea Matth. 132. Dod. 140	Agaricus arboreus 375. laxa. 375 b	bombycina 363 b. intubacea Lugd. 364		
Abdelavi Alpini 311 b	montana Lob. 134	Agatuga 439 b	latifolia 364. marina Lob. 364		
Aberas 384 b	Achilleos Cæsalp. 278 b	Agavatus Ponæ 380 b	ibid. b minima Cæf. ibid. 369		
Abbel 488 b	Achilades 439 b	Ageratum ejusq; species 221.	tinctoria. 369		
Abies 504. Dodon. 493. marina 365. mascula Theoph. 493.	Acinaria marina 365. palustris 471 b	Dod. gal. 264. ferulaceum 134	Algodon 430		
	Acinos ejusq; species 224	um 134	Alhagi Rauvvolf. 394 b		
Abrotanoides faxea Cl. 365 b	Aconitum ejusq; species 183.	Agiahalid Alpini 479	manna 497		
Abrotanum ejusq; species 136.	batrachoides 182. candidum Lugd. 182. lycoctonum 182 b. pardalanchies ejusq; species 184. pardalanchies Fuch. 167. racemolus 183 b. salutiferum Tab. 167. Geln. 184	Agitatorium Gazæ 314 b	Alypias Aetij Ang. 461 b		
Abrus Alpini 343	Aconitum Americanum 520 b	Aglaophotis Aelian 323. Guil. 512 b	Alypum Matth. 463		
Abfinthium ejusq; species 138	Aconiti lycoctoni genus Lugd. 322	Agileoforis Cortusi 354 b	mon- 463		
arborescens 136. dulce 159.	Acorus ejusq; species 34	Agnir Pragof. 113 b	ibid. 463		
marinum 137. montanum ejusq; species 139 b	Acorus Theoph. Ang. 274	Agnus calius ejusque species 475. Scythica 512 b			
Abfinth. Santonicum ejusq; species 139 b	Acera Plin. 183 b	Agria Anguil. 425 b	Alhima Cord. 84. Matth. 189		
Abfinth. Seriphium ejusque species ibid. Seriphium Trag. 109 b	Acua potus 24 b. Acuan verum 512 b	Agrimonia 321 b	Lugd. 185 Cordi 190 Trag. 216		
Abfus Alpini 332 b	Aculeata Lonie. 178 b	Agrimonoides Col. 321 b	Lob. 19 b. Guil. 251 b		
Abutilon Avicen. 316 b. Ponæ. 317 b	Aculeosa Gazæ 385 b	Agriocinara Ponæ 384 b	267 Diof. Colum. 242		
Acacalis Cam. 402 b. Diof. Amat. 436 b	Acus mofchata Cæf. 454 b	Agriomelea 452	Cæf. 244 b. alterum Plinij 241. 243. pratorum Col. 241		
Acacia ejusq; species 392. al- vera Ang. 394	Acuta spina Cæf. 454 b	Agriopastinaca Belli 216			
Acacia Germanica 496 b. Indica 403 b. major Castor. 402 b. vera Matth. ibid.	Acutella Cord. 389	Ahovay Theveti 434 b	Alyfson Antonij Col. 232.		
Acacia succus 496 b	Adiantum ejusq; species 355. album Cæf. ib. Lob. 358 b.	Ayri Palma 507	Matth. 107. Dod. 201 b. Fracast. 238. Col. 250. Diof. 201 b. montanum Colum. 249. Galeni Cæfalp. 230.		
Acaciu 512	Adiantum nigrum. Cæf. 356 b. Lob. 355 b. Tab. 355	Aiavve 495 b	Galenij Clusij 232. Germanicum echinoides 257 b		
Acanthia Hipp. 392	Adonis ejusq; species 178	Aies Cluf. 91 b	Alyflos Geln. 334		
Acanthaleuce Diof. 381 b	Adoreum Lugd. 21. Dod. 22	Aiuga Matthiol. 249. Intea Cluf. 250	Alyfson arvenfe album; Taber. 132 b. majus Tab. 233		
Acanthifolia peregrina Cæfalp. 386 b	Adrachne Theoph. Cl. 460	Aizoon arborescens 282 b.	b. Plinij 333 b. Cæf. 335 b.		
Acanthioides Col. 379	Adrachla Cretens. 460	dalyphyllum 283 b. telephium 109	trigonum Lugd. 465 b		
Acanthium ejusq; species 382. montanum Lugd. 381 b	Ægilops Plinij. Trag. 21. Geln. 9 b. Matth. Lob. 10	Aizoo perfoliatus Lob. 384	Alkakengi 166		
Acanthus ejusq; species 385. Germanica Trag. 378 b. syl. Lugd. 376. 377. vulgaris 157	Ægilops arbor 420 b	Alabaftrites Lob. 322	Alagacy 286		
Acanus Lugd. 380	Ægyptron Cratevæ 389	Alaternus Lugd. 276 b	Alhelja Lon. 330 b		
Acarna ejusq; species 379	Ægolettron Plinij 180 b. Gelnieri 88 b	Alabaca Acosta 426 b	Alliaria 110		
Accepitrina Cæf. 105 b	Ægopodium Tab. 156	Album olus Dodon. 165 b	Alliaporrum 74		
Acer ejusq; species 430	Æquum Gazæ 455	Alcali Geln. 289	Allium ejusq; species 73. an- guinum 74 b. bicornes 74		
	Æra Gracorum 9	Alcanna Arabum 476	b. caninum exiguum Trag. 43. can. i. Trag. 74 b.		
	Æreomeli 496 b	Alcea ejusq; species 316. Syriaca 317. Veneta ibid. venetaria Dod. 317. villosa ib. 331 b	fluviatile ibid.		
	Æschynomene 359 b. Plinij 110. Ang. 163 b. Plinij 238	Alchimilla 319. montana 152	Allium montanum ejusque species 74 b. mofchat. 75 b.		
		Alcyonium ejusq; species 368	saxatile. ibid. sylvestre 74		
		rubrum 367 b	b. fphariceo capite 74. ulpicum Pto. 74. urfinum ib.		
		Alectorolophos Dalechampi 110. Ang. 163 b. Plinij 238	Allium live Moly Virgini- um		

I N D E X.

num	520	Amomum Cord.	138. 484 b.	Anthedon Theoph.	453 b	Arachida Czf.	88 b
Alnus ejufq; species	418. bac-	Lob. 166. Germanicum	154	Anthemis 135. eranthemos		Arachyda Belli	345. Col. 344
ibid. b		Amomum Ang.	412 b. offi-	Lugd. 142 b. Dalech.	178.	Arachidna 90 b.	Theophr.
Aloe ejufq; species	286. fuc-	cin. Lob. 412. Clufij	413 b.	Theoph.	454 b	Cluf.	167
cus	495	Ponæ	413. quorundam	Anthemon 204 b. phyllo-		Aracle potus	24 b
Alepecuros graminea	388 b.	Clufij	411 b	Theoph.	ibid.	Arachus ejufq; species	345.
Theoph. Ang. 4 b. mon-		Amomum falſum Gef.	455 b	Anthera	330 b	Fuch. 338 b. latifolius Do-	
tana Lugd.	235 b	Amotes	91	Anthyllis ejufq; species	282.	don.	351
Alpenraut Lon.	236	Ampiloprafum 72 b. 74. pro-		prima Diof. Czf. 288 b. al-		Aracus Czf. 345 b. Dod. 344.	
Alpina Gazæ	429 b	literum	75	tera Cluf. 249 b. altera Czf.		Matth. 343. Tab.	345
Alſineanthemos Thal.	191 b	Amuſa	507 b	267 b. altera Lugd.	289.	Aralda Gef.	243 b
Alſine ejufq; species	250. al-	Anabaſis Dodon.	15 b	montana Lugd. 213 b. falſa		Arantia marina	369 b
pina Schwenck. 191 b. e-		Anacampteros Gefner.	287	Cam.	289	Aratoucon fructus	406 b
jufq; species	251	Anacardium	511 b	Anthyllis altera Dod. 347. Lo-		Arbor aquam fundens	512 b
Alſine Czf. 122 b. cornicula-		Anacok Clufij	341	bel. 486 b. claviculata Lug-		Arbores admirandæ 512. ædi-	
ta 204 b. hederula 231 b.		Anadendromalache Gal.	315	351. leguminofa Lob. 338 b		culas ſuſtinentes 513. ana-	
lutea 252. minima Taber.		Anagallis ejufq; species	252	Anthylloides Thal. 289. mites		tiſeræ 513 b. ſiliquas ſerentes	
108 b. nodofa	251	Anagyris ejufq; species	391	nor	288 b	Arbor Braſilia 393. citrifolio	
Alſine hiſtuta ejufque species		Ananas Lugd.	384 b	Anthora 184. Avicennæ	36	465 b. contrariarum ſacul.	
251 b. myofotis Lob.	254	Anapallus	458	Anthriscus Lugd.	152 b	457 b. contra fluxum	408
Alſine paluſtris ejufq; species		Anblatrum Dodon.	88	Antriphates Lob. 366. Ponæ		b. Cochinnile	458 b
251. petraza Tab. 285. pur-		Anchufa ejufque species	255.	366 b.		Arboris cortex ad rheumati-	
pura Lugd. 205 b. trida-		Dod. 256. Cord. 257. dege-		Antirrhinum ejufque species		mos	457 b
tylites alpina 284 b. ver-		ner 258. ſylv. Thal.	254	211. Diof. Czf. 250. Tra-		Arbor paradyſæa 488 b. pe-	
na	210 b	Andirian Rhafis	480 b	gi	100	regri. ex Guinea Cluf. 461	
Alſines facie Colum.	122 b	Andrachnes Theoph.	460	Antonii herba Gef.	240 b	b. Laurocerafi folio ibid.	
Altercum	169 a	Androſace ejufq; species	367	Antophylli	411 b	Arbor piperis 455 b. pudica	
Alchæa ejufq; species	315	Androſace Ang. 219 b. altera		Aparæpo	184 b	512 b. rupturas curans 458 b	
Althæa Avicen. herba 156. ſuc-		Matth. 251. Bellonij	15 b	Apargia Dalech.	127 b	ſancta 416 b. ſine folijs 411	
cus	499 b	Androſemum Lon. 279. ejuf-		Aparine ejufque species	334.	tritiſis	
Alubias de Indias	340	que species	280	major Plin.	257 b	469. vitæ 488. vitis 401 b	
Allum Gallicum Scribon.	259	Andryala Lugd.	124.	Aparine 334. lævis Thal.	335 b	Arbor de rayz 458. eryſipelas	
Aman	238	Anemone ejufq; species	173.	Apate Dalech.	130 b	curans 399 b. ſariniſera 508.	
Amaracus ejufq; species	224.	agreftris Trag. 178 b. alpina		Apbaca ejufque species	344.	folijs ambulantis 512 b.	
Galen	133	177 b. corniculata 172 b.		Lob.	345 b	ſinuum regundorum 419 b.	
Amara dulcis	167	lanſolia 173. limonia Gef.		Aphace Theophr. Lob.	126.	ſexida	428 b
Amaranthus ejufque species	264	49. lutea 177 b. 178. minor		Apharea Theoph.	476 b	Arbor Goa 450. Indica Stræ-	
Amarella Czf.	215	Lug. 172. nemorola 177. 178		Aphyllantes prima Lugd.	92	boni 458. Juda Bell. 402.	
Ambare	417 b	Anemone flore pleno ejufq;		b. Lob. 209 b. Anguil. 262.		Magellanica 461 b. Ne-	
Ambela	405	species 176. ſylv. ejufque		Dod.	273	pal	458
Ambo & Amba	440 b	species 176 b. 177		Aphroſcorodon Gef.	74	Arbutus ejufq; species	460
Ambroſia Cluf.	224	Anemone tenuifolia ejufque		Apiaſtrum Cord. 180. Lob.		Archangelica Czf. 94. Tab.	
Ambroſia ejufq; species	138	species 174. Cordi	178 b.	229		155 b. Cluf. 156 b. Lob.	231
Ambroſia Cord. 138. Lob. 136.		Matthioli	175 b	Apios Fuch. 344. Turn. 162.		Arctium Cord.	198
altera Matth. ibid. Taber.		Anethum 147. Col. 153 b. ſyl.		ejus species	292	Arctopodium Tab.	100
137 b. montana Lugd. 191.		Lacu.	148	Apium ejufq; species	153.	Arctium	198
b. Nicandri Ang.	76	Angarathi	240 b	cutarium 161. montanum		Arctolcorodon Gef.	74
Ambulon	459 b	Angelica ejufq; species	155	Gef. 150 b. ſylvaicum Thal.		Arcturus Pon.	240 b
Amedanus	428	Angelina arbor	449 b	150 b. ſylv. Dalech.	152 b	Arctifrigi Avicen.	480 b
Amelanchier Lob.	452 b	Angiers flos	133 b	Apochyma	504	Area. Linſcot.	286
Amellus Lob. 267. montanus		Anguria ejufq; species	312	Apocynum ejufq; species	302	Area.	510
Col. 265 b. Virgilij Thal.		Anil herba	113. 342 b. 352	Amati 351. latifol. Cluf. 294		Arepas panis	25 b
276 b. paluſtris Col.	267	Anime 498 b. Occident.	502	b. Dioſcor. 303. Syriacum		Argemone ejufq; species	172.
Amygdalus ejufq; species	441	Aniſum ejufq; species	159	Cluf.	116	an Dioſc. 133. Trag.	171 b.
Amygdaloperſicus	440 b	Aniſomaratrum Col.	152 b	Apellinaris	169	Tab.	178
Aminea	498 b	Annona	439 b	Aquæ ligna in lapides verten-		Argemone altera Fuch. 321 b	
Amirbaris Avicen.	454	Anon Oviedi	434	tes	421 b	Argemonia 132. Plinij	133.
Ammi ejufq; species	159. par-	Anonys ejufq; species	388	Aquifolia vulgo	425 b	321 a, b	
vum 154 b. quorundam		Anonymos Garzia 359. Fra-		ibid.		Argentaria petraza Gef.	326
Lugd.	386 b	golo 408 b. Clufij	213 b.	Aquilegia ejufq; species	144.	Argentilla Thal.	164 b
Ammiodes 159. Ammiotele-		altera Cluf. 466 b. flore		minor Lugd.	178 b	Argentina Lob. 321. Tab. 248 b	
num	ibid.	coluteæ Cluf.	471 b	Aquilla brava	394 b	Aria Theoph.	452
Ammoniacum	494	Anonyma radice dentata Co-		Arabis Dod. 106 b. Matth.	109	Ariena pomum	507 b
Amomis Clufij 413 b. Dioſc.		lum.	234 b	Araboutan	393	Arifarum Matth. 195. ejufq;	
Czf. ſalp.	484 b	Anferina Trag.	324 b	Aracinappil	437	ſpecies	198
		Anteuphorbium	387			Ariſto;	

I N D E X.

88b	Aristolochia ejusq; spec. 307.	251	Banani	508	Bette	410
Col. 344	rotunda vulg. Trag. 143 b.	352	Bangue	320	Betula	427
heophr.	rot. vulg. similis Trag. 178 b	349 b	Baobab Alpini	434	Betulus	ibid. b
167	Armeria ejusq; species 208 b.	351.	Baptiscula	273	Bexugo	300
24 b	syly.	210	Baracocca	442	Bezoardica radix	14
ies 345.	Armoracia Tab. 95 b. Brunf.	349	Barba capre ejusq; species 103	442	Bibinella, Cæf.	191
lius Do-	96 b. Plinij Lac.	186	capri Cæf. 183 b. hirci 274.	194	Bidens, Cæf.	321
351	Armoracia Lob.	132	sylyana Cæf.	336	Bifolium 87. Lonic.	304 b
od. 344.	Arnabum	300	Barba caprina minor Gef.	397	Bifal radix	259 b
345	Aromata	407	Barba Jovis 390. Cæf.	397	Bifermas Cam.	238
243 b	Arraguero	509, 510	Barbarea 98 b. minor 101 b.	397	Biflingua	305
369 b	Artemisia ejusq; species 137.	379	muralis	397	Bifmalva	315
406 b	marina 139. monoclonos	379	Bardana	397	Bifnaga	151
512 b	132. polyclonos 131. ramo-	379	Baryococcalon	397	Bistorta ejusq; species	192
512. ædi-	fa 133. tenuifolia Fuch. 135.	379	Basilicum ejusq; species	397	Bixa Oviedi	419 b
13. ana-	fecunda Cl. 136. Turcica 138	379	syly. 204. aquaticum	397	Blattaria ejusq; species	240
us feren-	Arbanita	308	Batan	434	Blatterlos Holand.	484 b
512	Arthetica Pandeet.	260	Batatas	91	Blitum ejusq; species 118. In-	203
itrisfolio	Arthetica Thal.	333	Barthlechia	167 b	dicum 120. Peruanum 121	203
n facult.	Arthetica Cam.	241	Baticula 288. Batis	311 b	Bolbonach	422 b
am 408	Artifi vulgo	274 b	Barie Indi	311 b	Boletus quercus	433 b
458 b	Artifchochi	383	Batrachion Apuleij Dod.	179.	Bolunbac	433 b
umacit-	Artifchochi sub terra	277 b	Cluf.	180	Bombax 430. humilis	265
427 b	Arturo Cortuf.	310	Bavanus	508 b	Bon vel Ban 428 b. Alp.	474 b
8b. pe-	Arum ejusque species 195.	167 b	Baucia	512	Bonannas	399 b
luf. 461	Ægyptiacum 196. palustre	436	Baxama	510	Boniama	384 b
o ibid.	Geln.	195 b	Bdellium 503. ejus fructus	252 b	Bonifacia	305
publica	Arundinacea pinnata Lobel.	387 b.	Bedeguar	483	Bonus henricus	115 b
us 458 b	387 b.	278 b	Bedengian	167 b	Bona Dod. 338. syly.	388 b
is 401 b	Arundo ejusq; species 17. In-	262.	Been album Gef. Dod.	205	Boramez	512 b
ryfpelas	dicula Guilan. 17 b. ejus spe-	254.	Been rubrum quibusdam 165.	205	Boraz	446 b
fera 508.	cies 18. lithofermos Gef.	333 b. Col. 263 b. Cæf.	officin. Guil. 192. quibus-	205 b	Borda	289
as 512 b.	258. minima Lugd. 5. b. fac-	246 b. 249. major Trag. 129.	dam	205 b	Borrage 256. minor syly. Col.	257 b. minima Lugd. 259 b
m 419 b.	charifera 18 b. varicolor	19	Behen album & rubrum Ara-	151 b	Botryo rubrum	191 b
428 b	ibid. volubilis	19	bum 135. Anguil.	146 b	Botrys ejusq; species	138
ica Seta-	Afa 166. fecunda	499 b	Beidellar Alpini	166	Botrys ambrosioides Mexio-	520
ell. 402.	Afarina Matt. 197 b. Lob. 136 b.	102	Bella donna	388 b	cana	476 b
b. Ne-	Afarum 197. muri Lugd. 259 b.	454	Bellan Lugd.	212	Bourgespine	443
458	Afalonicis Cæf.	72 b.	Bellevidere	261.	Brabyla	443
460	Afebra magnum Mef.	290	Bellis ejusq; species 161. cæ-	261.	Branca urfina 157. Italica 383.	ibid. b
4. Tab.	Afelepis ejusq; species 303	280	rulea 262. lutea ejusq; spe-	176 b	Brasiliun arbor	393
lob. 231	Acyrum Cord. 279. ejus spe-	409 b	cies 162 b. lutea Dalech.	317 b	Brassica ejusq; species 110. syly.	393
198	cies	280	265 b. Plinij	503	ejusq; species 112. marina	111 b
100	Afcolimbro Bellon.	384	Belmuscus Ægypt. Ponæ	321 b	Brassica Murciana 359 b. pra-	376
198	Afcopo arbor	409 b	Belzoinum	402 b	tenfis Lon.	412 b
74	Afcuzenas Lob.	151	Benedicta Trag.	499 b	Brindones	434 b
240 b	Afpalathus ejusq; species 392.	264	Ben Judæum 503. magnum	454	Bryonia ejusq; species	297
480 b	& 394	91 b	Monard. 418. parvum Mo-	461	Britannica Plin. 101. Ang. 242	242
286	Afpargus ejusq; species 489	452 b. 470	nard.	513 b	b. Cam. 211. Gefner. 110.	110.
510	Alperula ejusque species 334.	447	Ber 433 b. Acoftæ	252 b	Gefn. Lob. 205 b. quorum-	233 b
25 b	muralis Col.	334 b	511 b	410	dam	21 b
172.	Afperrugo Pli. 334. Dod. 257 b	511 b	Berberis ejusq; species	235	Briza	21 b
171 b.	Afpodelus ejusq; species 28.	402	Beretinus fructus	235 b	Bromos	9 b. 10 a
178	femina Fuch. 77 b. Galeni	438 b	Bernacles	235 b	Brunella ejusque species 160.	234 b
ich. 221 b	70 b. Iliaceus Tab.	80	Berula Tab.	408 b	italica	434 b
linij 133.	Afpentum Matth. 354 b. syly.	359	Beshale Avic.	117.	Brufchaer	470
ref. 326	Trag.	403 b	Beta ejusq; species 117. syly.	192	Brufcus	470
164 b	Affa five Tamarindi	403 b	Cord. 191. Plinij	410	Buhonitum Hippocr. 159. lu-	266 b
ab. 248 b	After Atticus ejusque species	266.	Betella	235	teum Tab.	266 b
452	266. luteus alter, Lugd. ib.	306.	Betonica ejusque species 235.	235 b	Buc-	
507 b	cernuus ib. cæruleus Cluf.	227.	altitilis 206. aquatica 235 b.	235 b		
5. ejusq;	267. conyzoides Lob. 266	228	236. fecunda 236 b. syly.	231 b		
Arifo-	b. Peruanus 277 b. purpur.	157 b	Fuch. 209 b. 210. syly. Pau-	247		
	Fuch. 267. non atticus Tra-	18	li Quadramio			
	gi	317 b	Betonica Pauli Dod. 246. Ca-			
	Aftergir Rhaifis	415 b	mer			

I N D E X.

Buccinum Dod.	142 b	Calamagrostis Trag.	4. 12 b.	Capnos 143. Plinij	178 b	Caryophyllata ejusq; species	
Bucranion Cordo	212	Lugd.	152	Capotes fructus	437 b	326. Veronensium	243 b
Buenes oculos fructus	255	Calamba	393	Capparis ejusque species	480.	Caryophyllus ejusque species	
Buglossum sativum ejusque		Calamintha ejusque species		Alpini	266	207. barbatus ejusq; species	
species 256. sylv. Lon. 254.		228. aquatica Tab. ib. mon-		Capparis fabago	480 b	cies 208 b. 209. carthufian.	
syl. ejusque species 256 b.		tana Trag. 225. ocimoides		Caprago Cæf.	352	208 b. 209. caruleus ibid b	
echioides 128 b. rubrum		Tab. 227. tertia Fuch. 266		Caprisicus	457 b	Caryophyllus hortensis sim-	
Lon.	255	Calampart	393	Caprifolium ejusque species		plex ejusq; species 208. ar-	
Bugula Dod.	260	Calamus aromaticus 34. In-		302. tertia Dod.	451 b	borelscens ibid. b. virgine-	
Bulapathum Fracast.	192	dicus 18 b. Peruvianus spi-		Capriola Leonie.	8	us Tab. ibid. b. monratus	
Bulbus æstivus 47. corona-		nolus	387 b	Capricum ejusq; species	102.	Lobel. 211. pumilio Clusij	
rius 43. crinitus 48 b. cru-		Calathiana verna Lugd.	188	rotundum Lugd.	167 b	206 b	
entus Hipp. 76 b. efculen-		Calceolus Mariæ Lob.	187 b	Caput canis vel vituli	211.	Caryophyllus holostius ejuf-	
tus 42. 48. leucanthemus		Calcatreppola Cæf.	387	gallinac. Lob. 350. mona-		que species	210 b
70. follequius	70	Calcatrippa, Cord.	142	chi 126 b. Gef.	343.	Caryophyllus Indicus ejusq;	
Bulbus eriophorus ejusq; spe-		Calcitruga Lob.	288	Caputium, Cord.	111	species 132. Saxatilis ejusq;	
cies 47. lanatus Cæf.	48	Calendula ejusq; species 275.		Carambolas	433 b	species 211. simplex laci-	
Bulbus sylv. Cæf. 43. sylv. bi-		alpina Ger.	185	Carandas	460 b	natus ejusq; species 209 b	
folius Gef. 45 b. Gef. 52 b.		Calichimathia Ang.	222	Caranna	503 b	Caryophyllus sylv. ejusq; spe-	
Fuch. 71. unifolius Clusf.		Calla Plinij Dalech. 195. 196 b		Carcapuli	437	cies ibid. prolifera ibid.	
56 b. Lugd. 183. vomitorius		Calliomyonius Gef.	304	Cardamine 104. alpina 104 b.		Caryophyllus aromatic. 410.	
Marth. 35. Lon. 45 b. 46		Callitriche Plin. Col.	362	105		Plinij Imper.	412 b
Bulbine Plinij	42. 43	Caltha ejusq; species 275. al-		Cardamomum ejusq; species		Caryota	508. 509
Bulbocastanum ejusque (spe-		pina Gef. Tab. 185. Africana		413. Arabum 102. Lac. 146		Carlina humilis Col. 380. syl.	
cies 162. Coniophyllon Ca-		132 b. palustris Clusf. 276 b		Cardes radix	91 b	379	
mer.	161 b	Camartinnas	486 b	Cardi 4. 8. sylv. ibid. b.		Carnabadium	246
Bulbocodium Theoph.	52 b	Camarronum Rhafis	293 b	Cardiaca 230. melica	229 b	Carobe	402
Buna	428 b	Camelina Dod.	109	Cardispermon Tab.	343.	Carolus sanctus	298 b
Buna palla	408	Camirri fructus	406 b	Cardones Cæf.	383 b	Caros alpinum Gef.	148 b
Buncho Avicen.	428 b	Camolanga Clusf.	311 b	Cardopatum Gef.	380	Carota Marth.	151 b
Bunias 95. adulterinum	99	Camotes Clusf.	91	Cardus ejusq; species	376	Carpefium Alpin. 266. Cæf.	
Bunium 162. Dalech.	150 b	Caftus Theophr.	383 b	Carduus aculeus Lob. 380 b.		410. Cæf. 164. Cord. 412 b.	
Buphthalmum ejusq; species		Campanula ejusq; species 93.		aculeatus Marth. 383 b. æ-		Lonic.	412
134. Fuchij 135 b. ellebori		arvensis Dod. 215. alba syl.		reophyl. Lugd. 382 b. Ara-		Carpinus Lugd. 431 b. Marth.	
species Dod. 186. Lon.	261	294. autumnalis Dod. 188 b		bicus 385. avenarius 377 b.		447. nigra ibid. Theophr.	
Bupleuron ejusq; species 278		cærulea 295. Indica 295 b		aven. Lon.	378 b	Trago	418
Nicandri 157. Plinij 159.		lactescens Clusf. 93. lutea li-		Cardus benedictus	386 b	Carpobalsamum	400
Hippoc. 165 a. b. angustifo-		nifolia Lob.	214	bulbosus Lob.	377	Carthamum offic. 378. sylv.	
lium alpinum	277 b	Campanula hirsuta ejusque		Carduus chondrilloides Lug.		Cæf.	379
Burla pastoris ejusque species		species 94. sylv. Trag. 243.		385 b. chrysanth. Dod. 384		Carvi ejusq; species	158
108. minor	105 b	244		Carduus eriocephalus Dodo.		Carvisolia	ibid.
Burla marina Cæf.	368 b	Camphora	500	382 b. exotici	384	Cassia Marth. Tab. 463. Latio.	
Bulfinon Plinij	153	Camphorata Lob 486. Cæfal.		Carduus ferox Lugd. 379 b		Ang. 217. Latio. Guil. 396 b	
Butomus Anguil. 194 b. Cæf.		221. quorundam	238 b	fullonum ejusq; species 385		Cassia alba Dalech. 216. nigra	
12 b. Clusf. 34 b. Dod. 152		Canacorus	19 b	Carduus hortensis 383. Indi-		Dalech. 217. poetica Lo-	
Buzus	471.	Canada	277 b	cus 458. lacteus 381. lan-		bel.	212 b
		Canaria Plinij 1. Plin. Ang. 8		ceolatus Tab.	385 b	Cassia radix	91 b
		Cancamum 498 b. Græco		Carduus Mariæ 381. Monar-		Cassia 408 b. 409 b. fistula	
		rum	499	dis 387 b. monitrosus 379		403. nigra Dod. ibid. li-	
		Canella ejusq; species	408	b. muricatus Clusf.	387	guea Cæf.	212 b
		Canior	36	Carduus mollis ejusq; species		Cassida Col.	231 b
		Canna Ang. 17. Indica ibid. b.		377 b. pitahaia Lugd. 384		Cassina	170 b
		19 b. Hierosolymitan. 18 b.		pratens.	376	Cassurta Fuch.	219 b
		ibid. b. ejus fructus 511. fa-		Carduus sanctus 378 b. sylv.		Cassa Gazæ	313
		gitivoma	19 b	Cæf. 382. sylv. Dod. 385.		Cassanea ejusq; species 418.	
		Canna fistula	403	folstitialis	387 b	equina 419. purgatrix 419	
		Cannabis ejusq; species 320.		Carduus sphærocephalus ejus-		b. Indica	512
		syl. Lob. 232 b. Anguil. 316		que species 381. spinosiff.		235 b	
		Cannabina aquatica Lob. 320		ejusq; species 385. stellatus		Calstrangula	
		Cantabrica Plinij Ang. 93 b.		ejusq; species 387. stellatus		Catanance Cam. 287 b. Cæf.	
		458 b		Lob.	272	306 b. 307. Imper. 190.	
		Caiahaba	111 b	Carduus tomentosus 382. vul-		Lugd. 131 b. 344. Rauw.	
		Caiova brassica	512	garis Marth.	379	189 b. Tab.	100
		Calous	402 b	Carduncellus 386. Cæf.	131	Cataputia major 432. minor	
		Cairini	99 b	Carex 11 b. Lon. 6 b. 15. alter		193	
		Cakile Serap. Lob.	474 b	Lon. 12 b. Lugd.	6	Cate Acofæ	479
		Calaf Alpini				Catecomer	286
						Catta-	

I N D E X.

Cattagium	497 b	Cerretia Cæf.	235	Cordi	395 b	viscosa	130
Cattaria Dod.	228 b	Cereus spinosus	458 b	Chamælinum	214 b	Chondrilla altera Diofc. Lob.	126 b. Galeni Ang. ibid.
Caulis ejusque species	152.	Cerinthæ ejusque species	258	Chamæmelum ejusque species	135. Chriftanth. Fuch.	Chondrilla tragopogonanthem.	mos Thal.
Bellon.	161	Ceronia Theoph.	402	134 b. eranthemum Fuch.	142 b. Dod. 178 b. mini.	Chonidretos gummi	274
Caucafon	75	Cerreus ejusque species	420 b	mum Dalech.	134 b	Chrysea Lugd.	500 b
Caucon Ang.	15	Cerofugaro	424	Chamæmepilus Cordi	452	Chryfanthemum ejusque species	134. Lob. 275. laifolium Dod. 135. littoreum Lob. 288 b. marinum Lob. 131. Peruanum Dod. 276 b. fegetum Lob. 262 b. fim.
Cauda equina 16. muris 190		Cervaria Gef.	248	Chamæmifine Lugd.	215	Plex Fuch.	179
b. vulpis Lob. 4 b. vulpina Bellon.	398	Cervibolletus Matth.	376	Chamæmoly Col.	75	Chryfanthemis Ad.	466 b
Caulis capitulatus Trag.	111	Cervifpina	488 b	Chamæmoros	459 b. 420	Chryfites Plinij	264 b
Caulerapa	ibid.	Ceterach Cæf.	354. 359 b	Chamænerion	245 b	Chryfippea Plinij	235
Cautior fructus	407	Cevadilla Monard.	23 b	Chamæorchis Lob. 84 b. al.	81 b	Chryfobalanos Gal.	407
Caxumba	37 b	Chaaia Japonia	147 b	Chamæpericlymenon	302 b	Chryfocome Diofc. 98. Diof.	Columnæ 213. Germanica Lob.
Cazabis panis	91	Chærophylum ejusque species	152	Chamæpeuce Ang. 486. Cor.	di 467 b. Gefa. 360 b. Lugdun.	Chryfogonum Penæ	314
Cazeras Garz.	14 b	Chaiar Alpina	311 b	249. Brunf. 248. Berthio.	lo 271. altera Dod. 138 b.	Chryfolachanum Dod. 115 b.	Plinij Ruell. 124 b. peregrinum
Ceanothus Theophr. Lugd.	377. fpina Theoph.	Chalcicum Plinij Lugd.	165 b	Chamæpyrus ejusque species	249. Brunf. 248. Berthio.	Chryfoplenium Tabernamont.	309 b
Cedria	501 b	Chalcios Cluf. 388 b. Lug. 381		249. Brunf. 248. Berthio.	lo 271. altera Dod. 138 b.	Chriftophoriana	183 b
Cedrium mel Hipp.	487	Chaleb Gef.	474	Chamærododendros 468 a. b.	247 b. 507	Chulem Garziæ	2 b
Cedrus 393 b. baccifera 487.		Chambefal Oryza	24 b	Chamærops Plinij, Lugdun.	247 b. 507	Chunno panis	167
Lycia Matth. 487. 489 b.		Chamæactæ	456 b	Chamærubus	479 b	Cyanus ejusque species	273.
phœnicia Lob. 487. Matth.	489	Chamæbalanus Tab. 344 b		Chamæfchenos	12 b	274. Plinij Colum. 131. angulifolius 271. fruticofus Ponæ 452 b. fylv. minus 269 b. spinofus 273 b	
Cedrus confiera 490. Libani	479	Chamæbaubus 326. Theophr.		Chamæficye Dalecham.	282.	Cynaoides Taber. 274 b. floa Dod.	272
Cedula Gef.	489 b	Chamæcitilus ejusque species	465	herbariorum	193	Cibago	491 b
Cefaglion	507	Chamæcitinus Gef.	304	Chamæficye arbor	477 b	Ciccaria fructus	492 b
Ceibas	513	Chamæcilema Cordi	306	Chamæfpartium Trag.	395 b	Cicer ejusque species 347. aragatium Trag. 342. aftragatoides Ponæ 351. erivum Lugdun. 343. orobzum Lob.	346
Celape	298	Chamæcifus Fuch. ibid. fpi.	260	Chamke	410 b	Cicera Lugd.	344
Celaftus	476 b. 477	Chamæciparifus Plinij Trag. 136 b. Dalechampi 137. agreftis 138. Plinij quorundam	212 b	Champe	470	Cicerbita 123. Cordi	124
Celofia Trag.	121 b	Chamædaphne Adv. 462 b. Brunf. 301. Diofc. 304. Col.	305 b. Matth.	Chappovv	334 b	Cicercula Cæf. 344 b. Ægyptiaca Cluf.	344 b
Cemos Plinij	264	Chamædrys ejusque species	248. affurgens 247. laci niata 138 b. fcutellata repens	Charamais	401	Cichorium ejusque species 125. bulbofum Dalecham. 130. Conftantinopolit. Matth. 126 b. dulce Colum. 124 b. globulare Imper. 192. fpi.	126
Centaurium aquaticum Gef.	279 b	Chamædrops Lugd.	248	Charantia Dod.	306	126. ftrumofum Myconi 130. verrucarium Matth.	130
Centaurium majus 117. murorum Gef. 273. nothum Lugd. 270. pratense Gef.	271	Chamæficus	457 b	Charunfel	410	Cichorium fyl. luteum ejusque fpecies	126
Centaurium minus ejusque species 278. minus viscofum	205 b	Chamæfilix Lob.	358	Chate Alpini	310 b	Cici	432
Centauroides Thal.	235	Chamægelifimum	398	Chaupe potus	428 b	Cicla	117
Centella	300 b	Chamægenifta ejusque species	395	Chelape	298	Ciclamen ejusque species 308. unifolium Dalech. 304 b	
Centeria Theoph. Cæf. 280 b		Chamæitris ejusque species	33	Chelidonium majus 144. capnitis 143. 144. minus 309.		Cyclaminus altera Diof. 167.	
Centimorbia Gef.	309 b	Chamæitea	474	palufre Cordi	276 b	Ghini 250 b. altera Lob.	305 b. ciffanthemos Diof.
Centinervia	189	Chamælelea Trago 462. vera Matth.	ibid.	Chenopodia Belli 394 b. Plinij	490 b	167. 297	
Centonia Gef.	136 b	Chamæleoneon	44 b	Chenopodium Tab.	119 b		
Centrum galli	238	Chamæleon non aculeatum	272 b	Chermafel	485 b		
Centromyrtin Theoph.	470	Chamæleuce Anguil. 276 b.		Chermes Arabum 159 b. 499. officio.	425		
Centumgrana	282 b			Chicha potus	435 b		
Centumnodia Brunf.	281			Chicocapores	100 b		
Centunculus Cæf. 250. 251. Americanus 263. Plinij Anguil.	205			Chymeni	34 b		
Cepa ejusque species 71. alfconia 72. fectilis ibid				China ejusque species 295. fpu.	34 b		
Cepæa Dod. 252 b. Matr. 288. Pancij	287 b			Chironia Cæf.	466		
Cera Hispanica	429			Chiuef	457 b		
Cerafus ejusque species 449. racemofa	450 b			Chlarofiftion Gef.	358 b		
Ceratia Plinij Col. 322 b. 402				Chocolate potus	442 b		
Ceratonia	402			Chondrilla ejusque species 130. bulbofa ibid. czrulea 130 b. fortida ibid. Græca ibid.			
Cercis Theoph. 429 b. filiquata Theoph.	402 b						
Cerefolium magnum	160						

I N D E X.

Cicuta ejusq; species 160. ma- xima Eyflet. 154 b	Cicuta ejusq; species 160. ma- xima Eyflet. 154 b	Cicuta ejusq; species 160. ma- xima Eyflet. 154 b	Cicuta ejusq; species 160. ma- xima Eyflet. 154 b
Cicutaria ejusque species 161. odorata 160	Cicutaria ejusque species 161. odorata 160	Cicutaria ejusque species 161. odorata 160	Cicutaria ejusque species 161. odorata 160
Cidromela 435	Cidromela 435	Cidromela 435	Cidromela 435
Cyle Oviedo 430 b	Cyle Oviedo 430 b	Cyle Oviedo 430 b	Cyle Oviedo 430 b
Cymbalaria 306. verior Co- lum. 287	Cymbalaria 306. verior Co- lum. 287	Cymbalaria 306. verior Co- lum. 287	Cymbalaria 306. verior Co- lum. 287
Cimiasgero 146 b	Cimiasgero 146 b	Cimiasgero 146 b	Cimiasgero 146 b
Cyminum bulbosum Pl. Col. 162. equinum Trag. 158 b	Cyminum bulbosum Pl. Col. 162. equinum Trag. 158 b	Cyminum bulbosum Pl. Col. 162. equinum Trag. 158 b	Cyminum bulbosum Pl. Col. 162. equinum Trag. 158 b
Cynagrolitis 1	Cynagrolitis 1	Cynagrolitis 1	Cynagrolitis 1
Cinamomum ejusq; species 408. veterum 409 b	Cinamomum ejusq; species 408. veterum 409 b	Cinamomum ejusq; species 408. veterum 409 b	Cinamomum ejusq; species 408. veterum 409 b
Cynanthemis Lob. 135 b	Cynanthemis Lob. 135 b	Cynanthemis Lob. 135 b	Cynanthemis Lob. 135 b
Cinara ejusq; species 383	Cinara ejusq; species 383	Cinara ejusq; species 383	Cinara ejusq; species 383
Cinnabarium 499	Cinnabarium 499	Cinnabarium 499	Cinnabarium 499
Cineraria 131	Cineraria 131	Cineraria 131	Cineraria 131
Cynocephalus Plinij Lug. 211	Cynocephalus Plinij Lug. 211	Cynocephalus Plinij Lug. 211	Cynocephalus Plinij Lug. 211
Cynocephalea Guil. 512 b	Cynocephalea Guil. 512 b	Cynocephalea Guil. 512 b	Cynocephalea Guil. 512 b
Cynocrambe Cæfal. 119 a. b. Lon. 302 b. Matth. 122. le- gitima ibid. b	Cynocrambe Cæfal. 119 a. b. Lon. 302 b. Matth. 122. le- gitima ibid. b	Cynocrambe Cæfal. 119 a. b. Lon. 302 b. Matth. 122. le- gitima ibid. b	Cynocrambe Cæfal. 119 a. b. Lon. 302 b. Matth. 122. le- gitima ibid. b
Cynoglossum ejusque speci- es 257. Matth. 255. Trag. 257	Cynoglossum ejusque speci- es 257. Matth. 255. Trag. 257	Cynoglossum ejusque speci- es 257. Matth. 255. Trag. 257	Cynoglossum ejusque speci- es 257. Matth. 255. Trag. 257
Cynoglossum montanum e- jusq; species 258	Cynoglossum montanum e- jusq; species 258	Cynoglossum montanum e- jusq; species 258	Cynoglossum montanum e- jusq; species 258
Cynogl. minor Brunf. 254 b. quorundam 189 a. b.	Cynogl. minor Brunf. 254 b. quorundam 189 a. b.	Cynogl. minor Brunf. 254 b. quorundam 189 a. b.	Cynogl. minor Brunf. 254 b. quorundam 189 a. b.
Cynomorion Plinij 87	Cynomorion Plinij 87	Cynomorion Plinij 87	Cynomorion Plinij 87
Cynops Theoph. Gef. 191 b	Cynops Theoph. Gef. 191 b	Cynops Theoph. Gef. 191 b	Cynops Theoph. Gef. 191 b
Cynorrhodos Plinij 483. po- lyacanthos Lugdun. ibid. b	Cynorrhodos Plinij 483. po- lyacanthos Lugdun. ibid. b	Cynorrhodos Plinij 483. po- lyacanthos Lugdun. ibid. b	Cynorrhodos Plinij 483. po- lyacanthos Lugdun. ibid. b
Cynosbates Diof. Adv. 483. Theophr. Trag. 474 b	Cynosbates Diof. Adv. 483. Theophr. Trag. 474 b	Cynosbates Diof. Adv. 483. Theophr. Trag. 474 b	Cynosbates Diof. Adv. 483. Theophr. Trag. 474 b
Cynosphorhis ejusq; species 80	Cynosphorhis ejusq; species 80	Cynosphorhis ejusq; species 80	Cynosphorhis ejusq; species 80
dracontias 86. militaris e- jusq; species 81. macrocau- les 85 b. palustris 86	dracontias 86. militaris e- jusq; species 81. macrocau- les 85 b. palustris 86	dracontias 86. militaris e- jusq; species 81. macrocau- les 85 b. palustris 86	dracontias 86. militaris e- jusq; species 81. macrocau- les 85 b. palustris 86
Cynospastostetreftris 512 b	Cynospastostetreftris 512 b	Cynospastostetreftris 512 b	Cynospastostetreftris 512 b
Cyperella Cordi 7 b	Cyperella Cordi 7 b	Cyperella Cordi 7 b	Cyperella Cordi 7 b
Cyperus ejusq; species 13. Ba- bylonicus Corn. 35 b. efco- lentus 14 b. graminea 6 b. Indicus 36. 37. longus & ro- tundus 34	Cyperus ejusq; species 13. Ba- bylonicus Corn. 35 b. efco- lentus 14 b. graminea 6 b. Indicus 36. 37. longus & ro- tundus 34	Cyperus ejusq; species 13. Ba- bylonicus Corn. 35 b. efco- lentus 14 b. graminea 6 b. Indicus 36. 37. longus & ro- tundus 34	Cyperus ejusq; species 13. Ba- bylonicus Corn. 35 b. efco- lentus 14 b. graminea 6 b. Indicus 36. 37. longus & ro- tundus 34
Cypote Cluf. 406	Cypote Cluf. 406	Cypote Cluf. 406	Cypote Cluf. 406
Cyprus Diof. Tra. 475 b. Gre- corum 476. Dod. ibid. b	Cyprus Diof. Tra. 475 b. Gre- corum 476. Dod. ibid. b	Cyprus Diof. Tra. 475 b. Gre- corum 476. Dod. ibid. b	Cyprus Diof. Tra. 475 b. Gre- corum 476. Dod. ibid. b
Circæa Diof. Cæf. 102. Lu- teriana Lob. 186 b. Mon- spel. Lob. 167. Tragi 121	Circæa Diof. Cæf. 102. Lu- teriana Lob. 186 b. Mon- spel. Lob. 167. Tragi 121	Circæa Diof. Cæf. 102. Lu- teriana Lob. 186 b. Mon- spel. Lob. 167. Tragi 121	Circæa Diof. Cæf. 102. Lu- teriana Lob. 186 b. Mon- spel. Lob. 167. Tragi 121
Cirium Italicum Fuch. 256	Cirium Italicum Fuch. 256	Cirium Italicum Fuch. 256	Cirium Italicum Fuch. 256
Cirium ejusq; species 377. lu- teum Lob. 379	Cirium ejusq; species 377. lu- teum Lob. 379	Cirium ejusq; species 377. lu- teum Lob. 379	Cirium ejusq; species 377. lu- teum Lob. 379
Cistus ejusq; species 464	Cistus ejusq; species 464	Cistus ejusq; species 464	Cistus ejusq; species 464
Cistus ledon ejusque species 467. Silefiacus 468	Cistus ledon ejusque species 467. Silefiacus 468	Cistus ledon ejusque species 467. Silefiacus 468	Cistus ledon ejusque species 467. Silefiacus 468
Cytinus 437	Cytinus 437	Cytinus 437	Cytinus 437
Cyrtus ejusq; species 389. Co- lum. Cam. 332. Tragi 328 b	Cyrtus ejusq; species 389. Co- lum. Cam. 332. Tragi 328 b	Cyrtus ejusq; species 389. Co- lum. Cam. 332. Tragi 328 b	Cyrtus ejusq; species 389. Co- lum. Cam. 332. Tragi 328 b
Citrango Gef. 229	Citrango Gef. 229	Citrango Gef. 229	Citrango Gef. 229
Citrangula 435 a. b.	Citrangula 435 a. b.	Citrangula 435 a. b.	Citrangula 435 a. b.
Citreolus Cæf. 310	Citreolus Cæf. 310	Citreolus Cæf. 310	Citreolus Cæf. 310
Citrullus 312	Citrullus 312	Citrullus 312	Citrullus 312
Citrus 435	Citrus 435	Citrus 435	Citrus 435
Clavi filiginis 23 b	Clavi filiginis 23 b	Clavi filiginis 23 b	Clavi filiginis 23 b
Clematis daphnoides ejusq; species 301. Ægyptia Plinij 302 b. cærulea 398. mi- nima 143 b	Clematis daphnoides ejusq; species 301. Ægyptia Plinij 302 b. cærulea 398. mi- nima 143 b	Clematis daphnoides ejusq; species 301. Ægyptia Plinij 302 b. cærulea 398. mi- nima 143 b	Clematis daphnoides ejusq; species 301. Ægyptia Plinij 302 b. cærulea 398. mi- nima 143 b
Clematidis ejusq; species 300	Clematidis ejusq; species 300	Clematidis ejusq; species 300	Clematidis ejusq; species 300
Cleome Octavij Ang. 101	Cleome Octavij Ang. 101	Cleome Octavij Ang. 101	Cleome Octavij Ang. 101
Clymenon Diof. Colum. 275	Clymenon Diof. Colum. 275	Clymenon Diof. Colum. 275	Clymenon Diof. Colum. 275
b. Columnæ 287 b. Italo- rum Lob. 280 b	b. Columnæ 287 b. Italo- rum Lob. 280 b	b. Columnæ 287 b. Italo- rum Lob. 280 b	b. Columnæ 287 b. Italo- rum Lob. 280 b
Clymenon femina Gef. 236.	Clymenon femina Gef. 236.	Clymenon femina Gef. 236.	Clymenon femina Gef. 236.
mas Gef. 235. minus Lugd. 236 b. Matth. 344. quorun- dam Lob. 300 b	mas Gef. 235. minus Lugd. 236 b. Matth. 344. quorun- dam Lob. 300 b	mas Gef. 235. minus Lugd. 236 b. Matth. 344. quorun- dam Lob. 300 b	mas Gef. 235. minus Lugd. 236 b. Matth. 344. quorun- dam Lob. 300 b
Clinopodium Cæf. 218 b. e- jusq; species 224. alpinum Ponæ 247 b	Clinopodium Cæf. 218 b. e- jusq; species 224. alpinum Ponæ 247 b	Clinopodium Cæf. 218 b. e- jusq; species 224. alpinum Ponæ 247 b	Clinopodium Cæf. 218 b. e- jusq; species 224. alpinum Ponæ 247 b
Cneoron album Lugd. 463 b.	Cneoron album Lugd. 463 b.	Cneoron album Lugd. 463 b.	Cneoron album Lugd. 463 b.
Theoph. 462 b	Theoph. 462 b	Theoph. 462 b	Theoph. 462 b
Cneoron Cæf. 463 b. Galenij Ang. 462 b. Matth. 206 b.	Cneoron Cæf. 463 b. Galenij Ang. 462 b. Matth. 206 b.	Cneoron Cæf. 463 b. Galenij Ang. 462 b. Matth. 206 b.	Cneoron Cæf. 463 b. Galenij Ang. 462 b. Matth. 206 b.
463. Theoph. 217. 463	463. Theoph. 217. 463	463. Theoph. 217. 463	463. Theoph. 217. 463
Cnicus ejusq; species 378	Cnicus ejusq; species 378	Cnicus ejusq; species 378	Cnicus ejusq; species 378
Coagulum terræ Plinij 86 b	Coagulum terræ Plinij 86 b	Coagulum terræ Plinij 86 b	Coagulum terræ Plinij 86 b
Coca 469 b	Coca 469 b	Coca 469 b	Coca 469 b
Coccimela Theoph. 443 b	Coccimela Theoph. 443 b	Coccimela Theoph. 443 b	Coccimela Theoph. 443 b
Coccognidium 159 b. Bello. 453. Cord. 462 b	Coccognidium 159 b. Bello. 453. Cord. 462 b	Coccognidium 159 b. Bello. 453. Cord. 462 b	Coccognidium 159 b. Bello. 453. Cord. 462 b
Coccum infectorium 425	Coccum infectorium 425	Coccum infectorium 425	Coccum infectorium 425
Coccus baphica 425. Indica 509	Coccus baphica 425. Indica 509	Coccus baphica 425. Indica 509	Coccus baphica 425. Indica 509
Coccus radicum 159. 281	Coccus radicum 159. 281	Coccus radicum 159. 281	Coccus radicum 159. 281
Cochinilla Frag. 159 b. 451 b	Cochinilla Frag. 159 b. 451 b	Cochinilla Frag. 159 b. 451 b	Cochinilla Frag. 159 b. 451 b
Cochlearia ejusq; species 110	Cochlearia ejusq; species 110	Cochlearia ejusq; species 110	Cochlearia ejusq; species 110
Guiland. 252 b	Guiland. 252 b	Guiland. 252 b	Guiland. 252 b
Cochucho Acoft. 91 b	Cochucho Acoft. 91 b	Cochucho Acoft. 91 b	Cochucho Acoft. 91 b
Cocconileia arbor 415. grana- 458 b	Cocconileia arbor 415. grana- 458 b	Cocconileia arbor 415. grana- 458 b	Cocconileia arbor 415. grana- 458 b
Cocculæ officina. 511 b	Cocculæ officina. 511 b	Cocculæ officina. 511 b	Cocculæ officina. 511 b
Coculchau radix 91. 92	Coculchau radix 91. 92	Coculchau radix 91. 92	Coculchau radix 91. 92
Codiaminum Gef. 52 b	Codiaminum Gef. 52 b	Codiaminum Gef. 52 b	Codiaminum Gef. 52 b
Codomalo Bellon. 452 b	Codomalo Bellon. 452 b	Codomalo Bellon. 452 b	Codomalo Bellon. 452 b
Coffoi fructus 510	Coffoi fructus 510	Coffoi fructus 510	Coffoi fructus 510
Coggygia 415	Coggygia 415	Coggygia 415	Coggygia 415
Cohyne Thevet. 461 b	Cohyne Thevet. 461 b	Cohyne Thevet. 461 b	Cohyne Thevet. 461 b
Coix Myconi 2. Theoph. 258	Coix Myconi 2. Theoph. 258	Coix Myconi 2. Theoph. 258	Coix Myconi 2. Theoph. 258
Gola 507 b	Gola 507 b	Gola 507 b	Gola 507 b
Colchicum ejusq; species 67.	Colchicum ejusq; species 67.	Colchicum ejusq; species 67.	Colchicum ejusq; species 67.
Alexandri Lob. 69. Illyri- cum Ang. Lob. 68. luteum 69 b. montanum 68. varie- gatum ibid. vernum 69	Alexandri Lob. 69. Illyri- cum Ang. Lob. 68. luteum 69 b. montanum 68. varie- gatum ibid. vernum 69	Alexandri Lob. 69. Illyri- cum Ang. Lob. 68. luteum 69 b. montanum 68. varie- gatum ibid. vernum 69	Alexandri Lob. 69. Illyri- cum Ang. Lob. 68. luteum 69 b. montanum 68. varie- gatum ibid. vernum 69
Coles Camer. 315 b	Coles Camer. 315 b	Coles Camer. 315 b	Coles Camer. 315 b
Coles phaseolus 404	Coles phaseolus 404	Coles phaseolus 404	Coles phaseolus 404
Colytea Theophr. 454. Lug- dun. 391. tertia Theophr. 402 b	Colytea Theophr. 454. Lug- dun. 391. tertia Theophr. 402 b	Colytea Theophr. 454. Lug- dun. 391. tertia Theophr. 402 b	Colytea Theophr. 454. Lug- dun. 391. tertia Theophr. 402 b
Collum gruis German. 318	Collum gruis German. 318	Collum gruis German. 318	Collum gruis German. 318
Colocassia 195 b. 196	Colocassia 195 b. 196	Colocassia 195 b. 196	Colocassia 195 b. 196
Colochierni Belli 379 b	Colochierni Belli 379 b	Colochierni Belli 379 b	Colochierni Belli 379 b
Colocynthis ejusq; species 313	Colocynthis ejusq; species 313	Colocynthis ejusq; species 313	Colocynthis ejusq; species 313
Colophonia 504	Colophonia 504	Colophonia 504	Colophonia 504
Columbaria Lob. 270 b	Columbaria Lob. 270 b	Columbaria Lob. 270 b	Columbaria Lob. 270 b
Columbaris Barba 269	Columbaris Barba 269	Columbaris Barba 269	Columbaris Barba 269
Columbina Cæf. 144	Columbina Cæf. 144	Columbina Cæf. 144	Columbina Cæf. 144
Colubrina Trag. 192	Colubrina Trag. 192	Colubrina Trag. 192	Colubrina Trag. 192
Colus Jovis Lob. 238 b	Colus Jovis Lob. 238 b	Colus Jovis Lob. 238 b	Colus Jovis Lob. 238 b
Colus rustica Cord. 379	Colus rustica Cord. 379	Colus rustica Cord. 379	Colus rustica Cord. 379
Colutea ejusque species 396	Colutea ejusque species 396	Colutea ejusque species 396	Colutea ejusque species 396
Coma aurea 264	Coma aurea 264	Coma aurea 264	Coma aurea 264
Comacum Theoph. 407	Comacum Theoph. 407	Comacum Theoph. 407	Comacum Theoph. 407
Comandaovafou 339	Comandaovafou 339	Comandaovafou 339	Comandaovafou 339
Comaron Apuleij 460	Comaron Apuleij 460	Comaron Apuleij 460	Comaron Apuleij 460
Comarus 7 b	Comarus 7 b	Comarus 7 b	Comarus 7 b
Combretum Plinij 513 b	Combretum Plinij 513 b	Combretum Plinij 513 b	Combretum Plinij 513 b
Conchæ anatifera 501	Conchæ anatifera 501	Conchæ anatifera 501	Conchæ anatifera 501
Conder Avicen. 501	Conder Avicen. 501	Conder Avicen. 501	Conder Avicen. 501
Condurum Plinij 165. 204 b	Condurum Plinij 165. 204 b	Condurum Plinij 165. 204 b	Condurum Plinij 165. 204 b
Conduri 343 b	Conduri 343 b	Conduri 343 b	Conduri 343 b
Conferva Plinij Lobel. 364 b.	Conferva Plinij Lobel. 364 b.	Conferva Plinij Lobel. 364 b.	Conferva Plinij Lobel. 364 b.
marin. Lob. 368 b. tricho- des Lugd. 364 b	marin. Lob. 368 b. tricho- des Lugd. 364 b	marin. Lob. 368 b. tricho- des Lugd. 364 b	marin. Lob. 368 b. tricho- des Lugd. 364 b
Conyza ejusque species 265.	Conyza ejusque species 265.	Conyza ejusque species 265.	Conyza ejusque species 265.
alpina Gef. 131 b. Hippocr. 138. montana Lugd. 265 b.	alpina Gef. 131 b. Hippocr. 138. montana Lugd. 265 b.	alpina Gef. 131 b. Hippocr. 138. montana Lugd. 265 b.	alpina Gef. 131 b. Hippocr. 138. montana Lugd. 265 b.
palustris ibid. Eyflet. 321.	palustris ibid. Eyflet. 321.	palustris ibid. Eyflet. 321.	palustris ibid. Eyflet. 321.
marina Lugd. 330	marina Lugd. 330	marina Lugd. 330	marina Lugd. 330
Conyzoides cærul. Gef. 265 b	Conyzoides cærul. Gef. 265 b	Conyzoides cærul. Gef. 265 b	Conyzoides cærul. Gef. 265 b
Connarus Cluf. 477. Theo- phrast. 460	Connarus Cluf. 477. Theo- phrast. 460	Connarus Cluf. 477. Theo- phrast. 460	Connarus Cluf. 477. Theo- phrast. 460
Connina 119 b	Connina 119 b	Connina 119 b	Connina 119 b
Confiligo Ruell. 185. Vegerij 186 b	Confiligo Ruell. 185. Vegerij 186 b	Confiligo Ruell. 185. Vegerij 186 b	Confiligo Ruell. 185. Vegerij 186 b
Confolida aurea Cord. 465 b.	Confolida aurea Cord. 465 b.	Confolida aurea Cord. 465 b.	Confolida aurea Cord. 465 b.
rubra Tab. 326	rubra Tab. 326	rubra Tab. 326	rubra Tab. 326
Confolida ejusq; species 259.	Confolida ejusq; species 259.	Confolida ejusq; species 259.	Confolida ejusq; species 259.
aurea Tab. 268. Sarrae- nica Eyflet. ibid.	aurea Tab. 268. Sarrae- nica Eyflet. ibid.	aurea Tab. 268. Sarrae- nica Eyflet. ibid.	aurea Tab. 268. Sarrae- nica Eyflet. ibid.
Confolida media ejusq; spe- cies 260. minor Ad. 261 b.	Confolida media ejusq; spe- cies 260. minor Ad. 261 b.	Confolida media ejusq; spe- cies 260. minor Ad. 261 b.	Confolida media ejusq; spe- cies 260. minor Ad. 261 b.
palustris Tab. 266 b	palustris Tab. 266 b	palustris Tab. 266 b	palustris Tab. 266 b
Confolida regalis ejusq; spe- cies 142	Confolida regalis ejusq; spe- cies 142	Confolida regalis ejusq; spe- cies 142	Confolida regalis ejusq; spe- cies 142
Convolvulus ejusque species 294. argenteus 295 b. ma- rinus Imperati 295	Convolvulus ejusque species 294. argenteus 295 b. ma- rinus Imperati 295	Convolvulus ejusque species 294. argenteus 295 b. ma- rinus Imperati 295	Convolvulus ejusque species 294. argenteus 295 b. ma- rinus Imperati 295
Convolvulus pennatus Col. 398 b. rectus Ponæ 463 b	Convolvulus pennatus Col. 398 b. rectus Ponæ 463 b	Convolvulus pennatus Col. 398 b. rectus Ponæ 463 b	Convolvulus pennatus Col. 398 b. rectus Ponæ 463 b
Copal 503 b	Copal 503 b	Copal 503 b	Copal 503 b
Copau 417 b	Copau 417 b	Copau 417 b	Copau 417 b
Copey 19	Copey 19	Copey 19	Copey 19
Coquillo 510 b	Coquillo 510 b	Coquillo 510 b	Coquillo 510 b
Coral arbor Cluf. 402 b	Coral arbor Cluf. 402 b	Coral arbor Cluf. 402 b	Coral arbor Cluf. 402 b
Corallina ejusq; species 366.	Corallina ejusq; species 366.	Corallina ejusq; species 366.	Corallina ejusq; species 366.
Lob. 363. altera Tab. 664.	Lob. 363. altera Tab. 664.	Lob. 363. altera Tab. 664.	Lob. 363. altera Tab. 664.
Britan. Lugd. 368 b. mon- tana Tab. 361	Britan. Lugd. 368 b. mon- tana Tab. 361	Britan. Lugd. 368 b. mon- tana Tab. 361	Britan. Lugd. 368 b. mon- tana Tab. 361
Corallina Ægin. 252	Corallina Ægin. 252	Corallina Ægin. 252	Corallina Ægin. 252
Coralloides Cordi 322. Lo- bel. 366 b	Coralloides Cordi 322. Lo- bel. 366 b	Coralloides Cordi 322. Lo- bel. 366 b	Coralloides Cordi 322. Lo- bel. 366 b
Corallum ejusq; species 366	Corallum ejusq; species 366	Corallum ejusq; species 366	Corallum ejusq; species 366
Coralli herba 184 b	Coralli herba 184 b	Coralli herba 184 b	Coralli herba 184 b
Corchorus Dalech. 119. Lob. 317. Plinij 352. Gef. 156	Corchorus Dalech. 119. Lob. 317. Plinij 352. Gef. 156	Corchorus Dalech. 119. Lob. 317. Plinij 352. Gef. 156	Corchorus Dalech. 119. Lob. 317. Plinij 352. Gef. 156
Corcopal fructus 435 b	Corcopal fructus 435 b	Corcopal fructus 435 b	Corcopal fructus 435 b
Cor andrum ejusque species 158			

I N D E X.

Crispula	233	Daftylon Col.	284	Dotterblumen/Dod.	276	Elleborine	183
Crispina uva	455	Damafonium Lugd.	185	Draba ejusq; species	109	Emerus Cæf.	397
Crispinus	454 b	di 186 b. Dod. 187. Diofc.		106 b. minima Col.	108 b	Empetron Ang.	463 b. pha-
Crista Cæf.	234. alpina Cæf.	267. Diofc. Col. 142. Diofc.		Draco herba Dod. 98. arbor		coides Lugd.	463. Rondel.
163 b. galli Lob.	ibid.	Cæf. 244 b. Stellatum Lug.		Cluf.	505	288. Tragi	281 b.
Critheum ejusq; species	288.	190		Dracunculus ejusque species		Endivia major Trag.	122 b.
agreste Trag.	386 b	Dante radix Acoft.	293 b	194. efculentus 98. hortenf.		ejus species	125
Crocodylion Ad.	381. Cæf. 386.	Daphne Alexand. Fuch.	304 b	Matth. 98. major Brunf.	192	Endiviola Adv.	ibid.
Lugd. 380. 381 b. Tab. 380 b		Daphnoides 301. Fuch.	462	Dracuntium majus	194 b	Enger	113 b
Crocus ejusque species	65. au-	Daracht	508 b	Dragonat fructus	505	Englanteria Ruell.	483
tumnalis ibid. Indicus A-		Darfeni Avicen.	408 b	Dragone Cæf.	98	Enneadynamis Gef.	309
coft.	37	Datura Lugd.	168	Drakena radix Cluf.	14	Enneaphyllum Lob.	354. Pli-
Cocus angustif. ejusq; species		Davanas	508 b	Drymopogon Tab.	164	nij Lugd.	87 b. 180 b. 185
67. luteus ejusq; species	66 b	Daucoides majus Cord.	112.	Dryophanum Plin. Ruel.	414	Enula	276
Crone	412 b	minus Cord.	153	Dryopteris Matth.	338	Enzanda Pigafett.	458
Croron Nicandri Ang.	15 b	Daucus ejusq; species	150. of-	Drypis Lob. 388. Lugd.	385 b	Ephedra Plinij	152. b
Cruciata Dodon. 335. muralis		ficin. 151. acantocarpus Col.		Drofera Cord.	320	Ephemerum Diofc. Lob.	243.
Col. 334 b. gentianæ spe-		152 b. Creticus Lob. 148. al-		Drofolomeli	496 b	Matth. & Lob.	244. quo-
cies	188	ter Fuch. 157. alter Plinij		Dudaim	507 b	rundam	304 b
Crucialis Cæfalp.	257 b. ma-	Col. 153 b. fellinoides Cord.		Dulcichinum Dod.	14 b	Ephemeru non lethale Fuch-	
ritim.	334	160. lepiarius Gef.	152 b	Dulcamara Dod.	167	ij	304
Crus galli Brunf.	179	Delphinium Cluf.	142. buc-	Dulcis amara Trag.	ibid.	Epilobium Gef.	245 a. b
Cubebæ	412	cinum Diofc. Lob.	245 b	Dulcis radix Trag.	352 b	Epimajorana Tab.	224 b
Cuci Plinij	510	Dende Serap.	432 b	Dulciffida Gaze.	323	Epimedium Col. 155. Dodo.	
Cuciphora	509 b	Dendrobryon Col.	361 b	Dulbaha Arabum	312	276 b. Plinij 70 b. Lob.	323
Cucophicos Cretenf.	338 b	Dens canis 87. canis gramen		Duracina	440	Epimelis Diofc.	453
Cucubalus Plinij Ad.	250 b	Dens leonis ejusque species		Duracoon	434	Epimelis Gal. 460. Lugd.	452
Cucullata Lugd.	243 b	126. Lonic.	316	Duryaocen	ibid.	Epipactis Camer.	186 b. Ey-
Cucullus Fernel.	ibid.	Dentali Cluf.	87 b	Durion	ibid.	stert.	187
Cucumis ejusque species	310.	Dentaria ejusq; species	322	Dutroa Linfc.	168.	Epipetron Gef.	369 b
afininus 314. Gal. 310. m-		Dentaria (Orobanchæ speci-		E.		Epithymum	218 b
rinus	311	es major Matth. 88. minor		Ebanos Acoft.	393 b	Epithymum	218
Cucumis puniceus Cord.	306	Cluf.	ibid. b	Ebenus 448. 507. ejus spe-		Equisetum ejusq; species	15
Cucumer marinus Aldroan.	369 b	Dentellaria Rond.	97 b. Gef.	cies 391. Cretica	390	Eranthemum Dod.	178
265. Lugd.	322	265. Lugd.	322	Ebulus	456 b	Eravvay	432 b
Cucurbita ejusq; species	312.	Dentilaria alia Gef.	101	Echinomeloeactos Lob.	384	Erechthites	131
laciniata ib. Somphos Pli-		Denticulata Lugd.	178 b	Echinophora Col.	152	Ergen	444
nij 316. fylvestr.	313	Desiderium Gaze.	301	Echinopoda Belli 394 b. Gef.		Erica ejusq; species	485. Ale-
Culeas	196	Diaboli stercus Germ.	499	381. Cretica Ponæ	490 b	xandrin. 463 b. baccifera	
Culices minores Lob.	83	Diapensia Matth.	319	Echioides Col.	254 b	Lugd. 471 b. Lob.	486 b.
Cuminum ejusq; species	146.	Dictamnus ejusq; species	222	Echium ejusque species	254.	chrysanthem. Lugd. 466 b.	
pratense 158. lativum alter.		Digitalis ejusq; species	243	Fuchfii. Lobel. 256. mui-		maritima Cluf.	365 b
Cæf. 151 b. fylv. Gef. 142.		Diofanthos Theoph. Anguil.		mum Col.	254	Ericoides Thal.	234
fyl. alter. Matth. 142. Fuch.		209 b		Echium fcorpioides ejusque		Erigeron ejusque species	131.
145. Matth. Lob. 172. fili.		Diospyros Gef. 452. Theoph.		species	ibid.	Dod.	265
quofum	ibid.	447. Lugd.	448	Egano Ang.	391	Erinacea Cluf.	394 b
Cuneno Melitenf.	28 b. Dipcadi	42 b. 43		Eghelo Dod.	ibid. b	Erinaceus Lufitan.	511
Cunila Cæf.	218	Diplacus ejusque species	385	Elæagnus Matth.	472 b. 473.	Eryngium ejusq; species	386.
Cunilago Plinij	266	Dodecatheon Plinij Ang.	241.	Lugd. 474 b. Lob.	475 b.	Vegetij Cam.	384
Cunus marinus Bellon.	369	Gef. Cam.	243 b	Bellon.	414 b	Erinus ejusq; spec. 225. Matt.	
Cupressus herba Cord.	136 b.	Dolichus Bellon.	340. Dod.	Elæprinos Bellon.	476	129 b. Nicandri Col	92
arbor	488	Donas Norbenenf. Lob.	50 b	Elaphobofcum nigrum J. on.		Eryfinum ejusq; species	100.
Curcas Balfamum	401 b. Ri-	Donax	17	150. Diofc. 155. Gef. 278. al-		Cam. 95. verum Lugd.	98
cini species Cluf.	432 b	Donderndgeftin / Brunf.	109	bum Lon. 157. Matth.	155 b	b. Aldroan. 309. cereale 27	
Curcuma	37	Dora Rauvvolf.	26 b	Elaterum	314. 496	Theoph. Lob.	ibid. b
Cuscuta	219 b	Dorella Cæf.	109	Elatine ejusque species	252.	ibid.	377
Cuslus altera Serap. Trag.	295	Dorycnium Diofc. Pon.	272	Brunf. 306. Cæf. 215 b. Cor-		Erythrodanum marinum	
Cutarapama	184 b.	b. Cordi 343. Imper. 463 b.		di 295. Dod. 250. Tragi 257		Lugd.	334
Cusculula Rauvvolf.	511 b.	Lobel.	329	b. tertia Tab.	345 b	Ermellinus Cæf.	447 b
		Dorycnion congener. Clufij		504		Ervanga Gaze.	294 b
D.		332. fimilis Ang.	ibid. b	504		Erucago Col.	100
Aburi	419 b	Dorionce	434	Elcelfiacos	237	Eruca ejusq; species	98. 99 b.
Dachel	506	Doronicum ejusque species		Eleofclionum Lob.	154	cinerea fyl. muralis Lugd.	
Daftyl. ib. b. Trapezun.	405 b	184. Americum	520 b	Elephas Col.	248 b	109 b. nafur. cognata 105 b	
Daftyl. libotanon ceryl. Tha-		285		Elhanne Alp.	476 b	Eruca cærulea 99. maritima	
lij 250. alt. Thal.	285	Doronic. Arabum Ponæ	35 b	Elkarje	428 b	ib. peregr. 201 b. fyl. Gef. 98	

Vuu 3 Ervi-

I N D E X.

- Ervilium Cæf. 344. Lug. 342.
 fylv. Dod. 343
 Ervum Tab. 346. album Fuch.
 343. candidum Trag. 344
 b. fyl. Fuch. 344
 Eschara coralloid. Cluf. 366 b
 Esculus Plinij 420
 Esula ejusq; species 291 b. 292
 Indica 116. rara Lob. 291.
 minor Lugd. 291. rotunda
 292
 Ettalch Scalig. 489 b
 Evonymus ejusq; species 428
 Theoph. 468 b
 Eupatorium ejusque species
 320. 321 b. cannabinum
 Lobel. 321. Mesius Matth.
 221. Mef. Cord. schol. 270
 Euphorbium 387. succus 496.
 arbor 458 b
 Euphrasia ejusq; species 233.
 cerulea 254. gramen 210 b.
 nobilis 247. 4. Trag. 254.
- F.**
 Faalim Thev. 276
 Faba ejusq; species 338. ar-
 borefcens 338 b. Ægyptia
 196. ficulnea 347. Græca
 Plin. 447. 448. inverfa Cæf.
 343. Lob. 287. Trag. 391 b.
 Malucana 511 b. purgatrix
 338 b
 Fabago 402. Belgarum 480 b
 Fabaria 287
 Fael Serap. 400
 Fafago Australis 368
 Fagara 413
 Fagotriticum 27 b
 Fagus 419. feptaria 427
 Far 21. 22. clufiaum 22 b. ha-
 licaftrum 22
 Farfara 397
 Farfarus antiquor 429
 Farfugium Cæf. 276 b
 Farrago Plinij 23
 Feruminatrix Indor. 458 b
 Favagella Cæf. 309 b
 Fautcl. 85. 510
 428 b
 Fauftbaum 27 b
 Fegopyron Dod. 412
 Felfel 412
 Ferraria quorundam 235 b.
 Gefn. 276 b
 Ferrum equinum ejusq; spe-
 cies 349
 Ferula 148. fagapenifera 149
 b. Tragi 395 b
 Ferulago 148
 Festuca ejusq; species 9 b
 Festucago Gazæ 10
 Ficaria Brunf. 309
 Ficus ejusq; species 457. Æ-
 gyptia 459. Cypria ibid. b.
 Indica 457 b. 458. Idæa 415.
 Linfcot. 508 b. Martaba-
- nis Indica 507. Pharaonis
 459. infernalis 172
 Filago Dod. 263
 Filfil 411
 Filipendula ejusq; species 163
 b. Tab. 162
 Filius ante patrem 245 b
 Filix ejusq; species 357. fæx
 358
 Filicula ibid.
 Findens oculus Cæf. 387
 Fior capuccio Cæf. 142
 Fistula Lob. 17 b. pæftoris Lo-
 nic. 190. pæftoris Avicen-
 244 b
 Fiftularia ejusq; species 163
 Flamma Ang. 131. Gef. 97 b.
 203 b. Jovis 300 b. ranun-
 culus 180 b. recta Camer-
 300 b. repens ibid.
 Floors 37 b
 Floribundio 470 b
 Flos Africanus ejusq; species
 132. ambarualis Dod. 215.
 coccineus Lugdun. 203 b.
 Conftantinopol. 203. cu-
 culi Dod. 104. Tragi. 205.
 Tab. 210. frumenti 273
 Flos hepaticus Taber. 309 b.
 Hierofolymit. 203. Mexi-
 oceanus 133 b. noctis Gefn.
 295. pallionalis 301 b. Per-
 ficus Cluf. 41 b. regius Do-
 don. 142
 Flos mirabilis Peruvian. 168 b
 Flos fanguineus Monardi 306
 b. Scarleti Lon. 209. Solis
 Dod. 466
 Flos Solis ejusq; species 276 b
 Farnesianus 277 b
 Flos tinctorius Fuchfij 395 b.
 Trag. 165. trinitatis Eyflet.
 200
 Focot Guebit 430
 Fœniculû ejusq; species 147.
 aquaticum 141 b. erraticû
 Lonic. 158 b. maritimum
 Lob. 288. montanum Tra-
 gi 148. porcinum Lob. 149
 b. fylv. Trag. 161 b. tortuo-
 sum Lugd. ibid.
 Fœnum Burgundiacum Lo-
 bel. 336
 Fœnum Græcum ejusq; spe-
 cies 348. fylv. Tragi 353
 Folium Indi 410. prægrande
 Lobel. 505 b. palmæ fila-
 menta 506
 Fontilapathum Lob. 193 b
 Forbefina Gefn. 321
 Formentone Cæf. 27 b
 Fragaria ejusque species 326.
 ibid.
 Fragula Trag. ibid.
 Fragula Cord. ibid.
 Frangula Matth. 428 b. Lug-
 duo. 431
- Fraxinella Cæf. 303
 Fraxinella Dod. 222 b
 Fraxinus ejusq; species 416.
 bubula 415 b
 Fraxinea arbor Trag. 415
 Frifoles 346 b
 Frizoles Guateli 340 b
 Frifillaria ejusq; species 64
 Fromentone alterum Cæf. 255
 Frondipora 367 b
 Fructus cholagogus Monard.
 Lugd. 419 b. exotici 405.
 sub terra Lugd. 376
 Frumento 27
 Frumentum amyllum 22.
 barbatum Ruel. ibid. b. fa-
 tuum Lon. 9. Indicum 24.
 locale Ruel. 21. Sarrace-
 nicum 27 b. fylv. 10
 Frutex coronarius Cluf. 398 b.
 spinofus peregrinus Rau-
 vvolf. 478 b
 Frutilla 471 b
 Fucus capillaceus 364. cupref-
 sius 365 b
 Fucus folliculaceus ejusque
 species 365. fungularis 364.
 ferulaceus Lobel. 365. lin-
 za 364
 Fucus marinus Dod. ib. 365.
 folijs abrotani 365. marin.
 baccifer. ibid. b. vermicu-
 laris 366. zolfter 364 b
 Fulle 470 b
 Fumaria ejusq; species 143
 Fumaria bulbola ejusq; spe-
 cies ibid. b. bulbola mini-
 ma Tab. 178 b
 Fungus ejusq; species 369. A-
 manita Gal. 372. auricular.
 Cæf. 368. boletus Cæf. 371 b
 Fungus capreol. Tab. 370 b.
 cervinus Matth. 376. ely-
 peifor. Lob. 373 b. coralloi-
 des. Cluf. 375. digitelli Tra-
 gi 372. efculentus 370. 371
 Fungus galericulatus Lobel.
 372 b. gallinaceus Cæf. 371.
 galucci Portæ 370. ignia-
 rius Trag. 372 b. lacinia
 372. laticus 371 b. lepori-
 nus Cluf. 371
 Fungus marinus Ald. 369 b.
 Dod. 374 b. minimus Cæf.
 367 b. mufcarius 373. ma-
 ximus 372. orbicularis Do-
 don. 374 b. orientalis 511 b
 Fungi noxii ejusq; species 372
 Fungus petreus 375 b. pezica
 Col. 370. 372 b. Cæf. 375.
 piperitis. Portæ 371 b. pra-
 teoli. Cæf. 372 b. prunuli.
 Cæf. 371 b. quercinus Col.
 ibid.
 Fungus ramosus ibid. fæxus
- Cluffj 375 b. in faxis 372.
 fpongiolus. Lug. 370. fuil-
 lus. Cæf. 371. turini. Cæ-
 falpin. 370
 Fufanus 418
 Fuffi 411 b.
- G.**
 Gægel German. 414 b
 Gaguey 508 b
 Gaiderothymum 236 b
 Galanga ejusq; species 35
 Galbanum 494
 Galbula fructus Cupreffij 488
 Galeadragoti Xenocratis An-
 gult. 385
 Galega ejusque species 352.
 montana Lugd. 351 b. fylv.
 Dod. 345 b
 Galeopsis Lob. 230. Dod. 235.
 lutea Lugd. 238 b
 Galerita Trag. 197
 Galla 420. myricæ 485 b. te-
 rebinthi 400 b
 Gallicus Apul. 8
 Gallitricum 238
 Gallium ejusque species 335.
 tertium Tragi 334 b. tetra-
 phyllon Colum. 333 b
 Galum radix 193 b
 Ganti radix 477 b
 Garb five Garab Arab. 37 b
 Garyophyllon Plinij 411 b
 Garioflata Cæf. 321 b
 Garnire fructus 406 b
 Garofimum 119 b
 Gato camber 407 b
 Gehuph arbor 440 b
 Geiduar Lugd. 36 b
 Gelapo 298 b
 Gelbenech Ang. 279
 Gelfeminum ejusque species
 397. rubrum Cæf. 168 b
 Gelfomoro 513 b
 Gemez 507 b
 Genipat 434
 Genista ejusq; species 395. A-
 rabica Bello. 395 b. humi-
 lis Dod. 397. Iluenfis. Lug.
 396 b. rotunda. Cæf. 394 b.
 rubra Cæf. 212 b
 Genista spinofa ejusq; species
 394
 Genista fpartium ejusq; spe-
 cies ibid.
 Geniftella aculeata. Lob. 395.
 montana. Lob. 396
 Gânffblum. Brunf. 108 b
 Gentiana ejusq; species 187.
 concava 106. paluftris 188
 b. pratensis 188
 Gentianella ejusque species
 187 b
 Geranium ejusq; species 317.
 banachoides ibid. colum-
 binum 318 b. mofcatum 319
 nodo-

INDEX

372. uil.
Ca.
370
418
11 b.
- 114 b
108 b
236 b
35
494
1488
An.
385
372.
fylv.
347 b
1235.
238 b
197
te-
100 b
8
238
335.
tetra-
333 b
193 b
37 b
475 b
411 b
321 b
406 b
119 b
407 b
440 b
36 b
298 b
279
pecies
168 b
513 b
507 b
434
95. A.
humil.
s. Lug.
394 b.
212 b
species
q; spe-
ibid.
b. 395.
396
108 b
es 187.
tris 188
188
species
ies 317.
colum-
tum 319
nodo-
- nodosum Clus. 318 b. robertianum 319 b. saxatile Camer. 318 b. sanguineum 318. tuberosum ibid. b. Geranium folio malve ejusq; species ib. b. primum quorundam Lugd. 173 Geran. palma 507 Geronopogon Gels. 274 Gethyllis Gels. 712 Geum alpinum 243 b. Gels. 322. Plinij 321. rivale Gels. neri 320 Githa jamaica 497 b Gicherum Cels. 791 Gigantea 277 b Gigantum Cels. 191 Gymnactron hordeum Camer. 22 b Ginge Cam. 343 b Gingidium ejusq; species 151 Gypsiophyton Thal. 211 Gypsilucus 497 b Gitaloryz 24 b fructus 511 Gith 145 Githago Trag. 204 b Gladiolus ejusq; species 44. ceruleus Trag. 32 b. caeruleus major Trag. 30 b. fectidus 30. luteus Fuch. 34 b. palustris Cord. 12 b. Tab. 15. Clus. 202 b Gladiolus Indicus 19 b Glans virginea 421. unguentaria 402 Glandes terrestres Clus. 344 b Glastivida Creten. 201 b. Belli. Ponz. 291 Glastum ejusq; species 131. Ang. 204 b. fyl. Cels. 97 b Glaucium 167 b. Diof. 172 Glaux Anguil. 332. Clus. 347. Gels. 350. vulgaris, Lob. 353. maritima 215 Glycidia Plinij. 323 Gyzzyrhiza ejusq; species 313. spinosa. Lac. 386 Gyzzyrhiza astragaloides 328 Globularia Monip. 262 Gluten Alborio. Avic. 500 Gnaphalium ejusq; species 263. Diofcor. Tragi 4 b. Diof. Ponz. 222. maritimum Dalech. 267 Gaoconia 401 b Goan arbor 441 Gongularia marina Imp. 365 Gomphrena Lugd. 121 b Gor fructus 419 b Gossypium ejusq; species 430 muscus 363 b Gotne album 190 b. rubrum 191 b Grain 25 Gramen & ejus species 1. aculeatum 7 b. 8 a. alopecuroides 4 b. amorettes 22 a. b. anthoxanthos 3 b. aquaticum panicul. 3. aureum. ibid. arvense panicul. 3. a. rundinaceum 6 b. 7. avenaceum 10 b Gramen bufonium 7. bulbosum 2. 3. caninum 1. canarium 7 b. caryophyllata folijs 3 b. 4. cyperoides 6 a. 7 a. b. cristatum 3 b. crucis 7 b Gramen dactylon 7 b. 8 a. di. stachyphoron 9 a. dulce 1 b. echinatum 7 b. equinum 3 Gramen festuca 9 b. filicolum 2 b Gramen geniculatum 8 b. lumolium 10 b Gramen holostemum 7 a. hordeaceum 9 a. hirsutum 7 a Gramen junceum 5 b. 6 a. 7. leucanthemum 7 b. leporinum 2. liliaceum 2. 3. 7. 9 Gramen manna 8. maritimum 6. 10 b. miliaceum 8 b. montanum 3 Gramen nemorosum 7. 10 b. nodosum 2 Gramen panicum 4. 8. paniculatum 2 b. panicula crispa 3. pennatum 5. phalaroides 4. 9 b. pratense 2 b Gramen segetum 3. sylvaticum 7. torghinum 8 b. spar. teum 5. spicatum 3 b. 5 b. spica leriz 9. spica gemina 9. lecatum ibid. tritici 8 b. triacum 7 Gramen tomentosum 4 b. 7. typhoides 9. tremulum 2. trigloch 6 a. b. xerampelinum 3. 7 Gramen 2. Plinij Ang. 182 b. 3. Plinij Ang. 283 b. leucanthemum Dod. 210 b. floridum Cam. ibid. maritimum Clus. 211 Gramen Parnassi ejusq; species 309. Lugdun. 199 b. Marth. 304 Granadillo lignum 393 b Granadilla Monard. 301 b Granum alzelin 14 b Granum Anescen 412 b. ben. 402. kermesinum 469 b. regium Mef. 432. tinctorium 425. viride 410 b Grana paradyfi 413 Gratia Dei Aug. 279. Cels. 246 b. Dod. 465 b. Gallo. rum Gels. 278. Germanorum Trag. 319 b Gratiola ejusq; species 279. caerulea 246 b. minor Gels.
- neri 218 b Grossi ficum 457 Grossularia ejusq; species 455 Guacarana Monard. 221 b Guadarella Cels. 100 Guayaba 437 b Guajabara 19 Guajacum Patavinum 447 Guajana fructus 511 Guajanos 441 b Guayavas 437 b Guama Oviedi 404 Guanabanus Oviedi 434. Scalligeri 191 Guanar 417 b Guanavano 439 b Guanayanus 511 Gummi ejusq; species 498. Diofcor. ibid. elemmi 472. 504. ex molle 500. ad podagram 497 b Gutta Gamandra ibid.
- H. Abaziz Portæ 14 b Habbures Cam. 190 b Habascen radix 92 b Habulcoul Serap. 432 b Habzel Serap. 412 Hachal Indi Clusij 68 b Hamodori Clus. 395 Hamorrhoidalis Aldr. 281 b Cast. 130. herba Brunf. 309 Haernia Serapion. 412 b Haia 91 b Hairi Theyeti 507 Halicacabum 166. peregrinum Fuch. 343 Halimus ejusq; species 120 Halimus Lac. 475. Trag. 411 b Haliphleos 420 b Hamamelis Athenæi 452 Hareomen Bellon. 26 b Hartriegel 447 b Hastula regia Trag. 28. 29 Hatle radix 91 Haur Arabum 429 Haulegi 477 Hebulben 401 b Hederalis 303 Hedera ejusq; species 306 Cilicia 296. rigens Plinij Cels. 425 b Hedera terrestris ejusq; species 306 Hederula Trag. 305 b. palustris Tab. 362 Hederæ lacryma 498 b Hedyppnois 126 Hedyllarum ejusq; species 348. clypeatum Lob. 350. minus Tab. 349 b. minimum Lugd. 348 Helbane 414 b Helenium ejusq; species 276. comagenium 37. Theophrast. 224 Helianthemum ejusq; species 456. ejus species Lugdun. 465 b Helichrysum ejusq; species 264. Italicum Matth. 147. fylv. Trag. 263 Heliochrysos Trag. 213 Heliotropium ejusq; species 253. erectum Ger. 254 Helleboraster Lob. 185 Helleborine ejusq; species 186 b. Dalechamp. 188 Helleborus albus ejusq; species 186 b Helleborus Hippocr. Taber. 186 Helleborus niger ejusq; species 185. ferulaceus Adver. 186 Helxine Matth. 127. cissampelos 294. 295. fylv. Thal. 168 b. stans Guil. 295 b Hemeris 420 Hemerocallis Diof. 77 b. 78. Chalcedon. 73. Valentina Clusij 54 b Hemionitis ejusq; species 313 Händelstraut/ Tragi 285. caeruleo flore Trag. 250 Henne Arabum 476 Henephyllum Gels. 304 Hepatica Tab. 362 Hepatica aurea Tab. 330 b alba Cordi 309. palustris ibid. b. stellata Tab. 334 b. trifolia Lob. 330 b Hepatorium aquatile Dodo. 321 Heptaphyllon Fuch. 326 Heracantha Tab. 379 Heraclea Tragi 231 b Herba alba Plinij Lugd. 8 b. amoris Cels. Lugd. 359 b. 287 b. articularis Tab. 205. cava Imper. 364. Malavatica 437. mimosa 360. molle ibid. Herba S. Alberti Cels. 101 b. Antonij 97 b. S. Barbaræ Fuch. 98 b Herba de Balestera 186 b. benedicta Brunf. 321. de Bengala 320 b Herba cancri major Lob. 253. minor Cord. 182. cervi Gels. 248. clytie Cam. 253 b. colla Cels. 156 b. S. Crucis 169 Herba doria Lob. 268. fullo. num Brunf. 188. gattaria Matth. 228. Gerardi Dod. 155 b. Kunigundis 320 Herba Laurentiana 260 Herba S. Jacobi 131. Joannis infantis Monard. 114 b. Judaica

I N D E X.

daica Gef. 233. Dod. 246 b.
 Julia Ang. 221
 Herba S. Mariae Cæfal. 226 b.
 Molucana 321. mimosa
 Lug. 360. molle Acoft. ib.
 Herba mortua prædicens 512
 radioli Apul. 359. Sentiola
 Linc. ibid. viva. Cluf. ibid.
 Herba Papagalli Dod. 121 b.
 paralytis 241. paris Matth.
 167. perforata Trag. 279.
 pudica Lugd. 512 b.
 Herba rena Cæf. 156 b. renum
 morbos curans Mon. 123 b.
 ad rupturas 282 b.
 Herba sacra Dalecham. 231 b.
 Ang. 269 b. Sardoia Dodo.
 177. Guil. 180. Simeonis
 316. Stephani Taber. 168 b.
 stella Dod. 190 b. studiofo-
 rum Tab. 212
 Herba trionalis Cord. 191 b.
 trinitatis Fuch. 199 b. tuni-
 ca 207 b. turca Lob. 281.
 turca montan. Cæf. 281 b.
 Herba venti Trag. 177. Mon-
 spel. 230 b. Ungarica Lon.
 317. vulneraria ad flumen
 Trag. 266 b. 278
 Herba Wiapaffa 326 b.
 Herba admiranda 512
 Hermodactylus Mesfuri Gef.
 87 b. Tragi 308 b. vulgo 67.
 verus 40 b.
 Herniaria Dod. 282
 Hesperis ejusque species 202
 Hetich Americanorum 90
 Hyacintho alphonelus 70 b.
 Hyacinthus ejusque species
 41. Arabicus 45. autumnal-
 lis 46 b. 47. botrioides 42 b.
 43. Campan. flore 44 b.
 Colchici folio 47 b. como-
 fus 42
 Hyacinthus flore oblongo 43
 b. 44. obfoleto 44. Indicus
 47. latifolius 46 b.
 Hyacinthus non feriptus e-
 jusque species 43. 44
 Hyacinthus Orientalis ejusque
 species 44 b. flore pleno 45
 b. ferotinus 45. Ornitho-
 galoides Col. 70 b.
 Hyacinthus Peruanus 47 b. de
 padre nostro 69 b. poetar-
 um Lob. 38. 39. Lobel. 40.
 Trag. 77 b. racemofus 42 b.
 Hyacinthij stellaris species
 45 b. Tripolitanus 45. Vir-
 gilij 37. uvaramola 42 b.
 Hiberis Fuch. 104
 Hydrolapathum Lob. 116 b.
 Hydropiper ejusque species
 101. lanceolatum Lugdun.
 180 b. rubeum Fuch. 195 b.
 Lugdun. 321

Hieracium ejusque species 126.
 arborefcens 127. asperum
 126. echinoides Tab. 128 b.
 Hieracium chondrillæ folio
 ejusque species 127 b. Creti-
 cum 127. dentis leonis fol.
 116. foetidum ibid. b.
 Hieracium fruticofum ejusque
 species 129 b. intybaceum
 128. majus 126 b.
 Hieracium montanum ejus-
 que species 128. glabrum
 129. phlomoideis 128 b. pra-
 reate ibid. b.
 Hieracium Sabaudum ibid. b.
 128
 filitqua falcatâ
 Hierobotane mas Lugd. 249.
 Brunf. 269. fœmina Brunf.
 100. Lugd. 249
 Higuerio Oviedo 434 b.
 Hyefcyamus ejusque species
 169. peregrin. Dod. 167 b.
 Peruvianus Cord. 168. Do-
 dou. 169
 Hyofiris Plinij 271 b. Taber.
 127 b.
 Hypocoon ejusque species 172.
 Matth. 317. forte Lug. 337 b.
 Hypericum ejusque species 279
 Hypericum frutescens 521 b.
 Hippia Lob. 250 b.
 Hippion Gef. 188
 Hypocheiris Dalech. 125 b. Ta-
 bern. 127 b.
 Hypocistis 465
 Hypodrys 422 b.
 Hippoglossum Valentinum
 Cluf. 463
 Hippomanes 511 b.
 Hippomelis Palladij 454
 Hippophaë 293. Diofc. Col.
 477 b. Anguil. 478 b.
 Hippophaëftum 189. Col. 387
 Lugd. 478 b.
 Hippoglossum Lugd. 303 b.
 Matth. 304 b.
 Hippolapathum Matth. 114 b.
 Lob. 115 b.
 Hippomanes Cratevæ Ang.
 168
 Hippomarathrum Cam. 147
 a. Belli b. Franco 158 b. Ta-
 bern. 162 b.
 Hippofelinum Theoph. 154 a.
 Dod. Fuch. Lob. b. Lugd.
 158 b.
 Hippuris Lob. 15. Saxea Cluf.
 365 b.
 Hirculus 165. Frificus 466
 Hirundinaria Tab. 309 b.
 Hirundinaria Trag. 303
 Hyflopi folia 218 b.
 Hyflopioides Cam. ibid. Gef.
 465 b.
 Hyflopus ejusque species 217.
 campeftris 465. Diof. 223 b.

Hebræorum 217. montana
 Lon. 466. nemorum Lugd.
 234 b. vulgaris Col. 279 b.
 Hivourahæ 444
 Hobos Linc. 417 b.
 Hofer Steinhæch/Loos. 205
 Hovrin Theveti 384 b.
 Holcus Plinij Ang. 9
 Holocentis Hipp. 14 b.
 Holofchoenos Lugd. 11 b. 12
 Holofteum ejusque species 190
 Matth. 7. alterum Lobel.
 358 b. caryophylleum Ta-
 ber. 210 b.
 Holothuria Arift. 369
 Hordeum ejusque species 22.
 alterum ibid. b. causticum
 23 b. Galaticum 24. gla-
 brum 22 b. marinum 9. nu-
 dum 22 b. fporium 9
 Horminum ejusque species
 238
 Hovos fructus 446
 Hoxocoquomaclit Cam. 352.
 I.
 Aca Garz. 511. major Caff.
 434
 Jacea ejusque species 271. al-
 ba Lugd. 273. aculeata Ta-
 ber. 377. Babylonica 272.
 incana Lobel. ibid. b. laci-
 niata 271 b. capite fpinofa
 272. major tricolor Caff.
 199 b. nigra Lob. 271 b. o-
 lea folijs 272 b. Tab. 273 b.
 Jaceros 511
 Jacobæa ejusque species 131
 Jalama 384 b.
 Jalapium 278
 Jalave fructus 407 b.
 Jambolones 460 b.
 Jambos 441
 Jangomas 444 b.
 Japatri 407
 Jaline montana Lugd. 284
 Jafminum ejusque species 397.
 rubrum Cæf. 168 b.
 Javanos fructus 407 b.
 Iberis ejusque species 97
 Idæa ficus Lug. 451. radix Di-
 ofcor. 470 b.
 Igname 90. 91
 Ilatrum Cæf. 476 b.
 Illex ejusque species 424
 Illecebra major Lob. 283
 Impatiens herba Dod. 307
 Imperatoria ejusque species 156
 Impia Plinij 263
 Incenfaria Camer. 136. Caff.
 266
 Incenfum 500 b.
 Indiamos fructus 407
 Indicum officin. 113
 Indorum ferruginatrix 458 b.
 Inguinaria Plinij 335 b.

Inhame Cluf. 90 b
 Iniamos Linc. ibid. b.
 Intybus ejusque species 125.
 apophyllocaulos Thal. 129 b.
 platiphyllos Thal. 124 b.
 Iylv. Trag. 123
 Inturus Gazæ 400
 Jolo Suchel 133 b.
 Jondraba alifoides Col. 107 b.
 Jon thafpi Col. 107
 Jovis barba Plinij 473
 Jovis flos Theoph. 203 b.
 Iphyon Theoph. Ang. 28 b.
 Itrauch 495 b.
 Irion Fuch. 95. Matthiol. Lo-
 bel. 101
 Iris ejusque species 30. alba
 31. Africana ibid. Afriatica
 ibid. b. agria Theophr. 30.
 biflora 32
 Iris angustifolia ejusque species
 32 b. prunum redolens 33
 Iris chalcidonica 31. Dama-
 fceia & Dalmatica 31 b.
 Florentina 31. Illyrica 31. 32
 laefolia 30. Lufitanica 31 b.
 32. lutea 32 b. 34 b. Mauri-
 tanica 39 b. maritima 32
 b. 33
 Iris pratensis 30 b. Pharaonis
 31 b. Sufiana 31. Tripolita-
 na 32 b.
 Iris bulbofa latifolia ejusque
 species 38. angustifolia 38 b.
 cærulea 40. lutea 39. ver-
 ficolor 39 b.
 Iris rubrofa Lob. 40 b.
 Irates ejusque species 113. Iylv.
 Lob. 204 b.
 Iſchæmon Lob. 8
 Iſchas alter Cluf. 292 b.
 Iſophyllon Cord. 278
 Iſopyrum Diofcor. Col. 144.
 Matth. 145 b. Cæfal. 343 b.
 Gefn. 327
 Iva mofchata Tabern. 138 b.
 Monfpelienf. 249. Rhe-
 torum 132 b.
 Jucca Benzoni 91
 Juglans 417
 Jujubæ ejusque species 446.
 Iylv. Cæf. 478 b.
 Juliola Scalg. 330 b.
 Juncaria Tab. 334
 Juncellus Ad. 11 b.
 Juncus avellana Ama. 14 b.
 odor. aquat. Dod. 163
 Juncus & ejus species 11. a-
 cutus 11 b. afper Dod. 20 b.
 bombycinus 12 b. Lob. 4
 b. capitulis equifeti ibid.
 capitulo lanuginofa ibid.
 clavatus ibid. cyperoides
 ibid. floridus
 Juncus lævis 12. lychnanthe-
 mos 7. 12. marinus grami-
 neus

I N D E X.

90 b	neus 4 b. maritimus 6 b.	Lagopus ejusque species 328 b.	alterum Cæf.	143 b	452 b. aromat. Monard.
ibid. b	melancranis 12 b. odora-	Diofc. 321. 328 b. primus	Leontopodium Lon.	254 b.	409 b. Brasilium 393
125 b.	tus 11. rotundus ibid.	Trag. 332. alter Trag. 263 b	Diofc. 264. Brunfels. 319.		Lignum Calamba ibid. de
124 b.	Juncus petrosus, Ang. 366	Lamium ejusque species 230.	Creticum 190. vulgare		Cochi 449. cotis vicem
123	Juni pappayma 434	pannonicum Cluf. 236	Magh.	263 b	præbens 424 b. colubri-
480	Juniperus ejusque species 488.	Lampfana Matth. 35. Lob. 125	Lepidium ejusque species 297.		num ejusque species 301.
133 b	major Diofc. 487	Lanaria Imper. 206 b	Diofc. quibus. 226 b. minu-		exoticum Cluf. 489 b. exo-
1107 b	Juniperi gummi 500 b	Lancea fructus 444	Cord.	104	tic. alt. Cluf. 393 b
107	Jusael Avicem. 568 b	Lancea Christi Gef. 130. Cæ-	Leplab Clufij	341	Lignum ferri duritie 449. fo-
473	Junfa 346 b	falpin. 354	Lerchenblumen/ Gef. 242 b		mitis vicem præbens 424 b
203 b	Juvv Cluf. 399	Lanceola Cæf. 89 b. monta-	Leucacantha Ang. 377. Dod.		Lignum Guajacum ejusque
28 b	Ixia 379	na Gef. 90	380. Lac. 381. Lugd. 382 b.		species 448
495 b	Ixione Theophr. 380	Lancuas 35	quorundam Lugd. 387 b		Lignum de Manglar. 449 Mo-
iol. 30.	Ixocaulos Thal. 205 b. alte-	Lanifera arbor Cluf. 430 b	Leucanthemum alpin. 136 b		lucente 393 b. nephriti-
101	ra Thal. 210 b	Lantana Dod. 419	Leucas Cæf. 231. Diofc. 327		cum 416 b
124 b	Ixopus Cordi 130.	Lantor 19. 509 b	Leucographis Plinij Ang. 268		Lignum odoratum Cæf. 392.
124 b		Lapathum ejusque species 113.	Lugd.	381 b	rubrum Cæf. alp. 393. Pava-
124 b		Egyptiacum 116. aquati-	Leucocium aizoides Col. 284		num ibid. b. Rhodium 392.
124 b		cum ibid. b	b. bulbosum ejusque species		Belli 399
124 b		Lapathum sylv. latifolium	55. non bulbosi species 200		Lignum Sambarane 393 b.
124 b		ejusque species 115 b. folio	Leucocium corniculat. 202 b.		Sanctum 448 b. S. Crucis
124 b		acuto 115	Creticum ejusque species		413. Sapo. 393 b. Teixo
124 b		Lapides resinacei 504 b	201 b. luteum ejusque spe-		449
124 b		Lappa ejusque species 198. a.	cies ibid. alyssoides ibid.		Ligna petrefacta diverfa 422
124 b		grestis Trag. 152. boaria	maritimum 201. montan.		Ligusticum ejusque species
124 b		Lugd. 153. sylv. Tragi 168 b	107 b. Syriacum 202 b		162. Ang. 156 b. Belgarum
124 b		Lappago 334. Plinij 150. Cæ-	Leuconarcissifolium 55		Lob. 162. Matth. 157 a. vul-
124 b		falp. 333 b	Leuconarcissus æstivus 51 b		gare 157 b. sylv. 161
124 b		Lappula canaria 152 b. rufi-	Levisticum Lob. 157		Ligustrum ejusque species 475.
124 b		corum Lugd. 257 b	Libanotis ejusque species ib.		Brunfels. 447 b. nigrum
124 b		Larix 492 b	coronaria 217. nigra Thal.		476. Columellæ 295. ori-
124 b		Laserpitium ejusque species	150 a. Taber. 150 b. Theo-		entale 398
124 b		156. Lac. 155. Anguil. 158 b	phraft. Sterilis Tab. 123 b		Lilac Matth. ibid.
124 b		Lata fructus 439 b	Libanotis ferulæ facie ejusque		Liliago Cord. 29. Cæfalpin.
124 b		Lathyrus ejusque species 293	species 158		80 a. b
124 b		Lathyrus ejusque species 343	Libyiticum Fuch. ibid.		Liliasphodelus Cluf. 80
124 b		Lavandou 35 b	Lichen ejusque species 362.		Lilioraciffus ejusque species
124 b		Lavandula ejusque species 218	Diofc. Col. 361 b. arborum		56. 57. orientalis 55
124 b		Lavandula folio arbor Cluf.	Tab. ibid. marinus 458 b.		Lilium album ejusque species
124 b		401 b	marinus Cluf. 364. Plinij		76. Alexandr. 69 b. aspho-
124 b		Lavera Dod. 104 b. Fuch. Dod.	Col. 362 b		deli radice 80. marinum
124 b		Lob. 154. minus Lon. 163	Lichen primum Plinij 285		54 b
124 b		Laureola ejusque species 462	Lychnis ejusque species 203		Lilium bulbiferum ejusque
124 b		Laurus ejusque species 460.	Chalcedonica Lob. ib. coc-		species 77. Canadense 79.
124 b		Græca Plinij Gef. 416	cinea ib. marina Lob. 205		fatui 80 b. floribus reflexis
124 b		Laurus Alexandrina 303 b. ta-	Lychnis coronaria ejusque spe-		77 b. Perficum 79 b. po-
124 b		xa Plinij 305	cies 203 b. aquatica 204.		lyrrhizon 29
124 b		Laurocerasus 450 b	multplex ibid.		Lilium purpureo-roseum e-
124 b		Lechyas fructus 444	Lychn. alpina species 206 b.		jusque species 76 b. rubrum
124 b		Ledum ejusque species 467.	hirsuta species 206. lege-		77. variegatum 64. Zusi-
124 b		alpinum 468 Silefiacum	tum species 204. sylv. spe-		niare 78
124 b		467 b	cies 205. viscofæ species		Lilium convallium 304. ve-
124 b		Legumina 337. capreolis do-	ibid.		rum Theoph. ibid.
124 b		nata ibid. carentia 346	Lycium ejusque species 478.		Limas 436 b
124 b		Legume leoninum Ruel. 87	Creticum Belli 454 b		Limeum Guil. 186 b. Plin. 184
124 b		Lemna Theoph. Lugd. 362	Licondo 513		Limnæum Cord. 279
124 b		Lens ejusque species 346. ma-	Lycopercicum 167		Limnopeuce Cord. 16
124 b		ior repens Tab. 330	Lycopodium Tab. 360 b.		Limodorum Austriac. Cluf.
124 b		Lentago 461 b	Lycopis ejusque species 255.		86 b. Dod. 87
124 b		Lenticularia Gef. 141 b	Ang. 250. Cord. 254. Fuch.		Limones ejusque species 436
124 b		Lenticula marina Lobel. 365.	257. Anglica 256		Limonium ejusque species 192
124 b		palustris ejusque species 362	Lycopus Fuch. 230		Monspeliensium 165. Lon.
124 b		Lentiscus ejusque species 399	Lycostaphylon Cord. 456 b		191. Gef. 192. aliud Lugd.
124 b		Leo herba 87. Dod. 379 b	Lignum Aloës 393. America-		268. pratense Trag. 327
124 b		Leontobotanos Gef. 87	num varium 392. aequi-		Linus arborum 444 b
124 b		Leontopetalon Matth. 324.	num 393. aequilæ Amato		Linagrostis 4 b
124 b					X x x Lina-

I N D E X.

Linaria ejusque species 212.	Lugd. 328. tetragonobolus Camer. 332 b. urbana Matth.	minor Fuch. 309 b.	Dodon. 223 b.
aurea Trag. 213. botryodes Col. 259 b. hederula folio Colu. 306 b. quarta Trag.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Malicorium 437.	Madia 495.
Lingua avis 416. passeris ib. passerina Trag. 259 b.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Malinathalla 14 b.	Mafia 408 b.
Lingua cervina 353. cervina ramosa Colum. 354 b.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Malope Plinij 315.	Maffiche 501.
Lingua Plinij 180 b. major Lugd. 266 b. serpentina. Cael. 354.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Malva ejusque species 314. al-tera Cael. 316. Theophr. 316 b. Veneta Lon. 317.	Maffice Gallorum 224.
Lingula vulnerar. Cord. ibid.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Malva arborea 315 b. crispa 315. rosea ibid.	Maffura Belli 329 b.
Linocarpos Thal. 214 b.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Malva villosa Ang. 315 l.	Mater violarum Lugd. 199 b.
Linofyrus Lob. 213.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Malus ejusque species 433. A- rancia ejusque species 436.	Mates 404 b. Indorum 399 b.
Linofpartum Theophr. 5.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Malus Asmenica ejusque spe- cies 444.	Matos 441 b.
Linum ejusque species 214.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Malus citria ejusque species 435. cydonia ejusque spe- cies 434.	Matticaria ejusque species 135.
marinum Imper. 364 b.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Malus granata 438. marina A'droa. 369 b. Indica A- colta 433 l.	Matticaria Col. 238.
pratense 4 b.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Malus limonia ejusque spe- cies 436.	Matticaria ylv. Trag. 334.
Liquidambar 502 b.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Malus Persica ejusque species 439. punica 437. Peruvia- na 168.	Matticaria ylv. Trag. 334.
Liquiritia succus 496 b.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Malum Hespericum 436. m- fanum marin. 369 b.	Mauropapnos 435.
Lirium mas 39. alterum The- ophrast. 69 b.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mamara 431 b.	Maurongaus 312.
Lyfimachia ejusque species 244. Lon. 395 b. galericu- lata Eyst. 236 b. Lob. 246 b.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mambi fructus 376.	Mauronia 97 b.
lutea 245. corniculata 520 b. filiquosa 245. spicata 246 b. Virginea 245. 520 b.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mambu Lugd. 15.	Mauz 507 b.
Lithobryon Col. 361.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mamel arbor 417 b.	Mazza de Congo 27.
Lithontribon Lugd. 282.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandechade 91.	Mechinum 31.
Lithophyton maritum Gef- neri 366.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandech parpie ibid. b.	Mecoacham ejusque species 297 b.
Lichoreuleucon Col. 201 b.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandepore ibid.	Mecofium Cord. 164.
Lithospermum ejusque species 258. angustifolium umbel- latum 521. fruticosum 255 b.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandioca 90 b.	Medica ejusque species 329.
Lithothalpi Col. 107.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	Medicaria Cam. 329 b. Dio- fcor. 330. flava Cluf. ibid.
Lithoxyla 421.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	lunata Lugd. ibid. marina 329 b.
Loborum species Cluf. 404.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	Lob. 329 b.
Lobus crassus Cluf. 338 b. e- chinodis Cluf. 399 b.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	Medeum Diosc. Rauw. 94.
Loca 21.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	Mehenbethene 418 b.
Loces fructus 434 b.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	Melampyrum ejusque species 234.
Locusta Gef. 185 b.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	Melandyron Plinij 163. ge- nium Cluf. 204 b. quo- rundam Cluf. 205.
Lolade 196.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	Melanguila 45 b.
Lolium 9. marinum ibid. b.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	Melanthium ejusque species 145.
rubrum ibid. Fuch. 204 b.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	Melanzina 167 b.
Lonchitis ejusque species 359.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	Meleagris 64.
Cael. 53 b. major Calster.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	Melenken 507 b.
40 b. prior Dalech. 187 b.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	Mel frugum Dioclis 27. Ca- 331 b.
Lotopiflos Ponæ 332 b.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	Melica 26 b.
Lotus ejusque species 331. Egi- ptis 193. 196. asperior Lo- bel. 332 b. campestris Trag.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	Melilotus ejusque species ibid.
328. eeneaphylos Lugd.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	coronata Lob. 332. Diofco- 227. exigua Trag. 328. Ita- lica Cam. 331. Fuch. ibid.
349. hortorum Lob. 331 b.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	vulgaris Cael. 332.
latifolia Lugd. 333 b.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	Melilotus quarta Trag. ibid.
Lotus Lybica Lugd. 332 b.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	quinta Trag. 349 b. septi- ma Trag. 332. major tertia Trag. 330.
Lotus pratensis filiquosa Cluf. 332 b. purpurea Lugd. 328.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	Melilotus major pinguis Lug- dun. 389 b.
pentaphylos Gef. 332. qua- drifolia Tab. 327 b. filiquo- sa Cam. 332 b.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	Melinum Cael. 338 b. alterum Cael. 248.
Lotus fativa Fuch. 331. fylv.	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	Melissa ejusque species 219.
Matthiol. ibid. fylv. minor	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	fylv. 220.
	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	Melissophyl'on 229. Fuchij 231 b.
	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	Mellegeta 413.
	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	Melocactus 384.
	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	Melochia Alpini 317 b.
	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	Melocarpali 435 b.
	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	Melongena 167 b.
	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	Melo ejusque species 310.
	Lotus arbor ejusque species 447. alba 416. Africana 447. Homeri Guil. 446. altera Theophr. Lugd. 450 b. verterum Cord.	Mandragora ejusque species 169. Theophr. Dod. 166.	Melope-

O.
Ocio xochiel 48b
Ochrus (ylv. Lob. 344
Ocymastrum Fuch. 225. Mar-
thiol. 204. alterum Trag.
235. verrucarium Gesner.
168 b
Ocymastrum Valentinum
Clusij 230. Valerianchos
Lob. 165
Xxx 2 Ocy-

I N D E X.

[illegible]

I N D E X

altera Matth. 222. alfinefolia Lob. 108 b. Hispanica Clus. 281 b. myagrifolia Geln. 109	Perfoliata Achilles Gef. 278	Phyllon Lugdun. 284 b. 285	Pyra infana Cæf. 167 b
Paronychia Matth. 156. lacinia 285. rutaceo folio Lob. 109	Perlaro gramen secundum Bellon. 415 b	Theoph. Cord. 121	Purra Theoph. Guil. 486
Parote Mexioc. 138. 520 b	Permonaria Ang. 360 b	Phyllon spicatum & reticulatum 122	Pyrastror 439. idæus Gef. 451 b
Parthenium ejusq; species 133	Perpenfa Dod. 197	Phyteuma Cæf. 92. Matth. 93. Belli 212. Monfpel. 100 b.	Pyrethrum ejusq; species 148
Trag. 135. nobile Gef. 135	Perpelia Clus. 441. fortè Plinij 512	Diofc. Colum. 270 b. minor Col. 271	Brunf. 98. fyl. Dod. ibid. b.
Pafflerina Trag. 259. minor faxatilis 214 b	Perpica ejusq; species 440	Phyximilon 507 b	alpinum Geln. 136 b
Paffulæ Corinthiaca 229	nux 417. minor 442 b	Phlomis Lobel. 241. phlomos 239. 240	Pyrola ejusq; species 191
Paffellus herba Linfo. 113 b	Perfonata Plinij 197. 198	Phleon & Phleas Theop. 194	Pyrum marinum Ald. 369
Paffinaca ejusq; species 155	Peruana Aloësfacie 423 b	Phleas mas Lugd. 194. fœmina Lugd. 15	Pyrus ejusq; species 438
aquatica Lob. 154. latifolia 155. latifolia fyl. Dod. ibid. b.	Pes anferinus Fuch. 119. 261. Pandect. 110. cati 367 b.	Phlox Theoph. 178. 203 b	Pifa nuda Indica 399 b
marina Lob. 288 b. nigra fyl. Cord. 162 b. pratenfis Theoph. Cord. ib. b. Syria ca Lugd. 155 b	columbinus 318 b. corvi Brunf. 179 b. leoninus Ad. 264. leonis 319. milvi Angul. 336 b	Phœnicobalanus 445 b	Pilum ejusq; species 342. cordatum Lobel. 343. Græcorum Trag. ibid. nigrum Cam. 338 b. Tab. 343. fylv. Trag. 344
Patecas 311 b	Petafites ejusq; species 197	Phœnix carduus 379 b	Pifum Americanum Lugd. 343 b. Indicum ejusq; species ibid.
Pater noster Lugd. 14	Petrocerafus 457	Phœnix 9 a. b.	Piffalæon 504 b
Pavame Indorum 431	Petromarula Belli 93	Phoribon Galeni 238	Piftacia ejusq; species 401
Pavana 393 b	Petrofcorodon Gef. 75 b	Photel 97 b	Piftana Magonis Plinij Lobel. 194
Pavate 399 b	Petrofelinum 153. fylv. 163	Phthoridionon 324	Piftolochia Fuchfij 143 b. Dodon. 307 b
Pecten veneris Lob. 151	Petrofelini vitium Trag. 161	Phu ejusq; species 164	Pitine Theoph. Ang. 345 b
Pedicularis ejusq; species 163	etum Thever. 169	Picea ejusq; species 493. Dodon. 505	Pitys ejusq; species 439
Cor. 324 b. fœtida Trag. 187	Peuce ejusq; species 491	Pycnocomon Ang. 100. Diofcor. Co. tulo 167. Brunf. 155 b. Colum. 269 b. Creta Lob. 379 b	Pityula ejusq; species 294
Paderota Paulin. 247	Peucedanum ejusq; species 149. Lon. 158 b. aquaticum Tab. 141 b	Pieris Lugd. 128	major 291
Pedua Guiland. 133	Phacoides Oribafij 463 b	Pigamum Lugd. 326	Pix 504. navalis ibid.
Peganton Narbon. Ad. 336 b	Phagus Græcorum 420	Pygus Theoph. 456	Pyxantha Dod. 478
Pelecisus Gefn. 319	Phalangites Cord. 29	Pila marina Cæf. 368 b	Plantia Banatica Clusfij 265.
Penoabfou 511	Phalangium ejusq; species ibid. Creræ ibid.	Pilofelia ejusq; species 262. major 128 b. major Gallor. Thal. 129. minor Fuch. 163.	marina retiformis Clusfij 366
Pennachio marious 366	Phalaris ejusq; species 28.	filiquata Cam. 108 b. fylv. Trag. 254	b. languinem movens 512
Penna marina Rondel. 369 b	parva Cæf. pratenfis Lob. 2. fylv. 8 b	Pimento del rubo 412 b	Plantula peregr. Clusf. 412
Imper. 3631	Phallus Hollandicus 85. 374 b	Pimpinella ejusq; species 159.	Plantago ejusq; species 189.
Pentaphyllum ejusq; species 325	Phana Bellon. 485	fol. Agrimoniz 321 b. Romana Cæfalp. 161. Ipinof. Clusf. 388 b	albid. Dodon. 190. marina Lobel. ibid. b
Pentorobon Plinij 323	Phafeolus vulgaris ejusq; species 339. Ethiopius 340 b.	Pinas 384 b. 433 b	Plantago angustifolia ejusq; species 189 b. aquatica ejusq; species 190
Pepaios 434 b	Africanus Clusf. 340. Braffilianus 341 b. Guineensis ib. Nigritarum ibid.	Pina radix 91 b	Plantagini fimilis Lugdun. ibid. b
Pepitas del Peru 441	Phafeolus Indicus ejusq; species ibid. peregrinus Clusf. 338. 340. Belli 331. Peruanus 338 b. primus Trag. 342	Pindo 513 b	Plantaleonis Dod. gal. 186
Pepitas Quith 480 b	Phafeolus fativus Dod. 338. fyl. Dod. ibid. b. fyl. Lugd. 343. fylvarum Lugd. 351. Turcicus Cæf. 339	Pinea purgativa 492 b	Plantula cardamines æmula 105
Peplion Dod. 282	Phafelus Cæf. 339 b	Pingicula Gef. 243 b	Plantaria Dod. 15
Peplis ejusq; species 293	Phafelus Romanus 432	Pinioen 492 b	Plantanus Diofc. 431. aquatica 456 b. Oviedi 508. Lon. 431
Peplus Lob. 291	Phellodrys ejusq; species 423	Piniopinichi 434 b	b. Trag. 430
Pepo ejusq; species 311. latus 312. Matth. 310	coccifera 425	Pinafter ejusq; species 492. Auftricus 491. Belli 492	Platyphyllos 419
Pepolina Cæf. 219	Phellandrium Dod. 161 b	Pinas ejusq; species 491. ma-ricima 492. tubulus Plinij 491 b. fylv. Cæf. 493	Plumbago Clusf. 97 b. Plinij quorundam 101. Plinij fortè 192
Perechepier Lob. 152 b	Philanthropos Plinij 314	Piper 411. abortivum 412 b. Ethiopicum ibid. caudatum ibid. longum ib. Martiol. 411 b. rotundum 411	Pneumonanthe Lob. 183 b
Perdicium 121. Theoph. 130	Phyllyra Theoph. 478	Piper Indicum ejusq; species 102	Podagraria Lob. 156
Perebeceue 169	Phyllyrea Guil. 426 b	Piperis radix Diofc. 35 b	Podifarina 158 b
Periclymenum ejusq; species 302	Cast. 426 b. Dod. 475	Piperitis Brunf. 57	Poconia ejusq; species 323. flo-re pleno 324. Indica 343 b.
Periclymenum Allobrog 451	lacustris Cord. 193	Pyracantha Lob. 454 b	malcula Lon. 212 b. Gale-ni 512
b. rectum 451		Pyramidalis Lugd. 93	Polemonium Tab. ibid. pet-trazum Gefn. 205. alt. Dod. 165. palufte 279 b
Periploca ejusq; species 303			Polemonium Monfpel. Lob. 398 b
prior Dodon. 294 b. alter Dod. 303. minor Lob. ibid.			Polyacantha Cord. 387. Theophrast.
Perseus Lob. ibid. b			
Peristerona Cratæg Ang. 156			
Perfoliata ejusq; species 277			
altera Lugd. 154 b. minor Gefn. 112 b. napifolia Lob. ibid. filiquofa Lobel. ibid. fylv. Brunf. 87			

I N D E X.

phrafi. Lugd.	385 b	Praefum Ang.	230 b	Matthiol. 271. montana	Ran. grumosa radice ejusque
Polyanthenum Ang. 178. pa		Priapeia Gel.	170 b	Lugd.	Species 179. lanceolatus
lufre Dod. gal.	180	Primula veris ejusque species		Pteridion Cordi	Tab. 180 b. lanuginolus
Polycarpum Lugd.	28	141. Cæf. 261 b. Brunf.	67	Pteridion mafc. Cordi	181. latifol. Lugd. 309 b.
Polycnemum Lugd.	229 b	Præcocia	442 b	Pucho Linf.	longifolius 180 b. Eufita-
Polygala ejusque species 215.		Procura	362	Pulegium ejusque species 222	nicus 181 b.
legumen ejusque species 349		Proferpinaca Apul.	281	aquaticum Eyst.	Ran. montanus 180 b. ejusque
Polygala Ang. ibid. b. Gefn.		Prunella ejusque species 260		montanum Lon. 215. pe-	species 181 b. nemorolus
350. Camer. 351. Cordi 353.		Prunus ejusque species 442.		træum Gefn. ibid. fyl. Do-	176 b. nemorum 177. 178.
Lugd.	350	Myrobalanus 444. fylveft.		don.	paluftris 180. phragmitis
Polygonatum ejusque species		ibid. b		Pulicaris herba Lugd.	178. pratensis 178. laxatilis
303. Tragi	204 b. 205	Pruno fylv. affinis Canaden-		Pulicaria Gazæ	182 b. tuberosus Dod. 179
Polygonum ejusque species		fis	521 b	Pulmonaria ejusque species	Rapa ejusque species 89
281. bacciferum 15. cocci-		Pruna infana	444	259. Gallica Lob.	Rapa braſica 111
ferum Tab. ibid. femina		Prunidactyla	443	Gefn. 322. minor Lugd.	Raphanus ejusque species 96
Marth. ibid. bederacemum		Pſeudoacorus cæruleus Tra-		258 b. Romana Cæf.	aquaticus 97. major ibid.
Colum. 295. marinum Ta-		gi Lugd.	32 b	Vegetij Gefn.	ruſticanus 96 b. Lob. 97.
bern.	15 b	Pſeudoagnus Dod.	451	Pulmonaria Matth.	ſylv. Cord. 95. Lob. 97
Polygonum mafculum fruti-		Pſeudoamomum Gef.	455 b	Pulmo marinum Matth.	Rapiftrum ejusque species 95
colum Thal. 284. quartum		Pſeudoapios Matth.	344 b	Pulſatilla ejusque species 177	aquaticum Tab. 97 b. ſylv.
Plinij Cluſ. 15 b. Plinij Da-		Pſeudopocynon	307 b	Pumex quercionis	lronis folio Col. 101 b
lech.	212 b	Pſeudoſphodelus Cluſ.	29 b	Pummuckoner	Rapum Americanum 90.
Polypodium ejusque species		Pſeudobunias Dod. gal.	99		Brallianum ibid. genitæ
359. livenſe Lugd.	ibid. b	Pſeudocapſicum Dod.	167		87. ſylv. Matth.
Polypodium marinum Im-		Pſeudochamædrys 471 b			90 b
per.	303 b	Pſeudochamædrys Gef.	249		Rapunculus ejusque species
Polypremon Lugd.	165 b	Pſeudocyperus Lob. 6. Thal.			92. alopecuroides Cluſ. ib.
Polyrrhizos Lugdun.	322 b.	ibid. b			corniculatus Col. ibid. b.
Plinij	186	Pſeudocynitilus Dod.	390		hortenſis Trag. 155. nemo-
Polyſpermon Lob.	118	Pſeudochinopodium Matth.			rolus 93. ſpicatus 92. um-
Polyſtricha Bellon.	490 b	225			bellatus Thal. ibid.
Polytrichum aureum ejusque		Pſeudocolocynthis Eyst.	314		Rapuntium umbellatum
ſpecies 356. Apuleij album		Pſeudocoronopus Dod. gal.			Col.
Lon 357 b. officinar.	356	190			287
Polium ejusque species 220.		Pſeudocostus Matth.	156 b		513 b
Græcorum Col. 136 b. ma-		Pſeudocrania Cordi	447 b		64 b
ritimum	221	Pſeudodiſtannus Matth.	222		100.
Pomum Adami 437 b. para-		Pſeudoelleborus Matth.	186		ibid. b
dyſi	507 b. 508 b	Pſeudoeupatorium Dodon.			canis
Pomum amoris Lob.	167 b	gal.	320		Rubus
Hiericoticum Imper. 168.		Pſeudoiris Dod.	34 b		316
ſpinolum	ibid.	Pſeudoleontopodium Mat-			Rucula
Poncires	437 b	thiol.	263 b		Rumex
Pontica nux	418	Pſeudoligustrum Dod.	451		Rufco
Populago Tab.	276 b	Pſeudolyſimachium Dodon.			Ruta b.
Populus ejusque species 429.		245 b			canis
albæ ſimiles Cæf.	427	Pſeudololochitis aſpera Mat-			Ruta ca-
Pori corallio affines	367	thiol.	359 b		lunat
Portrum ejusque species 72.		Pſeudomelanthium Matth.			raria
Portulaca ejusque species 288.		204 b			Ruta ej-
aquatica 251 b. major 287.		Pſeudomelilotus Cam.	332.		hyper
marina Dodon. 120. tertia		Pſeudomyagræum Matth.	109		Ruta pt-
Brunf.	383	Pſeudomyrtus Bellon.	469 b		cies
Portulaca arbor	460	Pſeudomoly Lugd.	211		Ruta ſyl-
Portamogeton ejusque species		Pſeudonardus Matth.	216		Cæf.
193. Caſtoris	141	Pſeudonardiffus ejusque ſpec.			Ruthru
Potates	91	Pſeudoorchis Cluſ.	84 b		
Potentilla herbariorum	311	Dod.	87		
prima Angu. 164. ſecunda		Pſeudoflycomorus Matth.	45		
Ang.	163 b	Pſeudofurperum	149 b		
Poterium ejusque species 388		Pſyllium ejusque species 191			
Pothol Theveti	459	Pſipacia Belli	313 b		
Pothos Theophr. 203 b. cæ-		Pſiphelida Belli	323 b		
ruleus Lug. 301. Theophr.	295				
quorundam	246 b	Pſarmica Matth. 98. altera			
Poutiou					

I N D E X.

ejusque	Ricinus ejusque species	432	Sagapenum Geln.	156	Sargazo Lugd.	361	Scolopendria Trag.	354	leguminosa 349. major Lon.	359	vulgar.	353
ecolatus	Americanus folio	494	Sagittaria	421	Sari Theophrasti. 19. Indorum	246	Scoparia	212				
ginolus	521 b		Sagetamener	421								
309 b.	Rima maria Ang.	110	Sagitta ejusque species	194								
Lusita-	Ritro Theoph. Lob.	381	Saga	508	Sallifera Italorum	274	Scopa regia 98 b. Plinij Da-					
ejusque	Robur ejusque species	420	Salang	411	Sallifera	431	lech.	132	b. 238			
morolus	Robus	416	Salicaria Geln.	241	Sallifragia Indica	ibid.	Scordium ejusque species 247.					
77. 178.	Rocella Imper.	365	Salicetrum Plinij	297	Satyrum Cael.	40 b. basili-	alterum Plinij 238. majus					
agmittis	Cardan.	455	Plinij Cael.	167	cum 85. caltratum 86. eri-		Plin. Geln.	248				
faxatilis	Rogga ejusque species	23	Salicornia	289	thronium 46. erythron.		Scordotis Plin. Belli	248	b			
od. 179	Rola ejusque species	480	Salicunca	165	Lob.	87	Scorodonia Thal.	247	b			
89	alpina Geln. 466 b. 468 b.		Salix ejusque species 473. A-		Satyrum mas 81 b. 82. ru-		Scorodoprafum	74				
111	Hiericonth. 484. Hieric.		merina Amat. 472 b. Mat-		brum Lugdun. 87 a. b. pri-		Scorpioides ejusque species 287					
ies 96	Frago. 276. b. molcata		thiol. 475. Plinij 473. Heli-		mum Brunf. 80. octavum		aquaticum Geln. 254. al-					
for ibid.	482. pomifera 484. Sper-		ce Theophr. 474. marina		Trag. 186 b. trifolium Do-		bum Geln. 253. legumino-					
Lob. 97.	monia Plin. 483. b. sub-		Lugdun. 365 b. Sabina Co-		don. 45 b. Diof. 57. Fuch-		sa Lob.	350	b			
ies 95.	viridis	482	lunel.	473	83. Lugd. 87 b. trifolium		Scorpius ejusque species 394.					
7 b. sylv.	Rola sylv. ejusque species	482	Salix pumila ejusque species		Matth.	374	maritimus	15	b			
101 b.	Rola India Geln. 132. Ju-		474 b		Satyrum utrinque Matth.	85	Scorzonera ejusque species 275.					
m 90.	nonis 76. mariana 203 b.		Saliparilla	291	Satureia ejusque species 218.		quarta Cluf.	119				
genitix	205		Salifolia Cael.	289	lutea Lugd.	234	Scotinum	415	b			
90 b	Rola graeca Plinij	203	Salvia ejusque species 237. a-		Saxifraga sylv. Tragi	360	Scrophularia ejusque species					
species	Ros Libani	497	grestis Dod. 248. sylv. Cael.		Saxifraga tertia Matth. 149 b.		235. major Trag. 287. mi-					
Cluf. ib.	Rosmarium sylv.	475	236. Trag. 247 b. montana		tertia Cael. 153 b. tertia Co-		nor Brunf.	309				
ibid. b.	Matth.	467	Gel.	248	lum. 251 b. Anglica 281. an-		Seutellaria	231	b			
y. nemo-	Rosmarinus 217. ferulaceus		Salvia vitæ Lob.	356	tiqorum 211. aurea 309 b		Sebesten	446				
92. um-	Ad. 158. Theoph. Ang. 157		Sambata fructus	436	Saxifraga alba rotundifolia		Secacul Arabum Lugd. 155 b.					
ibid.	Ros solis ejusque species	37	Sambac	397	309. Fuch. 356. prima Mat-		Ang. 288 b. quorundam					
bellatum	Rosstrum porcium	116	Sambaya	36	thiol. 218 b. magna Matth.		male	303				
287	Rota	18	Sambarane	393	211. tertia Brunf. 258. al-		Secale ejusque species	23				
513 b	Rubella tinctorum	364	Sambucus ejusque species 456		tera Cael.	333	Secalis mater	ibid. b				
64 b	Rubecola ejusque species	334	Samolus Plinij	252	Saxifraga montana Geln. 322		Secamone Alpin.	303				
ies 100.	Rubea ejusque species	333	Samparanton	399	lutea Gelfneri 336. lutea		Securidaca ejusque species 348					
ibid. b.	marina Lob. 334. spicata		Samplicus ejusque species		Fuch.	331	Sedum ejusque species 282.					
365 b	ibid. Virginea ibid. b.		224		Saxifr. Pannonica 150. petra-		alpinum ejusque species 284					
es 500.	Rubus ejusque species	479	Sanamunda 278 b. 321. Cluf.		Pong. 284 b. pimpinella 159.		Sedum aquaticum 286 b. Mada-					
ca 504 b.	canis tur.	48	Sana sancta	169	Romanorum Lugd. 101.		gascarium 283. palustre					
species 388	Rubus Idæus non spinosus	316	Sandalia	343	rubra Tab. 163 b. Brunf. 166.		Cluf.	205	b			
116	Rucula marina Trag.	98	Sandalia lemen Cael.	343	rubra Thal.	356	Sedum folijs laciniatis ejusque					
Indicum	Rumex ejusque species	115	Sandalida Cretica	331	Scabiosa ejusque species 269.		species 284 b. minus ejusque					
rum Tra-	Rumex 470. sylv.	415	Sandaraha Anstot.	500	alpina Lob. 270. arvenis		species 283. petrazum Pon-					
115 b	Rufcus 470. sylv.	415	Sandarax	ibid.	269. capitulo globoso 270		277 b					
118	Rufco affinis Cael. 303 b. 305		Sanguen Cael.	447	b. folio scisso Caelalp. 269.		Sedum ferratum ejusque spe-					
ies 477.	Ruta baccifera Tab. 398 b.		Sanguinalis mas Cord. 281		montana 270. ovula 92 b.		cies	285				
454 b	Ruta canina I. ob.	236	foemina Cord.	16	pratensis 269. prolifera 170		Scitellum	473				
116. 117.	Ruta capraria Tab.	352	Sanguinaria Trag.	8	stellata	201	Sclaglo Plinij ejus species 300					
307 b	lunaria Tab. 354 b. mu-		Sanguisorba	160	Scammonea ejusque species		b. Plinij Cael. 284. quibus-					
33	lunaria Dod.	356	Sanguis draconis herba	115	294. minor Plinij Tab. 295		dam 485. Guil. 486. Lug-					
440	Ruta ejusque species	356	officin.	499	b. parva Cam. 294 b. Pata-		dun.	ibid.				
464	hypericoides	280	Sanicula alba Geln. 322. officin.		vina	295	Sclerum 153. montanum (Ca-					
468 b	Ruta pratensis ejusque spe-		na 319. Icemina Fuch. 180		Scammoneum succus 295 b		fi)	150				
163	cies	336	Sanicula alpina ejusque species		Scandix ejusque species 352.		Sclerays	143				
431 b	Ruta sylv. Diof. 279 b. sylv.		242		153		Semen Canariense 28. Con-					
es 414.	Cael. 336. alt. Cael. 337 b.		Sanicula rotundifolia ejusque		Scariola 125. sylv. Ang.	124	gratum 27. sanctum 139 b					
salp. 419.	Ruthrum alterum Lugd. 381.		species	243	Sclerata Apuleij	180	Sementina	139	b			
414 b			Santalum ejusque species 392.		Scheha Avabum	739	Sempervivum ejusque spe-					
471 b.			cinericium 393. rubrum ib.		Schenna Græc.	476	cies 282. tertium Diofcor.					
50 b.			156 b. 137		Schcenoprafum	72	Col.	285	b			
Vir-			Santolina Dod.	136	Schvvaden	8	Sempia	366	b			
521 b			Santonium Cord.	136	Seilla ejusque species	73	Sena Ruellij 396. vera	397				
455.			Sapinus Bellon.	493	Scirpus Trag. 7. Indicus 12.		Senetio ejusque species	131				
54 b.			Saponaria ejusque species 206.		ibid.		Senetio carduus Col.	130	b			
Rici-			de concava ibid. b. minor		major		Senis 479. canis	483				
			Lugd.		Sclarea Matth.	258	Serapias Diof. 81. batrach-					
			Sapumener	421	Scolymus ejusque species 383.		tis 85 b. minus	86				
			Sarcocolla	498	Diof. Lugd. 384 b. Theoph.		Serapinum officin.	156				
			Sarcophago	97	Cluf.	384	Seri-					

I N D E X.

Serica	446	Dodon.	297	Smilax lavia ejusq; spec.	294	Spina Arabica Cæf.	381. Do-
Sericum	415 b	Sigillum Salomonis ejusq;	186 b	Smyrnum Matth. 154. Cord.	155. Fuch.	158 b	don. 381 b. Lugd. 381. cer-
Serifolia Frago.	435 b	Species 303. Cæf.	186 b	Soda Lob. 289. Cam.	316 b	394. birc	vina 478 b. Christi Cæfal.
Seriphium Diofc. Lob. 137 b.	105 b	Silaum Plinij Ang. 154. Cæf.	161. forte	Sodouwaya	246 b	388	394. birc
German. Trag.	105 b	Silene Theoph. Aldroa. 205 b		Solaris herba Gazæ	253	Spina appendix Plinij	454 b
Seriola	125	Siler montanum Lobel. 162.		Sol Indianus Lon.	276 b	Spina infectoria 478 b. Judai-	454 b.
Seris Diof. ib. longifolia	130	officin. Ger. 161 b. Cretic-		Solanum ejusq; species 166.		ca 478. Latinorum	454 b.
Ser montanum Cæf.	162 b	um Cam. 162 b. pratenfe		bacciferum ibid. b. Mexio-		Marruca 478 b. regia The-	389 b
Serpentaria Fuch. 129. Brunf.	309. femina Fuch. 192.	Dod.		canum 168 b. spinofum 167		ophraft.	
major Lugd. 194 b. minor	195 b	Siler Plinij Cæf. 428 a. Lugd.		b. 168. tuberosum 167		Spina felinitis Theoph. Guil.	385. folstitialis Lob. 387 b.
195 b		428 b. arbor Ang. 474		Solanum pomiferum ejusq;		folstit. altera	272
Serpentina Dod.	190 b	Silybum Lob. 381. Lugd. 382		Species ibid. peregrinum		Spinachia	114 b
Serpyllum ejusq; species 210.		Siligo Lob. 21. Trag. 23. Tur-		Lac. 343. tetraphyllum Lo-		Spinastella Tab.	387 b
hortenfe	219	cica 22 b		bel. 167. triphylla ibid.		Spin merlo Cæf.	478 b
Serpyllum acinarium	471 b	Siliqua Theophr. Tragi	339	Soldanella ejusq; species 295		Spiræa Theophr. 475. Lugd.	
Serratula	238	Siliqua arbor ejusq; species	403	Solea equina Lugd.	349		
Sertula campana Matth.	331	402. Indica		Solidago Brunf. 261. Ang. 268		Spini vineta	454
Sertularia Imper.	364	Siliquastrum Bellon.	402	Sarracenia Lon. 235. alia		Split Cæf.	143
Sesamoides majus & minus	463 b	Siliquastrum ejusq; species	102	Trag. 246. tertia Tragi		Spongia ejusq; species 368.	368
Lugd.	463 b	102		266 b		in rofis	483
Sesamum verum 27. Tra. 109		Silphium Diofc.	156	Soliflora Thal.	357	Sponfa Solis Thal.	357
Sesban Alpini	352	Silphium succus	499	Sonchus ejusq; species 123.		Spuma maris Cæf.	368 b
Sesamoides magnum Lacun.	100. Lobel. 185. Salmanti-	Symphytum ejusq; species	259	arborescens ibid. b. asper		Squamata	88 b
cum Cluf.	206	259. petraum Thalij	221.	124. lavia ibid. lanatus Da-		Squiananthum	11
Sesamoides parvum 100 b.		Lob. 260 b. tertium Ta-		lech. 124 b		Stachys ejusq; species 236.	236
Cord. 186. Matthiol. 130 b.		ber. 1. & 2. Tab. 268 b		Sonchus montanus ejusq;		spinola ibid. b. Ang. 216 b.	216 b.
Diofc. Lob.		Symphytum petraum Mat-		Species	124 b	Plinij	238 b
ibid.		thiol.	280	Sonchus villosus ejusq; spe-		Stade	151
Seseli ejusq; species 151. æ-		Symphytum maculosum e-		cies ibid.		Staphylinus Trag.	151
thiopicum Matth. 157. Cæf.		jusq; species 259		Sopha Alpini	352	Staphylodendrum Plin. 401 b.	401 b
277. Creticum 148. Massi-		Symphonia Plinij	121 b	Sophia chirurgorum	105 b	Staphis agria	334
lienfe Matth. 151 b. aliud		333 b. 334		Sora potus	25 b	Staticæ Lugd.	211
162.		Sinapi ejusq; species 99. a-		Sorbus ejusq; species 415. al-		Stelephurus Theoph.	4
Seseli palustre Cam. ibid. pe-		greffe Trag. 95. albi Lug-		pina Gefn. 452. aculeata		Stelis viscum	505
laponnefacum Lob. 148.		dun. 112 b. echinatum Lug-		454 b. terminalis Gallor.		Stella leguminosa Lob. 350 b.	350 b.
Fuchij 150. Ang. 160. Mat-		dun. 99 b. pumilum alpi-		451. tormia. Lob.	454	Stellaria Lugd. 251. aquatica	251.
thiol.	161	num Cluf. 105. fylv. Fuch.		26 b		Lob. 141 b. argentea Ca-	141 b.
Seutomalache	115	100 b		Sorghum Dod. 12 b. ejus-		mer. 346 b. Brunf. 334. Mat-	334.
ibid.		Sinapi & Thlapi media pro-		que species 15. Ruell. 30.		thiol.	320
Seutolaphyllum	118	vincialis planta	109 b	Placz	69 b	Sternutamentaria Lob.	98
Sferro cavallo Gef.	349	Sion Cratæz 104 b. Fuchij		Spartium ejusq; species 396.		Styrax ejusq; species 452. la-	452.
Sycamine Theoph.	459	252 b. ejusq; species 154		Adverf.	395	cryma 502. liquida ibid. b.	502.
Sycaminodes Theoph.	422	Syphonium Tab.	9 b	Spartum Plinij 5. aphyllon		Stoebe ejusq; species 273. ca-	273.
Siciliana	280 b	Sippo Brasilian.	298 b	Lugd.	394 b	pitata 271. Salmantica 272.	272.
Sycomoros ejusq; species		Syringa ejusq; species 398.		Spatha	506	Theoph. Lugd.	194 b
459. Italic. 415. Ruel. 430 b		laciniatis folijs	476	Spatula fortida	30	Stoebe Diofc. Bellon. 388 b.	388 b.
Sida Theophr.	306 b	Syrinx Lob.	17 b	Speculum Veneris	215 b	Theoph. Cæf.	387
Sideritis ejusq; species 233.		Sifarum ejusq; species 155		Spelra Cæf. 21 b. Trag.	21	Stoechas Arabica 216. citrina	216.
prima Matth. 230. secunda		Peruanum Tab.	91 b	Spergula ejusq; species 251		264	
Matthiol. Lug. 232 b. 233 b.		Sifer Matth. 151 b. palustre		Sphacelus Guil. 236. quorun-		Storax	502
tertia Matth. 132 b. 136. An-		Lugd.	163	dam 238 b. fylvest. 247 b.		Stramonia	169
guil.	319	Sifon Diofc. 154. Lon.	163	Theoph.	237	Stratiotes 140. potamios Do-	140.
Sideritis secunda Diofc. Col.		Sifymbrium Matth. 228. car-		Sphæritis	273 b	don. gal.	286 b
160 b. Cæfal. 236 b. tertia		damiæ Lugdun. 104. fylv.		Spagnus Plinij	422 b	Stratiotes Diofc. Alpin. 362 b.	362 b.
Diofc. Col.	319	Cæfal.	97 b	Sphærolæ saponariæ	511	ibid.	
Sideritis prima Thalij	136 b.	Sifymbria mentha Lob. 227.		Sphondilium ejusq; species		Strychnodendron Lob. 166 b	166 b
ærulea Thal. 246 b. Hera-		Gerat.	228.	157		Strychnon, vide Solanum.	198 b
clea Diofc. Col. 232 b. Cluf.		Sifyrinchium ejusq; species		Spica celtica 165. Indica 13.		Struthium Lob.	198 b
233. Fracast. 238. montana		40. Cordi	71	Indica fylv.	216	Struthium Lacun. 100. Cord.	100.
Lob.	233 b	Smilax aspera ejusq; species		Spicant vulgo	259	156. quorundam 165. Fuch.	165.
Sideritis latissima Fuch. 98 b.		295		Spica nardus	216	206	
latissima Plinij Gefn. 129.		Smilax arbor Lugd. 245. Ca-		Spina acaciæ Lob. 392. acida		Struthiopteris Cordi	359.
Monpel. 230 b. pratenfe		flor.	505 b	454. alba Cæf. 382 b. Fuch.		Thal.	358
Lugd.	234 a. b.	Smilax hortensis ejusq; spe-		381. Dalech. 386. Lob. 382.		Suber ejusq; species	424
Sigillum Mariae Cæfalp.	187.	cies	339	Lon. 478 b. Matth.	381	Succisa ejusq; species Mat-	thiol.

I N D E X.

thiol. 269. tertia Trag. 127 b	Tertianaria Tab. 246 b	Typha ejusq; species 20. Dio-	330 b. capitulo spumoso
Succudus Avic. 216 b	Terræ glandes Lob. 344 b	scor. 4 b. cerealis Dod. gal.	329. cervinum 320 b
Succus Cyrenaticus 499 b	Testiculus canis 80 b. hirci-	21 b. Portæ 23	Trifolium cochlearum ejusq;
Succi exotici 497 b. planta-	nus 82 b. mulcarius 83. vul-	Tiphium Theoph. 197	species 329. cochlearum c.
rum 493	pinus 82 b. 83	Tit Linscori 320 b	chinatum ibid. b. cornicu-
Sudar Serap. 477	Tetragonia Theoph. 428	Tithymalus ejusq; spec. 290	latum Dod. 331. 332
Sultan Zambach 76	Tetrahit Lob. 233	amygdalus ibid. characias	Trifolium falcatum Cluf. 330
Sumach 414	Tetrorchis 84 b	ibid. cyparissus 291 b. den-	fibrinum Tab. 327. fragife-
Suneg. Egypt. 145 b	Teucrium ejusq; species 247.	droides 290 b. helioscopius	rum Clu. 329. globosum ib.
Superba 209 b. 210	alpinum 248 b. pratense	291 a. b. latifolius 291. lini-	Trifolium hepaticum ejusq;
Surahan 296 b	Lob. 249 b. Trag. 246. 247	folius 291. leptophyllus ib.	species 330 b. maritimum
Sura liquor 509	Thalictum ejusq; species 336	b. lunato flore 290 b. ma-	Cæsalp. 329
Surdæ nuces 417.	angustifolium Tab. 105 b	ritimus 291. fylv. Lon. 307.	Trifolium montanum ejusq;
	Thamecnemon Cord. 204 b	verrucosus Lugd. 291	species 328. oculatum Ang.
	Thapsia ejusque species 148.	Tithymalus tuberosus ejusq;	331 b. odoratum Dod. 331.
	37 b. Alclepiadis Ang. 333	species 292	Fuch. ibid. b.
	Thapfus barbatus 239	Tocot Guebir 430	Trifolium pratense ejusq;
	Theligono affinis Cæf. 309	Tokaun 320 b	species 327. palustre Dod.
	Theombrotum Plinij 121 b	Tomates grana 103 b	ibid. peltatum 329
	Thilicrania Theoph. 447 b	Tomonpute radix 37 b	Trifolium spicatum ejusque
	Thymelæa Ang. 462. Matth.	Tomentum Cord. 263	species 328 b. spinosum 330.
	463. Trag. 462. minor Cor-	Tora Gef. 184	stellatum 329. vesicarium
	di 463	Tordylion Cord. 148. Lob. 101	332 b
	Thuya 488. quarta Lugd. 487	Tormentilla ejusq; spec. 326	Trifolium fruticans Dod. 398 b
	Thalpidium cornutum Tra-	Torna bona Cæf. 169 b	Trinciella Cam. 126 b
	gi 110	Tota bona Lob. 115 b	Trinitas Matth. 330 b
	Thlaspi ejusque species 105.	Toucon Brasileens. 360 b	Trionum Theoph. 317 b
	Alexandrinum 108 b. alte-	Trachelium ejusq; species 94.	Triorchis 83. lutea 84 b
	rum Diofcor. 96 b. alterum	giganteum 95. petreum	Trifolium ejusq; species 267.
	Cratæ 203. alpinum 107	Ponæ 93 b. 94 b. thyrsoi	Diofcor. 149
	Thlaspi Alyfion ejusq; species	des Cluf. 254 b	Trifrago Matth. 248
	ibid. amarum 106. arvense	Tragacatha 388. lacryma 498	Triticospeltum 22
	latis siliquis 105	Tragium Gef. 15 b. Pod. 222	Triticum ejusque species 21.
	Thlaspi clypeatū ejusq; spec-	b. Creticum Bellon. 280 b.	amylæum 22. bafricanum
	ies 107 b. Creticum 108 b	Diofcor. Col. 160. alterum	25. Indicum. ibid. maritimum
	Thlaspi facium 108. hedera-	Diof. Lugd. 216 b. Germa-	Dod. 9. fyl. Cæf. 10. temu-
	ceum Lob. ibid. b. incanum	nicum Dod. gal. 119 b	lentum Lob. 9
	Lob. 108 b	Tragum ejusque species 289.	Triticum vaccinum Trag. 234
	Thlaspi fruticosum ejusque	vulgare Cluf. 98. cereale	Trixago 138 b. Col. 248 b. pa-
	species 108. majus 97. mi-	Trag. 22 b	lustris Ad. 247
	nus 105 b	Tragus Lob. 15 b. herba Cor-	Trollius flos Gef. 182 b
	Thlaspi montanum 105. 106 b	di 283	Trombas 19
	Gef. 203. perfoliatum 106	Tragopogon ejusque species	Trumgibyn 497
	Thlaspi laxatile 107. spino-	274	Tsinavv radix 92
	sum 108. vaccaia folio 105	Tragorchis 82 b	Tubak & Tubacka 169
	b. 106. villosum 106. Ve-	Tragoriganum ejusq; species	Tuba amoris Frag. 276 b
	ronica folio 108 b	223. Clu. 224. nothum Lug-	Tuberaria major Lugd. 465
	Thlaspi umbellatum ejusque	dun. 255 b. praffoides 233.	Tuber Plinij Cæf. 416. Cord.
	species 106	Tragofelinum Tab. 159. 160	446 b
	Thymbra ejusq; species 218	Tragotropon Dod. gal. 27 b	Tupha 441
	Thymus ejusque species 219.	Tranichibil 497	Tubuli ad asthma 19
	latifolium 220. nigrum	Trasi Matth. 14 b	Tuero 148 b
	Taber. 219 b	Traupalus Theoph. 456	Tulipa ejusque species 56. A-
	Thymum magnum Alp. 223 b	Tremula Latin. 429 b	peninea 63 b. bulbifera 63.
	Thysfelinum Plinij Lob. 153 b	Trec 499	dubia 61. flore pleno ibid.
	Thuracine Galeni 123 b	Tribulus aquaticus 194. mi-	folijs hyacinthi 60. min. 63
	Thus terra 249	nor Cluf. 193 b. maritimus	Tulipa præcox ejusq; species
	Thus 501. Judæorum 452 b	Lugd. 288 b. fylv. I. con. 352	57. pumilio 63. ramosa 61
	Thuris arbor 329	b. terrestris Matthioli. 350.	Tulipa ferotina ejusq; species
	Tianco fructus 407	Lugd. 319. 330	60 b. varij coloris 57 b. vi-
	Tibcadi 43 b	Trichomanes ejusq; species	ridis 61
	Tigridis flos Lob. 48 b	356	Tomatle Guil. 167 b
	Tilia ejusq; species 426. mas	Trifolium ejusq; species 327.	Tunal 458
	March. 427	acetosum 330. alpinum Po-	Tunica minima Lugd. 211 b
	Trictorius flos Tragi 267	na 328. Americum 327 b.	Tune ficifera Ad. 458
	Tinus 461	alphaltites 327. aureum	Tunne 457 b
			Yyy
			Tufai

I N D E X.

[illegible]


F I N I S.



ERRATA


Pagina 2, lin. 3. Thab, lege Tab. p. 8. l. 37. SORGHINUM. p. 12. b. l. 36. altera. p. 17. l. 7. Plutarcho. p. 19. b. l. 9. Acorum. p. 21. a. l. 14. Tragus, five Olyra. p. 23. b. l. 23. hist. 7. p. 26. a. l. 39. Triticum. p. 36. l. 18. Actuarium. p. 37. a. l. 25. Costarus. p. 46. a. l. 39. Gallacia. p. 48. b. l. 1. eriophorus. p. 71. b. l. 9. lutei. p. 78. a. l. 18. punctatum. p. 93. b. l. 12. Rapunculus. p. 106. a. l. 4. Crateva. p. 113. l. 29. LAPATHUM. p. 114. a. l. 3. lapathum. p. 119. l. 4. aureum. p. 146. a. l. 2. notas. p. 150. l. 1. staphylino. p. 169. b. l. 42. quia. p. 191. l. 6. Coronopo. p. 193. a. l. 43. prima. p. 216. b. l. 18. ferrata. p. 218. b. l. 1. conferta. p. 220. l. 33. Pélus. p. 222. b. l. 45. hirci. p. 237. b. l. 28. legimus. p. 251. a. l. 41. delectat. p. 288. a. l. 23. Κελύμεν. p. 295. a. l. 5. Orobanche. p. 305. b. l. 26. huic. p. 306. l. 4. Chamæclema. p. 330. a. l. 25. cornuta. p. 334. b. l. 110. fixatilis. p. 344. l. 37. legumen. p. 369. l. 5. pungat. p. 372. b. l. 24. salignus. p. 395. l. 38. in carne. p. 421. b. l. 17. radices. p. 431. l. ultim. gracilium. gravidarumque. p. 446. l. 13. cæpere. p. 473. l. 14. vinearum. pag. 489. l. 41. Orminium. Hujus. Hæc sunt, Lector benevole, sphalmata, quæ sensum turbare possunt. Leviora faciliè condonabis.

47.251




541


1.7.251





543


1.7.251

















Laboratorio S. Agostino, La Spezia
Biblioteca BNC di Firenze
Segnatura: 177.251

Collazione, scucitura e
smontaggio/Spolveratura/Lavaggio H₂O, 35°.
Bagno in soluzione di idrossido di Ca s/satura.
Rinsaldo a pennello Tylose mh 300p 1%.
Rammendo: velo 502, imbrachettatura: carta
giapp. Vang., adesivo Tylose mh 300p al 6%.
Sguardie carta Ingres 20231, struttura F con cotone
pelle uovo. Cucitura su 4 nervi di canapa Barbour a
8 capi con filo di lino n° 35 Barbour. Indorsatura
con tasselli di pelle uovo e pelle allumata scarnita
adesi con tylose mh 300p al 6%. Capitelli cuciti al
centro dei fascicoli alternati con lino Barbour su
canapa a 6 capi sottocatenella, ricamo bicolore in
ritorto fiorentino Cucirini. Piatti in cartone fibrato
accoppiato con tirante e fodera in cartoncino LC.
Incartonatura entro scanalature ad I. Tubo in pelle
uovo e carta giapp. 517 adeso e staffilato sul dorso.
Coperta in pelle di capra a concia mista collata con
Tylose mh 300 al 6%, staffilatura dei nervi.
Compensazione dei contropiatti con cartoncino LC.
Incassatura dell'aletta e guardie a piatto aperto con
Tylose mh 300p al 6%.

Data collaudo 16/12/97
Collaudatore

005644671